四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第六五冊目次

褚氏遺書一卷（南齊）褚澄撰　明刻廣百川學海本　〇〇一

聖濟總録纂要二十六卷（清）程林輯　清康熙二十年黄綺堂刻本　〇〇八

儒門事親十五卷（金）張從正撰　明萬曆二十九年新安吳勉學刻古今醫統正脈全書本　四六〇

褚氏遺書一卷

（南齊）褚澄撰

明刻廣百川學海本

褚氏遺書一卷 浙江范懋柱家天一閣藏本

舊本題南齊褚澄撰。澄字彥道、陽翟人。褚淵弟也。尚宋文帝女廬江公主、拜駙馬都尉。入齊爲吳郡太守、官至左民尙書。事蹟具南齊書本傳、是書分受形本氣平脈津潤分體精血除疾審微辨書問子十篇。大旨發揮人身氣血陰陽之奧。宋史始著於錄。前有後唐清泰二年蕭淵序、云黃巢時羣盜發冢、得石刻棄之、先人偶見載歸、後遺命卽以褚石爲槨。又有釋義堪序、云石刻得之蕭氏冢中、凡十有九片、其一卽蕭淵序也。又有嘉泰元年丁介跋、稱此書初得蕭氏父子護其石而始全、繼得僧義堪筆之紙而始存、今得劉義先鋟之木而始傳云云。考周密癸辛雜識、引其非男非女之身一條、則宋代已有此本。所謂刻於嘉泰中者、殆非虛語。其書於靈樞素問之理頗有發明。李時珍王肯堂俱採用之。其論寡婦僧尼必有異乎妻妾之療、發前人所未發。而論吐血便血飲寒涼百不一生、尤千古之龜鑑。疑宋時精醫理者所著、而僞託澄以傳。然其言可採、雖僞本不可廢也。中頗論精血化生之理、所以辨病源、戒保嗇耳。高儒百川書志列之房中類、則其誤甚矣。

褚氏遺書序

黃巢造變從亂羣盜發人塚墓掘取金寶遇大穴爲方丈餘中環石十有八片形制如槨其盖六石題曰有齊褚澄所歸厝盖棺骨已蛇蟻所穴環石内向文字曉然盜疑兵書移置穴外視之棄去先人偶見讀徹囑鄉鄰愼護明年具舟載歸欲送官以廣其傳遺時兵革不息先人亦不幸遺命異物終當化去神書理難久藏其以褚石爲吾棺槨之石褚石隱則骸骨全褚石或與吾名亦顯淵募能者謁墨治刻百本散之餘遵遺戒先人諱廣字叔常清泰二年五月十九日古揚蕭淵序

褚氏遺書

齊陽翟褚澄彥通編 金嘉會訂

受形

男女之合二精交暢陰血先至陽精後衝血開裹精精入爲骨而男形成矣陽精先入陰血後參精開裹血血入居本而女形成矣陽氣聚面故男子面重溺死者必伏陰氣聚背故女子背重溺死者必仰走獸溺死者伏仰皆然陰陽均至非男非女之身精血散分駢胎品胎之兆父少母老產女必羸母壯父衰生男必弱古之良工首察乎此補羸女先養血壯脾補弱男則壯脾節色羸女宜及時而嫁弱男宜待壯而婚此疾外所務之本不可不察也

本氣

天地之氣周于一年人身之氣周于一日人身陽氣以子中自左足而上循左股左手指左肩左腦横過右腦右肩右臂手指脇足則又子中矣陰氣以午中自右手心通右臂右肩横過左肩左臂左脇左足外腎右足右脇則又午中矣陽氣所歷充滿周流陰氣

上不過腦下遺指趾工氣之行晝夜不息中外必徧一爲痰積壅塞則疢疾生焉疾証醫候紕紕浩繁詳其本源痰積虛耳或痰聚上或積留中遏氣之流艱于流轉則上氣逆上下氣鬱下臓府失常形骸受害暨乎氣本虛弱運轉艱遲或有不周血亦偏滯風濕寒暑乘間襲之所生痰疾與痰積同凡人之生熱而汗産而易二便順利則氣之通也陽虛不能運陰氣無陰氣以清其陽則陽獨治而爲熱陰虛不能運陽氣無陽氣以和其陰則陰獨治而爲厥脾以養氣肺

以通氣腎以泄氣心以役氣凡臓有五肝獨不與在時爲春在常爲仁不養不通不泄不役而氣常生心虛則氣入而爲蕩肺虛則氣入而爲喘肝虛則氣入而目昏腎虛則氣入而腰疼四虛氣入脾獨不與受食不化氣將日微安能有餘以入其虛嗚呼茲謂氣之名理與

平脉

脉分兩手手分三部隔寸尺者命之曰關去肘度人曰尺門前一寸爲寸左手之寸極上右手之尺極下男子陽順自下生上故極下之地右手之尺爲受命之根本如天地未分元氣渾沌也既受命矣萬物從土而出惟脾爲先故尺上之關爲脾脾土生金故關上之寸爲肺肺金生水故自右手之寸越左手之尺爲腎腎水生木故左手尺上之關爲肝肝木生火故關上之寸爲心女子陰逆自上生下故極上之地左手之寸爲受命之根本既受命矣萬物從土而出惟脾爲先故左手寸下之關爲脾脾土生金故關下之尺爲肺肺金生水故左手之尺越右手之寸爲腎腎

水生木故右手寸下之關爲肝肝木生火故關下之尺爲心男子右手尺脉常弱初生微眇之氣也女子尺脉常强心火之位也非男非女之身感以婦人則男脉應胗動以男子則女脉順指不察乎此難與言醫同化五穀故胃爲脾府而脉從脾同氣通泄故大腸爲肺府而脉從肺同主精血故旁光爲腎府而脉從腎同感交合故小腸爲心府而脉從心同以脉爲竅故膽爲肝府而脉從肝澄生當後世傳其言而已爾初決其祕發悟後人者非至神乎體修長者脉疏

形併儒者脉處肥人如沉而正沉者愈沉瘦人如浮而正浮者愈浮未燭斯理曷愈衆疾表裏多名呼吸定至抑皆末也世俗並傳玆得畧云爾

津潤

天地定位而水位乎中天地通氣而水氣蒸達土潤膏滋雲興雨降而百物生化人肖天地亦有水焉在上爲痰伏皮爲血在下爲精從毛竅出爲汗從腹腸出爲瀉從瘡口出爲水痰盡死精竭死汗枯死瀉極死水從瘡口出不止乾即死至于血充目則視明充

耳則聽聰充四肢則舉動强充肌膚則身色白漬則黑去則黄外熱則赤内熱則上蒸喉或下蒸大腸爲小竅喉有竅則咳血殺人腸有竅則便血殺人便血猶可止咳血不易醫喉不停物毫髮必咳血滲入喉愈滲愈咳愈咳愈滲飲溲溺則百不一死服寒凉則百不一生血雖陰類運之者其和陽乎

分體

耳目口鼻陰尻竅也脊股指趾肢也雙乳外腎關也齒髮爪甲餘也枝指旁趾附也養耳力者常飽養目力者常瞑養臂指者常屈伸養股趾者常步履夏臟宜凉冬臟宜温背陰肢末雖夏宜温胸包心火雖冬難熱熱作腫而竅塞血不行而肢廢餘有消長無疾痛附有疾痛無生死關有生死疾痛無消長有消長疾痛生死者疾痛而已

精血

飲食五味養髓骨肉血肌膚毛髮男子爲陽陽中必有陰陰之中數八故一八而陽精升二八而陽精溢女子爲陰陰中必有陽陽之中數七故一七而陰血

升二七而陰血溢陽精陰血皆飲食五穀之實秀也方其升也智慮開明齒牙更始髮黄者黑筋弱者强暨其溢也凡充身肢體手足耳目之餘雖針芥之瀝無有不下凡子肖形父母者以其精血嘗于父母之身無所不歷也是以父一肢廢則子一肢不肖其父母一目虧則子一目不肖其母然雌鳥牝獸無天癸而成胎者何也鳥獸精血往來尾間也精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出内敗小便道澁

而爲淋精已耗而復竭之則大小便道牽疼愈疼則愈欲大小便愈便則愈疼女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而之腫或雖合而難子合男子多則瀝枯虛人產乳衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

除疾

除疾之道極其候証詢其嗜好察致疾之由來觀時人之所患則窮其病之始終矣窮其病矣外病療內上病救下辨病臟之虛實通病臟之母子相其老壯

酌其淺深以制其劑而十全上功至焉制劑獨味爲上二味次之多品爲下酸通骨甘解毒苦去熱鹹導下辛發滯當驗之藥未驗切戒急投大勢既去餘勢不宜再藥修而肥者飲劑豐羸而弱者受藥減用藥如用兵用醫如用將善用兵者徒有車之功善用藥者薑有桂之效知其才智以軍付之用將之道也知其方伎以生付之用醫之道也世無難治之疾有不善治之醫藥無難代之品有不善代之人民中絕命斷可識矣

審微

疾有誤凉而得冷證有似是而實非差之毫釐損其壽命浮栗經二氣篇曰諸瀉皆爲熱諸冷皆爲節熱則先凉臟冷則先溫血脈疾篇曰乾痛有時當爲蟲產餘刺痛皆變腫傷寒篇曰傷風時疫濕暑宿痰作瘧作疹俱類傷寒時人多瘧宜防爲瘧時人多疹宜防作疹春瘟夏疫內證先出中濕中暑試之苓朮投之發散劑吐汗下俱至此證號宿痰失導必肢廢嗟乎病有微而殺人勢有重而易治精微區別天下之良工哉

辨書

尹彥成問曰五運六氣是邪非邪曰大撓作甲子隸首作數志歲月日時遠近耳故以當年爲甲子歲冬至爲甲子月朔爲甲子日夜半爲甲子時使歲月日時積一十百千萬亦有條而不紊也配以五行位以五方皆人所爲也歲月日時甲子乙丑次第而及天地五行寒暑風雨倉卒而變人嬰所氣疾作于身氣

難預期故疾難預定氣非人爲故疾難人測推驗多舛拯救易誤俞扁弗議淳華未稽吾未見其是也曰素問之書成於黃岐運氣之宗起于素問將古聖哲妄邪曰尼父删經三墳猶廢扁鵲盧出盧醫遂多尚有黃岐之醫籍乎後書之託名於聖喆也曰然則諸書不足信邪曰由漢而上有說無方由漢而下有方無說說不乖理方不違義雖出後學亦是良師固知君子之言不求貧朽然於武成之策亦取二三曰居今之世爲古之工亦有道乎曰師友良醫因言而識

變觀省舊典假筌以求魚博涉知病多診識脉屢用達藥則何愧于古人

問子

建平王妃姬等皆麗而無子擇良家未笄女入御又無子問曰求男有道乎澄對之曰合男女必當其年男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁皆欲陰陽氣完實而後交合則交而孕孕而育育而爲子堅壯强壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣蚤洩未完而傷未實而動是以交而不孕孕而不育育而子脆不壽此王之所以無子也然婦人有所產皆女者有所產皆男者大王誠能訪求多男婦人謀置官府有男之道也王曰善未再朞生六男夫老陽遇少陰老陰遇少陽亦有子之道也

褚氏遺書終

聖濟總錄纂要二十六卷

（清）程林輯

清康熙二十年黃綺堂刻本

聖濟總錄纂要二十六卷、浙江巡撫採進本

宋政和中奉敕編。

國朝程林刪定。林字雲來、休寧人。初徽宗御製聖濟經十卷四十二章、又詔集海內名醫出御府所藏禁方祕論纂輯成編、凡二百卷。其書久而佚脫。林購求殘帙、凡得三本、互相補苴、尚闕一百七十三卷至一百七十七卷、不可復見。以其繁重難行、乃撮其旨要、重為纂輯。門類悉依其舊。所闕小兒方五卷、則倩其友項睿補之。仍冠以徽宗原序、大德四年集賢學士焦惠校上序、及校刊諸臣銜名。考晁陳二氏書目、但有徽宗聖濟經、不載是書。觀焦惠序、稱始成於政和、重刊於大定。殆汴京破後、隨內府圖籍北行、南渡諸人、未睹其本歟。今未見其原書。然宋代崇尚醫學、搜羅至富、就所採錄古來專門授受之方、尚可以見其大略。其每類冠論一篇、亦皆詞簡而理明、均足以資考訂。原本之末有神仙服餌三卷、或言烹砂煉石、或言嚼柏咀松、或言吐納清和、或言斬除三尸。蓋是時道教方興、故有是妄誕。林病其荒誕、一概汰除、惟約取其尋常頤養之藥三十餘方、其別擇具有條理。故所錄諸方多可行用、與膠執古法者異焉。

新安程雲來先生輯纂

聖濟總錄

賴古堂書

[illegible]

[illegible]張景岳全書[illegible]

寶翰堂藏板

序

醫之道在隱顯而功侔造化始於神農黃帝之世其後學者相師延其術無成書歷唐虞三代二千有餘歲大和保合民不夭札物無妒傷及乎春秋戰國王迹寢衰人與天地正氣隔閡而風寒暑溼燥熱相運行於營衛經絡之中乘情

欲食飲居起罷勞而爲之
疾於是秦越人倉公扁鵲
淳於意者各以其術顯而
素問靈樞甲乙之書因以
出然其高者猶爲導引吐

納治之於未始有病之先
葢人之身陰陽合象而爲
氣清者曰氣濁者曰血血
之大隧謂之經經之首曰
衝其次曰督曰任其次曰

蹻皆先天隧道卯而通之
可以長生左右手足三陰
三陽諸經皆後天隧道卯
而調之可以已病平臍居
腰而約束一周者帶也是

爲兼統先後天之隧道卯
而行之可以出入生死故
帶衝督任蹻五經者不病
其病則手足經病經病乃
移注五經而陰陽十二經

又有系絡之數三百六十
有五其隧穴六百四十有
七能通其道而治之則醫
之神祕盡矣宋政和間有
聖濟總錄彙斠禁方祕論

凡二百卷再刻於金元實
醫學之河海爲時方所掩
者迄今湮沒四百餘年矣
吾鄉程子雲來從其從祖
敬通先生繙閱是書有年

因思全書浩瀚有不切於
治者遂纂其精要得二十
六卷詳在凡例中刻之廣
陵以行世而問序於余乃
作而歎曰是其道在隱見

而功侔造化者乎昔者黃
帝與浮丘公鍊丹黃山其
處即名鍊丹臺雲來之先
有松厓先生讀書其上獲
遇至人洞抉道奧用之醫

藥人皆謂神丘文莊公嘗以異人稱之今雲來生長黃山而僑居武林又嘗從敬通先生遊其有得於古今之書與夫至人之所口

授而闕之於世者無不動見於發用之機其睟然面背類有道者著釋甚多此其一也雖然醫之道有要焉逆與順是也升降浮沉

則順之寒熱溫涼則逆之如操舟者知江河之險易與風水之動靜而順逆其道尠不克濟余故以前人之所著書如李時珍之本

草綱目王肯堂之證治準繩張景岳之類經素問與是書皆有功於天地人物眞醫學之河海也顧世之能用變而通其方者鮮矣

方也者方舟也竝舟謂之
方所以濟川者也然則雲
來氏之所以纂聖濟總錄
之要者其不亦爲醫學之
方舟以濟人於河海也哉

是爲序

康熙辛酉孟冬上浣同里
年家眷弟洪琮拜譔





序

醫者意也古人多不肯著
書然肘後禁方又無不神
驗者書果可盡廢乎哉歷
攷載藉以來藝文所志軒

岐家言無慮數十百種要
皆通人畸士卓然有傳世
之識而後發爲文章挼部
就班處方立案嘉惠來學
其道與六經相表裏近世

學者狃於所聞守師承執一之見其言固陋而不能以相通自誤誤人獘至莫可紀極無他讀書不博見道不眞用心不廣坐是三

者而醫道或幾於熄余戚友程雲來氏鄣山世胄也少從其叔祖敬通先生講越人之術先生道高望重名滿天壤雲來與之遊處

者十餘年盡得其眞傳秘授又其先明初有松厓公者以名進士起家一代偉人精星象奇門岐黃術著有醫案等書雲來皆宗法

之故於方書無所不讀研窮考究殫精竭思以與古遇出而仁民利物稱國工鉅手焉歲辛酉余遊維揚邂逅雲來於廿四橋頭蓋

方以校訂聖濟總錄一書留此者幾一載矣既而向余曰是書始末甚異幸爲我序而傳之余覽其發凡而觀其用心雲來之不朽無疑也夫雲來以名家子負才倜儻博奥多奇間以餘情溢爲圖篆繪事得異人授内養辟穀顏如渥丹至生平醫道所入輒梓所

著諸書不名一種散布人間藏之者若寶籙然挾此才技安往不足以垂名立教而顧以是書爲斤斤其立心誠欲利濟天下如范文正所云不爲良相即爲良醫是宜不朽者一雲來得讀是書刻本於敬通先生所又三十餘年之久始從友人江子鄞上再覯抄

本遂慨然有剞劂之志而不欲自專其美推原究極詳著師友之淵源是宜不朽者二且是書自宋徽宗政和年間詔集海內名醫

出御府所藏禁方秘論纂輯成編非人世所恒見閱年既久湮漫隨之雖再刻於金大定三刻於元大德重以耶律楚材之論定頒

行終無解於若滅若沒之數非雲來孰能表章及之者是宜不朽者三雲來以三不朽之盛心又慮卷帙之繁重於是刪訂收束以

便行篋之可攜知古今之不一其宜也於是酌損裁成以定規條於可守鴻編鉅典恃有雲來爲之發皇矣雖然醫者意也書不可

盡廢而亦不可徒泥陳言
顧用之何如耳如或守一
偏之見而不知變通雖日
誦是書復將奚益又當進
求雲來自著之心傳而後

可也
康熙辛酉年八月既望同
邑年家眷弟吳山濤頓
首拜題

政和聖濟總録序　宋徽宗御製

生者天地之大德疾者有生之大患方術者治病之大法
昔者神農氏黄帝氏獨觀太初洞竅獨妙有味百藥以辨物
辯有疾以全生其制名其取類其正君臣其立佐使其見
於太素玉冊之書雷公岐伯之門著皆闡神明之蘊窮陰
陽之變原性命之理而與天地同其覆載中古以還鏤之
玉版藏之金匱功利及草木惠澤被牛馬所以遺天下後
世甚厚歷年既久流弊滋甚淆舛具在而精意不傳內經
有病名而莫之究有治法而莫之習極其妙至於通仙而

莫之悟人之生也其位參於天地其靈貴於萬物形不盈
仞而心侔造化崑崙尺宅修之可以長生寸田神牖闢之
可以反照天闕神廬息之可以名和去土符書金格鍊丹
却粒御氣凌虛不假於物而裕然自足嗟夫達士可以神
解昧者且不能養其形而況於了其心乎內之五臟六腑
外之九竅四關著之於色發之於聲寓之於三部九候一
失其平則疾病噬神聖治於未兆工巧救其已然非天下
之至精孰能探天下之至賾非天下之至粗孰能施天下
之至神朕惻大道之鬱滯流俗之積習斯民之沈痼庸醫

之妄作學非精博識非悟解五行之數六氣之化莫索其隱莫擬其遠曰寒曰熱曰寒熱之相搏差之毫釐失以千里而有餘者益之不足者損之率意用法草石雜進夭枉者中可勝嘆哉萬幾之餘著書四十二章發明內經之妙曰聖濟經其意精微其旨邃遠其所言在理所以探天下之至賾又詔天下以方術來上并御府所藏頒之為補遺一卷治法一卷卷凡二百方幾二萬以病分門門各有論而序統附焉首之以風疾之變動終之以神仙之服餌詳于鍼俞究經絡祝由符禁無不悉備名之曰政和聖濟總

錄其所載在事所以施天下之至神蓋聖人之賦世本在於上末在於下無見於上則治之道不立無見於下則治之具不行經之所言者道也醫得之而窮神總錄之所載者具也醫用之而已疾漢張仲景作傷寒論而雜之以方唐孫思邈作千金方而繹之以類以謂不如是則世莫能用其術然之二人者游於方術之內者也彼超然獨見於方術之外下續岐伯之流而與之處始可謂知道㪅作總錄於以急世用而救民疾亦斯道之荃蹄云耳天下後世宜致思於忘荃蹄而自得者俯仰之間嚬笑之處御五行

之數運六氣之化以相天地以育萬物至於反營魂而起當生者豈細事哉蓋將有來者焉

大德重校聖濟總錄序

臣聞天地以濟生爲大德所以曲成萬物而不遺聖人贊天地之化育故斂時五福以敷錫於庶民夫民之爲物也智者寡愚者衆起居失常食飲無節外爲寒暑燥濕風以賊其形內爲喜怒思憂恐以亂其氣形氣乃傷疾所由作聖人有憂之謂視由不可以盡已也遂制藥石鍼艾以攻八風六氣之邪爲湯液醪醴以佐四時五行之正防其未然救其已病然後物各遂其生民不夭其命矣又謂非立憲言不可以福萬世也於是上法天道下因地宜究陰陽

之本明生死之由考於古而驗之今取諸已而施之人定爲成書著之玉版藏之金匱宜之於布政之堂秘之於靈蘭之室以俟來哲以施無窮其爲仁民愛物之心斯可謂極矣然其言至簡其論至要其理至深後世學者雖有上智非研精殫慮則亦未易窺其奧也故歷代之中能以斯術鳴世者將固有之若夫神聖工巧獨得先世不傳之秘如和緩越人亦不過十餘人而已況去聖已遠支分派別析而爲衆科業而爲專門所以人各拘其偏而莫肯究其全則益不逮於古矣積習成常流弊兹甚懼大道將遂於湮微故聖濟總錄由是而作爲上下凡二百餘卷始終幾二百萬言逐病分門門各有方據經立論論皆有統若將使讀之者觀論以求病因方以命藥則世無不識之病病無妄投之藥唯法有逆從治有先後在乎智者擇其所當從其所宜而已究而言之實醫經之會要學者之指南生民之司命也惜其始成於政和重刊於大定旣綿歷百年之久不能無亥豕之訛

今主上神極御天

修節制度治具畢張

以謂是書所載紐先聖之緒餘其所以康濟斯民亦致治之一助也迺

詔江浙行省刊於有司布之天下其或繆戾隨加釐正復

降

勅臣俾下臣爲之序引臣誠愚陋竊不自量仰惟

聖德如天

甄陶萬類爰自

即位以來于今七年

恩浹飛沈

仁及草木然猶
夙夜孜孜
廣求民瘼或一物不得其所則必
爲之惻然臣謂此書發出則上可以輔相天地之宜下可
以永庇烝民之生物無疵癘咸躋於仁壽之域矣
大德四年二月一日集賢學士嘉議大夫典瑞少監臣焦
養直謹序
方技之書尚之久矣聖人治世亦所不能後者也若夫黄
帝內經神農本草秦越人之八十一難經仲景之三百九

十七法王叔和之脉訣朱奉議之活人固在所勿論其餘
千方萬論歷世所傳誠不爲不多然得其全者或寡矣故
近代諸書猶不若聖濟總録之詳且備也
聖主以至仁爲心
勤卹民隱所以首
命板行之於天下非推重下民今日之命蓋將有開於先
而覺於後也書曰賛賛襄哉夫是書之行也雖本於
上意之所注其所以始而終之者亦近臣有以贊襄之也
故凡與斯議者并附於左

醫愈郎諸路醫學副提舉臣申甫
醫効郎御藥院副使臣王希逸
承直郎太醫院判官臣和思誠
奉訓大夫太醫院判官臣問 有
朝列大夫太醫院副使臣王 佐
集賢直學士朝列大夫太醫院副使臣歐陽懋孫
中順大夫太醫院使臣韓公麟
少中大夫同提點太醫院事臣汪 斌
嘉議大夫提點太醫院事臣麻惟繇

正議大夫同僉樞密院事左衛親軍都指揮使提點太醫院事臣鄭忙古歹
昭文館大學士正奉大夫提點太醫院事臣李邦寧
榮祿大夫平章政事大都護提點太醫院事臣旋丙納

江浙等處行中書省大德三年九月

內欽奉

聖旨刊造大德重校聖濟總錄至大德四年二月內畢工

今具在局提調官於後

正議大夫杭州路總管兼管內勸農事臣梁曾

中順大夫江南浙西道肅政廉訪副使臣商晦

嘉議大夫江南浙西道肅政廉訪使臣田滋

中奉大夫前江南浙西道肅政廉訪使臣徐琰

嘉議大夫簽江浙等處行中書省事臣奪兒只哥

正奉大夫江浙等處行中書省參知政事臣安祚

聖濟總錄纂要

凡例

一是書宋徽宗政和詔集海內名醫併出御府所藏彙成共二百卷禁方秘論人所未聞按病治療無不奇驗厥後再刻於金大定三刻於元大德自耶律楚材精較奉詔頒行天下越今四百餘年無有剞劂此書幾幾泯滅矣余昔從先叔祖敬通夫子緒聞刻本今經三十餘年又從友人江邨上再覩抄本據今追昔不勝愉快邨上請余刪繁纂要以便梓行濟世因留淮揚一載纂其精粹去其繁蕪共得二十六卷誠醫家之雲笈瓊函方藥

中之赤文綠字也博覽者知之

一大德重較聖濟總錄元朝奉詔頒行者大板大字每卷首篇署元耶律楚材五字明朝武林高相國家抄本用綿紙硃格繕寫精工亦依內府式大板大字今刻小板密字以便行笈可攜撿方療病也

一是書方法淵奧博學究心者方能領會如虛勞紫雪方有追攝義霍亂青金散有坎奇義熱痢黃連湯有反佐義用之皆取效如神至若調七傷平五志攻六氣理三

因方中有參附而用補黃者有桂附而用芩連者必須熟諳古人方經庶幾領會方法之妙也

一書中婦人門選其胎前産後帶漏崩中小兒門選其急慢驚風五疳吐瀉若一切雜症與大人治法不殊於大人方中推類酌量用之

一書中運氣集定六十年每年可按素問稽查茲不刻

一書中鍼灸四卷符禁三卷古法不易行乳石發動二卷今人罕此患又食治三卷藥食不合宜俱不刻

一方中難得藥品如金牙銀牙礜石莽草之類不刻難合之方廢時日而不能應倉卒急需者亦不刻

一方中藥名仍從原本如天麻爲赤箭牛蒡爲惡實又爲鼠粘甜桔梗爲薺苨山梔爲越桃柴胡爲茈胡土茯苓爲菝葜香附爲莎草根薄荷爲鷄蘇砂仁爲縮砂蔤花粉爲栝樓根輕粉爲膩粉如此之類不能更改

一方中分兩古法難用今欲更改又失古人之意大約方中一兩今用一錢方中一分去聲係二錢五分今用一字二分半一匕有半錢至五錢者在人以意消息加減可也

一是書成於北宋其時四大家未生劉河間李東垣張子和朱丹溪無一

切活套應時方法補中益氣逍遙歸脾之類四物四君之類醫家遇沉疴痼疾疑難奇異等證用時方而不奏効良工亦束手者是書有神方也

一聖濟經四十二章發明靈素精微鉤玄索隱補聖經之未備家有藏本嗣刻行世

康熙辛酉桂月　靜觀居士程林雲來氏識於淮陰翕順堂中

聖濟總錄纂要目錄

卷一　甲集

諸風門 統論

中風　卒中風　肝中風

心中風　脾中風　肺中風

腎中風　癱緩俗名癱瘓　風嚲曳

四肢拘攣不得屈伸　風痙

角弓反張　中風失音　中風舌强不語

風口噤　風口喎　破傷風

偏風　風偏枯　肉苛即肌肉不仁

歷節風　中風百節疼痛　風走注疼痛

白虎風　風不仁　風瘙癢

風瘖癗　風瘙癮疹

卷二　乙集

諸風門

蠱風　肌肉瞤動　風癩

風癇　風狂　腦風

風頭眩　風頭痛　偏頭痛

漏風　勞風　風頭旋

風痰　胃風　風秘

癧瘍風　白駁　白癜風

紫癜風　惡風　大風眉鬚墮落

大風出虫　大風癩疾　烏癩

白癩

諸痺門 統論

痛痺　著痺　行痺

皮痺　肌痺　血痺

脉痺　筋痺　骨痺

腸痺　周痺　痺氣

熱痺

卷三

傷寒門 統論

傷寒可汗　傷寒可下　傷寒可吐

傷寒可溫　傷寒過經不解

中風傷寒　傷寒濕溫　傷寒時氣

傷寒疫癘　傷寒結胸　傷寒譫語

傷寒潮熱　傷寒煩渴　傷寒煩躁
傷寒厥逆　傷寒頭痛　傷寒喘
傷寒上氣　傷寒咳嗽

卷四　丙集

傷寒門

傷寒乾嘔　傷寒嘔噦　傷寒心悸
傷寒痞滿　傷寒霍亂　傷寒小便不通
傷寒大便不通　傷寒下利
傷寒陰毒　傷寒陽毒　傷寒發斑
傷寒發黃　傷寒發豌豆瘡　傷寒發狂
傷寒剛痓　傷寒柔痓　傷寒壞病
傷寒狐惑　傷寒百合　傷寒陰陽易
傷寒鼻衄　傷寒吐血　傷寒瘀血
傷寒口舌生瘡　傷寒舌腫脹
傷寒咽喉痛　傷寒毒攻手足
傷寒後夾勞　傷寒後勞復
傷寒後骨節煩疼　傷寒後虛煩
傷寒後盜汗　傷寒後驚悸

傷寒後失音不語　傷寒後咽喉閉塞不通
傷寒後變成瘧　傷寒後腳氣
傷寒後下利膿血　傷寒後惡瘡
辟瘟疫令不相傳染

卷五

瘧疾門 總論

寒瘧　溫瘧　寒熱往來瘧
癉瘧　間日瘧　痎瘧
痰瘧　勞瘧　久瘧
鬼瘧　瘧母　瘧疾發熱身黃
瘧痢　瘴氣　瘴瘧

中暍門 總論卽暑病

中熱暍　中熱悶絕

霍亂門 總論

霍亂吐利　霍亂嘔吐不止
霍亂四逆　霍亂心腹痛　乾霍亂
中惡霍亂　霍亂乾嘔　霍亂轉筋

卷六　丁集

泄痢門 統論
水瀉 濡瀉 飧瀉
洞瀉寒中 鶩溏 白滯痢
冷痢 熱痢 赤痢
血痢 膿血痢 赤白痢
氣痢 休息痢 蠱痢
久痢 下痢裏急後重
痢後脫肛 疳䘌 濕䘌 二證皆久痢所成

卷七

咳嗽門 論
咳嗽 暴嗽 久嗽
冷嗽 熱嗽 呷嗽
五臟諸嗽 咳嗽上氣 咳嗽吐膿血
咳嗽失聲 風冷聲嘶
諸氣門 統論
諸氣 上氣 上氣喉中如水雞聲
短氣 陽厥
積聚門 統論
積聚 肥氣 伏梁
痞氣 息賁 賁豚
諸瘕 結瘕 痃氣
酒癖

卷八

失血門 統論
吐血 吐血不止 嘔血
唾血 舌上出血 汗血
鼻衄 衄不止 大衄

衄衊 衊爲汗血
腳氣門 統論
風毒腳氣 腳氣痺攣 腳氣疼痛不仁
腳氣上氣 腳氣腫滿 腳氣心腹脹滿
腳氣衝心 腳氣語言謇澁 乾濕腳氣
腳氣變成水腫 腳氣大小便不通
江東嶺南瘴毒腳氣 腳氣雜治膏藥淋渫

卷九 戊集

膈氣門 統論

五種膈氣　膈氣咽喉妨塞　膈氣不下食
膈氣痰結
嘔吐門 統論
嘔吐　乾嘔
痰飲門 統論
痰癖　支飲　留飲
冷痰　熱痰　膈痰結實
膈痰風厥頭痛
消渴門 統論

消渴　消渴煩躁　消渴小便白濁
久渴　消渴後成水　消渴後成癰疽
消中　消腎
卷十
水病門 統論
水腫　十水　風水
石水　大腹水腫　水腫欬逆上氣
水氣偏身腫滿　水蠱　膜外氣
卷十一
黃疸門 統論
黃疸　急黃　陰黃
酒疸　穀疸　胃疸
黑疸　女勞疸　黃汗
三十六黃
胸痺門 統論
胸痺　胸痺噎塞　胸痺心下堅痞急
胸痛
卷十二

心痛門 統論
心痛　卒心痛　久心痛
肝心痛　脾心痛　胃心痛
腎心痛　厥心痛　九種心痛
停飲心痛　蟲心痛　冷氣心痛
中惡心痛　惡注心痛　心掣
心腹門 統論
心腹痛　腹痛　久腹痛
腹脹腸鳴切痛　腹內結強

䐜脹　胠脹　脅痛
息積
腰痛門 統論
腰痛　卒腰痛　風濕腰痛
腰痛強直不能俛仰　腰脚冷痺痛
卷十三　巳集
虛勞門 統論
肝勞　心勞　脾勞
肺勞　腎勞　冷勞

熱勞　氣勞　急勞
風勞　虛勞咳嗽　虛勞痰飲
虛勞寒熱　虛勞潮熱　虛勞盜汗
虛勞咳唾膿血　虛勞嘔吐血
虛勞不得眠　虛勞失精　虛勞便溺
白淫　筋極　氣極
脉極　肉極　骨極
精極
卷十四

骨蒸傳尸門 統論
虛勞五蒸　骨蒸肺痿　傳尸骨蒸
傳尸勞
諸疝門
寒疝　心疝　厥疝
寒疝心腹痛　七疝　蠱病
陰疝　陰疝腫縮　陰疝卒腫痛
控睾
卷十五

大小便門 統論
大小便關格不通　小便不通
小便不禁　小便多利　小便出血
大便秘澁　大便不通　結陰便血 詳痔門 腸風下血
諸淋門 統論
卒淋　冷淋　熱淋
氣淋　血淋　膏淋
石淋　勞淋
九蟲門 統論

九蟲　蚘蟲　寸白蟲
蟯蟲　五臓蟲　三蟲
諸尸門統論
諸尸　遁尸　飛尸
尸注
諸注門統論
諸注　風注　走注
鬼注　氣注　卒魘不寤
中惡　卒死　尸厥

鬼魅　鬼擊
卷十六　庚集
臓腑虚實門
肝臓
肝脹　肝氣逆面青多怒
膽腑
膽虚　膽實　膽虚不眠
膽熱多睡　膽癉口苦
心臓

心中寒　心健忘　善笑
小腸腑
小腸虚　小腸實
脾臓
脾癉口甘　穀勞
胃腑
食亦　胃反　噦
噫醋吞酸　胃寒腸熱　胃熱腸寒
肺臓

肺消　膈消　肺痿
肺痿咽燥　肺痿小便數　肺癰
肺癰喘急胠滿
大腸腑
腸垢　伏瘕
腎臓
腎虚　腎實　腎脹
解㑊　瘖俳　腎虚陽痿
腎虚多唾　骨虚實　髓虚實

膀胱腑
胞痺　胞轉
卷十七
面體門
面皯黯　面皯皰　面皴皰
面皴　面體疣目　狐臭
滅瘢痕
髭髮門統論
烏髭　榮養髭髮　鬚髮黃白
白禿　赤禿
眼目門統論
肝虛眼　肝實眼　目胎赤
目赤痛　目熱碜痛赤腫
目赤爛　目血灌瞳人　赤脉衝貫黑睛
墜睛　蟹目　目珠突出
目見黑花飛蠅息肉淫膚　目生努肉
目內生瘡　目膿漏　目生珠管
雀目　目瞼垂緩　目瞼腫硬

倒睫拳攣
卷十八
眼目門
目生膚翳　目生花翳　目青盲
將變內障眼　目昬暗　眯目
鍼眼開偷鍼
耳病門統論
耳聾　風聾　勞聾
五聾　耳聾有膿　耳虛鳴
耳耵聹　聤耳　百蟲入耳
鼻病門統論
鼻塞氣息不通　鼻塞不聞香臭
齆鼻　鼻中生息肉　鼻淵
鼻流清涕　鼻中生瘡　疳蟲食鼻生瘡
卷十九　辛集
口齒門統論
口瘡　口糜　口吻瘡
口舌生瘡　口臭　脣瘡

唇生核　重舌　舌腫强
牙齒歷蠧　牙齒疼痛　齒悪
虫蝕牙齒　腎虛齒風痛　齒風腫痛
齒齗腫（骨槽風附）　風𤻲　齒間出血
齒䘌　牙齒動揺
咽喉門（統論）
咽喉閉塞不通　喉痺　走馬喉痺
咽喉生瘡　尸咽喉　咽喉中如有物妨悶
骨鯁　誤吞諸物

癭瘤門（統論）
五癭　諸瘤
瘰癧門
瘰癧結核　瘰癧寒熱　瘰癧久不差

卷二十

癰疽門（統論）
附骨癰　附骨疽　乳癰
腸癰　胃脘癰
瘡腫門（統論）

諸瘡　諸惡瘡　反花瘡
浸淫瘡　下注瘡　冷瘡
月蝕瘡　凍爛腫瘡　瘑瘡（即震稟瘡）
漆瘡　湯火瘡

卷二十一　壬集

瘡腫門（統論）
丁腫　諸疥　癬瘡
代指（即天蛇頭）　丹毒　㾦瘡
肉刺（即鷄眼睛）

金瘡門（統論）
金瘡血不止　金刃傷中筋骨
金瘡中風水痙　金刃腸出
毒箭所傷　箭鏃金刃入肉
狐尿刺　惡刺　竹木刺傷肌肉不出
痔瘻門（統論）
諸痔　牡痔　牝痔
脉痔　血痔　腸痔
氣痔　痔瘻　腸風下血

傷折門 統論
從高墜下傷損腫痛　傷折惡血不散
筋骨傷折疼痛　傷折風腫
卷二十二
傷折門
打撲損傷　被傷絕筋　諸骨蹉跌
傷損止痛生肌　傷折貼熁并膏藥
雜療門
中藥毒　食毒　食諸菜蕈菌中毒

飲酒中毒及大醉不解　牛馬猪犬魚蟹毒
解金銀銅鐵石毒　中蠱毒
狗咬　蛇螫　蠍螫
蜂螫　蜘蛛咬　蜈蚣咬
溺水死　自縊死
卷二十三
婦人門 統論
月水不通　月水不斷　月水不來腹痛
室女月水不通　帶下　漏下

經血暴下 附血崩　經血暴下兼帶下
血分　水分　無子
妊娠門
妊娠惡阻　妊娠漏胎　妊娠胎動下血
妊娠胎萎燥　妊娠胎不長養
妊娠嘔逆不下食　妊娠咳嗽
妊娠傷寒　妊娠下痢　妊娠子淋
妊娠浮腫　妊娠小便不通
妊娠大小便不通　妊娠半產

妊娠數墮胎
卷二十四　癸集
產難門
逆產　難產　子死腹中
息胞 卽胞衣不下
產後門
產後血暈　產後語言妄亂
產後中風　產後中風口喎
產後中風角弓反張　產後蓐勞

產後大便不通
產後乳汁不下
產後妬乳
產後乳結核
產後乳癰
卷二十五
小兒門
小兒初受氣法
小兒相法
小兒浴法
小兒口噤
小兒撮口
小兒鵝口
小兒重腭
小兒臍風
小兒解顱
小兒顖陷
小兒急驚
小兒慢驚
小兒天瘹
小兒門
小兒諸疳
小兒無辜疳
小兒哺露丁奚
小兒嘔吐
小兒欬 吐哯
小兒泄瀉
小兒洞泄注下
小兒燕口瘡
小兒語遲
小兒齒不生

小兒涎液不收
卷二十六
神仙服餌門
神仙服草木藥石
補益門
平補
峻補
補虛益氣
補虛益精髓
補虛固精
補虛壯元陽
補虛理腰膝
聖濟總錄纂要目錄 終

聖濟總錄纂要卷之一

程　林雲來　纂
黃家珮鏘鳴
新安　吳汝漸非止　較
許承家師六
江　湘郢上　閱

諸風門

中風　卒中風　肝中風　心中風
脾中風　肺中風　腎中風

諸風統論

論曰易曰撓萬物者莫疾乎風夫以吹噓鼓舞奧而易入枯者榮者成物之功實在於是然而分四時位八方適應其時則爲正弗循其方則爲邪人惟萬物之靈能察諸此覩冬至之日有從南方來必曰賊風其他可類推矣感之淺者留於肌膚感之深者達於骨髓而況倉卒頃刻之間大可畏懼因有治療所不逮者蓋禍患之機藏於細微非常人所豫見及其著也雖智者不能善其後是以上古聖人之教下皆謂之虛邪賊風避之有時不然何以言風者百病之始風者百病之長風者善行而數變先聖之言可深思之

中風

論曰風邪中人以春甲乙得之爲肝風以夏丙丁得之爲心風以季夏戊己得之爲脾風以秋庚辛得之爲肺風以冬壬癸得之爲腎風若中其五臟六腑之俞則各隨其證而治之人生自幼稚至於老耄率多因風而致疾或嗜食傷飽或不食失飢或渴而失飲或飲而過量或因五味之傷或因熱衝風或大寒近火或暴露寒淫或刺損肌膚撲

傷肢體或失節安或多嗜慾緣此風邪趨諸竅或留一偏遂使手足不隨言語蹇澀或痛連骨髓或痺襲皮膚瘙痒如蟲行痛痒如錢在或多痰好睡或徒忘多嗔血脉不行肉色乾瘦久在床枕起便須人語澀面浮精神困耗皆其證也

附子湯方　治中風欲死身體緩急目不得開舌強語澀

附子（破去皮臍製一枚）　芍藥　甘草　麻黃（去根節先煎掠去沫焙）　白朮（各一兩）　防風（去叉）　防己（各一兩半）　人參　黃芩（去心）　桂（去皮）　獨活（去蘆）　芎藭（各一兩）　天雄（炮製去皮臍一枚）

右一十三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半分切煎至八分去滓空心日午夜臥各溫服如人行五里以熱生薑粥投之微汗出慎外風

麻黃湯方　治中風肢體弛緩言語蹇澀精神昏憒

麻黃去根節先煎掠去沫焙三兩　桂去麤皮　獨活去蘆　羚羊角鎊各三分　萎蕤切焙一兩　葛根剉三兩　升麻　防風去叉各一兩半　石膏碎六兩　甘草炙剉三分

右一十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服如人行五里再服用熱生薑稀粥投汗出

慎外風

薏苡仁湯方　治中風肢體緩縱精神恍惚言語蹇澀

薏苡仁一兩半　萎蕤焙切　茯神去木各二兩　犀角鎊二兩　烏梅去核七枚　麥門冬去心焙三合

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分切煎至八分去滓入竹瀝白蜜各少許再煎三五沸食後日午夜臥各一服

吐痰白礬散湯　治初中風失音不語昏昧不知人先宜吐風痰令省覺次可服諸湯散

白礬生用二兩　生薑一兩連皮擣碎水二升煎取一升二合

右二味先細研白礬如末入濃煎生薑湯研濾分三服旋旋灌須臾吐出痰毒眼開風退方可救治若氣衰力弱不宜猛性藥吐之

防風湯方　治中風不語兩目不開手足抽掣發歇往來昏塞涎潮

防風去叉　羚羊角鎊　獨活去蘆　赤箭即天麻苗無以天麻代之　當歸切焙　麻黃去根節　杏仁湯浸去皮尖麩炒　桂去麤皮各一兩　前胡去蘆　秦艽去苗　甘草各半兩

右一十一味麤擣篩每服四錢匕以水一大盞生薑半分切煎至七分去滓不計時溫服

取涎丸方　治中風不語喉中如拽鋸口中沫出

天南星大者一枚去浮皮剜中作坑入醋令八分滿四面用火逼令醋乾黃色剉　藜蘆一分

右二味擣研爲末用麪糊丸如梧桐子大每服三丸溫酒下良久吐出痰涎爲效吐不止用冷葱湯呷即止

羚羊角丸方　治中風手足癱瘓行步艱難

羚羊角屑一兩　桂去麤皮　白檳榔剉　五加皮剉　杏仁去皮尖炒黃　人參　丹參　柏子仁　枳殼去瓤麩炒　附子

製炮去皮臍各兩半 茯神去木 防風去叉 熟乾地黃焙 麥門冬去心焙各二兩 南木香 牛膝酒浸切焙各一兩 薏苡仁二兩半

右一十七味擣羅極細錬蜜爲丸梧桐子大每服空心溫酒下三十丸日二

卒中風

論曰內經謂邪風之至疾如風雨言邪之迅速如此卒中風之人由陰陽不調臟腑大虛氣血衰弱榮衛乏竭故風之毒邪尤易乘間致仆倒悶亂語言蹇澀痰涎壅塞肢體痛痺不識人事者此證也

奪命散方 治中風卒倒不省人事口面喎斜失音不語但吐涎沫或口噤不開目瞑垂死一切風疾

黑豆一合 烏鷄糞 馬牙硝研 龍膽去蘆頭剉碎一分

共四味先將鷄糞及豆同炒熟次入龍膽馬牙硝拌勻以酒三盞煎二盞去滓分三服不拘時候溫服

救生散方 治卒中風

白礬 半夏 天南星三味等分

同爲細散每服以好酒一鍾藥末二錢匕生薑三片煎七分通溫灌之當吐涎扶令正坐經一復時不得令臥如臥則涎難出良久再依法煎藥一錢後常服只半錢

竹瀝飲方 治卒中風倒悶口噤不能語昏不知人鍼不如痛

竹瀝五合 防風 甘草 桂各一兩 防己 麻黃 白术 人參 黃芩 細辛 芍藥 秦艽去土 附子去皮臍各一兩 生薑三兩焙乾 除竹瀝外剉如麻豆每服五錢匕水一鍾半竹瀝一合同煎至一盞去滓溫服不拘時

羗活湯方 治卒中風悶亂語言蹇澀牙關緊急

羗活 桑根白皮 麻黃 天雄去皮臍 當歸各二兩 桂 旋復花炒 遠志各一兩 大腹皮 甘草 芎藭 威靈仙 枳殼去瓤麩炒 菖蒲各一兩 杏仁二十一枚湯浸去皮

剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎至八分去滓溫服不拘時

阿膠丸方 治臟腑久虛氣血衰弱卒中風邪及癱緩等疾

阿膠炙令燥 蠣殼去土 犀角屑 麝香三錢 白花蛇二分 桂一兩 白鮮皮 白殭蠶炒 天南星 半夏酒浸三日麩炒 天麻 桔梗 黃芪 當歸 羗活 虎頭骨酥炙

海桐皮 白芷 白茯苓 附子(去皮臍) 防風(去叉) [illegible]
麻黃(各一兩) 乾蠍(去尾用糯米炒焦十一枚) 人參 没藥(各半兩)
木香(一兩) 羚羊角屑(半兩) 乾薑(四錢五) 烏蛇(酒浸去皮骨二分)
共細剉焙乾擣爲末錬蜜爲丸如彈子大每服一丸
生薑酒嚼下中風甚者拗開口或先以藥嗅化藥灌
下一丸立省

牛黃丸方 治卒中風仆倒悶亂語言蹇澀涎痰壅盛
牛黃 盧會 天竺黃 血竭 没藥 丹砂(研俱) 鐵
腦子 皂莢灰(各半兩) 丁香 木香 乾蠍(去土炒)

粉霜 雄黃 甘遂(各一分) 麝香(二錢) 肉豆蔻(二枚)
檳榔(二枚) 龍腦(一字)
共擣羅爲末每抄藥末四錢入輕粉三錢再研勻麪
糊爲丸如黍米大每服五丸金銀薄荷湯下隨大小
加減一方添天麻一兩酒浸炙爲末研勻丸如小彈
子大凡中風用冷水化下一丸立效些小風寒每服
半丸小兒驚風一丸分作六服並用冷水化下(與後牛黃丸并前方牛黃丸不同)

肝中風

論曰內經謂以春甲乙中風爲肝風肝風之狀多汗惡風
善悲嗌乾善怒時憎女子者有頭目瞤兩脅痛行常傴僂
嗜甘如阻婦狀者有但踞坐不得低頭兩目連額色微青
唇青面黃者治法宜灸肝腧後以藥治之

排風羌活散方 肝藏中風筋脉拘攣疼痛
羌活(去蘆頭一兩半) 天麻(二兩) 芎藭(一兩) 酸棗仁(炒一兩半)
薏苡仁(一兩) 鹿角膠(炙燥一兩) 蔓荊實(去皮三分) 羚羊角(鎊一
兩半) 桂(一兩) 人參(一兩) 白附子(製一兩) 牛膝(酒浸焙二兩)
烏蛇(酒浸三寸炙用肉) 犀角(鎊三分) 白鮮皮(剉一兩) 地骨皮
(剉一兩) 梔子仁(一兩五錢生用) 右一十七味擣羅爲散以豆淋
酒調下一錢匕漸加至二錢匕日三夜一

升麻湯方 治肝虛中風頭痛目眩胸中客熱氣壅衝心
煩悶
升麻 前胡(去蘆頭各一兩五錢) 玄參 地骨皮(各一兩) 羚羊
角(屑) 葛根(各一兩) 酸棗仁(一兩)
右七味麤擣篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分
去滓入竹瀝半合重煎三兩沸放溫食後服如人行
五六里更進一服

心中風

論曰心中風之狀多汗惡風焦燥善怒嚇赤色病甚則言不快診在口其色赤夫心受風風盛則生熱熱甚則汗不止心之液為汗故也汗多則腠理疎疎則與邪相薄是以惡風又心惡熱熱極則脣焦內燥多怒心之聲為言病甚則言不快心氣通於舌故也又其證胸背拘急不可傾側面赤頭痛翕翕發熱不能安臥以心主血脉其風日久隨榮衛行內外相搏蘊積而然也

辰砂天麻丸方　鎮養心神搜祛諸風和流榮衛滋潤筋絡開通關膈肥密表腠

丹砂半兩　天麻一兩　半夏湯煮軟焙乾　天南星各半兩

蠍梢一分炒　白附子半兩　白殭蠶炒　牛黃研各半兩

蓬砂一分研入　麝香一分研入　右為末水煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸荊芥湯下不計時候

烏犀散方　治心中風精神昏悶語聲錯誤恍惚多驚

烏犀角鎊二兩　丹砂研　獨活去蘆頭　丹參　遠志去心

人參　蔓荊子　防風

右擣羅為散每服二錢匕食後溫酒調下日三

人參丹砂丸方　治中風恍惚驚悸安神志化痰涎

人參　丹砂各研二兩　紫石英研　白石英　龍腦

細辛去苗葉　赤箭　天門冬去心焙　遠志去心　生乾地黃焙

菖蒲九節者米泔浸切焙各一分　白茯苓去皮二兩　犀角鎊

沙參　防風去叉各半兩　麝香研半分　右擣研為末鍊蜜丸如小雞頭大每服一丸溫酒嚼下不拘時候

脾中風

論曰脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲舉色薄微黃不嗜食診在鼻上其色黃又曰踞而腹滿身通黃吐鹹汁又曰翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮肉瞤動短氣脾裨諸臟灌四旁者也所主四肢故脾中風則身體怠惰四肢不欲動脾者倉廩之官故病則不嗜食診在鼻中央之位也其色黃黃土之色也煩重發熱風之候也形如醉人者邪氣之甚也

獨活湯方　治脾臟中風肢體緩弱言語不利翕翕發熱

獨活　麻黃去節先煎掠去沫焙乾　防風去叉各一兩　白茯苓去皮

人參　羚羊角鎊　前胡去蘆頭　沙參去蘆頭　旋覆花

黃芪　半夏湯洗七遍切焙　附子炮裂去皮臍二分　甘草炙半兩

共剉如麻豆每服三錢匕以水一盞半入生薑汁半
分切同煎取七分去滓溫服不拘時日三

秦艽湯方　治脾臟中風身體拘急舌強不能語

秦艽（去苗土）　麻黃（去根節湯掠去沫焙乾）　石膏（各一兩）　獨活　赤
茯苓（去皮）　山茰　芎藭　防風　桂　白朮　人參
防己　附子（炮裂去皮）　杏仁（去皮尖雙仁炒各三分）　乾薑　甘草（炙）
細辛（去苗葉各半兩）　共剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎
取八分去滓溫服不拘時候

羚羊角丸方　治脾臟中風口面偏斜語言蹇澀虛煩手
臂腰腳不隨

羚羊角（屑）　防己　白芍藥　獨活（去蘆頭）　白茯苓（去黑
皮）　防風　酸棗仁（微炒）　杏仁（去皮尖雙仁炒黃）　麥門冬（去心
焙各三分）　人參　芎藭　栢子仁（炒）　檳榔（剉）　桂（去粗皮）
當歸（切焙各半兩）　附子　薏苡仁　熟乾地黃（焙各一兩）
共擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心溫酒
下三十丸

肺中風

論曰肺中風之狀多汗惡風色皏然白時欬短氣晝日則
差暮則甚診在眉上其色白又曰燥而喘身運而重冒而
腫脹偃臥則胸滿短氣冒悶汗出夫熱生風風盛則熱勝
理開多汗者熱甚故也風薄於內所以惡風皏然而白金
之色也在變動為欬又肺主氣故時欬短氣也風陽也陽
遊則在表暮在裏陽裏而風應之故暮則甚也診在眉上
其色白肺之色也身運而重風使然也喘而腫脹偃臥而
胸滿短氣以肺主氣故也

羚羊角丸方　治肺中風氣急背項強鞕語聲嘶敗

羚羊角（二兩）　白鮮皮（去錢）　升麻　蔓荊實　惡實（炒）
枳殼（一兩）　天麻（白者）　秦艽　共擣羅為末鍊蜜和丸如
梧桐子大食後煎桑白皮湯下十五丸日三服

秦艽湯方　治肺中風項強鼻塞語聲不出喘鳴肩息胸
滿短氣

薺苨（二兩）　防風　人參（各一兩五錢）　獨活　細辛　赤箭
芎藭　羚羊角（各五錢）　麻黃（二兩）　桔梗（剉炙三分）　前胡（去蘆
頭）　蔓荊實　白鮮皮（各五錢）　甘草　石膏（各一兩）
共細擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服
食後臨臥服

腎中風

論曰腎風之狀多汗惡風脊痛不能正立其色炲隱曲不利診在肌上其色黑夫身之本在腎受五臟六腑之精氣以養百骸九竅腎受邪則諸陽之氣不上至於頭面故有面痝然浮腫之證陽氣虛者則多汗惡風腎主骨骨不強則脊痛不能立精神衰弱則隱曲之事不利肌上黑如炲色又踞而腰疼不可俛仰或為冷痺或為偏枯耳鳴聲濁志意昏沉善恐多忘皆腎風證也

海桐皮散方　治腎中風踞而腰痛脚腫疼重耳鳴面黑志意不樂

海桐皮剉　五加皮去粗皮剉　萆薢炒　薏苡仁各一兩　虎骨酥炙令黃　枳殼　赤芍藥　牛膝去苗酒浸切焙各一兩　惡實微炒　防風　續斷　杜仲去皮剉炒　郁李仁湯浸去皮尖雙仁炒　熟乾地黃一兩

共搗羅為散每服二錢匕溫酒調下漸加至三錢匕空腹食前各一服

杜仲丸方　治腎中風腰脚不隨骨節痠疼筋脈拘急行履艱難兩脅牽痛

杜仲去皮剉炒三分　牛膝去苗酒浸切焙一兩　萆薢一兩半　酸棗仁一兩　當歸三分　防風一兩　丹參三分　赤芍藥三分　桂半兩　肉蓯蓉酒浸切焙一兩　石斛三分　附子五錢　郁李仁湯浸去皮三分　檳榔煨一兩

共搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空腹用溫酒下三十丸

防風湯方　治腎中風腰脚痿痺不仁骨髓痠疼不能久立漸覺消瘦

防風一兩五錢　羌活一兩　黃芪一兩五錢　五加皮一兩五錢　牛膝去苗酒浸切焙一兩五錢　丹參一分　酸棗仁一合　桂一兩五錢　赤芍藥一兩五錢　麻黃去節煎掠沫焙一兩　檳榔煨一兩　當歸切焙一兩　木通一兩五錢

共麄搗篩每服三錢匕水一盞至七分去滓空心服及晚食前服

石斛浸酒方　治腎中風注腰脚痺弱利關節堅筋骨除頭面遊風補虛勞益氣力

石斛去根四兩　黃芪一兩五錢　丹參二兩　牛膝去苗二兩　人參一兩五錢　杜仲去粗皮炒　五加皮　白茯苓二兩　枸杞子

炒一升半　山茱萸　山藥　萆薢炒二兩　防風一兩五錢
天門冬去心焙三兩　生地黃三兩　細辛去苗葉炒一兩　薏苡仁半升
共細剉如麻豆用生絹囊盛以酒五斗於淨瓷器中浸七宿初溫服三合日三夜一漸加至六七合一升許令常有酒氣不至大醉

癱緩俗名癱瘓　風嚲曳　四肢拘攣不得屈伸
風痙　角弓反張　中風失音
中風舌强不語

癱緩

論曰癱緩之辨癱則懈惰而不能收攝緩則弛縱而不能制物故其發四肢不舉筋脈關節無力不可收攝者謂之癱其四肢雖能舉動而肢節緩弱憑物不能運用者謂之緩或以左為癱右為緩則非也但以左得之病在左右得之病在右耳推其所自皆由氣血內耗肝腎經虛陰陽偏廢而得之或有始因他病服吐下之藥過度亦使真氣內動榮衛失守一身無所稟養而致然也

紫金天麻丸方　治中風癱緩手足嚲曳

天麻　沒藥研　乳香研　牛膝酒浸　白术
當歸各半兩　牛黃研二分　犀角一兩　附子去皮臍三分
五靈脂一兩　共十味為末取二家井華水丸如櫻桃大每服一丸先用生薑汁化開次用酒調下如中風癱緩手足嚲曳蹇澀口眼喎斜不省人事口吐涎沫或手足搐掉骨筋疼痛皮肉麻痺並宜服之

天麻浸酒方　治癱緩風不計深淺久在牀枕

天麻半兩　松節剉兩　龍骨　虎骨酥炙　骨碎補半兩
敗龜醋炙一兩　烏蛇酒浸去皮骨　白花蛇酒浸去皮骨

惡實根各半兩　附子去皮臍一枚　羌活
獨活去蘆頭　牛膝酒浸各半兩　當歸　芎藭各兩
大麻仁二兩　熟乾地黃焙半兩　茄子根二兩
原蠶沙炒一兩　共十九味㕮咀如麻豆用酒二斗浸密封春夏三日秋冬七日每服一盞不拘時候溫服

虎骨丸方　治癱緩風手足不隨口眼喎斜頭目昏重腰膝少力及風氣凝滯筋骨疼痛

虎脛骨酥炙半兩　當歸一兩　赤箭半兩　安息香酒研半兩
海桐皮　獨活　牛膝酒浸各一兩　肉蓯蓉酒浸一兩

金毛狗脊去皮　續斷各半兩　草薢　烏頭去皮臍
芎藭各一兩　甜瓜子　僊靈脾　乳香研各半兩　防風
天麻　石斛去根各一兩　酸棗仁去皮研　黃松節酒炒
細辛各半兩　共二十二味除別研外為末酒煮麪糊丸
如梧桐子大每服十五丸酒下或荊芥湯不拘時

天麻丸方　治風氣癱緩等疾

天麻二兩　玄參　防風　地榆　乾浮萍紫背者焙
焙　乾薄荷　烏頭去皮臍　牛膝酒浸各一兩
不蛀肥皂莢五挺就地坑內燒成黑及甕椀合定候冷用半兩細研入諸藥　牛黃

龍腦各一錢別研　共十一味除別研外為細末和勻鍊蜜
和杵百餘下丸如雞頭大每服一丸溫酒下

牛黃丸方　治一切風及癱緩言語蹇澁搜風鎮心

牛黃一分　龍腦一錢　麝香一錢　雄黃一分　丹砂五分五味同研
天麻　烏犀　乾蠍去土炒　羚羊角鎊　羗活
獨活　防風　細辛　白芷　赤茯苓
蟬蛻　麻黃去根節　牛膝酒浸　芎藭　五加皮各半兩
白附子炮一分　烏蛇酒浸去皮骨炙一兩　共二十二味研
為末鍊蜜和杵一千下丸如雞頭大每一丸嚼破溫
酒或荊芥茶下日三

沉香煎丸方　治癱緩不收體重無力肢節緩弱運動不
能

沉香　丁香　葫蘆巴炒　附子去皮臍　牛膝去苗剉酒拌炒
補骨脂炒　蘹香子　石斛剉酒拌炒　芎藭　木香
青橘皮湯浸去白　桂去粗皮　肉蓯蓉酒炒各半兩　共十三味
搗羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十丸生
薑鹽湯下酒亦可

風嚲曳

論曰人假水穀之精化為血氣周流一身使四肢相隨筋
脉相續猶挈裘領無所不從若脾胃虛弱水穀不化筋脉
無所稟養復遇風邪外搏膚腠流傳筋脉縱緩則肢體嚲
曳共嚲則偏而不舉曳則弛而不隨是皆不能收攝也

獨活湯方　治中風手足嚲曳不能言

獨活二兩　甘草炙　桂　生葛根　芍藥
栝樓根實各一兩　右六味剉如麻豆每服五錢生薑二
片同煎溫服日三夜一

敗龜丸方　治中風手脚軟弱嚲曳

敗龜（塗酥炙五兩） 一味為細末研飯為丸如梧桐子大每
服二十丸酒下
附子湯方 治風嚲曳手足不隨身體不能俛仰
附子（去皮臍） 乾薑 甘草（炙） 防風 獨活（各一兩半）
石膏（碎） 白茯苓 白术 芎藭 柴胡
當歸（切焙） 人參（各一兩） 杏仁（去皮尖雙仁炒研二十一枚） 細辛（一兩）
共十四味剉如麻豆每服五錢水酒共煎溫服日三
人羸弱者只用水煎服
羚羊角丸方 治中風手顫嚲曳語澀

羚羊角（一兩） 犀角（三分） 羌活 防風（各一兩半）
薏苡仁 秦艽（各二兩） 右六味為末鍊蜜丸如梧桐子
大服十丸煎竹葉湯下（加至二十丸）
中風四肢拘攣不得屈伸
論曰膝與散於肝肝藏筋膜之氣筋為肝所養筋得所養
則俯仰屈伸與或重疾若經絡偏虛風邪乘虛客於機關
則筋脈縮急丁於陽絡則肩背從而拘攣此皆邪氣內盛
且氣不能榮養於筋故為四肢拘攣不得屈伸
夜合枝釀酒方 治中風手足不隨攣縮屈伸艱難

夜合枝 桑枝 槐枝 柏枝 石榴枝（各生用剉五兩）
黑豆（用緊小者生用五升） 羌活（別杵二兩） 糯米（五升） 細麴（七斤） 防風（別杵五兩）
共十味以水五斗浸五枝同煎取二斗
五升去滓浸米黑豆二宿蒸熟與麴防風羌活二味
拌和造酒依常醞法封三七日壓去糟滓取清酒三
合至五合時飲之常令有酒氣物令過醉恐至吐悖
亂正氣
乳香丸方 治中風四肢拘攣筋骨疼痛
乳香（研一兩） 烏頭（去皮臍半兩） 羌活（一兩） 雄黃（細研水飛半兩）

白附子 羚羊角（各一兩） 附子（去皮臍半兩） 原蠶蛾（炒）
防風 烏蛇（酒浸去皮骨炙） 白殭蠶（炒） 虎脛骨（酒炙各一兩）
膩粉 麝香（各三分） 赤箭 牛膝（酒浸） 沒藥（研各半兩）
右十七味為末再同和勻鍊蜜丸梧桐子大每服用
豆淋酒下十丸如人行十里再服
地龍餅子方 治中風手足筋急攣疼痛
地龍（炒） 海蛤 硫黃（研） 烏頭（去皮臍各半兩） 鯪鯉甲（各一兩）
五味同研為末醋煮麪糊為丸如雞頭捏作餅子暴
乾每用一餅以葱白裹安手足節上以手帛繫住閤

在一朽木桶上用熱湯淋之候覺肘中熱極方解去帛子後看手足未得舒展時再用熱湯淋之每一餅可用三次如用藥畢且着衣服蓋之不得透風

酸棗仁煎方　治筋骨拘急及腰疼痛行履不得

酸棗仁一兩半生杵如 虎骨酒炙一兩半 海桐皮　羌活各二兩
膃肭臍　赤箭　萆解　杜仲去粗皮炙令黃 敗龜酒炙
蒺藜子　石斛　牛膝酒浸 巴戟天　附子去皮臍
木香　熟乾地黃　酥各一兩 桑枝一握一尺長 白蜜四兩

共十九味搗羅十七味為末再研勻用清酒七升先煎桑枝令黃色去桑枝後下藥末更煎一二十沸次下酥蜜煎成膏有香氣得所用瓷盒盛每服一匙頭溫酒調下日三服

風痓

論曰風痓者以風傷太陽之經復遇寒濕故也其狀口噤不開腰背强直如發癇益風邪內薄於經則榮衛凝泣筋脈緊急故令口噤不開卒然倒仆不知所以凡發極則復甦甦則復作其或耳中策策而痛身背直而不屈者不治也

天麻湯方　治風痓身如板直徧身鞕强

天麻半兩 羌活　人參　桂去粗皮 白术　麻黃去根節煎掠去沫焙乾 杏仁去皮尖雙仁炒各一分 附子去皮臍一枚 八味剉如麻豆每服五服五錢生薑一棗大同煎再入酒半盞煎熱服後以生薑稀粥投之取汗日三

甘草湯方　治風痓口噤不語肢體强直神識不明

甘草炙 羌活一兩一分 人參半兩 防風一兩 附子半兩

每服四錢入地黃汁一合煎再入荊瀝竹瀝各半合同煎溫服日夜各一

角弓反張

論曰風角弓反張之狀腰背反折不能俛也中風邪客於諸陽之經邪正相搏風氣勝則筋脈縮急腰背反折如弓之形也

麻黃飲方　治中風身如角弓反張四肢不隨煩亂口噤

麻黃去根節三兩 防風　桂　白术　人參　芎藭
當歸　甘草炙 乾薑炮各一兩 附子一兩 杏仁去皮尖雙仁三十枚 每服五錢水煎溫服不拘時

當歸湯方　治中風身如角弓反張口噤不開

當歸 細辛各三分 防風 獨活各一兩半 麻黃去根節一
兩一分 附子一枚去臍 每服三錢水酒同煎溫服如汗出
愼外風若口噤卯斡開口灌之
急風散方 治中風身如角弓反張狀
附子一枚去皮臍 烏頭二枚去皮臍 天南星一枚 藿香去梗
防風 白芷各半兩 乾蠍全者去土炒 白附子各一分
共八味爲散每服半錢豆淋溫酒調下併二服未愈
再服
中風失音

論曰喉嚨者氣之所上下也會厭者聲音之門戶其氣宣通則聲音無所阻礙若風邪搏於會厭則氣道不宣故令人失音入臟則不能言語也
羌活湯方 治中風失音不語
羌活去蘆頭兩半 甘草炙剉 人參各半兩 附子去皮臍一枚
荊瀝 竹瀝 生乾地黃 共七味先將四味剉如麻
豆每服五錢入三件汁瀝同煎溫服日三夜一
地黃湯方 治中風失音不語
生地黃汁 淡竹瀝各半盞 獨活去蘆頭一兩 附子去皮臍半

箇 四味將二味剉如麻豆每服三錢入竹瀝地黃汁
同煎溫服空心日午夜臥各一
羚羊角湯方 治中風失音手足不隨
羚羊角鎊 芎藭 細辛去苗 木香 防風 麻黃
獨活 羌活 當歸酒浸 附子去皮臍 桂去粗皮 天麻
各一兩 每服三錢水煎溫服不拘時候
竹瀝湯方 治中風失音不語昏沉不識人
竹瀝 荊瀝 梨汁各二合 陳醬汁半合 四味相和微
煎一二沸再濾一徧令溫細細灌入口中口噤斡開

口灌之
竹豆湯方 治中風失音不語
新青竹截如竿子四十九莖 烏豆二升 二味以水八升相和煮
令豆爛去滓再煎取一升每服二合灌之或口噤不
開者卯斡口灌
羌活湯方 治中風舌強不得語手足嚲曳不隨
羌活一兩 羚羊角半兩 麻黃去根節一兩 防風半兩 旋覆
花炒半兩 獨活半兩 龍腦研半 人參 白茯苓
當歸 麥門冬各半兩 杏仁湯浸去皮尖雙人一兩 每服一兩

水煎溫服空心日午夜臥各一服

竹瀝湯方　治中風舌强不得語心神煩悶

淡竹瀝五合　人乳汁二合　三年醬汁半合　三味相和調

勻分三服口噤斡灌之立差

陳醋方　治中風不得語舌根强硬

陳醋二合　三年醬汁　人乳汁各五合　三味相和研以

生絹濾絞取汁分爲三服日夜服之服盡能語

三聖散方　治中風舌强不語

沒藥研　琥珀研各一分　乾蠍七枚全者炒　三味研爲末每

服三錢用鵝梨汁半盞皂莢末半錢濃煎湯一合與

梨汁相和調下須臾吐出涎毒便能語

雄黃丸方　治心脾中風舌强不語涎潮昏塞不省人事

雄黃研　丹砂研　牛黃研　天南星牛膽內製者　白殭

蠶生用　天麻生用各半兩　麝香一分　金箔　銀箔各五十片與麝香研

九味研爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸

溫薄荷汁化下不拘時

風口噤　風口喎　破傷風

口噤

論曰風口噤者風寒客於三陽之筋使筋脉拘急口噤不

開牙關緊急若不速治恐致他病以風者善行而數變也

開關散方　治中風目瞑口噤不能下藥者用此散以中

指點散子揩齒三二十次在大牙左右其口自開始得下

藥

天南星生搗爲細末　龍腦別研　各等分研細五月五日午

時合患者共使一字若值心門小下分兩當半

烏梅飲方　治中風不語口噤吐痰頸項筋急

烏梅二十七枚并子捶碎　菝葜剉炒各半兩　白礬一兩生用　先以水

一升煎菝葜根取三合去滓別盛又別以水一升煎

烏梅至二合去滓別盛又以水五合煎白礬取三合

別盛以物斡開口先灌菝葜湯次下烏梅湯又次下

白礬湯旋旋停服之良久即吐惡痰毒涎如不吐

以鵝毛攪喉口取吐

附子散方　治中風牙關緊急緬身强硬

附子一枚一兩者炮裂去皮臍　白附子　共末爲細散每服一

錢七溫酒調下三服效

海帶散方　治風口噤牙關不開

海帶炒半兩 烏梅肉 天南星生各一兩 麝香二分別研後入
爲細末入瓷盒內勿令透氣如患急以半錢七於顋
裹牙關上揩便自開口立效
治牙關緊急方
甘草比中指節截作五截於生油內浸過炭火上炙候油入甘草用 以物斡開牙關
令咬定甘草可如人行五里時候又換甘草一截後
灌藥極效
白梅散方 治中風或吐瀉牙關緊噤下藥不能
白梅末不拘多少 將揩牙立開蓋酸能收斂自然牙骨易
開也

風口喎
論曰足陽明脉循頰車手太陽脉循頸上頰二經俱受風
寒筋急引頰令人口喎僻言語不正目不能平視又云風
入耳中亦令口喎蓋經絡所繫然也診其脉浮而遲者可
治
治中風口面喎斜葛根湯方
葛根 防風 附子 麻黃各一兩炙 獨活一兩 杏仁湯浸
去皮尖四十枚 松實去殼兩半 共剉如麻豆每用藥十錢七以

水二盞酒一盞入生薑三片煎一盞半去滓分三服
日二夜一
防風湯方 治中風口面喎斜涙出失音
防風 防已 升麻 桂 麻黃 芎藭各一兩 羚羊
角半一兩 剉如麻豆每服三錢七以水一盞煎取六分
去滓入竹瀝半合更煎二三沸熱服空心日午及臨
臥各一服
治賊風吹著口眼喎斜一字散方
烏頭生用 青礬各半兩 共爲散每用一字搐入鼻內取
出涕吐涎

治風口喎方
蓖麻油 巴豆油 二味等分並相和如右喎即點左
口角如左喎即點右口角仍急覷纔正當急揩去藥
治中風口面喎斜青松葉浸酒方
青松葉一斤細剉如大豆 木石臼中杵令汁出用生絹囊貯
以淸酒一斗浸二宿近火煨一宿初服半升加至一
升頭汗出即正
治中偏風口面喎斜石灰塗方

石灰（半斤） 炒乘熱以醋調似泥塗於一邊緩處纔正急用溫水洗去

人參丸方 治中風口眼喎斜手足軃事語不蹇澀止緣坐臥處對耳有竅爲風所中筋牽過一邊連眼皆緊睡著一眼不合者服此藥二十日內眼口皆正矣

人參 草烏（生去皮尖） 牛膝（去苗酒浸焙乾各一兩） 按（十味入腦虛人口服獨用之）

擣羅爲細末水煎麪糊丸如梧桐子大每服十丸炒黑豆淋酒下一日二服

治一切風口眼偏邪假蘇丸方

生假蘇（去梗） 生薄荷（一斤取葉） 二味並沙盆內研生絹絞取汁瓷碟內看厚薄日煎成膏餘滓三分去一分粗滓不用將二分滓曬乾杵爲末將膏和爲丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下

破傷風

論曰破傷風者因卒暴傷損風邪襲之傳播經絡致使寒熱更作身體反張口噤不開甚者邪氣入臟則不可治諸瘡久不差榮衛虛弱肌肉不生瘡眼不合者風邪亦能外入爲破傷風之候

羌活湯方 治破傷風身如鐵石或如角弓反張口噤不開宜斡齒灌藥

羌活 防巳 羚羊角 升麻 黃芩 蔓荊實（去皮各一兩半） 犀角（一兩） 茯神（去木） 葛根 甘草（各一兩一分） 防風（三分） 麻黃（一兩）

麁擣篩每服三錢匕水一盞入地黃汁半合蔥白二寸煎至八分去滓空心日午臥溫服如病急不拘時服蓋覆出汗即愈

羚羊角散方 治打擊破瘡或洗頭挑齒灸瘡狗咬等中風

羚羊角 石斛 芎藭 知母 山茱萸 薏苡仁 白芷 曲棘鍼（生用） 甘草（炙） 芍藥 紫苑（去土） 天雄 防風 牛膝 枳實（去瓤麩炒） 蔓荊實 石南葉（酒浸炒） 杏仁（湯浸去皮尖） 麻黃 龍骨（去土） 黃芩 防巳 白朮 萆薢 乾蔓菁花 葛根 赤茯苓 羌活 蒼耳心 車前子 桑白皮 菊花（不用青） 酸棗仁 當歸 丹參 烏蛇（酒浸去皮骨炙各三分） 陳橘皮（湯浸去白） 共四十味擣羅爲散每服一錢半至二錢匕空心午時夜臥溫酒調下要丸即鍊蜜丸如梧子大每服十丸豆淋酒下

治破傷風獨聖散方

蘇枋木 不拘多少 共爲細散每服三錢七酒調服之立效

一方用鰾膠白色炙令黃色爲末熱酒調六錢

治破傷風身體牙關不開白殭蠶散方

白殭蠶 直者不拘多少 生研爲末每用生薑自然汁調以雞翎於瘡口掃之勿令乾斯須腫揭皮雖爲效仍用生薑汁調半錢七服

治破傷風打撲內損飲緑花散方

天南星 大者半生半炮 白附子 半生半炮 防風 去叉等分 爲細末每服二錢七重者童子小便調稍輕熱酒調下如外傷用此藥貼瘡口仍依法服之如破傷風先以小便溫洗瘡口次用藥乾貼追出風毒立愈熱稍惡口噤者以童子小便調斡開口灌之如鬬打至死但心頭微煖者併灌三服即活常須合下以備急用 一方無白附子

偏風

偏風 風偏枯 肉苛

偏風

論曰人身所養者惟血與氣血氣均等則無過不及之害稍至衰微則所運不周遂致體有偏複因風客身一邊者謂之偏風其狀半體不知痛痒或痛痺不仁或縱緩或痺痛是也

荊瀝湯方 治偏風不隨心中煩悶言語謇澀

荊瀝 五合 竹瀝 五合 生薑汁 三合

三味相和再煖每服三合以酒調下

防巳湯方 治偏風半身不隨口眼喎斜不能言語筋脉拘攣不得轉側

防巳 芎藭 桂 黃芩 芍藥 人參 甘草 炙 麻黃 去根節 附子 去皮臍 防風 各一兩 杏仁 去皮尖四十枚

每用十錢生薑十片同煎分溫三服日二夜一溫其藥不虛人老少並可服之

生地黃湯方 治偏風手足一邊不收口目喎戾言語謇

生地黃汁 竹瀝 荊瀝 各一升五合

三味別作羌活防風各一兩去蘆頭并叉剉附子一枚重半兩者去皮臍生用作八九片入前三汁中慢火煎取一升半每用醇酒三合調化藥汁二合煖服之日二夜一無問冬夏並得服之

麻子仁湯方 治偏風手足不隨口面喎斜

麻子仁炒二合 黑豆二合緊小者炒 鴿糞炒二合 番柳枝二握剉半寸長

四味先以酒七升煮柳枝及五升炒鴿糞麻仁黑豆等令黃乘熱便投柳枝酒內須臾去滓令淨每服旋取溫服二合至三合空心臨臥各一服

續命獨活湯方 治偏風半身不隨熱悶語澀

獨活 防風 人參 芍藥各二兩 防巳一兩半 桂一兩 羚羊角鎊三分

㕮咀如麻豆每服五錢入竹瀝半合同煎溫服

安息香丸方 治偏風半體不仁縱緩不收或時痺痛

安息香研一兩 乳香研一兩 麻黃去根節二兩 胡桃仁湯浸去皮研一兩半 乾浮萍草去土一兩半

右五味先擣麻黃浮萍草為末與研藥拌勻鍊蜜和丸如彈子大每服一丸溫酒化下以汗出為效

擬金丸方 治偏風半身不隨不知痛痒

草烏頭生去皮臍二兩半 骨碎補去毛一兩半 狗脊去毛一兩

五靈脂一兩 馬蘭花一兩半 地龍去土半兩 乳香研一兩

楓香脂研一兩 乾蘚一兩

九味擣羅為末入研者二味和勻醋煮麪糊和丸如小豆大每三丸至五丸荊芥湯下空心臨臥各一服

風偏枯

論曰氣血不足腠理開踈風溼客於分肉之間久而不差真氣去邪氣獨留乃為偏枯之疾其狀肢體不隨肌肉偏枯細小而痛言語不變神智不亂乃可治也宜溫臥取汗益不足而損有餘診其胃脉沉而大心脉小而牢急皆偏枯之脉也

當歸湯方 治中風手足偏枯口面喎斜疼痛一目不能

合

當歸 白芷 防風 白鮮皮 白朮 芎藭 杏仁去皮尖 甘草炙 甘菊花 天雄去皮臍各一兩 人參半兩

每服五錢生薑半分同煎溫服日三夜一與食相間服之

磁石湯方 治中風偏枯骨瘦無力

磁石燒赤醋淬七徧三兩 防風三兩 五味子二兩 甘草一兩

玄參二兩 附子去皮臍一兩 牡丹去心二兩

每用五錢入黑豆三十五粒同煎空心日午夜臥服

沒藥丸方　治中風偏枯手足不隨言語謇澀口眼喎斜

沒藥研半兩　天麻酒浸一宿焙乾二兩　烏頭去皮臍一兩　地龍去土炒兩　羚羊角鎊屑一分　犀角鎊屑一分　丁香一分　木香一分　乳香研半兩　丹砂研半兩　龍腦研一分　麝香研一分　玄參分　人參半兩

右十四味搗研為末煉蜜和丸櫻桃大每服一丸溫酒下食前服　重病者服一月差初患五七服即愈

肉苛

論曰內經謂人之肉苛者雖近衣絮猶尚苛也以榮氣虛衛氣實夫血為榮氣為衛氣血均得通流則肌肉無不仁之疾及榮氣虛衛氣實則血脈凝澀肉雖如故而其證病重為苛也

苦參丸方　治榮虛衛實肌肉不仁病名肉苛

苦參二兩炒取粉　丹參炙　沙參去蘆皮土　人參一兩　五加皮　防風去叉　蒺藜子炒去角　烏蛇酒浸用肉　蔓荊實去白皮　敗龜酥炙　虎骨塗酥炙黃　玄參堅者各一兩

右十二味搗羅為末別以不蛀皂莢一觔以水三升挼取汁去滓於無油鐵器內煎成膏煉蜜四兩拌和

為丸如梧桐子大每食後良久及夜臥共三服各用荊芥薄荷酒下十五丸至二十丸

天麻丸方　治榮虛衛實肌肉不仁徧身痛重

牛膝酒浸切焙一兩　天麻酒浸切焙兩半　麝香研　桂各一分　乾蠍去土炒　白花蛇肉酒炙各半兩　檳榔剉　獨活各三分　防風一兩

右九味煉蜜和丸如桐子大每服十丸薄荷酒荊芥湯下不拘時

防風酒方　治榮虛衛實肌肉不仁病名肉苛

防風去叉二兩　白朮一兩半　山茱萸去子用一兩半　山藥乾者一兩半　附子炮裂去皮臍一兩　天雄去皮臍一兩半　細辛去苗葉輕炒一兩　獨活去蘆頭一兩半　秦艽去土兩半　芎藭去粗莖一兩半　杏仁去皮尖雙仁炒兩半　紫巴戟去心一兩　桂去皮一兩　麻黃去根節煎掠去沫焙乾二兩　生薑切焙一兩　磁石生搗碎如大豆醋淬去汁半斤　薏苡仁炒二兩　生地黃淨洗切焙二兩

共十八味剉如麻豆生絹袋盛以無灰酒三斗浸六七日空心溫飲四合至五合以知為度

五味子湯方　治榮虛衛實肌肉不仁病名肉苛

五味子 防風 牛膝 黃芩 白朮 當歸 澤瀉
知母 白芷 五加皮 枸杞子(用根白皮剉) 牡丹(去心)
肉蓯蓉(炒) 丹參(炙) 甘草(炙) 枳殼(麩炒) 厚朴(去粗皮薑汁炙五通)
細辛(去苗葉輕炒) 桂(各一兩)
共十九味剉如麻豆生絹囊盛用好酒二斗密封浸
經七日每空心日午夜臥各溫服五合久服加至七
合及一升勿令醉吐

歷節風 中風百節疼痛 風走注疼痛
白虎風

歷節風

論曰歷節風由氣血衰弱為風寒所侵血氣凝澀不得流通關節諸筋無以滋養真邪相薄所歷之節悉皆疼痛故為歷節風也病甚則使人短氣汗出肢節不可屈伸

防風湯方 治歷節風周身百節疼痛脚弱
防風(一兩) 白朮(一兩) 白鮮皮(一兩) 桂(一兩三分) 黃芪(二兩)
薏苡仁(炒二兩)
右六味研篩每服四錢生薑三片同煎溫服日三夜一

沒藥散方 治歷節風百骨節疼痛晝夜不可忍
沒藥(研半兩) 虎脛骨(酒炙三兩)
二味擣研為末每服二錢溫酒調下日三服

透關散方 治歷節風四肢攣急疼痛難忍短氣汗出
麻黃根(五兩) 天南星(炮) 威靈仙(各半兩) 萆薢 當歸
人參 天麻(各一兩) 赤小豆(炒去皮各半兩)
共八味擣羅為末每服半錢溫酒調下

獨活散方 治歷節風
獨活(去蘆頭一兩半) 玄參(一兩) 生犀角(鎊二兩) 升麻(二兩)

惡實根(半兩) 豉(二合) 生乾地黃(半兩)
共七味擣羅為散每服三錢空腹米飲調下

乳香大丸方 治血氣衰弱風毒攻注歷節疼痛
乳香(研) 沒藥(研各一兩) 五靈脂(去沙石四兩) 烏頭(去皮臍一兩半)
共四味擣研為末再和勻滴水和丸如小彈子大以
丹砂為衣每服一丸薄荷酒化下日三服

中風百節疼痛

論曰中風百節疼痛者由體虛受風風邪中於關節故令百節筋脉拘急疼痛寒熱更作不可屈伸此皆真氣怯弱

不勝風邪與邪相薄所以痛也

白花蛇散方　治中風肢節疼痛言語謇澀

白花蛇酒浸去皮骨一兩　何首烏去黑皮　牛膝三味用酒浸半日焙乾

蔓荊實去白皮各一兩　威靈仙　荊芥穗　旋復花各二兩

共七味擣羅爲末每服一錢溫酒調下空心臨臥服

羌活散方　治中風百節疼痛寒熱更作不可俛仰

羌活去蘆頭一兩　天麻去苗生用一兩　芎藭半兩　酸棗仁炒三分

鹿角膠炒燥半兩　蔓荊實揉去白皮一分　羚羊角鎊屑三分　人參半兩

白附子半兩　牛膝二分　桂半兩　薏苡仁炒一分　烏蛇酒浸炙去骨半兩　犀角鎊屑一分　白鮮皮炙半兩　地骨皮

柏子仁生用三分

右十七味擣羅爲細末每日空心及夜臥各以豆淋酒調下一錢至一錢半

白頭翁酒方　治諸風痛攻四肢百節

白頭翁草一握

一味爛研以醇酒投之頓服

又方

生懸實根摩酒服痛止即住

又方

黑豆炒去皮半升　威靈仙一兩　桑根白皮一兩

三味用醇酒一升半煎取八合去滓頓服之

又方

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒黃研半兩　虎骨以酒塗酥炙黃取半兩爲末

二味用醇酒一升熱調頓服

風走注疼痛

論曰風走注疼痛之病其痛無常處是也氣血流通筋脉和同則骨肉滑利一有不調風邪乘虛與血氣俱行使榮衛凝濇隨所注處發爲疼痛故謂走注痛也

虎骨散方　治風毒走注疼痛不定

虎脛骨酥炙　敗龜酥炙各一兩　麒麟竭研　赤芍藥

當歸　沒藥研　防風　白附子　桂去粗皮　白芷

骨碎補去毛　蒼耳炒　自然銅火煅醋淬研各二分　牛膝酒浸切焙去苗

天麻　檳榔　五加皮　羌活去蘆頭各一兩

共十八味爲散每服二錢溫酒調下

芸薹散方　治風毒走注疼痛如虎嚙

芸薹子　天南星　草烏頭各半兩

三味爲散五錢匕入生麪以釅醋生薑汁生油各少
許調成膏攤紙上厚一分貼痛處即止

消毒膏方　治風毒走注疼痛筋脉拘急

馬牙硝赤研一兩燒　烏頭大者二枚燒存性三分研

二味同研令勻每用三錢白麪三錢生薑汁一盞同
熬成膏攤於帛子上熱貼日二換之

乾地黃丸方　治走注疼痛

生乾地黃　白芷　當歸　沒藥　烏頭去皮臍　防風
木香　赤小豆

共八味等分擣研爲末水浸蒸餅心和丸如梧桐子
大每服五丸冷酒下空心食前服日二

白虎風

論曰白虎風之狀或在骨節或在四肢其肉色不變晝靜
而夜發發則痛徹骨髓或妄言妄有所見者是也蓋風寒
暑濕之毒乘虛而感播在經脉留於血氣畜聚不散遇陽
氣虛弱陰氣隆盛則痛如虎嚙故以虎名焉

羌活湯方　治白虎風痛甚如齧

羌活　防風一兩　秦艽　芎藭　當歸各一兩半　牛膝酒浸
一兩　附子去皮臍三分　大腹連皮用二枚　桃仁湯浸去皮尖雙仁炒二十
一枚

九味剉如麻豆每服五錢入生薑一棗大同煎溫服
日二夜一

牛膝散方　治白虎風疼痛難忍

牛膝酒浸　當歸各一兩　虎骨酥炙令黃二兩　赤芍藥一兩
芒硝別研半兩　桃仁去皮尖雙仁一兩　芎藭半兩

七味爲散每服空心用溫酒調下一錢至二錢

抵聖散方　治白虎風骨髓疼痛至夜轉甚

虎脛骨不以多少打破酒或醋炙令黃脆爲度

一味爲散每服半錢入薄荷末一錢人參末半錢煎
乳香湯調下

一神散方　治白虎風晝靜夜發痛徹骨髓狂言妄見

防風　羌活　桂去粗皮　地骨皮　芎藭　細辛
虎骨酥炙　乳香研

共七味等分爲散每服一錢溫酒調下

烏頭散方　治白虎風走注疼痛

烏頭去皮半兩　地龍　羌活　虎骨炙一兩　延胡索　當歸

沒藥研　防風各一兩

八味爲散每服二錢冷酒調下空心食前日二服

風不仁　風瘙痒　風瘖癗　風癮瘮

風不仁

論曰風不仁之狀皮膚搔之如隔靴是也由榮氣虛衛氣實寒風入於肌肉血氣不相與凝痺結滯皮膚痛痒厚無所覺知內經曰皮膚不榮故爲不仁此之謂也

烏鵶丸方　治風虛皮膚不仁頭目昏痛利咽膈解昏倦

烏鵶一隻燒爲灰　麝香一分別研　虎骨酥炙　白殭蠶炒　乾

蠍去土炒　防風去叉　白附子　烏蛇酒浸去皮骨炙　藿香葉各半兩　除別研外搗羅爲末入研者拌勻鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸至十五丸溫酒下茶清亦得

羌活湯方　治風不仁手足瘰痛麻疼

羌活　獨活俱去蘆頭　防風　蔓荊實　人參　蒺藜子炒去角　芍藥　白茯苓　枳殼　芎藭　天麻木　阿膠炙令燥　威靈仙去苗土各半兩

每服二錢空心豆淋酒調下或鍊蜜丸如梧桐子大豆淋薄荷酒下十五丸至二十丸

五參散方　治風不仁皮膚痛麻繞膝徧身似蛇皮黑癬旋生旋沒通身瘙痒

人參　丹參　沙參　苦參　玄參堅者各一兩　白花蛇酒浸去皮骨一兩半

右六味爲細散每服二錢食後溫酒調下加至三錢

風瘙痒

論曰風瘙痒者表虛衛氣不足風邪乘之血脉留滯中外鼓作變而生熱熱即瘙痒久不差淫邪散溢搔之則成瘡

五白散方　治皮膚風瘙晝夜不止

白附子　白殭蠶炒　白蒺藜炒　白鮮皮各一兩　白花蛇酒浸去皮骨炙三兩

右五味爲散每服一錢空心臨臥溫酒調下

枳殼散方　治風皮膚瘙痒麻痺

枳殼去瓤麩炒二兩　苦參　蒺藜子炒去角　蔓荊實各一兩　荊芥穗　麻黃去根節　羌活去蘆頭　獨活各等分

每服二錢臘茶溫酒調下食後臨臥各一服

大麻散方　治熱毒風攻徧體瘙痒癮瘮皮膚痛痒肢節疼痛四肢大腸不利

天麻　防風　羌活　甘菊花　杏仁(去皮尖雙仁麩炒黃各二兩)
甘草(炙一兩)　每服三錢空心蜜酒調下日再服

天門冬丸方　治風熱皮膚癮疹痒生瘡如水疥或如粟粒
天門冬(去心焙二兩)　枳殼(去瓤麩炒二兩)　白朮　人參(各一兩半)
獨活　苦參(各一兩一分)　為末蜜為丸如梧桐子大每食後米飲下三十丸日二服

八味散塗傅方　治偏身瘡疥皮破肉痛或瘙痒膿水
蜀椒(去目)　吳茱萸(湯洗焙乾炒)　青鹽(研)　石硫黃(研)
膩粉(研)　白殭蠶(炒)　檗皮(各一兩)　麝香(少許研)

八味搗研為散看瘡汁調塗之溼則乾傅

防風湯淋洗方　治瘙痒如蟲行或痛痹不仁
防風　益母草　苦參(各三分)　蒺藜子(炒五兩)　荊芥穗
蔓荊實　枳殼(去瓤麩炒各一兩)
每用三兩水一斗煎至八升乘熱淋洗患處

風瘖瘟

論曰風瘖瘟者由腠理不密三陽氣外泄發而為汗汗出未已為風邪所搏風熱相併不得流行故結為瘖瘟狀如麻豆甚者漸長搔之成瘡

獨活丸方　治風癮瘮瘖瘟腫起時痒時痛
獨活(去蘆頭)　天門冬　防風　蒺藜子(炒去角)　桔梗(炒各一兩一分)
薏苡仁(炒)　黃連(去鬚各一兩)　桂(半兩)　枳實(麩炒一兩)
為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心臨臥菊花湯下

景天花散方　治脾肺風毒偏身發瘖瘟瘙痒煩躁
景天花(慢火焙乾一錢俗謂慎火草)　紅麴(半兩)
同研為細末每服二錢食後臨臥服溫水下

胡麻散方　治肺脾風毒攻疰皮膚瘙痒手足生瘡及偏

身瘖瘟發赤黑靨子肌熱疼痛
胡麻(炒香熬八兩)　枳殼(各二兩)　防風　蔓荊實　威靈仙
苦參　何首烏(米泔浸透去黑皮炒乾)　芎藭　荊芥穗　甘草(炙各一兩)　薄荷(用葉半兩)　為散每服二錢溫酒下或鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下

枳殼酒方　治風瘙癮瘮皮膚生瘖瘟或如蟲行
枳殼(炒二兩)　秦艽　獨活　肉蓯蓉(各四兩)　丹參
蒴藋(各五兩)　松葉(切三升)　剉如麻豆用生絹袋貯以清酒二斗浸六宿每服半盞日三夜四

蒺藜浴湯方　治風毒瘙痒癮疹漸成瘡癤

蒺藜子（炒）　茺蔚子　羊桃　蒴藋根苗　漏蘆（去蘆頭）

苦參（各半斤）　鹽（四兩）　每全料用水三石煮取二石五斗去滓溫室中淋浴仍先飽食即入浴久浸最良可隔夜一浴乾衣蓋取汗慎外風

桃仁塗方　治毒赤疹浮腫成瘡癤

桃仁（去皮尖雙仁生用）　杏仁（去皮尖生研各三兩）　胡麻（生研）　凝水石（研如粉各二兩）　右四味各研細別研芸薹葉絞汁和以白蜜入煎研藥攪爲稀膏用塗患處乾則易之

風瘙癮疹

論曰風瘙癮疹其狀有二皆緣肌中有熱若涼濕之氣折之熱結不散則成赤疹若因風邪所折風熱相搏則成白疹赤疹得熱則劇得冷則減蓋熱氣鬱結於內故惡熱宜冷白疹得陰雨則甚得晴霽則消蓋熱氣散癢於外故惡冷宜熱冷熱之證異其爲癮疹則一蓋身體風瘙而痒搔之隱隱而起是也

秦艽丸方　治風瘙癮疹搔之愈甚

秦艽　防巳　松脂（錬成者各兩半）　枳殼　蒺藜子（炒去角各二兩）

半　苦參　白朮　芎藭　防風　附子　蒴藋

乾薑（炮各一兩）　共研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸酒下加至三十丸早食前各一服

蔓荊實散方　治風瘙癮疹手足麻木

蔓荊實　何首烏（各二兩）　羌活　威靈仙　荊芥穗

防風（各一兩）　苦參（一分）　爲散每服二錢溫酒調下日三

茵陳蒿散方　治風瘙癮疹皮膚腫痒

茵陳蒿（一兩）　荷葉（半兩）　爲散每服一錢蜜水下食後服

蒺藜子散方　治風瘙皮膚癮疹痒痛或有細瘡

蒺藜子（炒去角二兩）　枳殼　荊芥穗　羌活　防風（一兩）

蒼朮（米泔水浸一宿四兩）　共爲散每服一錢溫酒或茶調下

石南酒方　治風瘙癮疹經旬不解

石南葉（去粗莖半兩）　一味搗羅爲末每服半錢至一錢用酒三合煎一沸空心溫服

白蜜酒方　治風癮疹瘙痒不止

白蜜（一合）　酒（二合）　二味相和煎溫食前服（一方用松葉一斤酒一斗煮三升日夜服出汗）

枳實丸方　治風熱頭面身體瘙痒癮疹

枳實去瓤麩炒各一兩半 天門冬 獨活 黃連 防風 蒺藜子炒去角 桔梗炒各一兩一分 薏苡仁一兩 桂一分 共爲末

鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸空腹米飲下日二

塗藥方

慎火草一名景天大葉者焙乾 生薑和皮不洗等分研 鹽少許

三味塗摩痒如徧身癮瘮塗發處日再

芎藭粉摩方 治風癮瘮痒痛難止

芎藭 白芷 麻黃根各二兩 藿香一兩 米粉二升

五味搗羅爲粉摩病處立效

枳實熨方 治風白瘮

枳實八兩去瓤 一味搗碎以醋拌令浥浥炒熱用絹帛包

裹熨瘮上冷即易分作二包子更相炒熨尤佳

聖濟總錄纂要卷一終

聖濟總錄纂要卷之二

程 林雲來 纂

新安 汪朔周曼思 黃家珣藍孚 較

江 湘邱上 閱

諸風門

蟲風 肌肉瞤動

蟲風

論曰蟲風之狀在皮膚間一身盡痛若劃若刺淫淫躍躍如中蟲行故名蟲風皆由體虛受風侵傷正氣也

天麻丸方 治蟲風如皮膚刺割

天麻 躑躅花 獨活 附子 白附子 原蠶蛾炒

防風 蒼耳 蒺藜子 烏頭去皮臍各一兩 麻黃去根節

烏蛇肉 麝香 除研者外搗羅爲末入麝香再研勻

鍊蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每服二十丸溫

酒下不拘時候如有汗出即宜避風

石南湯方 治六十四種風淫走皮膚中如蟲行痛如刺

割狀似蟲毒及卒風面目腫起手不及頭口噤不能

言

石南 乾薑 黃芩 細辛 人參各一兩 桂 麻黃去根節 當歸 芎藭各一兩 乾地黃三分 甘草炙二兩 食茱萸一兩一分

㕮咀如麻大每服六錢水酒同煎溫服得汗爲度

何首烏散方 治蟲風

何首烏 威靈仙各一兩 苦參半兩 麒麟竭一分

並生擣爲散入乳鉢內研三五百遍每服一錢用荊芥湯調下每日三服酒服尤妙

薄荷丸方 治蟲風皮膚若蟲癢若刀割狀及頭目不利風痰等疾

薄荷葉一斤 天麻四兩 威靈仙三兩 羌活四兩 山梔子仁二兩 蔓荊實二兩 白芷 桔梗炒 防風各二兩 大黃濕紙裹煨令紙乾一兩 人參 赤茯苓各三兩 龍腦研半兩

擣研爲末再和勻鍊蜜丸如鷄頭實大每服一丸食後細嚼茶酒任下

肌肉瞤動

論曰肌肉瞤動命曰微風蓋邪搏分肉衛氣不通陽氣內鼓故肌肉瞤動然風之入脉善行數變亦爲口眼瞤動偏喎之病也

虎骨丸方 治風虛肌肉瞤動手足顫掉

虎脛骨酥炙 松節剉酒炒 天麻 牛膝酒浸 赤箭 海桐皮 獨活 石斛去根 防風 烏蛇酒浸去皮骨 酸棗仁 當歸 仙靈脾 甜瓜子炒 乳香研 五加皮各一兩

一十六味先以十五味擣羅爲細末入研者乳香再和勻酒煮麪糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸荊芥酒或茶酒任下不拘時候

天麻丸方 治衝經絡肌肉瞤動頭目昏眩手足麻痺

天麻 芎藭各一兩 荊芥穗 雞蘇葉各三兩 白附子 甘草各半兩

右六味爲末鍊蜜丸如櫻桃大每服一丸茶酒任下

荊芥湯方 治風氣肌肉瞤動頭目昏眩四肢煩疼

荊芥穗 旋復花各四兩 前胡 甘草炙 麻黃去根節 芍藥 芎藭 半夏洗七遍各一兩

每服三錢葱白三寸雞蘇二葉同煎溫服

風癲　風癇　風狂　腦風

風癲

論曰風癲之狀發無常時每發則仆地吐涎沫無所覺知蓋由血氣皆虛精神離散魂魄失守風邪入于陰經故也又以胞胎之初其母卒大驚精氣併居能令子發癲其證與風癲大率相似

丹砂煎方　治風癲疾時發時省涉歷年月

丹砂（細研水飛過焙研如粉二兩）　石膏（五兩研細）　黃連（去鬚搗篩一兩）

生地黃（研取自然汁二升）

共四味以清水一斗先煮石膏黃連取五升淨去滓次下生地黃汁又煎之如稠餳始下火取丹砂粉投入勻攪百餘徧貯於不津器中更攪待冷即任手丸日兩度以溫水調服約如中彈丸大服藥後只吃淡飯蔓菁菜等

雄黃丸方　治五癲各有聲牛癲若牛鳴馬癲若馬鳴狗癲若狗鳴羊癲若羊鳴雞癲若雞鳴凡此五癲皆宜服之

雄黃　丹砂　雌黃（三味各二兩碎同用生絹袋貯之入十兩蜜內重湯煮待蜜赤色滴如絲引若纔為度取藥袋出河水洗淨漉出曬乾入乳鉢中研如粉為度其蜜即丸藥用）　黑鉛（二兩大火化用鐵匙撥掠去塵垢者用精者一兩若無次於器中下水銀及錫同銷鎔攪令勻瀉于熱鐵器內待冷先將前三味石藥乳鉢內研次入錫同研取勻）　水銀（一兩）

共五味各如前修製畢便將前煮丹砂雄黃雌黃餘蜜再重湯煮散少少點入藥中漸漸和勻為丸如大麻粒延用桃柳柏桑木嫩條各長七寸寸剉以水一升煎至六合去滓分溫下丸藥空心午時臨臥下三丸至五丸小兒一丸至二丸

羚羊角丸方　治風癲癇

羚羊角　犀角　遠志　人參　山藥　茯苓（各一兩半）

防風（一兩三分）　生地黃（三分）　金箔（研）　銀箔（各一百片研）

麥冬　鐵粉（研）　天冬（各三兩）　龍齒（二兩研）　水銀（一分入金銀箔龍齒鐵粉五件同研水銀無星子為度）

共十五味先將十味搗羅為末入別研者相拌令勻鍊蜜和丸如菉豆大用桃柳枝湯下二十丸日二夜一或人參茯苓湯亦可

風癇

論曰風癇病者由心氣不足胸中蓄熱而又風邪乘之病

間作也其候多驚目童子大手足顫掉夢中叫呼身熱瘛
搖頭口禁多吐涎沫無所覺知是也然病發於陽者易差
發於陰者難治故經曰臟病難治腑病易治又曰大人曰
癲小兒曰癇

靈烏散方　治風癇多驚手足顫掉口吐涎沫

烏鴉一隻臘月取于甕瓶內盛以鹽泥固濟令乾用炭火燒存性候冷取出去肚腸研　丹砂研一分　細辛二兩　乾蠍全者十四枚炒

共四味將二味研末與別研二味同羅每服半錢匕
午前溫酒調下

安息香丸方　治男婦暗風癇病

安息香通明無砂石者　鉛丹　二味爲細末入白羊心中血
研勻丸如梧桐子大每服十丸空心溫水下

神聖丸方　治風癇涎潮等疾

雄黃　鉛丹各一兩　細研以醋一觔熬稠丸如梧桐子
大與惡實末同收每服十丸臨臥煎惡實末湯下

丹砂丸方　治風邪諸癇狂言妄走精神恍惚思慮迷亂
乍歌乍哭飲食失常疾發仆地口吐白沫口禁戴眼
魂魄不守年歲深遠者

丹砂光明者研一兩　酸棗仁微炒研　乳香光瑩者研各半兩

合研令勻先令病人盡量飲酒沉醉次取藥五錢匕
酒一盞調下於靜室中安睡勿令驚動候其自覺則愈

鐵粉烏鴉散方　治風癇

烏鴉一隻去嘴肚及腳足　鉛丹　黑鉛　鐵粉研各二兩　丹砂一兩研先將鐵粉并鉛丹入鐵器內熟炒次入黑鉛一處結成砂子入在烏鴉腹內縫合以罐子盛用物蓋定鹽泥固濟放乾用熟火一秤煆令通赤取出搗爲末次入丹砂更研如粉入後七味

獨活　防風　芎藭　乾蠍　天南星各二兩　天麻　羌活

共研爲細末入麝香少許再研令勻每服半錢匕臨
臥冷酒調下

五生丸方　治癇疾

乾薑不炮　烏頭生去皮臍　半夏生用　附子生去皮臍各一兩
大豆末生用　共五味除大豆末外細剉爲末以豆末煮
糊爲丸如梧桐子大每服三丸冷酒下

半夏丸方　治風癇痰盛瘛瘲口吐涎沫

半夏湯浸去滑生爲末五兩　白礬生爲末二兩　丹砂研　鉛丹各研一兩
同研勻以粟飯爲丸如梧桐子大每服食後生薑
湯下二十丸

五枝煎方　治風癇多驚手足顫掉身熱瘛瘲
桃枝　柳枝　桑枝　夜合枝　槐枝並剉如豆大各一斗
大豆一升淘過　共六味用水一石慢慢火煎候豆爛及將
諸枝無味即濾汁於銀石器內煎令得所不可熬過
以瓷器盛每服一匙頭許入盧會末少許溫酒化破
空心徐徐服
治風癇瘛瘲不省方
虎糞燒灰乾　野豬骨并蹄炙各不拘多少　共研爲散每日空心
以酒調下二錢忌一切有足之物

水銀丸方　治風癇
水銀一分　雄黃研　龍腦研　牛黃研各一分　丹砂研一錢
再同研勻用糯米飲和丸如菉豆大每服五丸至七
丸熟水下空心臨臥日再服

風狂

論曰風狂之狀始發則少臥不飢自高自賢自辨自貴恭
人之榮衛周身循環晝夜不窮一失其平則有血并於陰
而氣并於陽者有血并於陽而氣并於陰者陰陽二氣應
實不調風邪乘虛而入并於陽則謂之重陽故其病妄笑
好樂妄行不休甚則棄衣而走登高而歌或至數日不食
故曰狂也又肝藏魂魂則隨神往來悲哀動中有傷於魂
則爲狂妄是亦血氣俱虛風邪乘之陰陽相并也
真珠散方　治風狂妄語心熱狂走不知人
真珠研　牛黃研　丹砂研各半兩　金箔研　銀箔研各五十
片　麝香研一錢　鐵粉研　天竺黃　人參　龍腦研各
三分　黃芩一兩　防風　犀角鎊各半兩　茯神一錢　麥門冬
半一兩　遠志　白鮮皮　羚羊角鎊各半兩　甘草炙
胡黃連　甘菊花　白附子各三分

除研外搗羅爲末入研藥拌勻每服一錢加至二錢
薄荷溫水或梨汁調下
茯神湯方　治風狂失神少臥不飢笑樂無節棄衣登高
茯神去木　杏仁湯去皮尖雙仁各三兩　龍齒六兩　凝水石一斤
升麻二兩　石膏碎二十兩　沙參　白茯苓　白鮮皮各二兩
生麥門冬四兩　剉如麻豆每服五錢水煎溫服如病甚
煎成入竹瀝半合再煎服

腦風

論曰內經謂風氣循風府而上則爲腦風夫風生高遠始

自陽經然督脉陽維之會自風府而上至腦户腦户者督
脉足太陽之會也又太陽之脉起於目內眥上額交巔上
入絡腦今風邪客搏其經稽而不行則腦髓內弱故項背
怯寒而腦户多風冷也

石膏散方　治腦風邪氣留連頭痛不已

石膏（火煆研）　天南星（炮）　白殭蠶（炒）

三味等分擣研為散每服二錢匕葱白二寸臘茶一
錢同連鬚葱煎湯頓服良久再服

穀精草散方　治腦風頭痛吹鼻

穀精草（末）　銅綠（研各一錢）　硝石（半錢研）　共研和勻每用
一匙吹入鼻內或偏頭疼隨病左右吹鼻中

通關散方　治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多
嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶蛾（瓦上炒令黃）　白附子（炮）　苦參　益智（去皮）　蒺藜
子（炒去角）　乾薄荷（各一兩）

共為散每服一錢匕溫酒調下日三服

點頭散方　治腦風頭痛吹鼻

細辛　高良薑　瓜蒂（各一分）　硝石（半兩）　共研為細散
用新水滿含一口搐藥半匙入鼻中良久即定

遠志散方　治腦風頭痛不可忍

遠志（去心不拘多少）　為細散每用半匙先含水滿口即搐藥
入鼻中仍揉痛處

羌活丸方　治腦風氣厥或膈痰氣逆上冲於頭令頭旋運

羌活（去蘆頭米泔浸一宿切焙乾二兩半）　白蒺藜（炒去角）　芎藭　乾鷄
蘇（各二兩）　白殭蠶（去頭角炒一兩）　共為細末鍊蜜和丸如彈
子大荊芥茶嚼下一粒不拘時候入龍腦麝香尤妙

何首烏丸方　治腦風鼻息不通清涕流出及諸風疾

何首烏（去黑皮二兩）　芍藥（一兩）　桂（去粗皮）　烏頭　芎藭
甘草（炙剉）　藁本　甘松　羌活　天麻　陳橘皮（湯浸去白）
縮砂蜜（去皮各二兩）　髮（煆存性一分）　右一十三味共為末鍊
蜜和丸如櫻桃大每服一丸薄荷葱酒嚼下不計時候

芎藭湯方　治腦風鼻息不通或流清涕多嚏

芎藭（二兩）　細辛（去苗葉）　黃芩（去黑心各一兩）　荊芥穗（二兩）
甘草（炙剉半兩）　每服三錢水一盞入薄荷七葉同煎至七
分去滓溫服

吹鼻散方　治腦壅頭痛

蘆薈研　龍腦研一瓜蔕搗　硝石研

四味等分爲末每用一豆許吹之

勝金散方　治腦風頭痛鼻塞不通或流清涕多嚏不已

荆芥穗　薄荷葉各四兩　木賊去節二兩　蛇蛻二條炙

四味擣羅爲散每服二錢清茶調下食後日三服

風頭眩　風頭痛　偏頭痛

風頭眩

論曰風頭眩之狀頭與目俱運是也五臟六腑之精華皆見於目上注於頭風邪鼓於上腦轉而目系急使真氣不

能上達故虛則眩而心悶甚則眩而倒仆也

枳實湯方　治風頭運倒眼旋腦項急痛

枳實去瓤麩炒　防風　麻黃去根節先煎掠去沫焙乾　芎藭各一兩

杏仁去皮尖雙仁炒一兩　半夏爲末生薑汁和作餅曝乾　細辛各二兩

麤擣篩每服五錢七以水一盞半煎至一盞去滓入竹瀝半合更煎沸早晚食前溫服

人參湯方　治頭風眩但覺地屋俱轉目閉不開

人參　防風　白术　當歸酒洗切焙　麥門冬去心焙各一兩

獨活去蘆頭　黃芪　桂去粗皮　芎藭各一兩半

麤擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫服日再夜一

獨活湯方　治風頭眩仆地屋轉嘔吐痰涎惡聞人聲

獨活去蘆頭　茯神去木各半兩　甘草炙　當歸酒洗焙切

牡蠣煅　白术　附子　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩　黃芪一兩半

防風　遠志去心三分　人參二兩半

剉如麻豆每服五錢七水一盞半生薑三片棗一枚去核煎至一盞去滓溫服不拘時

菊花湯方　治風頭眩悶起卽欲倒頭痛眼疼視屋轉動

甘菊花　細辛去苗葉各半兩　防風　前胡　茯神　白术

麻黃去根節各一兩　芎藭　杏仁湯浸去皮尖雙仁各三分

每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入竹瀝半合更煎沸食前溫服

山藥散方　治風頭目眩眼痛耳聾

山藥　甘草　五味子　甘菊花揀各半兩　細辛

山茱萸　升麻　蔓荆實各三分　防風一兩

爲細散每服三錢七空心溫酒下

附子膏方　治風頭眩摩頭

附子炮去皮臍　躑躅花各半兩　爲細末以麻油和如稀餳洗
頭摩之日三
守中丸方　治風頭眩腦轉目系急忽然倒仆
白茯苓去黑皮十兩　麥門冬去心三兩　白朮　人參
甘菊花擇去梗　山藥　枸杞子各二兩　生地黃二十斤取汁
共八味將七味擣羅爲末先用生地汁於銀器內入
酥三兩白蜜三兩同煎逐旋掠取汁上金花令盡得
五升許於銀器內拌炒前七味藥漸漸令盡候乾入
白蜜同搗數千杵丸如梧桐子大每日空心或食後

溫酒下五十丸服百日後五臟充滿肌膚潤滑修合
須擇四季旺相日或甲子日此藥亦名五芝地仙金
髓丸

風頭痛

論曰風頭痛之病由風邪客於陽經循風府而上至於頭
腦令人頭重疼痛心膈煩熱上焦痰滯頭面虛汗診其脉
左手寸口浮緊者是也

石膏散方　治風壅頭痛眉骨疼
石膏研　芎藭　旋復花各一兩　白附子炮　細辛去苗

一葉　甘草炙各一兩　共擣羅爲散每服半錢七順茶調下
不拘時候

清氣香芎湯方　治頭痛
芎藭五兩　細辛去苗葉二兩半　人參一兩半　半夏麴一分用生薑和
半夏末作麴用　甘草炙三分　右五味㕮咀如麻豆每服三錢
七水一盞入生薑三片薄荷五葉同煎七分溫服不
拘時候

芎藭散方　治風頭痛
芎藭　莎草根炒去毛一兩　藿香葉　荊芥穗各一兩

石膏研一兩半　共爲散每服三錢七荊芥湯調下食後服

丹砂丸方　治諸風頭痛不可忍者
丹砂別研水飛　石膏燒通赤地上出火毒　白附子炮各一兩爲末　龍腦
少許研　共同研令勻粟米飯丸如菉豆大更以丹砂爲
衣每服五丸食後薄荷茶嚼下

六神散方　治頭痛眼睛痛
鷄蘇　芎藭　馬牙硝研各二錢　石膏研　乳香研各一錢
龍腦研一匙　共研爲細末每用一匙含水搐於鼻中

吹鼻麝香散方　治頭痛不可忍

藜蘆一兩和用者　一味焙乾研爲散入麝香麻子許研匀
吹鼻中

通頂散方　治鼻塞及頭痛

馬牙硝半兩研細　地黃汁一合　二味相和於銅器內用慢
火煎乾取出研細每挑少許入鼻搐上吐痰即差

偏頭痛

論曰偏頭痛之狀由風邪客於陽經其經偏虛者邪氣湊
於一邊痛連額角故謂之偏頭痛也

至靈散方　治偏頭痛

雄黃研　細辛去苗葉爲末等分　二味再同研每用一匙左
邊痛搐入右邊鼻右邊痛亦然

乳香散方　治偏頭痛不可忍

乳香如皂子大　高良薑如指頭大　二味於火上燒迎烟熏鼻
隨痛左右用之

天南星散方　治偏頭痛

天南星醋漿水煮透心硬切曝乾一兩　菊花三分　自然銅燒赤醋淬一兩
防風半兩用水一椀同菊花自然銅防風三味煮水盡爲度去防風自然銅不用只單用菊花
芎藭一兩　五味除二味不用外擣羅爲細散每服半錢
七椀茶清少許調只作一口呷盡分作三嚥每嚥點
頭一點

蓽撥散方　治偏頭痛

蓽撥　一味爲細末每用一匙先令病人含滿口溫水
隨病左右搐入鼻中

漏風　勞風

漏風

論曰內經曰飲酒中風則爲漏風漏風之狀或多汗不可
單衣食則汗出甚則身寒喘息惡風衣裳濡口乾善渴不

能勞事又曰身熱解惰汗出如浴惡風少氣亦名漏風夫
惰以養陽酒入於胃與穀氣相薄熱盛於中其氣慓悍與
陽氣俱泄使人腠理虛而中風故其證多汗惡風不可單
衣其喘息而少氣者熱薰於肺風客於皮毛也其口乾善
渴者汗出多而亡津液也其解惰而不能勞事者精氣耗
不能營其四肢也謂之漏風以汗出不止若器之漏久而
不治轉爲消渴

澤瀉散方　治漏風身熱解惰汗出如浴惡風少氣

澤瀉　白朮各二兩半　麋銜一兩

爲散每服二錢沸湯調食後服

黃耆湯方　治風虛多汗夜臥尤甚牀席衣被並溼

黃耆　人參各二兩　麻黃根　牡蠣煅赤各二兩　地骨皮二兩半　龍骨四兩　每服三錢大棗二枚同煎空心服二日

防風散方　治風虛多汗惡風

防風一兩一分　澤瀉　牡蠣煅赤　桂各三分

爲細散每服二錢溫酒調下空心服日再

杜仲散方　治風虛多汗夜臥尤甚

杜仲炙炒二兩　黃芪　牡蠣煅赤各二兩　麻黃根五兩

爲細散每服二錢煎敗扇湯調下食後服日二

勞風

論曰內經曰勞風發在肺下其爲病也使人強上冥視唾出若涕惡風振寒夫勞風之病腎勞則根勞於下經所謂根弱則華葉枯矣故目眩不明而背反強腎之脉入肺中故因皮毛感風而振慄也腎主唾故津液凝結唾如涎涕治之以救其俛仰者戒其勞動也

麻黃湯方　治勞風胸膈不利涕唾稠黏上焦壅滯喉中不快

麻黃去根節　荊芥穗　杏仁去皮尖雙仁　木香　當歸　黃芩去黑心　羌活　芍藥　茈胡　大黃煨熟各一分　半夏湯洗七遍去滑一錢　牵牛子半兩

每服二錢生薑一片同煎食後溫服

芎枳圓方　治勞風強上冥視

芎藭一兩　枳殼去瓤麩炒　爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸食後溫水下

萎蕤飲方　治勞風項強急痛四肢煩熱

萎蕤二兩　人參　羚羊角鎊各二兩　每半兩入豆豉三合

葱白一握以水煎分溫空腹二服

風頭旋　風痰　胃風　風秘

風頭旋

論曰風頭旋者以氣虛怯所禀不充陽氣不能上至於腦風邪易入與氣相鼓致頭運而旋也又有胸膈之上痰水結聚復犯大寒陰氣逆上風痰相結上衝於頭亦令頭旋

松香散方　治風頭旋

松實去殼　白芷　當歸　芎藭　甘草炙各二兩　甜瓜子洗一升　同擣羅爲細散每服二錢食後以荊芥薄荷清

茶調下

荊芥丸方　治風頭旋目痛眩肢體拘急手足少力

荊芥穗四兩　細辛　芎藭　白殭蠶炒各一兩　天麻一兩半

羗活　防風　蒺藜子炒去角各一兩　同爲末煉蜜丸如鷄頭大每服一丸食後細嚼荊芥湯下茶酒亦得

人參丸方　治風頭旋目眩痰逆惡心胸膈痞滿欬嗽痰涎喘滿嘔逆不欲飲食

人參　甘草　白朮　旋覆花炒各一兩　麥門冬　前胡

枳殼各二兩　木香半兩　同擣羅爲細末以湯浸炊餅和

丸如梧桐子大每服二十丸食後生薑湯下

祛痰丸方　治風頭旋痰逆惡心咽膈不利

天南星生　半夏生　赤茯苓　乾薑炮　陳橘皮湯浸去白焙各等分　稀麪糊丸如梧桐子大每服三十丸加至四十丸溫米飲下

羚羊角湯方　治熱毒風上攻頭面目旋運耳內虛鳴身體癮疹麻痺

羚羊角二兩　菊花三兩　防風去叉　羗活　前胡　藁本

玄參　黃芩　杏仁去皮尖雙仁　菖蒲　甘草炙各一兩

每服五錢水煎食後溫服

治頭旋腦悶鼻塞眼運貼膏頂方

蓖麻子去殼研　杏仁去皮研　食鹽　芎藭末擣　松脂研各等分　先擣食鹽次下四味杵勻即塗於蠟紙上有病者先炙百會三壯訖將蠟紙藥於炙處貼之日一易得膿血出效

風痰

論曰風痰之病得於氣脉閉塞水飲積聚其狀雖有冷熱之異至於心胸痞隔飲食不化則一也蓋風壅氣滯三焦不和則水飲易至停積風能生熱壅亦成痰是故有頭目

不利神思昏濁之候其或嘔逆不納飲食者則因於胃冷而得之其治固不可一槩也

半夏飲方　治風痰心腹煩滿嘔逆不欲飲食

半夏湯浸去滑　大腹皮　麥冬　赤茯苓　白朮　桔梗

前胡各三分　青橘皮去白　厚朴薑汁炙一兩　防風　枇杷葉拭去毛炙各半兩　每服三錢入生薑一棗大同煎稍熱服

澤瀉湯方　治風痰壅滯胸膈不利頭目昏眩不思飲食

澤瀉　前胡　白朮　赤茯苓　甘草　人參　半夏

湯洗七度切作片以生薑汁浸焙乾炒各一兩 檳榔 陳橘皮湯浸去白焙各三分
枳殼去瓤麩炒半兩
每服二錢半生薑半分同煎溫服不拘時候
鐵刷湯方 治風痰胃中有寒嘔吐痰涎胸滿氣逆
附子五枚炮令微拆坐上以盞子覆冷取去皮臍 半夏湯洗七遍去滑麩炒一兩
木香半兩 剉如麻豆每服二錢入生薑一棗大大棗三
枚同煎空心食前溫服
天南星丸方 治風痰胸膈煩滿頭目昏眩
天南星一觔每枚重一兩者 用湯浸洗刮去浮皮并臍處令

浮用法酒浸一宿以桑柴蒸不住添熱湯令釜滿飯
內氣旺更不住灑酒常令藥潤七箇時滿取出用銅
刀切開揀大者嚼看不麻人口即是熟未熟即便
蒸候熟用銅刀子細切入石臼內木杵爛擣如泥入
丹砂一兩水飛過者麝香一兩細研羅過丁香末一
兩龍腦一兩同擣令勻丸如鷄頭大又用丹砂末一
兩為衣每服一丸嚼破用薄荷茶或酒任下小兒驚
風半丸合時忌鷄犬婦人見
前胡丸方 治風痰不散食逆嘔吐

前胡 白朮 枳殼去瓤麩炒 半夏湯洗七遍去滑 赤茯苓
人參各三分 白礬半兩枯 丁香一分 為末棗肉和丸如
梧桐子大每服二十丸煎生薑竹茹湯下食後服
逐痰丸方 治風痰壅盛每日早晨多喜嘔吐
人參 赤茯苓 乾薑 半夏湯洗七遍去滑各一兩
為末以粟米飯和丸如梧桐子大每服二十丸空心
生薑湯下日午再服
胃風
論曰胃風之狀頸多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

失衣則䐜脹食寒則泄注形瘦而腹大蓋胃者水穀之海
五臟六腑之大源因而食寒失衣則風邪入易感故證頸
多汗惡風者以人迎胃脉之所動也食飲不下膈塞不通
腹善滿者其經循腹裏其病在中焦也失衣則䐜脹者重
感於風邪傷肌肉也食寒則泄者風寒交傷於胃故泄注
也形瘦者精不營也腹大者氣不通也
豆蔻丸方 治胃風頸項多汗惡風飲食不下膈塞不通
腹善滿失衣則䐜脹食寒則泄形瘦而腹大
肉豆蔻去殼半兩 羌活 防風 桔梗炒各一分 陳橘皮湯浸

去白 獨活去蘆頭 薏苡仁 人參 草豆蔻去皮 芎藭各半兩 甘草 木香各等分 爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸米飲下日三夜一

厚朴煮散方 治胃風冷氣攻心腹脹滿疼痛飲食不消四肢羸瘦

厚朴薑汁炙 訶梨勒煨去核各一兩 木香 蒼朮米泔浸宿切焙

枳殼 當歸 桔梗炒各一兩 陳橘皮湯浸去白二兩

爲散每服三錢棗一枚同煎溫服

風秘

論曰風秘之病以大腸秘澀不通大腸者肺之腑通行水穀傳導所出若三焦不和風熱所搏則腸胃乾燥津液虛少糟粕結聚傳導不行令人心煩腹滿便秘不通也

前胡丸方 治風氣澀利腸胃

前胡 大黃 黃芩 木通 麻子仁 芍藥各一兩一分

共爲末煉蜜爲丸如豌豆大每服十五丸溫水食前下

調中丸方 治大腸風熱秘澀不通

大黃 鼈甲去裙襴醋炙黃 朴硝 桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒各四兩

皂莢五挺去皮捶碎用水一升揉取汁濾過 萊菔一觔搥碎絞取汁

共六味將前四味爲末以陳醋一升半同萊菔皂莢煎五七沸後入藥末同熬得所丸如梧桐子大每服二十丸米飲下

木香丸方 治腸胃風熱津液燥少大便秘澀

木香半兩 檳榔剉 大黃煨 麻子仁各一兩 牽牛子不 郁李仁湯浸去皮 枳殼去瓤麩炒各一兩 爲末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫米飲下食前

威靈仙散方 治老人風氣壅盛大腸秘澀五六日方大便一次頭旋目暗發作無時

威靈仙一兩酒洗焙乾 羌活去蘆一兩 芎藭各半兩

爲散每服二錢空心蔥湯調下

香枳散方 治大腸秘結風壅氣

枳殼去瓤麩炒 防風各一兩 甘草炙半兩

三味搗羅爲散每服二錢沸湯點服

引飲導秘丸方 治風熱大腸秘澀不通心煩腹滿體熱

檳榔 木香 芎藭 羌活 桂各二兩 大黃濕紙裹煨

郁李仁湯浸去皮尖各四兩 爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服

二十丸漿水下茶湯亦可

癧瘍風　白駮　白癜風　紫癜風

惡風　大風眉鬚墮落　大風出蟲

大風癩病　烏癩　白癩

癧瘍風

論曰癧瘍風之病其狀斑駮點點相連而大圓概似白駮而稍微也皆由風邪熱氣搏於脾肺二經流散肌肉使然也

烏蛇散方　治癧瘍風頸面斑駮

烏蛇（酒浸去皮骨炙二兩）　秦艽　芎藭（各一兩半）　桂　羌活

人參　山梔子　枳殼　丹參　沙參　玄參　犀角（鎊各一兩）

升麻　防風　木通　白鮮皮　黃芩　蒺藜子（炒去角一兩）　苦參（二兩）

共為散每日溫酒調下三錢食後臨臥服

雄黃散塗方　治癧瘍風面頷頸忽生斑駮其狀如癬

雄黃　硫黃　白礬（各一分並研如粉）

三味合研勻以鍊成豬脂調和塗上

附子散塗方　治癧瘍風身體斑駮

附子（一枚大者去皮生用）　硫黃（半兩研）　蒼耳苗（一握乾者）

三味擣研為末以米醋調先以布巾揩瘍上即以藥塗之乾再塗

巴豆塗方　治癧瘍風面頰頸項忽生斑駮如癬

巴豆（去皮生用一分）　釅醋（一合）　先以新布揩令赤於故沙盆內用醋磨巴豆如稀膏塗於患上

白駮

論曰白駮之病其狀駮斑如癬過於癧瘍但不成瘡爾皆由風熱搏於膚腠脾肺二經不和也

治白駮傅方

雄黃　石硫黃（各一兩研如粉）　蛇蛻皮（一條大者燒灰）

同研細用醋調成膏先以巴豆一粒中截以平處磨令皮起然後傅藥三兩徧即瘥

治頭項及面上白駮漸長如癬但不成瘡宜用此傅方

桂（一兩去粗皮）　研為末每用半錢或一錢以津唾和傅於白駮上日三

治面項身體白駮傅方

鮎魚（一頭約重半斤去腸肚淨洗後一依鮓法用鹽椒蔥粳米飯勻拌即用青荷葉裹作二包各用蒲片）

更用荷葉裹褁令大臭爛先以布拭白駮令赤次炙鮓包熱熨令汗出以綿衣包無令風冷所傷

蛇蛻皮方　治周身白駮漸長似癬但不成瘡

蛇蛻皮一條大者　炒熱揩摩白駮時時喫嚥數百徧棄之田野草中

鰻鱺魚塗方　治頸項及面上白駮漫延漸長如癬狀但不成瘡

鰻鱺魚一條肥者　炙令脂出先將白駮用物揩拭之令小痛然後用魚脂塗

大蛇皮塗方　治面項身體白駮風

蛇蛻皮大者燒作灰　石硫黃研　槲皮燒作灰二錢

三味令研極細以清漆調和勿令稠稀薄揩白駮處欲塗藥時先以巴豆中截用揩處摩令皮微起然後傅藥

白癜風

論曰白癜風之狀皮膚皺起生白斑點是也由肺臟壅熱風邪乘之風氣相并傳流榮衛壅滯肌肉久不消散故成此疾也

烏蛇散方　治白癜風身體瘴麻

烏蛇酒浸去皮骨炙二兩　白殭蠶炒　胡麻子　獨活　天麻各二兩　烏頭炮去皮臍　細辛　防風去叉　桂　枳實

蟬蛻　白附子炮各半兩　天南星一分

為散每服溫酒調二錢不計時候

治白癜風方

杏仁去雙仁不去皮尖生用　每日早晨爛嚼二七粒於白點處揩夜臥再用

治白癜風方

雞子三枚和殼以米醋三升浸七日取白　石硫黃研半兩　附子去皮臍生用一枚重半兩者　粟米二錢　共四味將後三味搗羅為末以前

雞子白調如稀糊臨用藥先以葛布揩患處令赤塗之

苦參膏方　治白癜風

苦參　蘆各一分　研為末先以酒一升煎至四合入藥

二味攪勻慢火再煎成膏每用先以生布揩患處令赤塗之

紫癜風

論曰紫癜風之狀皮膚生紫點搔之皮起而不痒痛是也

此由風邪挾濕客在腠理榮衛壅滯不得宣流蘊瘀皮膚
致令色紫故名紫癜風
烏蛇散方　治癧麻紫癜風
烏蛇（酒浸去皮骨炙）　防風　羌活　人參　玄參　沙參
苦參　丹參　白附子　蒺藜子（炒去角各一兩）
爲散每服一錢溫酒調下
附子硫黃散方　治紫癜風斑點
附子（生用去皮臍一枚）　石硫黃（別研半兩）
共研爲細散入胡粉一分膩粉少許同漿柳汁和勻

臨臥揩三五徧早晨溫漿水洗不三五夜瘥
牡蠣散方　治紫癜風
牡蠣　膽礬（各半兩）　二味生用爲散釅醋調摩患處
胡桃塗方　治紫癜風幷白癜風
初結青胡桃（一枚取皮用）　石硫黃（一皂子研如粉）
二味先取胡桃皮切研如膏入硫黃末和勻塗之
羊蹄根塗方　治紫癜風
羊蹄根（絞自然汁半合）　生薑（絞自然汁半合）　石硫黃（一兩研如粉）
三味將二汁與硫黃末同研令粘塗患處一日不得
洗不過兩上瘥

惡風

論曰惡風者皆五風癘氣所致也風有青白赤黑黃之異其毒中人五臟則生蟲亦有五種蟲生息滋蔓入於骨髓五臟內傷形貌外應故食肝則眉睫墮落食肺則鼻柱倒塌食脾則語聲變散食腎則耳鳴如雷鼓之聲心不受食食心則爲不可治是故謂之惡風

五參散方　治惡風
人參　沙參　丹參　玄參　苦參　木通　蒺藜子

烏蛇（酒浸去皮骨炙）　乾蝎　天麻　赤箭　何首烏　陳橘
皮（各一兩）　黃芩（半兩）　原蠶蛾（一分）
並生用爲散每服三錢熱茶調下服及半料即減服二錢初服三日後先覺頭項脊膂身上疼痛乃藥力與病相擊也當安臥兩復時許即無事如或身上有瘡腫服藥一日後便覺漸減
何首烏丸方　治脾肺風幷惡風等疾
何首烏　石菖蒲　荊芥穗　蒼耳　胡麻（炒各一兩）
玄參　沙參　苦參　白花蛇（酒浸去皮骨）　烏蛇（酒浸去皮骨各）

半兩 共擣研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十丸茶酒任下如要作散每服二錢溫酒調下不計時候

威靈仙散方 治惡風

威靈仙二兩 丹參六兩 羌活一兩 獨活一兩 蒼耳四兩 仙靈脾 玄參 人參 沙參各二兩 紫參一兩 甘草一兩生用 黃芩各二兩 爲散食後臨臥溫水調下三錢若身體無瘡眼瞳人不斷鼻梁不塌服之一月可差

蔓荊實方 治肺臟風毒發作如癩變成惡風證

蔓荊實去白皮生用四兩 胡麻研爲末炒熟半兩 天麻二兩 菊花未開者良生用四兩 天南星 枸杞生用四兩 苦參研取粉四兩

爲散每服溫酒調下二錢日三夜一每服宜去食稍遠恐藥食相犯

大風眉鬚墮落

論曰大風眉鬚墮落者蓋癩病也皆由惡風染著榮衛不清風濕毒氣浸漬肌肉致淫邪散溢痒痱成瘡皮膚瘍潰鼻柱倒塌鬚眉墮落

枳殼散方 治大風癩病眉鬚墮落熱毒風入五臟身體頭面生瘡

枳殼去瓤麩炒 黃耆 蒼耳 白朮 蒴藋 白蒺藜炒 防風生用 升麻生用 梔子仁研三分 漏蘆 黃連 人參 天門冬 防已 乾薑 芎藭 丹參 麻黃去根節煮去沫 白芷 甘草炙 葛根各半兩 玄參堅者三兩 烏蛇酒浸去皮骨炙一兩

共爲末散每服溫酒調下二錢至三錢空心夜臥服

梔子散方 治大風癩疾眉鬚墮落徧身痹麻手攣縮

山梔子二兩半 芎藭一兩半 藁本三分 當歸 蔓荊實各一兩 桔梗一兩三分 羌活 白蒺藜 白茯苓 防風各一兩三分 側子 天麻各半兩 每日空心溫酒下二

錢加至三錢夜臥時再服服至一料眉鬚再生

羚羊角飲方 治大風癩身上生瘡并面部浮腫眉鬚墮落四肢痹痒

羚羊角鎊 甘草炙各三分 獨活 山梔子仁各一兩半 防風一兩 枳殼 黃耆 蒺藜子 丹參去苗少炒 玄參 木通各一兩一分 每服五錢水煎溫服每日早食後及夜臥各一服

大風出蟲

論曰蟲動物也皆風之所化風入五臟化生五蟲則成五癩入肝其蟲青入心其蟲赤入脾其蟲黄入肺其蟲白入腎其蟲黑四蟲皆可治惟黑蟲爲難瘥或所傷未深專意治之亦差者

熱艾方　治大風癩熏出蟲

艾葉(別搗令熟)　砒霜(研)　水銀(與雄黄同研)　膩粉　硫黄

丹砂(研)　阿魏(酒化去沙石麪和作餅炙)　附子　雄黄(研細入水銀點醋再研令星子盡如入膩粉砒霜硫黄丹砂同研各一兩)　麝香(研半兩)　豬牙皂角(一斤去皮研爲末)

共十一味除艾葉皂角別搗爲末外並合細研用紙四張先布次艾糝皂莢末次糝諸藥末卷刀切如餅餤若椀內燒以小木瓶子籠椀以衣襯四邊坐於上熏以衣被遮壅定不令透出氣熱悶即俯伏

獨活散方　治大風癩出五蟲

獨活(三分)　雄黄(研半兩)　白斂(研一分)　麻黄(去根節煎去沫半兩)

水銀(一分與丹砂雄黄點醋同研以水銀星子盡爲度)　阿魏(一兩生研)　雷丸

丹砂　滑石(各研半兩)　石膽　牛黄　紫石英(各研一分)　斑猫(四十枚與糯米同炒去翅足米不用)　芫青(四十枚與糯米同炒去翅足米不用)

共一十四味研爲散每服一錢空心温酒調下不得飽食晚更服當有蟲從小便中出或當日或三四日至十日方出若瀉出赤蟲如爛櫻桃或如豆麥或瀉出黄蟲似黄涕青蟲似青涕菜汁白蟲似馬尾蟲遇藥氣即死或隨大便下唯黑蟲如豆豉汁此爲難治

大風癩病

論曰癩者內經爲癘瘍者榮氣熱其氣不淸故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰其證不同其始則乍寒乍熱腠理壅塞血氣梢澀耗竭久而不治令人痛痺汗不流泄手足痠疼面目習習奕奕胸頸間狀如蟲行身體徧痒搔之成瘡或

身體錐刺不痛青赤黄黑如腐木形或痛無常處流移非一或似雞縛拘急不可俯仰眼目淨澀小便黄赤餘瀝心肺恍惚而善噫也日月浸久其風化生而蟲蟲既變動外先食氣血膚革不澤其內則食五臟食肝則眉睫墮落食肺則鼻柱損壞食脾則語聲散亂食腎則耳鳴雷鼓之音食心則死推是癩病率皆風與蟲之爲害也

羚羊角散方　治大風癩疾

羚羊角(鎊)　犀角(鎊)　吳茱萸(湯洗焙炒各一分)　羌活

獨活(各半兩)　麻黄(去根節炙)　烏蛇(酒浸去皮骨)　蔓荊實(去白皮)

當歸 黃耆 防風 附子 杏仁去皮尖 蒺藜子炒去角各半兩

為散每服一錢空心服食前溫酒調下

烏蛇丸方 治大風癩疾若眼脉斷指節冷落脚下有瘡語聲嗄為不可治如未有此證宜服

烏蛇一條酒浸去皮骨首尾二兩 檀香 丁香 茜根 紫葳

防風 苦參 獨活 沙參 梔子仁 酸棗仁生用

槐子 白芷 附子 藁本 防已 羚羊角 蒼朮蔺炒

犀角鎊 萆薢 秦艽 桃膠生用 蕪荑仁炒

括摟根 烏藥各三分 桑根白皮剉三兩 木通一兩半

共擣羅為末鍊蜜如赤小豆大每服空心溫酒下十丸至十五丸日二如不飲酒薄荷槐白皮湯下如要速差宜用後湯藥下

桑枝湯方 治大風癩疾下藥

桑枝 柳枝 槐枝 枸杞根 黃荊根 羚羊角鎊各一兩

六味並生用剉如麻豆大每服用藥五錢以水一盞半煎七分下前丸藥服一月必覺四體皮膚痒痛不可忍但宜飲酒不得搔抓仍頻飲食避外風如有汗必腥臭及有蟲從皮膚中出如麩塵或馬尾頭髮尖或如線縷尖或如麩皮片頭黑身白形色不定但痒之後仔細看之或從小便中出或從泄瀉中出者大效此疾稍退終身禁房室又忌動風物時以苦參湯洗浴須換新衣其舊衣幷牀薦等並焚之

艾蒿醞酒方 治大風癩病身體面目俱有瘡癩惡汗自出

白艾蒿十束每束如斗大淨擇木杵搗細剉 一味煮取濃汁拌麪米一如常醞法酒熟去糟取酒稍溫飲之令常醺醺然

天門冬丸方 治大風癩病

天門冬去心生用五斗研絞取汁 一味內瓷器中密蓋口以蠟封

勿失藥氣於淨室中經一年取開其色赤如沙糖即入苦沙參粉及乾地黃末為丸如梧桐子大每服十丸溫水下食後服

白花煎方 治大風癩疾

白蜜二十兩 石榴七顆甜者幷皮用 生薑去皮細切八兩

三味先研生薑石榴絞取自然汁更濾令淨入蜜盛於瓷瓶以蠟紙封口勿令通氣垂繫於釜中勿到底以重湯煎一復時成煎空心酒調二錢加至三錢日二夜一旬日內有惡物隨便而出是病根散矣

黄精丸煎方　治大風癩疾面赤瘮起手足攣急身發瘡痍指節落

黄精生者十二斤　白蜜五斤　生地黄肥者五斤

三味先將黄精生地黄洗淨細剉以木石杵臼搗熟復研爛入水三斗絞取汁置銀銅器中和蜜攪勻煎之成稠煎爲度每用溫酒調化二錢至三錢日三夜一久服風癩瘥平面如童子延年不老

黄金丸方　治大風癩病

金箔五十片　牛黄研　麝香研　龍腦研　白附子炮

天竺黄各半兩　人參　白芷　細辛　芎藭　天南星生用各二分　天麻　白花蛇酒浸肉炙　防風各一兩半　黄芪　藁本　白殭蠶　羌活　麻黄　白茯苓　犀角鎊　羚羊角　芍藥　甘草炙各一兩　甘菊三兩

共研爲細末别用生地黄汁二升蜜半觔酒一觔酥三分慢火同煎成放冷和藥末勻丸如鷄頭大每服三丸細嚼茶酒任下

黄芪丸方　治大風癩疾

黄芪　防風　丹參　白朮　白茯苓　芎藭　山梔子　赤芍藥　枳殻　細辛各一兩半　大腹皮一兩二分　升麻　秦艽各二兩　蒺藜子　獨活　苦參各三兩

共爲末錬蜜和丸如梧桐子大空腹煎枳殻湯下二十丸日再服

烏癩

論曰烏癩初覺皮膚變異肌膚之間淫淫躍躍如蟲行動眼前有物如系懸布時發驚恐言語錯亂皮肉惡瘮如桃李實或赤或黑手足痹痒不知痛所或脚下痛不可踐地身體生瘡兩肘如縛此名黑癩皆由惡風日漸傷損血氣不柔所致也

馬先蒿散方　治烏癩

馬先蒿不計多少一名馬矢蒿一名爛石草細切晞乾用　搗羅爲散每服一錢荆芥薄荷湯下

治烏癩浸酒方

苦參根白皮五斤　細剉如麻豆生絹袋貯好酒三斗冬浸七日夏浸四日每溫飲一合至三合日一夜一漸加五七合

露蜂房酒方　治烏癩

露蜂房五兩　苦參四斤　二味剉細用水三斗煮取一斗

五升去滓浸麯四觔半炊黍米二斗如常醞法酒熟每服三合至五合日二夜一稍增無妨

雌黃散塗方　治烏癩

雌黃半兩　以米醋和鷄子清如膏塗瘡上乾即便塗

白癩

論曰白癩之狀語聲嘶嗄目視不明四肢癱瘓關節熱痛如火燔灼脊膂拘急肉如刀劈手足緩弱身體瘾疹身生息肉目生白珠肉色斑白故謂之白癩也

烏蛇散方　治白癩語聲嘶敗四肢痿痺瘙痒生瘡

烏蛇酒浸去皮骨炙　葛根各一兩　苦參　紫參　沙參　人參　芎藭　天麻　黃芩　木通　地骨皮　防風　防己　白术　蒴藋　黃連　莽草葉　木蘭皮　附子炮去皮臍　烏頭炮去皮臍　牛膝　萎蕤　檳榔煨　熟乾地黃　芍藥　桂　玄參　龍骨研　石膏研　升麻　菊花未開者炒　蒺藜子炒去角　秦艽　細辛去苗葉　天雄炮去皮臍各一兩　當歸切焙　甘草炙　遠志　巴戟天　蒼耳花炒乾各三分　吳茱萸湯洗　麝香研各半兩　右四十二味擣研細羅爲散每服二錢空心溫酒調下加至三錢日再服

白花蛇散方　治白癩語聲嘶嗄目視不明四肢癱瘓關節熱痛身體瘾疹身生息肉

白花蛇酒浸去皮骨　天麻　槐子　羌活　防風　晚蠶沙炒　蔓荆實　白鮮皮　威靈仙　枳殼各一兩　甘草炙半兩　擣羅爲散每服一錢溫酒調下不拘時候

諸痺門

痛痺　著痺　行痺　皮痺　肌痺

血痺　脉痺

諸痺統論

論曰飲天和食地德皆陰陽也然陽爲氣陰爲血氣爲衛血爲榮氣衛血榮通貫一身周而復會如環無端豈鬱閉而不流哉夫惟動靜居處失其常邪氣乘間曾不知覺此風寒溼三氣所以雜至合而爲痺淺則客於肌膚深則留於骨髓陽多者行流散徙而靡常陰多者凝泣滯礙而有著雖異狀殊態然卽三氣以客之則所謂痺者可得而察矣且痺害於身其爲疾也初若無足治至其蔓而難圖則偏廢弗擧四體不隨皆自詒伊戚者也可不愼哉

痛痺

論曰寒氣勝者為痛痺夫宜通而塞則為痛痺之有痛以寒氣入經而稽遲泣而不行也痛本于寒氣偏勝則陽氣少陰氣多與病相益治宜通引榮衛溫潤經絡血氣得溫則宜流自無壅閼矣

茯苓湯方 治風溼痺四肢痛痺拘攣浮腫

赤茯苓 桑根白皮各二兩 防己 桂 芎藭 芍藥 麻黃去根節各一兩半 甘草一兩炙 每服五錢棗一枚去核水煎溫服連三服後以葱粥投之汗出為度

天雄丸方 治風濕痺皮肉不仁骨髓疼痛不可忍者

天雄去皮臍炮 附子去皮臍炮各一兩 桂一兩半 乾薑炮三兩

防風二兩 為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下日三夜一

當歸摩膏方 治諸風寒濕骨肉痺痛

當歸一兩 細辛半兩 桂一兩 生地黃一斤切研絞取汁 天雄十枚去皮臍生用 芎藭半兩 白芷三分 丹砂一兩研 乾薑三分 烏頭生用一兩二分 松脂四兩 豬脂四兩別鍊去滓

右十二味先將八味剉如大豆粒以生地汁浸一宿與豬脂松脂同慢火煎候煎白芷黃色以厚綿濾去滓瓷盒盛入丹砂末不住攪至凝即止每用藥用火炙手摩病處千徧

著痺

論曰內經謂溼氣勝者為著痺地之溼氣感則害人皮肉筋脈蓋溼土也土性重緩榮衛之與溼俱留弁以溼勝則著而不移也其證多汗而濡者以陰氣勝也治宜除寒溼通行經絡即差

天雄酒方 治寒溼著痺皮肉不仁至骨髓疼痛

天雄 附子去皮臍 防風 獨活 當歸 白朮

五加皮 芎藭 桂 乾薑二兩

剉如麻豆以夾絹囊盛用無灰清酒一斗浸春夏五日秋冬七日溫飲任性加減以醉為度

茯苓湯方 治風溼痺自著不去四肢痺麻拘攣浮腫

赤茯苓 桑根白皮各二兩 防己 桂 芎藭各一兩半 甘草炙二兩 芍藥 當歸 麻黃去根節煮各一兩半

每服六錢棗三枚劈破同水煎溫服如欲出汗以生葱熱粥投之汗出慎外風

治風溼著痺服藥雖多肌肉猶瘰痺摩風膏摩之方

防風　羌活　芎藭　細辛　蜀椒去目并閉口　當歸
白斂　躑躅花各半兩　白芷　丹參　黑參　桂
附子　烏頭　皂莢　莽草各一分　杏仁半兩　苦參

細剉如麻豆以米二升拌勻浸三宿蒸乾同臘月豬脂二觔以文武火煎一日綿濾去滓瓷缾貯每服少許點摩痛痺處兼治一切風毒其有年歲深久者丸

龍虎骨方　治風溼著痺肌肉痛厚不知痛痒

龍骨二兩　虎骨三兩酥炙　當歸　桂各一兩　皂莢半斤去皮子

共為末先別用好肥皂莢十挺以苦酒二升挼取汁去滓入鐺內煎減半即入前藥同煎如稀餳入瓷缾盛每用少許揩摩痛痺處

行痺

論曰內經謂風寒溼三氣雜至合而為痺其風氣勝者為行痺夫氣之在人本自流通所以痺者風寒溼三氣合而為病然三氣之中各有陰陽風為氣善行數變故風氣勝則為行痺其證上下左右無所留止隨其所至氣血不通是也治法雖通行血氣宜多以治風之劑

防風湯方　治行痺行走無定

防風　甘草各一兩　黃芩三分　當歸　赤茯苓各一兩
秦艽　葛根三分　桂去麤皮　杏仁炒各一兩　麻黃去根節煎去沫半兩

每服五錢棗二枚生薑五片酒一鍾水一鍾同煎溫服

山茱萸丸方　治風痺遊走無常處亦治血痺

山茱萸一兩一分炒　生乾地黃二兩　山藥　牛膝　澤瀉
萆薢各一分　天雄　蠐螬　車前子　乾漆　狗脊去毛
白朮　地膚子各三分　茵芋半兩　共為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服溫酒下二十丸加至三十丸

皮痺

論曰風寒溼三氣雜至合而為痺以秋遇此者為皮痺蓋肺主皮毛於五行為金於四時為秋當秋之時感於三氣遂為皮痺蓋正言其時之所感者爾固有非秋時而得之者皮膚不營而為不仁則其證然也

防風湯方　治肺中風寒溼項強頭昏胸滿短氣噓吸顫掉言語聲嘶四肢緩弱皮膚瘙痒

防風　芎藭　麻黃各一兩　獨活　桂　前胡　五味子　附子　杏仁　人參　茯神三分　甘菊花　黃芪

甘草各半兩　每服四錢生薑五片水煎溫服

蔓荊實丸方　治皮痺不仁

蔓荊實去浮皮三錢　防風　羌活　桔梗　白附子

枳殼　蒺藜子炒去角各半兩　皂莢半斤新水浸一宿挪濾去滓入麪少許同煎成

膏　七味爲末入膏中和搗丸梧桐子大每服二十丸

食後熱水下

天麻丸方　治皮膚瘙痒

天麻二兩　玄參　沒藥研　地榆　烏頭各一兩　麝香研一

分　四味爲末與二味研者和勻鍊蜜丸如梧桐子大

每服二十丸空心食前溫酒下

肌痺

論曰風寒溼三氣雜至合而爲痺以至陰遇此者則爲肌

痺其狀皮膚弗營肌肉痛痺而不仁是也

西州續命湯方　治肌痺津液開泄時復不仁或四肢急痛

麻黃去根節煎掠去沫焙乾　當歸切焙　石膏研各二兩　芎藭　桂

甘草　黃芩　防風　芍藥各二兩　杏仁湯浸去皮尖炒四十枚

每服四錢生薑一片棗二枚水煎溫服不計時候

細辛湯方　治肌痺淫淫如蟲行或腠理開疏汗出皮膚

肉色不澤脣鼻黃

細辛　防風　白朮　附子　桂各一兩　石膏研

黃芪　麻黃去根節煎掠去沫焙乾各二兩　枳實去白麩炒　甘草各半兩

當歸一兩　每服四錢生薑五片水煎溫服

血痺

論曰血痺之狀形體肌膚如被微風所吹者是也蓋血爲

陰邪入於血而痺故謂之血痺宜先鍼引陽氣後以藥之

芍藥湯方　治風血痺身體不仁肉冷

赤芍　側子　桂　麻黃　萆薢　當歸　丹參各一兩

細辛　甘草各半兩　每服三錢生薑五片水煎溫服

黃芪湯方　治風血痺陰陽俱微寸口關上微或尺中小

緊其狀身體不仁如賊風所中

黃芪　芍藥各一兩　桂三分　每服五錢棗二枚生薑三

片水煎早晨日午晚各一服

萆薢丸方　治風邪遊走無定處名曰血痺

萆薢　山藥　牛膝　澤瀉各一兩　白朮三分　地膚子半兩

山茱萸炒一兩　狗脊三分　茵芋一分　熟乾地黃二兩半

共爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十丸溫酒下不

拘時稍加至五十丸

脉痺

論曰血性得溫則宜流得寒則凝澀凝澀不行則皮毛萎悴肌肉痛痒內經謂風寒溼三氣雜至合而爲痺又曰夏遇此者爲脉痺痺則血凝不流可知也

人參丸方　治脉痺通行血脉

人參　麥門冬　茯神　龍齒　遠志　黃芪　菖蒲　赤石脂各一兩　熟乾地黃二兩　爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服食後良久以清粥飲下三十丸

防風湯方　治脉痺

防風　當歸　秦艽　赤茯苓　茵芋去莖　甘草炙　桂去粗皮　杏仁去皮尖雙仁麩炒　獨活各一兩

每服五錢以酒水各半生薑半分同煎服

筋痺　骨痺　腸痺　周痺　痺氣

熱痺

筋痺

論曰經曰風寒溼三氣雜至合而爲痺又曰以春遇此者爲筋痺其狀拘急屈而不伸是也筋痺不已復感於邪內舍於肝是爲肝痺其狀夜臥則驚飲多數小便上爲引如懷蓄涎氣乏竭痺聚在肝治法以筋痺爲先筋痺既平則邪弗入於肝矣

天麻丸方　治筋風四肢攣痺

天麻　細辛　菖蒲　赤箭　地榆　人參各一兩　附子　芎藭　木香各一兩　桂一兩半　苦參三兩　牛膝酒浸二兩　陳橘皮湯浸去白焙乾一兩　當歸切焙　赤芍　酸棗仁　威靈仙去土　藁本　防風　獨活各二兩

共爲細末鍊蜜和杵爲丸如梧桐子大每服溫酒下二十丸至三十丸

牛膝湯方　治筋痺以筋虛爲風所傷故筋攣縮腰背不伸強直時痛

牛膝酒浸　防風　丹參　前胡各二兩　石斛二兩半　桂塗酥炙　秦艽去苗土　續斷各一兩半　陳橘皮去白一兩　大麻仁一合　除大麻仁外擣篩每服五錢煎熟別下麻仁末一錢再煎空心服日二

防風湯方　治肝痺頭目昏塞四肢不利胸脇處煩

防風一兩 芎藭 黃芪 五味子 人參 茯神
獨活 羚羊角鎊屑 前胡各三分 細辛 酸棗仁
甘草各半兩 每服三錢大棗三枚水煎溫服

骨痺

論曰經謂人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨腎不榮則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痺是人當攣

節也夫骨者腎之餘髓者精之所充也腎水流行則髓滿而骨強迨夫天癸虧涸則腎脂不長腎脂不長則髓涸而氣不行骨乃痺而其證內寒也雖寒不為凍慄則以肝心二氣為陽火一水不能勝之特為骨寒而已外證當攣節則以髓少而筋燥故攣縮而急也

石斛丸方 治腎虛骨痺肌體羸瘦腰腳痠疼飲食無味小便滑數

石斛去根 牛膝酒浸 續斷各三分 菟絲子酒浸別研 石龍芮炒 桂各一兩 肉蓯蓉酒浸三分 鹿茸去毛酥炙一兩 杜仲

白茯苓 熟乾地黃各一分 附子一兩 巴戟天半兩
防風二分 桑螵蛸炙 芎藭各半兩 山茱萸二分 覆盆子半兩 補骨脂 蓽澄茄各三分 五味子半兩 澤瀉一兩
沉香 蘹香子各三分炒 薏苡仁一兩
共為末鍊蜜和杵數百下丸如梧桐子大每服空心以溫酒下三十丸日二服

熟乾地黃丸方 治腎虛骨痺面色萎黑足冷耳鳴四肢羸瘦腳膝緩弱小便滑數補腎

熟乾地黃 肉蓯蓉酒浸 磁石煅醋淬二兩 山茱萸三分

桂去粗皮 附子各半兩 山藥三分 牛膝酒浸切焙一兩 石南
白茯苓 澤瀉 黃芪各三分 鹿茸去毛酥炙二兩 五味子三分 石斛一兩 覆盆子 遠志二分 補骨脂炒一兩
萆薢 巴戟天各一分 杜仲一兩 菟絲子二兩酒浸別研
白龍骨兩 共為末鍊蜜和杵數百下丸如梧桐子大每服空心以溫酒下三十丸日三服

腸痺

論曰內經曰腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄夫大腸者傳導之官其所以傳導者皆冲和之氣今風寒

淫三氣乘虛客於腸間則邪留而和氣閉矣故其證數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄大小腸氣痺水道不通故雖多飲而不得溲便并氣於大腸使糟粕不化故中氣喘爭時發飧泄也

草豆蔻散方　治腸虛寒淫內攻腹痛飧泄

草豆蔻　陳橘皮（湯浸去白各一兩）　桂　木香　白朮　當歸（切焙）　白豆蔻仁　丁香　肉豆蔻仁　良薑（各半兩）

為散每服一錢生薑棗湯調下食前服

訶梨勒丸方　治腸痺飧泄腹脇脹滿

訶梨勒（煨用皮一兩）　乾薑（三分）　當歸（炒一兩）　黃連（去鬚一兩）

白朮（一兩）　木香（三分）　厚朴（生薑汁炙一兩）　為末鍊蜜和杵二三百下丸如梧桐子大每服三十丸粥飲下不拘時候

周痺

論曰黃帝鍼經謂周痺者在於血脉之中隨脉以上隨脉以下不能左右各當其所夫風淫寒之為痺本痺而不通今乃能周身上下者以其邪中於血脉之間與脉流通隨氣上下升降無礙也

黃芩湯方　治周痺身體不仁

黃芩　甘草　防風（各半兩）　秦艽　葛根　杏仁（麩炒各一分）　桂　當歸　赤茯苓（各半兩）　為散每服六錢水酒各半棗二枚生薑一片同煎溫服日二夜一

續命湯方　治八風十二痺

羌活（三分）　茯神　薏苡仁（炒各一兩）

每服六錢別入竹瀝一匙更煎數沸溫服日二夜一

醍醐方　治寒濕周痺

醍醐（一兩）　每日空心以溫酒五合和一匙服之

大豆糵方　治周痺除五臟留滯胸中結聚益氣止毒潤

皮毛補腎

大豆糵（一升炒令香熟）　為末每空心溫酒調下一匙再加

野駝脂方　治周痺

野駝脂（鍊了濾過一斤）　別入好酥四兩同鍊攪勻每服半匙以熱酒半盞和化服之加至一匙空心食前各一服

痺氣

論曰內經謂人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何是人多痺氣也陽氣少陰氣多故寒如從水中出夫陽虛生外寒陰盛生內寒人身陰陽偏勝則自然生寒熱不

必外傷於邪氣也痺氣內寒者以氣痺而血不能運陽虛而陰自勝也血凝泣而脉不通故其證身寒如從水中出也

溫補鹿茸丸方　治陽氣虛陰氣盛痺氣內寒如從水中出

鹿茸酥炙四兩　人參　天雄　五加皮　五味子　牛膝酒浸　防風　遠志　石斛　山藥　狗脊各一兩　肉蓯蓉酒浸切焙　熟乾地黃各三兩　萆薢　石南　蛇牀子　白术各二分　巴戟天　天門冬　杜仲各一兩半　乾薑　吳茱萸炒　桂　附子去皮臍　細辛　蜀椒去目并合口者各三分

白茯苓　兎絲子酒浸別擣各一兩一分　覆盆子　石龍芮各二兩

右除兎絲子別擣外擣羅爲末再拌勻鍊蜜丸如梧桐子大每服溫酒下二十丸加至三十丸空心食前日三

補益黃芪丸方　治陰盛陽虛痺氣身寒如水中出

黃芪　鹿茸酥炙　白茯苓　烏頭去皮臍　乾薑各三分　桂　芎藭　當歸　熟乾地黃各一兩　白朮　兎絲子酒浸一宿別擣　五味子　柏子仁　枸杞根各一兩半　大棗去核廿枚

共十五味除兎絲子別擣外同擣羅再拌勻鍊蜜丸如梧桐子大每服空心溫酒下十五丸日三

熱痺

論曰內經於痺論有云其熱者陽氣多陰氣少陽遭陰故爲熱痺蓋腑臟壅熱復遇風寒溼之雜至客搏經絡留而不行陽遭其陰故痛痺熻熱而悶也

升麻湯　治熱痺

升麻　射干　甘草　芎藭　人參各二兩　赤小豆炒三合　麥門冬　生薑　萎蕤各三兩

每服四錢生地黃汁半合青竹葉十五片水同煎溫服不拘時候

犀角升麻湯　治熱痺

升麻二兩　茯苓　人參　防風　犀角鎊　羚羊角　羗活去蘆頭各二兩　桂一兩半　每服四錢生薑一塊竹瀝少許水同煎溫服

聖濟總錄纂要卷二終

聖濟總錄纂要卷之三

程　林雲來　纂
閔丗璋象南
新安　　　　　　較
吳慈藹蓮士
江　湘郢上　閱

傷寒門

傷寒可汗　可下　可吐　可溫　傷寒過經不解

傷寒統論

論曰風寒暑溼飲食勞倦皆能爲病是謂五邪冬傷於寒者春必病溫春傷於風者夏必飧泄夏傷於暑者秋必痎瘧秋傷於溼者冬必欬嗽是乃四時之氣也然五邪所中雖不同本皆外邪大率同類唯多冬時嚴寒其毒厲尤甚人或中之病在冬時則正名傷寒若邪毒藏於肌膚至春之時乘溫而發者溫病若蓄積日久至夏之時乘盛暑而發者爲暑病所謂先夏至一日爲病溫後夏至日爲病暑是也其病之傳必先客於太陽其病令人頭項痛腰脊強其脉尺寸皆浮太陽不已傳於陽明其病體熱目疼鼻乾不得臥其脉尺寸皆大陽明不已傳於少陽其病胸脇痛

而耳聾其脉尺寸皆弦少陽不已太陰受之其病腹滿體重其脉尺寸俱微太陰不已少陰受之其病口燥舌乾而渴或背微惡寒其脉尺寸俱沉少陰不已厥陰受之其病煩滿舌卷囊縮其脉寸尺俱緩病之所傳不過三陰三陽而已其未滿三日者邪在陽經未入於裏其病在表宜汗之而愈若經四日者邪入陰經其病在裏宜下之而愈特其大畧爾蓋有一日而傳之數經者亦有數日而尚在太陽者陽病雖宜發汗陽明之病反宜下之陰病雖宜下少陰之病或宜溫之由人之稟受虛盛其傳有遲速又有不傳經者當審其脉證凡此六經受病五邪脉證各不同傷風必惡風其浮緩傷寒者必惡寒其脉浮緊以至傷暑脉虛傷溼脉濡人迎緊盛爲傷寒氣口緊盛爲傷食診得五邪知其本也診得六經知其標也有病雖在表而不可汗者或裏而不可下也或若汗之太多則津液燥竭遂致亾陽下之太早則邪氣動膈乃成結胸清濁相干則變爲霍亂熱毒內瘀則變爲瘀血又或爲發黃者溼熱相蒸也或爲發斑者陽毒太盛也陽盛之人得之於熱乃爲陽毒陰盛之人得之於寒乃爲陰毒蠱動則爲狐惑壞病之甚則

為百合若勞復陰陽易之類雖差後猶宜節慎變態多端不可備舉當以類求之皆以適當為良唯兩感之病表裏皆受邪為難治其他或陰證似陽陽證似陰或陰盛隔陽陽盛隔陰者在診病者以意詳之

傷寒可汗

論曰傷寒病汗之而愈者以初得病一日至三日陽經受邪未傳諸陰其邪在表故當發汗此大約也然病數日脉浮太陽證不罷者亦可汗之當以脉證為準凡頭痛發熱惡風振寒是為可汗之證其脉浮者是為可汗之脉陽虛則惡寒脉浮為在表或浮而弱或浮而緊或浮大而數皆宜汗之

麻黃湯方 治傷寒太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風發熱無汗而喘者

麻黃去根節三兩 桂去粗皮二兩 甘草炙一兩 杏仁去皮尖雙仁七十枚

㕮咀如麻豆大每服五錢水煎溫服覆取微汗不須啜粥餘如桂枝法將息

大青龍湯方 治傷寒太陽中風脉緊發熱惡寒身痛不出而煩躁

麻黃去根節六兩 桂去粗皮 甘草炙各二兩 杏仁去皮尖雙仁四十枚 生薑三兩 棗十枚大者 石膏一雞子大碎

㕮咀如麻豆大每服五錢水煎溫服脉微汗出惡風者不可服

桂枝麻黃各半湯方 治傷寒太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便一日二三度發脉微緩者為欲愈也脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒

桂去粗皮一兩半 芍藥 生薑 甘草 麻黃去根節各一兩 大棗四枚 杏仁二十四枚湯浸去皮尖雙仁

㕮咀如麻豆大每服五錢水煎溫服

桂枝湯方 治傷寒太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解

桂去粗皮 芍藥 生薑各二兩 甘草二兩 大棗十二枚

㕮咀如麻豆大每服五錢水煎溫服須臾啜熱稀粥助藥力取微汗

麻黃附子甘草湯方 治傷寒少陰病得之二三日宜微發汗以二三日無裏證故微發汗

麻黃去根節 甘草各二兩 附子一枚炮裂去皮臍 右吹咀如麻
豆大每服五錢水煎溫服

葱豉湯方 治傷寒初覺一二日頭項腰脊痛惡寒

葱白十四莖 豉半合 乾薑一分 麻黃去根節 去皮
芍藥各半兩 右吹咀如麻豆大每服五錢水煎溫服良久
投葱豉熱粥蓋覆出汗

葱粥方 治傷寒服葱豉湯後未得汗再服

葱白十莖并鬚切 豉三合炒 生薑半兩拍碎 右水五盞煎至二
盞半去滓入白米依常法煮粥入少鹽攪勻任意食

之衣覆出汗未汗再服

麻黃葛根湯方 治傷寒初得一二日出汗

麻黃去根節一兩 葛根 柴胡去苗各一兩 芍藥三分
每服五錢水一盞豉一百粒開口椒七粒連鬚葱白
三寸薄荷二十葉同煎熱服服後葱豉湯一盞投之
衣覆取汗未快再服

葛根湯方 治傷寒初覺頭痛惡寒壯熱腹內熱脉洪大
一二日宜服

葛根 黃芩 茈胡去苗各半兩 葱白五莖 豉一合

右吹咀每服五錢生薑一棗大拍碎同煎溫服良久再
服得汗卽止

麻黃解肌湯方 治傷寒初患一二日體熱頭痛

麻黃去根節一兩 石膏碎 葛根各一兩半 甘草一分半
芍藥 杏仁去皮尖雙仁炒各一兩 桂去粗皮三分
每服五錢生薑五片水煎溫服

葛根湯方 治傷寒一二日頭痛壯熱遍身疼痛其脉浮
數

葛根 白术 芍藥 乾薑各半兩 麻黃去根節 桂

去粗皮各三分 甘草炙一分半 每服五錢水煎熱服如脉微卽
加附子半兩

石膏人參解肌湯方 治傷寒初得一二日頭疼壯熱惡
寒脉浮緊

石膏碎 麻黃各一兩 茈胡去苗 人參各半兩 桂去粗皮
甘草炙各一分 葛根二兩 每服三錢入葱豉生薑同煎熱服

十味人參湯方 治傷寒頭痛體疼寒熱不解

人參 厚朴生薑汁炙 桂 甘草 杏仁去皮尖雙仁炒 白术
乾薑 白茯苓 陳橘皮湯浸去白各一兩 麻黃去根節湯煮去沫二

每服三錢生薑三片棗一枚同煎熱服纔覺傷風

併二三服汗出立差

羗活湯方　治傷寒表不解頭痛體疼發汗

羗活　獨活　柴胡　前胡　人參　白茯苓　桔梗

芎藭　甘草炙各一兩　枳殼去瓤麩炒二兩　每服三錢生薑二

片薄荷少許同煎温服不拘時

葱豉湯方　治傷寒一日至三日以前身熱脉大肢體疼

痛汗不出

蒼术米泔浸去皮麩炒黄　麻黄去根節湯煮去沫各二兩　甘草炙　桂各一兩

每服三錢葱白三寸鹽豉二十粒同煎熱服不拘時候

傷寒可下

論曰凡傷寒邪入於陰其病在裏法當下之諸腹滿不大便或口燥舌乾而渴或潮熱譫語皆爲可下之證諸診得脉沉而實即爲可下之脉但脉證已具不必拘以日數急宜攻裏若病雖過經而裏證未備者未可下也故經曰陽盛陰虚下之則愈其法謂此

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者可與調胃承氣湯傷寒吐後腹脹滿者可與調胃承氣湯

調胃承氣湯方

甘草炙二兩　大黄以酒洗四兩　㕮咀每服五錢入芒硝一錢更煎一二沸温服

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此大便已鞕也與大承氣湯若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下大承氣湯

大承氣湯方

大黄酒洗四兩　厚朴炙半斤　枳實麩炒五枚　㕮咀每服五錢

入芒硝一錢同煎温服

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則譫語小承氣湯主之若一服譫語止者勿再服

小承氣湯方

大黄四兩　厚朴二兩　枳實大者麩炒　㕮咀每服五錢水煎

温服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服

柴胡湯方　治傷寒四日以後煩熱不解大小腸澀

茈胡去苗 黃芩一兩 犀角鎊 芍藥各一兩 山梔子仁半兩 大黃炒一兩半 木通三分 朴硝一兩 每服五錢入竹葉三片同煎空腹服大小腸通為度如未效再服

大茈胡湯方 治傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者

茈胡半斤去苗 枳實麩炒兩 黃芩 芍藥各三兩 半夏二兩半湯洗七遍 大黃二兩 㕮咀每服五錢入生薑十片棗三枚同煎溫服

調胃承氣加橘皮湯方 治傷寒發汗不解蒸蒸發熱

陳橘皮去白半兩 大黃炒一兩 甘草炙半兩

每服四錢入芒硝一錢同煎溫服

大青散方 治陽盛發狂有斑大小便閉澀

大青 知母 黃芩 大黃煨 山梔子仁 升麻 黃連各一兩 甘草炙半兩 共為散每服三錢入朴硝一錢蜜水調下

承氣丸方 治傷寒時氣溫熱病大便不通

大黃炒二分 郁李仁湯浸去皮研 枳實麩炒 朴硝研各一兩 共研為末和勻煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下未利再服不計時候

傷寒可吐

論曰諸病吐之而愈者邪在胸中也傷寒大法謂四日以上若入陰經其傳未深邪氣高而裏實客於胸膈下之則動胃汗之則亾陽惟宜吐而出之然亦不必拘此凡寒邪熱毒痰實在胸中及有宿食在胃脘者皆當吐之但診其脈寸口或浮或滑或數或緊與諸部不同者其證心胸痞滿鬱鬱而痛不能息多涎唾飲食入則吐欲吐復不能出或手足厥冷及心下滿而煩饑不能食吐下後心中懊憹者是也內經所謂其高者因而越之即其法也

瓜蒂散方 治胸有寒病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞鞕氣上衝喉咽不得息當吐之

瓜蒂熬 赤小豆各一分 擣篩再和勻每服一錢匕一合湯七合先漬之須臾煮作稀糜取汁調散放溫頓服不吐少加之快吐為度亡血虛家不可與

擣膈湯方 治傷寒三四日胸中痰壅憎寒壯熱頭痛

桃枝一握東引者取梢 柳枝一握取梢 甘草生用一分 烏梅去核三枚 山梔子仁一分 各細剉同用漿水一大盞半煎至一盞空心分為二服相次再服取吐為度

三物湯方　服前撩膈湯吐後頭痛壯熱未退卽服此三物湯

薄荷一握　人參半兩　生薑一分　水煎空心溫服晚再服

苦參散吐方

苦參　爲細散每服三錢溫酒五合調服之卽吐

人參湯吐方　治傷寒出汗後心胸妨悶煩熱未退

人參半兩　燈心一小束　枳殼一分麩炒　大腹皮一枚　茶末二錢　生甘草　除茶末外各細剉用淡漿水二大盞煎至一盞下茶末攪勻分溫二服以紙撚子於咽喉中取吐爲度

傷寒可溫

論曰傷寒病雖有三陰三陽然在陽則太陽病多在陰則少陰病多以二經爲表裏故也至於陽明太陰病頗稀少而少陽厥陰病又少也然究觀古人治陽明則多下於少陰則多溫蓋陽明者胃也胃受病則不惡寒反惡熱濈濈汗出大便秘譫語潮熱須下之乃愈若乃氣弱本虛人初中病腠理寒邪氣更不經三陽而便見少陰證蓋少陰者腎也腎受病則身冷惡寒四肢厥逆脉微細心煩但欲寐或自利而渴須溫之乃愈雖然三陰病大約可溫而古人特於少陰詳言之者則少陰病尤宜溫故也

附子湯方　治傷寒少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之

附子二枚去皮臍　人參一兩　白术四兩　芍藥　白茯苓三兩

每服五錢水煎溫服日二

四逆湯方　治傷寒少陰病脉沉者急溫之

甘草二兩　乾薑半兩　附子一枚生用　剉如麻豆每服五錢水煎溫服强壯之人可倍加薑附

四逆湯方　治傷寒少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥冷脉微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉加減四逆湯

甘草二兩　附子一枚大者　乾薑二兩　各剉如麻豆大每服五錢水煎溫服其脉卽出者愈面色赤者加葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二兩嘔者加生薑二兩咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加人參二兩病皆與方相應者乃服之

生薑湯方　治傷寒手足厥冷脉細欲絕其人內有久寒

者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯

當歸 芍藥 桂皮去粗 細辛各三兩 吳茱萸湯洗炒
甘草炙 木通各二兩 剉如麻豆每服五錢入生薑半
分棗三枚水酒同煎溫服

通關飲方 治厥陰傷寒脉弦長者生沉細不足者死
附子一兩 乾薑 羌活 桔梗 甘草炙 五加皮各半兩
桂三分 黃芪一分 防風半分 剉如麻豆每服五
錢水煎食前溫服

迴陽湯方 治傷寒陰盛手足厥冷體寒脉微

延胡索炒 半夏切生薑汁炒黃 甘遂麩炒各一兩 陳橘皮湯浸去白
附子炮裂去皮 桂皮去粗 麻黃去根節湯煮去沫各半兩 檳榔一枚
天南星一枚 剉如麻豆每服二錢酒煎溫服服後
一次須患人頭面渾身覺熱時便與衣服蓋覆令汗出

溫白丸方 治傷寒面青心下堅鞕開口出氣身體不熱
頭面多汗四肢厥冷
半夏湯浸去滑 白附子炮 硫黃研各一兩 共研為末用粳
米飯擣和為丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下吐
逆炒薑鹽酒下或艾醋湯下陰毒併勞二三服不計
時候

白朮飲方 治傷寒伏陰胸膈妨悶吐逆不定手足厥冷
白朮 附子炮裂去皮 高良薑炮 桂皮去粗 人參
乾薑炮各一兩 藿香去根一分 剉如麻豆每服二錢水煎溫服

吳茱萸散方 治傷寒渾身手足厥冷面青脣口無色心
中寒慄
吳茱萸湯浸焙炒 硫黃研 桂皮去粗 附子炮裂去皮 芎藭各一分
擣羅為散煎艾葉湯調下三錢陰盛者兼灸氣
海數十壯

黑龍湯方 治傷寒陰盛隔陽身冷煩躁脉細沉緊
附子一枚及半兩者燒存性用冷灰占去火毒 擣研細入臘茶一錢和勻
分作二服每服以水一盞蜜半匙同放冷服須臾躁
止得睡汗出為效

退陰丸方 治傷寒陰盛手足多冷脉沉細助陽消陰
硫黃 消石 陽起石 太陰玄精石 白礬 石膏各半兩 研為末同入銚子內熬成汁為度放冷細研用
水浸炊餅為丸如梧桐子大煎艾湯下十五丸

傷寒過經不解

論曰傷寒為病六經受邪始傳於三陽病在表者可汗其滿三日傳於三陰病入裏者可下其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少歇九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹滿減如故十一日少陰病衰渴止舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病人精神爽慧也故傷寒愈者皆在十二日若過此經病猶不解者為邪熱結于[illegible]其八[illegible][illegible]妄語或鬱鬱微煩或腹滿吐下皆緣治之失宜邪氣稽留故病過經不能解也當隨其證以治若更感

異氣變為他疾者當依壞病法療之

犀角湯方　治傷寒過經不解熱結在裏往來寒熱煩渴躁悶

犀角屑一兩　茈胡去苗　吳藍各三分　大青　升麻各一兩

烏梅去核　黃芩各三分　甘草半兩

每服五錢入竹葉三十片同煎食後溫服

木通湯方　治傷寒十三日過經不解臍腹脹滿小便淋澀煩悶燥渴

木通　葛根　青橘皮湯浸去白鹽炒　檳榔　滑石

瞿麥穗各一兩

每服五錢入葱白二寸同煎溫服不計時候

茈胡湯方　治傷寒發汗下之後過經不解胸脇滿結渴而不嘔但頭汗出往來寒熱小便不通宜服茈胡湯

茈胡二兩　桂　黃芩各一兩　牡蠣生用　甘草各半兩

括樓根一兩半　木通一兩

每服五錢生薑半分葱白五寸同煎食後溫服

中風傷寒　傷寒溼溫　傷寒時氣

傷寒疫癘　傷寒結胸

中風傷寒

論曰中風傷寒三陽三陰候各不同太陽中風其脈陽浮陰弱其證發熱自汗嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔又曰太陽病發熱汗出脈緩者名為中風不可燔灸若以火發其汗邪風為火熱所劫血氣流溢榮衛失常兩陽熏灼其身發黃陽盛即衄陰虛即小便難陰陽俱虛竭其身體枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾循衣摸牀其小便利者可治陽明中風即陽明

病能食爲中風其證口苦咽乾腹滿微熱惡寒脉浮而緊
下之則腹滿小便難少陽中風兩耳無聞目赤胸中滿而
煩不可吐吐之則悸而驚太陰中風四肢煩疼其脉陽微
陰澀而長爲欲愈少陰中風其脉陽微陰浮爲欲愈厥陰
中風其脉微浮爲欲愈不浮爲未愈凡此六經之病其狀
雖異大抵其脉皆浮經所謂浮爲風是也

大青龍湯方　治傷寒太陽中風脉浮緊發熱惡寒身痛
不汗出躁煩

麻黄去根節煮去沫六兩　桂皮去粗　甘草炙各二兩　杏仁去皮尖雙仁四十枚

石膏如雞子大碎　㕮咀如麻豆服五錢入生薑一棗
大棗二枚同煎溫服取微汗汗多者以溫粉粉之

桂枝湯方　治中風傷寒陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱
者汗自出惡寒發熱鼻鳴乾嘔等疾

桂皮去粗　芍藥各三分　甘草炙半兩　每服五錢入生薑
一棗大棗二枚同煎溫服以汗爲度未汗更服仍作
生薑稀粥投之以助藥力

石膏湯方　治中風傷寒頭痛四肢痠痛身體沉重

石膏　甘草炙　麻黄去根節煎去沫　桂　芍藥各二兩

每服五錢入生薑一塊同煎空心溫服

麻黄桂心湯方　治中風傷寒脉浮緊發熱惡寒身體疼
痛汗不出而煩

麻黄去根節煎掠去沫二兩　桂去粗皮　甘草　乾薑炮各一兩
石膏　乾薄荷葉　杏仁去皮尖雙仁各半兩

每服五錢入棗二枚同煎食前溫服

桂枝湯方　治中風傷寒初得其外證頭項疼腰背強壯
熱語澀恍惚唾涕稠黏遍身拘急

桂去粗皮三分　芎藭　半夏湯洗七遍生薑等分同搗　附子　菖蒲

麻黄去根節煎去沫　羌活　細辛各半兩　白芷一分　剉如麻
豆每服三錢入生薑一塊同煎食前溫服蓋覆取汗

麻黄細辛丸方　治中風傷寒頭痛惡寒四肢煩疼心躁
悶

麻黄去根節一兩　細辛　人參　白茯苓　甘草
白术各半兩　栝樓根三分　共研爲末鍊蜜和搗丸如雞
頭大每服一丸薄荷蜜湯研下

傷寒溼溫

論曰傷寒有五其一爲中溼蓋風溼之氣中人爲病發熱

與寒之病相類故曰溼溫也此因汗出當風或因取冷過度致陰溼氣襲入肌膚流傳經絡其溼毒汗出關節疼痛發熱而煩小便不利大便反快是謂中溼若風溼相搏則一身盡疼日晡所劇微熱相蒸則身必熏黃凡治風溼者欲其微汗即風氣解而溼自去溼甚者當利其小便不可大發汗大汗則風去溼在其病不去亦不可下之下之早則噦下之而利不止即死診其脉當沉而細難經曰溼溫之脉陽濡而弱陰小而急是也

麻黃杏仁薏苡仁甘草湯方　治溼溫病一身盡疼發熱日晡即劇此病傷於汗出當風或久傷取冷所致

麻黃去根節一兩　杏仁去皮尖雙仁三十枚炒　薏苡仁一兩　甘草炙一兩　㕮咀每服五錢水煎溫服

桂枝附子湯　治傷寒八九日風溼相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之若其人大便堅小便自利者朮附子湯主之

桂去粗皮四兩　附子三枚　甘草炙二兩

㕮咀每服五錢入生薑五片棗二枚同煎熱服

朮附子湯方

附子炮裂去皮臍三枚　白朮四兩　甘草炙一兩　剉如麻豆每服五錢入生薑五片棗二枚同煎溫服初一服其人身如痺半日許復之三服後其人如冒狀勿怪此以附子朮併走皮中逐水氣未得除故使之然耳法當加桂四兩此本一方二法以大便堅小便自利故去桂也以大便不堅小便不利當加桂附子三枚恐多也虛弱家及產婦宜減服之

甘草附子湯方　治風溼相搏骨節疼煩掣痛不得伸屈近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者

甘草炙二兩　附子二枚　白朮三兩　桂四兩　㕮咀如麻豆每服五錢水煎溫服初服得微汗則解能食汗止復煩者少減服之千金方去身腫者加防風四兩悸氣小便不利者加茯苓三兩既有附子今加生薑三兩

治溼家身煩疼麻黃湯加朮四兩發其汗為宜慎不可以火攻之方

麻黃三兩　桂二兩　甘草炙一兩　杏仁去皮尖雙仁七十枚　白朮四兩　㕮咀如麻豆大每服五錢水煎溫服取微汗則解

防風黃芪湯方主之　治風溼脉浮身腫汗出惡風者

防風四兩　黃芪五兩　甘草炙二兩　白术三兩　㕮咀如麻豆大每服五錢入生薑半兩大棗二枚同煎溫服日三喘者加麻黃胃中不和者加芍藥氣上衝者加桂下有陳寒者加細辛服後當如蟲行皮中腰以下如氷後坐被上又以一被遶腰下溫令微汗差

杏仁湯方　治風溼身體疼痛惡風微腫

杏仁去皮尖雙仁炒二十五枚　桂去粗皮　麻黃去根節先煮一兩焙乾　芍藥　天門冬去心焙各一兩　㕮咀如麻豆大每服五錢入生薑半分同煎溫服

傷寒時氣

論曰春溫夏熱秋涼冬寒是爲四時正氣非其時有其氣人或感之病無分少長率相似者謂之時氣如春應溫而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反溫是也其候與傷寒瘟病相類但可汗可下之証比傷寒瘟病療之宜輕爾

葛根湯方　治時氣一二三日不解頭痛壯熱惡寒

葛根一兩　麻黃去根節炙二兩　陳橘皮湯浸去白　甘草炙

黃芩　知母　杏仁去皮尖雙仁各一兩

每服三錢入生薑三片同煎溫服

七聖湯方　治時氣頭痛壯熱肢體煩痛

麻黃去根節二兩　蒼术炒二兩　橘皮湯浸去白　木通各一兩　桔梗半兩　山茵陳一兩　甘草炙二兩

每服三錢生薑三片同煎溫服

八神湯方　治時氣一二日頭痛壯熱心神煩悶

麻黃炙一兩　大黃　當歸　甘草　白术　山梔子仁各半兩　芍藥　荊芥穗各一分　每服三錢入薄荷三葉葱白一寸生薑二片同煎熱服

人參乾葛湯方　治時行表不解壯熱惡寒

人參　乾葛　白芍藥　桔梗炒各一兩　赤茯苓三分　甘草炙　木香各半兩　麻黃依前炙三分

每服三錢水煎熱服併三兩服溫覆出汗

五苓散方　治時氣解表出汗

赤茯苓　桂　澤瀉　白术各一分　豬苓去黑皮半兩

爲散每服五錢以新汲水調頓服訖以葱豉粥投之衣蓋取汗

葱白湯方　治時氣傷寒發汗

葱白一兩研　生薑一兩　豉一合　細茶末二錢　先以水二盞煎葱并薑至一盞半次下豉煎少時即入茶末去滓頓服厚衣蓋取汗

解表湯方　治初得傷寒時氣壯熱頭痛

甘草二兩炙　生薑二兩半　黑豆二合　㕮咀每服五錢匙頓服厚衣蓋覆取汗

附桂散方　治傷寒時氣

附子去皮臍　桂去皮各半兩　為散每服三錢熱酒調頓服厚衣蓋汗出為度

藿香湯方　和養三焦調順陰陽升降痞滯祛逐寒邪溫中散寒煖胃和脾滋助氣血思美飲食虛寒痼冷痰癖動氣心腸疼痛噎悶嘔逆一切氣疾不日全愈

前胡　柴胡　秦艽　甘草炙各半斤　蘹香子炒　木香　桂去粗皮各一斤　檳榔十枚　白豆蔻去殼半斤　芍藥半斤　青橘皮半斤　芎藭半斤　甜葶藶微炒半斤　桔梗四兩

每服三錢大棗二枚同煎食前溫服

論曰人居天地間稟氣於陰陽氣和則安氣盭則病故一歲之內節氣不和寒暑乖候皆為疫癘之氣感而為病故名疫癘其狀無問長少率皆相似俗又名天行其病與時氣溫熱等病相類各隨其證以方制之

前胡湯方　治時行疫癘壯熱欬嗽頭痛心悶

前胡　升麻　麥門冬去心　貝母去心　紫菀去苗土　杏仁去皮尖雙仁研各半兩　甘草炙一分　石膏一兩一分　每服三錢竹葉二七片同煎溫服不拘時

葛根湯方　治時行疫癘兼風熱目疼心中妨悶

葛根一兩　芍藥三分　葱白三莖　豉半合　水煎溫服再服

石膏湯方　治時行疫癘壯熱頭痛脣乾

石膏一兩　葛根三分　芍藥　貝母　百合　升麻各半兩　梔子仁　甘草炙各一分

每服三錢豆豉五十粒葱白三寸同煎服

柴胡湯方　治時行疫癘一二日頭痛壯熱

柴胡二兩　芍藥一兩　梔子仁　黃芩各半兩　石膏　葛根各一兩　每服五錢葱白三寸豉三十粒同煎溫服不計時候

傷寒結胸

論曰傷寒病發於陽下之早邪毒之氣結聚於胸膈故名結胸其證心下堅鞕按之則痛項强如柔痓狀或從心下至少腹堅滿而痛其痛不可近其脉寸口浮關上自沈是其候也若正在心下按之即痛而脉浮滑亦名結胸凡此本太陽病脉浮而動數醫反下之胃中空虛客氣動膈令人短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下堅滿則為結胸又或因得病三二日不能卧但欲起者心下必結若脉微弱者此素有積寒而反下之利止作結胸但下之而脉浮者

必結胸皆當下之脉促者不為結胸也脉若浮即不可下下之則死結胸證悉具煩躁者亦死又有水結在胸脇者又有臟結者結胸無大熱為水結似結胸狀飲食如故時時下利陽脉浮關脉小細沈緊者為臟結舌上白胎滑者為難治若心下痞堅按之不痛者非結胸乃痞也宜審察而各依其法治之

陷胸丸方　治傷寒結胸心下堅實大便不利

大黃醋炒　葶藶子隔紙炒　杏仁炙各二兩　朴硝一兩研細與杏仁同研令如膏

共為末再同研勻入少鍊蜜和更杵三五百下丸如彈子大每服一丸別入甘遂末半錢蜜一合水煎溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效

大陷胸湯方　治傷寒結胸頭項强心下痛按之實鞕

大黃剉炒二兩　甘遂濕紙裹煨一錢　朴硝另研二兩　各擣研為末

每服用水一鍾入大黃末二錢煎下朴硝末一錢同煎一二沸次下甘遂末一匙攪勻溫服取快利為度

小陷胸湯方　治傷寒小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者

黃連去鬚一兩　半夏湯洗七遍焙二兩半　括樓實大者一枚　各細剉

先以水五盞煎括樓實取三盞去滓入黃連半夏各一半煎取一盞分溫三服

治傷寒寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯用前方白散亦可服之

桔梗炒三分　巴豆去皮心熬黑研如脂一分　貝母去心三分

除巴豆外擣羅為散入巴豆合勻每服强人半錢弱羸之人減之並溫熱水調服病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利不止進冷粥一杯身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水潠之洗之益令熱却不得出當

汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如
上法
葶藶湯方　治傷寒結胸心下痛如石堅鞕小便不利
葶藶子(隔紙炒三分)　檳榔(半兩)　桑根白皮(三分)　杏仁(去皮尖雙仁)　大黃(銼炒各半兩)　朴硝(三分)　每服五錢水煎食前溫服
增損理中丸　治傷寒下後虛氣不理毒復上攻毒氣相搏結於胸中縱不下者毒已入胸胃中不通毒還攻上心中結滿厥逆欲絕心起高胸手不可近當先理其氣

人參　白朮　甘草(炙)　括樓根　枳實(麩炒去瓤)
赤茯苓(去黑皮)　牡蠣(煅各二兩)　乾薑(一兩半)　擣羅為末鍊蜜丸如彈子大每服一丸熱水化下不歇再服不過五六丸胸中豁然
陷胸青龍湯方　治傷寒結胸毒氣內盛手足逆冷腹脹滿急大便不通
牽牛子(炒一兩半)　人參(三分)　陳橘皮(湯浸去白半兩)　桂
檳榔(各一兩)　大黃(半兩剉炒)　朴硝(一兩)
每服五錢入生薑半分同煎食前溫服

傷寒譫語　傷寒潮熱　傷寒煩渴
傷寒煩躁　傷寒厥逆
傷寒譫語
論曰傷寒不應發汗而汗之遂至亡陽津液內竭胃中燥實則令譫語此病或由津液不和內有燥屎或三陽合病或瘀熱蓄血在裏或婦人熱入血室皆使譫語也然譫語屬胃胃者足陽明經也陽明為病主身熱故譫言妄語則身當有熱脉當洪大洪大亦陽脉也故其病為煩滿譫語而手足厥脉反沉細而微者為逆也然又有鄭聲者取其

鄭重之意與譫語相類蓋古人以此分虛實醫者當以脉症參合別之不可不慎故謂虛則鄭聲實則譫語
小承氣湯　治傷寒陽明病人多汗津液外出胃中燥大便必鞕鞕則譫語宜此湯
大黃(四兩)　厚朴(二兩)　枳實(三枚)　水煎五錢空心溫服日二
大承氣湯　治傷寒陽明下血譫語此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濈然汗出則愈汗出譫語以有燥屎在胃中此為風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈

大黃四兩 紫朴半斤 枳實五枚 水煎五錢去滓入芒硝
末一錢再沸温服日二
白虎湯 治傷寒三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁
而面垢讝語遺尿發汗則讝語下之則額上汗出手
足厥冷若自汗出者宜此湯
知母六兩 石膏一斤 甘草二兩 粳米六合 水煎五錢温服
柴胡湯 治傷寒熱實得汗不解腹滿脹痛煩躁讝語
柴胡一兩 大黃炒 片芩 白芍 半夏三分 枳殻五錢
薑水煎五錢温服

犀角湯 治傷寒邪熱在胃讝語妄言身體壯熱
犀角 大青 人參三兩 遠志 升麻半兩 片芩
柴胡一兩 甘草五錢 薑水煎五錢入蘆根茅根各五寸
温服
人參柴胡湯 治傷寒經六七日不解默默而煩心腹乾
燥大腸結澀讝語妄言
人參二分 柴胡一兩 白芍 知母 片芩 萎蕤
大黃炒 半夏 甘草五錢 薑水煎五錢服日二
自愈方 治傷寒病汗多亡陽讝言妄語不可下與柴胡

桂枝湯以和榮衛以通其津液
柴胡四兩 白芍 人參 桂心 片芩 半夏
甘草一兩 薑棗水煎五錢空心温服日二
傷寒潮熱
論曰傷寒潮熱者謂潮作有時由邪氣入裏故病日晡發
潮熱已而微利者有微發潮熱而大便溏者有潮熱而咳
逆者有結胸而潮熱者大凡潮熱皆以邪氣內實制方宜
酌其輕重
小柴胡湯 詳讝語

柴胡加芒硝湯 治傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡
潮熱已而微利此大柴胡症下之而不得利今反利
者知醫以丸藥下之非其治也夫潮熱者實也先宜
服小柴胡以解外後與此湯
柴胡 半夏 芒硝二兩 人參 片芩 甘草二兩
薑棗水煎五錢去滓入芒硝一錢沸服
大小承氣湯 詳讝語
柴胡石膏湯 治傷寒十日以上潮熱不退
柴胡 石膏 白朮 赤茯苓 山梔 萎蕤

桑白皮三分　水煎五錢溫服日二

鼈甲湯　治傷寒過經潮熱不解或作寒如瘧狀

鼈甲　柴胡　赤茯苓一兩　片芩　甘草　知母五錢

桑白皮三分　薑棗水煎五錢服

秦艽湯　治潮熱不退發作無時

秦艽　鼈甲一兩　甘草五錢　生薑水煎五錢入豆百粒

葱白三寸空心溫服日二

傷寒煩渴

論曰腎者水藏膀胱者津液之腑二經相爲表裏傷寒熱

入于臟流于少陰之經則腎受病矣腎水惡燥熱盛則燥故渴而引飲又傷寒邪氣并發汗吐下則不能除若發汗吐下過甚則亡津液耗少熱氣内生亦令病人煩渴也

白虎加人參湯　治傷寒用桂枝湯大汗出大煩渴不解脉洪大者

知母三兩　人參半兩　石羔八兩　甘草一兩　粳米三合

水煎五錢至米熟溫服日二

五苓散　治發熱六七日不解煩渴引飲水入則吐此爲水逆

猪苓　赤茯　白朮　桂心　澤瀉一兩

共末熟水下二錢日二汗出乃愈

猪苓湯　治傷寒脉浮發熱渴欲飲水小便不利水入則吐

猪苓　赤茯　阿膠　滑石　澤瀉一兩

水煎五錢空心溫服以差爲度

八味知母湯　治傷寒病數日不解心躁煩亂小腹脹急臍下疼痛大渴喘之

知母　白芍　麥冬　柴胡　澤瀉三分　片芩

甘草五錢　石羔半兩　薑棗竹葉水煎五錢服

葛根散　治傷寒躁渴頭痛不得眠四肢痛

葛根　片芩　大青　石羔　人參一兩　甘草五錢

水煎三錢溫服日二

人參湯　治傷寒下後除熱止煩渴

人參　麥冬　五味　石羔一兩　甘草五錢

水煎五錢服日二

黃芩蘆根湯　治傷寒吐下後内外有熱煩渴

片芩　蘆根　人參　赤茯一兩　桂心五錢

薑棗水煎五錢服

竹茹湯　治傷寒吐下後煩渴不止

竹茹一乇　人參五錢　烏梅肉二枚炒　水煎三錢服日二

茯苓地黃湯　治傷寒胃熱引飲煩渴不止

赤茯　生地　括蔞一兩　知母五錢　麥冬兩半

水煎五錢入小麥百粒竹葉二七片棗二枚煎服

知母犀角湯　治傷寒煩渴飲水無度日漸消瘦

知母　犀角　升麻五錢　石羔三分　水煎五錢入竹葉二七片小麥五十粒土瓜根汁括蔞汁各半合服

傷寒煩躁

論曰傷寒陽氣多陰氣少病發于陽經者故令煩躁其候身熱而煩渴引水漿若胃中乾燥者必譫語亦有少陰經煩躁者當辨之

大青龍湯　治傷寒太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者此湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆

麻黃六兩去根節　甘草　桂心二兩　杏仁四十枚去皮尖炒

石膏三兩研　薑棗水煎五錢溫服出汗止後服

五苓散煩躁不得眠

白虎加人參湯大渴舌乾燥欲飲水數升二方俱詳煩渴

茯苓四逆湯　治汗下後病仍不解煩躁

白茯四兩　人參　附子一兩　甘草　乾薑二兩

水煎五錢服

吳茱萸湯　治少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者

吳茱萸一升洗炒　人參二兩　大棗生薑水煎五錢服日二

蘆根湯　治陽毒五六日以上胸中煩熱乾嘔躁悶

蘆根一兩　甘草　知母　柴胡　括樓根兩半　片芩兩半

生薑　水煎三錢溫服

梔子豉湯　治陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憒憒而反譫語若加溫針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者

山梔四枚肥大者　豉五錢　水煎空心溫服得吐便止

桂甘龍牡湯　治火逆汗下之因燒針煩躁

桂枝一兩　甘草　龍骨　牡蠣二兩　水煎五錢溫服日二

傷寒厥逆

論曰傷寒病手足厥逆其名曰厥此因陽氣衰陰氣盛陰勝則陽脉逆而不通于四肢所以逆冷其症令人惡寒不飲水下利清穀或清便自調或小便數外症默靜是其候也宜温之灸之若灸而手足不温者爲難治然厥亦有熱者先發熱而後厥熱深厥亦深熱微厥亦微脉雖沉伏按之當滑若或畏熱飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便秘小便赤外症昏憒者雖厥不可温也宜下之

通脉四逆湯　治手足厥冷微喘脉不出

附子五錢　人參　甘草一兩　乾薑半兩

水煎五錢温服日二

當歸四逆湯　治傷寒手足厥冷脉細欲絶

川歸　白芍　桂心一兩　細辛一兩　甘草　木通七錢

大棗水煎五錢温服日二

芍藥湯　治下利清穀內寒外熱汗出而厥腹痛兼嘔

白芍　附子一兩　人參　甘草五錢

薑水煎五錢温服日二

吳茱萸湯　治手足厥冷脉細欲絶

吳萸　白芍　川歸　桂心一兩　甘草　細辛三分

乾薑五錢　棗水煎五錢服日二

葱熨法　治傷寒病後氣虚陽脱體冷無脉氣息欲絶不省人事及陰厥服百法不效者

葱一斤水洗淨　以麻縷扎如盞許大切去根及葉惟存白二寸許如大餅餤先以火熁一面令通熱乃以熱處放在病人臍中連臍下其葱上以熨斗滿貯火熨之令葱餅中熱氣透入肌肉中須預作三四箇餅子一餅壞不可熨又易一餅良久病人漸醒手足俱温有汗出更服四逆湯以温其內其病即差

傷寒頭痛　傷寒喘　傷寒上氣

傷寒咳嗽

傷寒頭痛

論曰傷寒頭痛者邪氣循陽脉上攻于頭也是以傷寒傷風温病熱病風温病皆有頭痛病者蓋頭痛乃陽症也故太陽頭痛必發熱惡寒陽明頭痛不惡寒反惡熱少陽頭痛脉弦細而發熱至于三陰脉從足至胸皆不至頭惟厥陰脉挾胃屬肝絡膽循喉嚨上頏顙連目系上出額故仲景止有厥陰頭痛一症治以吳茱萸湯是也

桂枝湯　治太陽病頭痛發熱汗出惡風
桂枝　白芍三兩　甘草二兩炙　生薑大棗水煎五錢空
心溫服投以熱粥助藥力
小承氣湯　治傷寒六七日不大便頭痛有熱
大黃四兩　紫朴二兩薑汁炒　枳實三枚　水煎五錢溫服
麻黃湯　治傷寒太陽頭痛發熱身疼腰痛一身骨節俱
痛惡風無汗而喘者
麻黃三兩　桂枝二兩　甘草一兩　杏仁去皮尖炒一兩
水煎五錢稍熱服取汗

連鬚葱白湯　治傷寒已發汗或未發汗頭痛如破
葱白連鬚三莖　生薑二兩　分三服水煎通口熱服服不差
用葛根葱白湯
葛根葱白湯　治頭痛不止
葛根　白芍　知母五錢　川芎三分　薑葱水煎五錢溫服
小柴胡湯　治脉弦細頭疼發熱屬少陽少陽不可汗
柴胡二兩　片芩　人參　甘草三分　半夏六錢
薑棗水煎九錢空心溫服日二
吳茱萸湯　治傷寒厥陰乾嘔吐涎沫頭痛
吳茱萸三兩洗炒　人參半兩　薑棗水煎五錢空心溫服
茶調散　治頭痛不止
石膏二兩研　羌活　茵陳蒿　蒼朮　甘草　荊芥穗
川芎一兩　桂心五錢　共末用臘茶末一錢同葱煎湯下
一錢
石膏湯　治頭痛不可忍
石膏　麻黃一兩　葛根三分　何首烏五錢
水煎三錢溫服日二
瓜蒂散　治頭痛胸滿發熱惡寒脉緊而不大是膈上有涎

瓜蒂一兩　為末熱水下一錢吐痰涎愈
前胡湯　治頭痛壯熱
前胡　半夏　桂心　玄參　甘草　桔梗炒　旋復花
片芩　生地一兩　薑水煎五錢服
四白散　治頭痛身熱百節疼痛
白芷　白附子　白薑蠶炒　白蒺藜炒各等分
共末茶酒任下二錢
傷寒喘
論曰傷寒喘其症不一有邪氣在表表未解無汗而喘者

有邪氣在裏汗出不惡寒腹滿而喘者有潮熱者有心下有水氣而喘者古人各亦求其本故在表者當汗在裏者宜下至于心下有水而喘又當利其小便若乃陰症發喘是為無陽非灸之不可

小青龍加杏仁去麻黃湯　治心下有水氣咳而發喘

白芍　甘草　桂心　杏仁　五味　細辛　乾薑三兩

半夏半升二兩　水煎五錢服

麻杏草膏湯　治下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱

麻黃四兩去根節　石膏八兩　甘草二兩　杏仁去尖五十枚

水煎五錢服

麻黃湯　治太陽與陽明合病喘而胸滿不可下

麻黃三兩　桂心二兩　甘草一兩　杏仁七十枚

水煎五錢溫服取微汗

大承氣湯　治傷寒陽明病脉遲雖汗出不惡寒其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此大便已硬也大承氣主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下

大承氣湯方詳譫語

傷寒上氣

論曰傷寒上氣者肺主氣手太陰是其經也病人肺氣凡有不調又遇寒熱邪氣傷于其經則脹而氣逆不下故令上氣

竹茹湯　治上氣喘滿客氣在臟乾嘔口生瘡不得飲食

竹茹　葛根一兩　半夏　麥冬三分　甘草　陳皮去白炒五錢

薑水煎五錢溫服日二

天門冬丸　治心肺熱上氣喘逆

天冬　白茯　杏仁一兩　生地　貝母　甘草

烏梅肉炒　人參五錢　共末蜜丸彈子大含化一丸日可三五

葶藶湯　治上氣喘粗身面腫小便澀

葶藶紙隔炒五錢　大棗去核五枚　水煎溫服日二

貝母丸　治心肺有熱咳嗽上氣喉中作聲痰涕口乾

川貝母二兩　杏仁去皮尖炒四兩　天門冬一兩　旋復花五錢

炙甘草三分　共末蜜丸彈子大食後含化一丸

傷寒咳嗽

論曰傷寒咳嗽者寒氣客于肺也肺受虛寒微則咳嗽然又有邪熱客下上焦其人必欲飲水水停心下水氣乘肺而咳嗽者當熟察之

麻黃湯　治咳嗽日夜不止

麻黃去根節　赤茯　桑白皮一兩　葛根　五味子　紫蘇葉　炙甘草　紫菀五錢　石羔半兩研　桂心一兩　葶藶炒一分　薑棗水煎五錢空心溫服日二

小青龍湯　治心下有水氣咳而微喘發熱或利或噎

麻黃去根節一兩　白芍　半夏薑汁製　桂心　細辛　炒乾薑　五味子炒　甘草五錢　水煎五錢服日二

五味子飲　治傷寒咳嗽

五味子炒　麻黃去根節　阿膠　陳皮炒一兩　甘草　杏仁去皮尖炒五錢　薑水煎三錢服

加減小柴胡湯　治五六日往來寒熱或微熱咳嗽

柴胡二兩　片芩　半夏　甘草三分　黑乾薑五錢　五味子炒一合　薑水煎五錢服

地黃飲　治毒氣攻肺咳嗽咽喉生瘡

生地二兩　大黃　升麻　貝母　麥冬　甘草一兩　水煎三錢入蜜少許服

射干湯　治春冬月傷寒夏秋月中冷咳嗽喉鳴聲嗄乾嘔咽喉不利

射干　杏仁　麻黃　桑皮一兩　半夏　甘草　桔梗炒二兩　陳皮　紫菀五錢　薑棗水煎五錢服

前胡飲　治肺盛寒痰嗽不止心腸煩滿不能飲食常多噫逆

前胡　桔梗　玄參　人參　生地　甘草　旋復花

桂心一兩　半夏　紫朴二兩　薑水煎五錢服

聖濟總錄纂要卷之三終

新安　程　林雲來　纂
錢塘　陳　飈新謨持
　　　陳師錫升菴　較
新安　江　湘鄂上　閲

傷寒門

傷寒乾嘔　傷寒嘔噦　傷寒心悸
傷寒痞滿

傷寒乾嘔

論曰傷寒乾嘔者嘔而無所出也此因邪熱在胃或汗吐

後胃中不和尚有蓄熱氣熏上焦心中痞結故令乾嘔且諸邪氣在胃胃氣上逆皆發為嘔冷四肢寒痰凝結嘔出涎沫熱即津液消爍獨其氣逆故乾嘔不已施治者不可不察

竹茹湯　治胃氣虛熱乾嘔不止

竹茹　半夏　甘草五錢　人參　蘆根一兩　前胡　葛根三分　薑水煎五錢服

蘆根湯　治心脾虛熱乾嘔煩熱不下食

蘆根二兩　人參　赤茯　竹茹一兩　甘草五錢

水煎五錢入小麥一撮薑一分溫服日二

枇杷葉湯　治乾嘔煩渴不止

枇杷葉去毛蜜炙　麥冬　人參　葛根三分　白茯五錢　甘草炙一分　薑水煎三錢服

人參煮散　治胃氣虛冷乾嘔不止

人參一兩　白朮　白芍三分　杏仁　陳皮　枳殼　高良薑　甘草　乾薑五錢　薑棗水煎三錢稍熱服相繼三服以熱稀粥投之以助藥力汗出乃差

白朮飲　治邪熱雖退胃中不和乾嘔不已甚則吐逆

白朮　蘆根　紫朴一兩　枇杷葉去毛炙五錢

薑水煎三錢空心溫服日二

傷寒嘔噦

論曰傷寒嘔噦者病在足陽明胃經也足陽明之脉厥而上行令人氣逆氣逆故嘔噦仲景云嘔多雖有陽明症慎不可下蓋為此也又傷寒嘔噦有因熱壅府中邪氣之高所致有因吐下後虛熱在內及飲水停積所致症既不同治亦有異不可不察

半夏湯　治胃氣逆冷食已嘔噦即欲吐
半夏　白茯一兩　人參　枳殼五錢　白朮半兩炒
薑水煎三錢溫服日三服
人參湯　治服冷藥過多胃寒嘔噦不下食
人參　白朮　附子　白茯　陳皮一兩　桂心　乾薑五錢　丁香一分　薑水粳米煎五錢服
藿香人參湯　治嘔噦不止胸滿煩悶
藿香三分　人參一兩　甘草　陳皮五錢
薑水煎三錢服日二

通正散　治噦逆嘔吐虛氣妄行
丁香　乾柹蒂一兩　蓮肉五十枚　共末酒下二錢
四逆加薑湯　治少陰症嘔噦
甘草一兩炙　附子　生薑一兩半切焙　乾薑三分
水煎五錢溫服

傷寒心悸

論曰傷寒心下悸者謂悸動不定也傷寒飲水過多水停心下腎氣乘心則心虛氣弱故爲之悸動皆由發汗後又下之津液燥少若內生虛熱熱則飲水水氣停積故必振寒而心下悸也
茯苓甘草湯　治傷寒厥心下悸先治其水服此湯却治其厥不爾水漬入胃必作利
桂枝甘草湯　治發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲
赤茯　甘草　桂心一兩　薑棗水煎五錢溫服日二
按者
桂枝四兩　甘草三兩　水煎五錢溫服日二
甘草湯　治脈結心悸
甘草　麥冬一兩　生地四兩　人參　桂心五錢　麻仁一合

薑棗酒水煎五錢去滓入阿膠一片令洋盡溫服日二
桂枝湯　治水在心下心悸動欲得人按
桂枝二兩　赤茯一兩半　白朮一兩　甘草　陳皮五錢去白炒
生薑水煎五錢空心溫服日二

傷寒痞滿

論曰傷寒病發于陰醫誤下之邪氣入裏胃中虛客氣上逆心下滿不痛按之不堅此爲痞也法宜瀉心唯表未解者未可攻之當先解表然後攻痞若表解而裏未和或瀉心而痞不解其人口燥煩渴皆隨症處治其肢冐而經脉

動傷者久則成痿若表裏俱虛之人有氣痞陰陽氣并竭無陽則陰獨復加火針因胸煩面青黃膚瞤者難治其脈微浮而氣上冲咽喉不能息者非痞乃有寒在胸中故也治屬吐法

半夏瀉心湯　治心下痞但滿不痛者

半夏一兩　乾薑　人參二兩　片芩　川連　甘草五錢

大棗水煎五錢食後服日二

大黃黃連瀉心湯　治傷寒大下之後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜此湯

大黃二兩　川連一兩　以麻黃沸湯漬三錢須臾絞取汁溫服　一方有片芩一兩

瀉心湯　治傷寒汗解後胃中不和心下痞硬噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利

人參　甘草二分　川連　乾薑一兩　片芩一兩　半夏薑汁炒二兩半　薑棗水煎四錢空心溫服晚又服

甘草瀉心湯　治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行完穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不

得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使硬也

炙甘草四兩　片芩　乾薑三兩　半夏二兩半薑汁炒　川連一兩

水煎四錢大棗二枚溫服

旋復代赭湯　治發汗若吐下後心下痞硬噫氣不除

旋復花三兩　代赭石一兩　人參　半夏　甘草二兩炙

薑棗水煎四錢溫服日二

蘇橘湯　治胸中痞滿心腹氣滯不思飲食

紫蘇葉　大腹皮　旋復花一兩　陳皮二兩　赤茯半兩

半夏五錢　薑棗水煎五錢溫服

與效丸　治五六日大下後心中痞滿氣息喘逆欲絕

人參　白朮　甘草　枳殼　赤茯　括樓　陳皮炒

木香五錢　乾薑二分　共末蜜丸桐子大[illegible]米飲下二十丸至晚再加至三十丸

草豆蔻湯　治傷寒汗後胃氣不和心下結痞噫氣食臭脇下[illegible]雷鳴下利

草蔻　陳皮　枳殼五錢　人參　半夏　甘草

乾薑三分　薑棗水煎五錢溫服日二

傷寒霍亂　傷寒小便不通　傷寒大便不通

傷寒下利

傷寒霍亂

論曰嘔吐而利病名霍亂此由邪氣在中焦使陰陽二氣不能升降則心腹絞痛而作吐利其候先心痛則先吐腹後痛則先利心腹俱痛則吐利並作古人以其病迅暴揮霍之間便致撩亂故名霍亂傷寒霍亂亦由中焦陰陽不和所致故其狀有熱而渴者有寒而不渴者有發熱惡寒汗出厥逆者有病勢已而身體疼痛不休者不可槩以一

法治

理中湯　治霍亂吐利寒多不喜飲水

人參　白朮　甘草　乾薑二兩

共末蜜丸彈子大湯化一丸溫服日三夜二

五苓散　治霍亂頭痛發熱多欲飲水

豬苓　白朮二分　桂心五錢　赤茯　澤瀉一兩

共末溫水空心下二錢日二

蘆根人參湯　治霍亂心煩乾嘔

蘆根兩　人參　麥冬　赤茯一兩　枇杷葉去毛炙一分

水煎五錢入葱白三寸溫服日三

藿香湯　治霍亂轉筋嘔吐不止

藿香　人參　附子　木瓜　桂心　川歸二兩

生薑水煎三錢溫服日二

吳茱萸湯　治霍亂吐利脹腹轉筋手足冷飲食不消

吳茱萸　紫朴一兩　桂心　丁香　木瓜　甘草

藿香五錢　人參二分　薑水煎三錢服日二

白朮湯　治霍亂吐利轉筋

白朮　陳皮一兩　木瓜二兩　薑水煎三錢溫服日二

傷寒小便不通

論曰傷寒小便不通者或因發汗過多津液虛少胃中乾燥或小腸有伏熱氣道不宣皆令小便不通也方論云胃中乾則無小便慎不可利蓋言汗後亡津液也若下焦有熱而小便不利又當隨症利之

赤茯木通湯　治下焦有熱小便不通

赤茯　木通　滑石　車前子一兩　水煎五錢溫服日二

豬苓湯　治脉浮發熱渴欲飲水小便不利

豬苓　赤茯　滑石　澤瀉一兩

水煎五錢去渣入阿膠末一錢再沸溫服日二
五苓散　治傷寒汗後小便不利微熱消渴
豬苓　赤茯　白朮三兩　桂心五錢　澤瀉一兩
共末水下三錢
雞蘇湯　治小腹急痛小便不利
雞蘇一把　木通　滑石　杏仁去皮尖炒　冬葵子　石葦去毛一兩　生地二兩　水煎五錢溫服
傷寒大便不通
論曰傷寒大便不通者胃腑實也因太陽病若汗若下若

利小便亡其津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難此陽明症也當下之然有陽明症不可下者當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出爲小便數少津液當還胃中故知不久當大便如此則傷寒嘔多雖有陽明症不可下明矣凡胃中有燥屎常以湯水和之湯入腹中轉失氣者此所謂有結燥下之無害若不轉失氣者此但初硬後必溏不可下下之則脹滿不能食也
小承氣湯　治陽明病潮熱若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中　轉失氣者有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者但初頭硬後必溏不可攻攻之必腹脹不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便硬而少也以小承氣和之
大黃四兩酒洗　紫朴二兩薑汁炒　枳實三枚炒　水煎五錢溫服當更衣不爾者再服更衣者勿服服後若不轉失氣者不可攻
大承氣湯　治傷寒病不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時此爲有燥屎宜此湯

大黃四兩酒洗　紫朴八兩薑炒　枳實五枚炒　水煎五錢去渣入芒硝一錢數沸溫服　仲景云少陰病六七日不大便者此湯主之
麻仁丸　治傷寒趺陽脈浮而澁浮則胃氣强澁則小便數浮澁相搏大便則硬其脾爲約
麻仁半升　白芍二兩炒　紫朴薑汁炒　枳實炒一兩三分
杏仁二合炒　大黃四兩炒
共末蜜丸桐子大飲下十丸日三
蜜膽導　治大便秘澁服藥不通

白蜜二合　雄豬膽一枚　膩粉半分研　先將蜜入銅器中
微火慢熬二十沸入膽汁將枇子不住手攪慢煎成
膏入膩粉和丸如棗核大以薄綿包內下部中未通
再用

傷寒下利

論曰傷寒下利者其種固多端然皆由表實裏虛寒熱滲
氣乘虛客搏于腸胃之間故腸胃隨其所傷而下若傷寒
則下青白傷熱則下黃赤寒熱相雜則赤白俱下若兼以
溼毒則又下膿血如魚腦如爛肉也其候不同有下利而

脉虛者有下利而脉實者有濕毒勝而腹痛者有熱氣併
而煩渴者有津液搏滯而腸垢者有屎燥結聚而妄言譫
語者其要在審別虛實以治之

白頭翁湯　治傷寒下利飲水者內有熱也及熱利後重
白頭翁五錢　川連　川栢　陳皮三分
水煎五錢空心服日二

桃花湯　治傷寒少陰病二三日至四五日腹痛小便不
利下利不止及便膿血
赤石脂四兩一半研一半不用研　糯米二合半　乾薑一分
水一升煮薑米并不研石脂候米熟用汁一小鍾入
石脂末一錢再沸溫服日三

四逆湯　治自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之
炙甘草兩　附子五錢　乾薑炒三分　水煎五錢溫服
又治傷寒後下利清穀不止身疼痛急當救裏

犀角湯　治熱毒不解日晡壯熱腹痛純下鮮血
犀角　片芩　川連　茜根　地榆一兩　山栀五錢
水煎五錢入薤白五寸溫服

黃栢湯　治下痢膿血

川栢　阿膠五錢　川連一兩　山栀一分　水煎三錢食前
服日二

龍骨丸　治臟腑虛冷下白膿腹痛
龍骨　乾薑　附子一兩
共末醋糊丸桐子大米飲下三十丸日二

竹茹湯　治利下血不止
竹茹　白芍　子芩五錢　木通二分　升麻　黑木耳燒灰
兩半　水煎三錢去滓入生地汁一合溫服

傷寒陰毒　傷寒陽毒　傷寒發斑

傷寒陰毒

論曰陰氣獨盛陽氣暴衰陽爲陰所勝内外皆陰故成陰毒傷寒有初得病便成陰毒者有服藥經五六日不差變成陰毒者以病本屬陰因服寒藥過多或臟腑内外受寒陰氣轉盛陽氣不復所致其候四肢逆冷臍腹築痛身如被擊嘔吐下利其脉微細而疾

陰毒甘草湯　治傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥後自變成陰毒身重背强腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅强短氣不得息嘔逆脣青面黑四肢厥冷其脉沉細身如被杖五六日可治至七日不可治

甘草　升麻　桂心　川歸五錢　川椒　雄黄一分

鼈甲炙半兩　水煎五錢溫服日二

氣壅喘悶方　治陰毒手足厥冷或生斑點

附子二枚火燒焦色出火毒　爲末用沉香磨水米飲下二錢

正陽湯　治傷寒陰毒脣青面黑張口出氣心下硬身不熱額上出汗煩渴不止舌黑多睡四肢逆冷

附子　甘草　乾薑一兩　皂莢一枚去皮子炙黄　麝香一錢研

共末水煎二錢稍熱服

正陽丹　治陰毒手足厥冷脉沉細面目青

硫黄　砒石　太陰玄精石一兩　同研入瓶内鹽泥封固陰乾火煅赤細研酒煮糊丸桐子大酒下二十丸

附子回陽散　治傷寒陰毒面青脣黑四肢逆冷臍腹痛身體如氷幷一切卒暴冷氣

附子二枚　爲末用生薑自然汁半鍾冷酒拌勻下三錢更以冷酒送下相次再服良久臍下如火徧身和煖爲度

傷寒陽毒

論曰陽氣獨盛陰氣暴衰陰爲陽所勝内外皆陽故名爲陽毒傷寒有得病便成陽毒者有服藥經五六日不差變成陽毒者蓋以病本屬陽或以火劫發其汗或因炙焫陽氣轉盛陰氣内消所致其候面赤發躁狂走妄言或發斑如錦紋或咽喉疼痛或涕吐膿血或下痢黄赤其脉洪實滑促是其證也

升麻湯　治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒腰背疼痛煩悶不安面赤狂言或見鬼神或下痢脉浮大數面赤斑紋如錦咽喉痛吐膿血五日可

治七日不可治
升麻 犀角 射干 人參 片芩 甘草一兩
水煎五錢溫服少頃又服取汗未汗再服
梔子湯 治陽毒壯熱百節疼痛
梔子 赤芍 大青 知母一兩 石膏 片芩
杏仁二兩炒 甘草五錢 柴胡半兩
薑煲水煎四錢入豉百粒服
黑奴丸 治傷寒時行熱病六七日未得汗脉洪大或面
赤目脹身大熱煩躁狂言欲走渴甚又五六日以上

不解熱在胸中口噤不能言心下尚暖灌藥下咽即
活兼治陽毒及發狂
麥奴山麥未熟時中有不成者上有黑衣勃取下即名麥奴一兩 麻黃去根節三兩
大黃一兩 片芩 芒硝 釜底煤 竈突煤 梁上塵
各一兩 共末蜜丸彈子大取新汲水化下一丸渴者與
冷水盡量飲之須臾當寒寒過汗出即差若服藥日
移五尺不汗再服一丸差即止須微利下此藥須病
人大渴倍常燥盛者乃可與之不爾不可與
大青湯 治陽毒煩躁不解或下利危困

大青二兩 犀角 山梔 甘草 川連五錢 秦艽一兩
水煎五錢入豆百粒薤白七寸空心服
犀角湯 治傷寒陽毒初得身大熱目赤便黃心悶頭痛
煩渴不止四肢疼痛語言錯亂眠臥多驚
犀角一兩 赤茯 陳皮 甘草 麻黃 細辛
茵陳蒿五錢 人參二分 薑煲水煎五錢服
傷寒發斑
論曰傷寒發斑者陽盛故也其病在表或未經發汗或已
經發汗未解或吐下後邪熱不除毒氣內盛因表虛熱毒

乘虛出于皮膚發為斑疹如錦紋若色赤發在五六日內
者可治色黑過七日乃發者難治甚則身體喉舌皆成瘡也
黃芩湯 治傷寒熱病十日內未得汗表裏有熱遂發斑
點時或狂言目色黃心中煩熱大便不利
片芩 大青 大黃 升麻 朴硝 山梔一兩
茵陳蒿一兩 川連 甘草五錢 竹葉三七片水煎五錢服
石膏湯 治發黑斑
石膏二兩研 麻黃 葛根一兩 川連三分 故鞋一隻去土細切
川椒一分炒 桂心五錢 水煎五錢溫服取汗

傷寒發黃　傷寒發豌豆瘡　傷寒發狂
傷寒剛痓　傷寒柔痓

傷寒發黃

論曰傷寒發黃之狀身體盡變黑黃或如橘色是也凡陽明中風太陽中溼皆令人發黃蓋由得病無汗小便不利寒溼不散則熱結脾胃腠理閉塞瘀熱之氣與宿穀相搏而鬱蒸不能消散故二便結澀不通令人身體面目皆變黃色其病腹滿身疼發熱若其人小腹滿急眼澀疼鼻骨痛兩膊及項强腰背急者是也但得小便快利漸愈仍不

用大便多即令人心脹又有急黃者身體黃甚卒然而發心滿氣喘命在須臾故名急黃有初得病便黃者初不知是黃死後方變黃者此病亦因脾胃瘀熱本天行時氣所作宜細辯之但發熱心戰者乃是發黃之候

茵陳蒿湯　治陽明發熱汗出此為越熱不得發黃也但頭汗出小便不利渴飲水漿此為瘀熱在裏身必發黃下之宜此湯又傷寒七八日身黃如橘皮小便不利腹微滿者宜此湯

茵陳蒿六兩　梔子十四枚　大黃三兩生　共為粗末水煎五錢三服後小便當利下如皂莢汁狀乃愈

麻黃連翹湯　治瘀熱在裏發黃

麻黃二兩去根節　連翹　生薑各二兩　杏仁四十枚去皮尖炒　生梓白皮一升　大棗十二枚　甘草一兩　水煎五錢熱服

梔子柏皮湯　治傷寒身黃發熱

梔子十五枚炒　黃柏二兩　甘草一兩　水煎三錢

抵當湯　治傷寒太陽身黃脉沉細小腹鞕小便利者為無血也小便自利其人如狂者血諦證也

水蛭三十枚炒　虻蟲三十枚炒　桃仁十枚炒去皮尖　大黃三兩

水煎三錢服

龍膽湯　治發黃頰熱皮肉皆黃小便赤不利

龍膽　枳殼　山梔　木通　知母　柴胡　地骨皮　白芍　甘草　麥冬　升麻　羚羊角一兩　水煎五錢

黃芩湯　治傷寒發黃或先服利藥未差宜以內消以折熱氣

片芩　茵陳蒿　升麻　犀角一兩　山梔　柴胡　龍膽草五錢　水煎五錢入生地汁一合

茅根湯　治傷寒發黃通身如金色

茅根　山梔　甘草　茵陳蒿　地骨皮（一兩）

每服水煎五錢入豉三七粒熱服

梔子湯　治傷寒急黃

山梔　柴胡　朴硝（另研）　茵陳蒿（五錢）　水三大鍾煎二

大鍾去渣入硝分三服取利

茵陳蒿散　治傷寒時氣急黃疼痛

茵陳蒿　片芩　梔子　大青（一兩）　大黃　朴硝（二兩）

白鮮皮　葛根　升麻（兩半）　共末新汲水下二錢（得利差）

傷寒發斑豆瘡

論曰傷寒熱毒內盛多發皰瘡者以病人表虛裏實故也裏實則毒氣不能內消表虛故乘虛發于肌肉而成瘡其瘡大小形如斑豆其色或白或赤若頭作瘭漿戴白膿者其毒則輕若紫黑色作根隱隱在肌肉裏者其毒則重甚者周匝徧身五內七竅皆有也

參麻湯　治傷寒熱病生斑豆瘡并皰瘡煩悶昏迷

玄參　升麻　乾藍葉（一兩）　甘草（三分）　犀角（鎊五錢）

水煎五錢入葱白三寸豉一撮熱服日二

斑豆瘡四邊赤腫

胡荽（一把）　生地　二味搗取汁空心服盞許

犀角湯　治傷寒熱毒氣盛瘡如斑豆

犀角（二兩）　麻黃　川連（半兩）　木香（一兩）　水煎五錢日二

內消散　治傷寒熱病欲生斑瘡毒未出令不成

京墨（燒去烟一分）　用酒三合磨令頓服

紫草湯　治傷寒斑疹豆瘡

紫草　惡實　荊芥穗（一兩）　水煎三錢熱服日二

傷寒發狂

論曰重陽者狂謂陽氣獨盛也傷寒熱毒既盛內外皆熱

則陽憤瞋而發爲狂越使人狂走妄言或罵詈不避親疏或妄見妄聞棄衣而走登高而歌或數日不食踰垣上屋蓋四肢諸陽之本熱盛而四肢實是爲重陽故所上之處皆非素所能而病乃能也若乃因火爲邪而發爲驚狂及內有瘀血而外症如狂其爲病雖不同然其爲陽氣有餘則一也

犀角湯　治傷寒十數日頭戰掉大汗出恍惚狂走眼見鬼神

犀角　山梔（五錢）　白芍　生地　麥冬　茯神（一兩）

茵陳蒿三分　水煎五錢入竹葉二十一片食後服

羚羊角湯　治汗後熱毒未盡因有所驚狂言欲走

羚角　犀角　防風　片芩　升麻　玄參　茯神五錢

龍齒　甘草一兩　人參　竹茹　骨皮三分　水煎五錢

抵當湯　治太陰病六七日表症仍在脈微沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經蓄而瘀熱在裏故也

水蛭十枚炒　蝱蟲十枚去翅足炒　大黃一兩酒浸炒　桃仁七枚炒

水煎五錢服當下瘀血不下再服

絳雪丸　治傷寒發狂眼赤二便血出身如金色兼治六七日狂躁發熱

硝石一兩　丹砂一分　研細粟米飯丸彈子大砂糖冷水下一丸服藥後便覺稍稍汗出為效

傷寒剛痓

論曰傷寒病發汗過多因致痓其狀令人搖頭發熱頸項強急惡寒背反張瘈瘲口噤謂之剛痓者特以無汗而反惡寒故也

葛根湯　治傷寒太陽病無汗小便反少氣上冲胸口噤搖頭欲作剛痓

葛根四兩　白芍　麻黃二兩去根節　甘草　桂心一兩

薑棗水煎五錢熱服取微汗

大承氣湯　治傷寒剛痓胸滿口噤臥不着蓆脚攣急必齘齒

大黃四兩　枳實一兩　紫朴五錢　水煎五錢去滓入芒硝五分二沸服

羚角升麻湯　治傷寒剛痓仰目壯熱筋脉不舒牙關緊急不欲見食

羚角　升麻　白鮮皮　龍齒五錢　木通　百合

防風一分　石膏一兩　水煎五錢入豉百粒葱白五寸

小續命湯　治傷寒剛痓無汗惡寒口噤背强

麻黃　桂心　甘草五錢　白芍　白朮　人參　川芎

附子　防巳　防風半一分　薑水煎五錢日三夜二

傷寒柔痓

論曰柔痓之狀搖頭發熱頸項强急腰身反張瘈瘲口噤與剛痓同然謂之柔痓者特以其自汗不惡寒故也痓又謂之痙者蓋以痙一類古之時以强直名之

桂枝加葛根湯　治傷寒柔痓項背强几几反汗出惡風
桂枝二兩　葛根四兩　麻黃　白芍三兩　甘草二兩
薑棗水煎五錢取汗

桂朮湯　治傷寒柔痓手足厥冷筋急汗不止
桂心一兩　白朮　人參　附子三分　甘草　防風
乾薑五錢　水煎五錢日二

五味子湯　治柔痓汗出身體强直手足多寒
五味一兩炒　木香　附子　檳榔三兩　白朮　甘草
乾薑　桂心五錢　水煎五錢日二

柴胡飲　治柔痓四肢逆冷汗不止腹中痛筋脉急
柴胡　赤茯二分　桂心　乾薑一分　檳榔煨　五味子
炒五錢　水煎五錢服

傷寒壞病　傷寒狐惑　傷寒百合
傷寒陰陽易　傷寒鼻衄

傷寒壞病

論曰傷寒太陽病三日已發汗吐下溫針仍不解者多變爲壞病又陽病轉入少陽已吐下發汗少陽症罷此爲壞症知犯何逆以法治之此由傷寒病在諸經絡發汗吐下而病症不除又感異氣有寒暑燥溼風不同病亦隨變故謂之壞病又有傷寒過經再受邪熱留蓄臟腑病候多變者及傷寒解後虛羸少氣餘症未除者皆謂之壞病

知母麻黃湯　治傷寒壞病差後或十日二十日終不惺惺精神昏語言亂又無寒熱醫作鬼祟或作風病多端治藥弗效或朝夕潮熱頰赤或似瘧由發汗未盡餘毒在心包絡間所致
知母一兩半　白芍　麻黃　甘草　片芩　桂心五錢暑月減半
水煎五錢半日內可相次三服取汗未汗再服若心

煩不眠欲飲水者稍稍與之令胃中和即愈

黑奴丸　治壞病頭與骨肉俱疼狂言妄語醫所不治
麻黃　片芩　甘草　芒硝　竈突墨一兩　豉一合炒
共末蜜丸彈子大新汲水下一丸　考此丸與陽毒黑奴丸只同

麥冬湯　治傷寒壞病經久不差潮熱不退身體沉重昏憒煩悶
麥冬　赤茯　甘草　鼈甲一兩醋炙　水煎三錢入烏梅
肉一枚小麥五十粒溫服日二

傷寒狐惑

論曰狐惑之病初得狀似傷寒或因傷寒而變皆蟲症也

蟲蝕其喉爲狐使人聲啞蟲蝕其下部爲惑使人咽乾其候皆默默欲眠不得臥起居不得安惡飮食面目乍赤乍白乍黑是也由傷寒病腹内熱飮食少腸胃空虛而蟲爲之不安故隨食上下部而病名狐惑也

赤小豆當歸散　治傷寒變成狐惑脉數無熱微煩默默欲臥汗出得之三四日眼赤得之七八日目四眥黑能食者膿已成也

赤小豆一升浸洗　川歸一兩　共末水煎三錢溫服日二

黃芩湯　治傷寒不發汗變成狐惑脉數無熱微煩二日

赤但欲眠睡咽乾不能食

片芩　射干一兩　甘草　竹茹　知母　前胡五錢

川連三分炒　水煎五錢日二

黃連犀角湯　治病後瘡出下部

川連五錢　犀角一兩　木香一分　烏梅七枚

水煎三錢日二

木通湯　治傷寒陰陽不和變成狐惑目如鳩赤面色斑紋如錦

木通一兩　甘草　桂心　細辛五錢　吳茱萸三兩洗炒

薑棗水煎五錢葱白五寸

雄黃導氣湯　治傷寒狐惑下部䘌瘡

雄黃研　青葙子　川連　苦參五錢　桃仁一分炒

共末生艾汁和如棗大綿裹導下部扁蓄汁更好冬月無艾蓄用根

探膈湯　治傷寒狐惑病在上焦

苦參一兩　甘草五錢　作一服水煎五更服良久即吐

薰洗四皮湯　治狐惑攻下部肛內生瘡

槐白皮　柳白皮　桑白皮　桃白皮二兩

水煎四兩薰洗下部

檳榔丸　治未汗變狐惑毒蝕肛門痒不止下膿血

檳榔　丹砂五錢　麝香一錢　杏仁四十九枚炒　共末用飴糖和如棗核大先用椿根槐白皮各二兩水煎洗肛門將藥內之

雄黃薰方　治狐惑蟲食下部肛外如䘌痛痒不止

雄黃五錢研　用瓶一箇口稍大者入灰半瓶灰上放火將黃末燒之候煙出坐瓶口上薰之良

傷寒百合

論曰傷寒百合者謂百脉一宗悉致其病也其狀欲食復不能食常默默欲得卧又不能卧欲出行又不能行食飲有時美亦有時不美如有寒又如無寒如有熱又如無熱口苦小便赤黃得藥則吐利者是也此由傷寒及大病後臟腑俱虛榮衛耗弱不能平復變成斯病然以百脉一宗悉致其病又無復經絡故其病症變異治之各隨其症

百合雞子湯　治傷寒病吐之後

百合七枚　雞子黃一枚　水漬合一宿更水煎去滓入子黃攪服

百合知母湯　治傷寒已經汗後

百合七枚　知母一兩　水漬百合一宿更水煎分二服

百合滑石散　治傷寒變發熱

百合一兩　滑石半兩　共末空心飲下二錢日二

百合地黃湯　治傷寒不經汗吐下後病形如初

百合七枚　生地黃汁一升　水煮百合取汁和生地汁溫服中病勿更服大便當如漆

百合半夏湯　治傷寒病不差不思食欲成勞

百合二兩　半夏　人參　赤茯　川連炒　知母一兩　生地半兩　薑水煎五錢日二

百合紫菀湯　治傷寒病似勞形狀如瘧

百合二兩　紫菀　柴胡　杏仁　白茯　半夏　甘草

薑水煎五錢日二

傷寒陰陽易

論曰凡傷寒大病後氣血未復若房事太早不待令病人勞復因爾染易男病傳女女病傳男由轉易然故名陰陽易其狀身體重少氣熱上冲胸頭重不能舉目眯四肢拘急若小腹急痛力弱著牀不能轉側舉動憑人不急治則死或經歲月漸至羸困亦死

枳實湯　治傷寒勞復陰陽易

枳實　山梔一分　豉二合炒　雄鼠糞十七粒炒

水煎二服未效又服

燒褌散　治傷寒陰陽易身腫氣少小腹急陰中拘攣熱上冲胸頭重不欲舉眼目生花膝脛拘急

女人中褌取對陰處者水洗燒灰研末女人病取男人者　水服方寸匕日三服小便利陰頭腫愈

立效湯　治陰陽易身重小腹裹急陰頭微腫

韭白一把 雄鼠糞二十七枚炒 水煎一日服汗出愈

蔞薤湯 治陰陽易氣冲心胸頭重不舉

蔞薤一兩 木香 桂心三分 荆芥穗五錢 雄鼠糞二十七枚炒 水煎五錢溫服日二

二灰散 治傷寒陰陽易

手足指甲二十大片男病用女女病用男 裩襠布水洗一片男病用女女病用男

燒灰研末分三服酒下

犀角湯 治病未平復陰陽易壯熱頭痛鼻出血

犀角 竹茹 丹參 葛根一兩 石羔三兩

水煎五錢日二

傷寒衄血

論曰傷寒衄血者由熱氣蘊結血溢妄行蓋心生血肝藏之肺主氣鼻則通之心肝爲熱邪所傷則血隨氣妄行所以從鼻出也人謂陽盛則衄者蓋陽盛則熱盛熱盛則宜衄故傷寒太陽症衄血乃解謂是故也至于陰病則不宜衄蓋陰症自無熱安得而衄故少陰病但厥無汗强發之必動其血或從口鼻耳目出者是謂下厥上竭爲難治

茅花湯 治傷寒衄血不止

茅花 水煎濃汁溫服如無花以根代之

黃連散 治熱病鼻衄不止或兼吐血

川連 竹茹 伏龍肝三分 片芩一兩 山枝 甘草炙五錢

麄末水煎五錢入生地汁半合亂髮灰五分一沸食後服

阿膠湯 治衄不止此陽毒攻肺

阿膠 片芩一分 蔥白五寸 熟艾五錢 豉四十九粒炒

作二服水煎溫服入生地汁一合

刺薊湯 治傷寒衄血吐血心中堅硬一身疼痛自汗煩悶

刺薊 麥冬 生地一兩 竹茹 紫蘇 白茯苓五錢

麄末水煎五錢服

黃土湯 治衄血去五臟熱毒

黃土竈中者 白芍 川歸 片芩 甘草 川芎三分

生地半兩 桂心一分 竹茹五錢 水煎五錢服

髮灰散 血衄不止

髮灰 麝香 同研極細新汲水下一錢又吹鼻中少許

四生飲 治衄血心胸煩悶

生地汁三合 生藕汁二合 生薑汁半合 白藥子一分

生刺薊汁一合 五共微溫分二服

升麻湯 治衄血不止頭痛壯熱

升麻 紫蘇 白芍一兩 青蒿 犀角 芒硝三分

水煎三錢入生地汁一合

地黃飲 治血衄不止

懷生地黃汁二合 白蜜三合 攪勻頓服即愈

生地汁飲 治時疾壯熱頭疼血衄不止

生地汁 生藕汁 生薑汁 白生蜜各二合

和勻分三服微煎食後臥服

傷寒吐血 傷寒瘀血 傷寒口舌生瘡

傷寒舌腫脹 傷寒咽喉痛 傷寒毒攻手足

傷寒吐血

論曰傷寒吐血者熱在陽經邪盛于表應汗而不汗熱毒

入深結于五臟遂成瘀熱薰蒸于上焦血隨氣妄行并入

胸中胃得血則滿悶氣逆故爾吐血也

麥冬湯 治傷寒頭疼手足煩熱吐血不止

麥冬兩半 生地 片芩 甘草 吳藍 茅根

蒲黃一兩 水煎五錢入豆百粒

黃連湯 治吐血不止由心肺積熱血得熱即妄行

川連半兩炒 荷葉一兩微炒 熟艾葉五錢微炒 側栢葉三分微炙

水煎五錢入生地汁一合溫服

紫河車散 治吐血煩躁

紫河車三分瓦上炙 朴硝 甘草五錢 蛤粉一分

共末新汲水和沙糖下二錢日二夜一

蜜汁方 治傷寒病後餘毒不解心臟熱極吐血不止

生藕汁 生地黃 惡實根汁 刺薊根汁各二合

生白蜜一合 和勻頻頻溫服一二合

傷寒瘀血

論曰傷寒病在表當汗不汗邪無從出熱結在裏皆成瘀

血然太陽病不解熱結膀胱其人如狂者少腹硬滿小便

自利下血乃愈又陽明病其人喜忘者本有瘀血大便雖

硬反易其色必黑或赤病人腹不滿反自言其滿者亦為

瘀血在裏皆宜下之待瘀血得下即愈診其脉沉結者亦

瘀血病也

抵當湯 治傷寒陽明症喜忘者必有畜血所以然者本

有瘀血故令善忘大便雖硬反易其色必黑
水蛭十枚炒 䖟蟲三十枚去翅足炒 桃仁二十枚去皮尖炒
大黃一兩炒 水煎五錢空心服不下更服
桃仁承氣湯 治太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自
下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外已解
但少腹急結者乃可攻之
桃仁十二枚炒 大黃一兩 桂枝 甘草 芒硝五錢
水煎五錢去滓入硝再沸分三服
芍藥地黃湯 治傷寒病溫應發汗而不發內有蓄血及

衄血吐血不盡面色黃大便黑
白芍二分 地黃 丹皮二兩 犀角一兩 水煎三錢入生
地汁三合再沸服日二如發狂加黃芩一兩
傷寒口舌生瘡
論曰傷寒口舌生瘡此脾經受熱薰于口舌又或因冬時
發汗吐利後重亡津液表裏俱虛熱勢不已毒氣攻于上
焦致口中糜爛生瘡
升麻湯 治口舌瘡赤爛
升麻一兩 麥冬三分 丹皮 甘草五錢 水煎五錢入竹

棗二十一片大棗二枚溫服日二
苦酒湯 治少陰病咽中生瘡語聲不出
半夏十四枚 雞子一枚去黃留白 又以半夏入苦酒
內以雞殼放剪刀環中安火上煮二沸少少含咽
羚羊角湯 治病後餘熱上沖口舌生瘡
羚角 射干 麥冬三兩 白芍 木通 蘆根三兩
升麻一兩半 水煎五錢食後服
傷寒舌腫脹
論曰傷寒舌腫脹者病在三陰也太陰之脈連舌本散舌

下少陰之脈循喉嚨挾舌本厥陰之脈循喉嚨之後又手
少陰心經其氣通于舌凡此經絡爲風熱所乘隨脈至舌
熱氣留于血血氣壅滯故令舌腫脹胗其脈數急者是其
候也
升麻湯 治熱病喉嚨閉塞連舌根腫痛熱氣聚于胸中
升麻 麥冬 石膏一兩 竹茹 木通 黃柏五錢
朴硝二兩 玄參 前胡三分 水煎五錢服
犀角湯 治脾肺虛熱毒氣壅塞喉咽連舌根腫痛
犀角 川歸 白芷一兩 升麻 甘草 杏仁

射干五錢　水煎五錢日二

治心脾熱舌腫痛

生地汁半斤　生白蜜八兩　慢火煎稠含化半匙日二三

傷寒咽喉痛

論曰傷寒咽喉痛者少陰受邪邪毒雍遏于上焦微則咽喉痛甚則痛而生瘡又傷寒過經邪熱內盛熏于上焦亦令人咽喉痛各隨症治

甘草湯　治傷寒少陰二三日咽痛

炙甘草二兩　水煎空心分作四服

桔梗湯　前服甘草湯不差者服之

桔梗五錢炒　炙甘草一兩　水煎分二服

苦酒湯　治少陰咽痛生瘡不能言語聲不出

半夏十四枚洗七次　雞子一枚　將雞子去黃用白和苦酒半夏復入蛋中安火上令三四沸少少嚥之不差再服

半夏湯　治少陰咽中痛

半夏　桂心　甘草一兩　水煎放冷少少咽之

地黃煎　治咋氣肺熱咳嗽咽痛

地黃汁半斤　白芍　玄參　升麻　貝母三分　麥冬

柴胡　竹葉一兩　白蜜五兩

水五大鍾煎去渣入蜜汁慢煎日三

傷寒毒攻手足

論曰傷寒毒攻手足者熱勝則腫也熱毒之氣客于腑臟邪結在裏循經而出注于四肢故令人手足煩熱赤腫疼痛也

連翹湯　治毒氣攻手足腫滿疼痛心神煩悶

連翹　麥冬　犀角　片芩　枳殼　川歸一兩　大黃炒　木香　防風　羌活　惡實五錢　射香一錢

共末水煎服

又方　治毒氣攻手足虛腫疼痛欲死

蒼耳子五把　搗爛絞取汁漬洗手足

鉛丹膏　治毒氣攻冲手足虛腫

鉛丹五兩飛過　明松香　乳香炙去油　黃蠟一兩　麝香一分另研

先將松香煉化次入黃蠟化去渣入鉛丹乳末慢煎成膏入麝香攪勻候冷用絹攤貼腫處凡一切腫毒并宜貼此膏

傷寒後夾勞　傷寒後勞復　傷寒後骨接煩疼

傷寒後虛煩　傷寒後盜汗　傷寒後驚悸
傷寒後失音不語　傷寒後咽喉閉塞不通

傷寒後夾勞

論曰傷寒差後復夾勞者由病人先有風瘵因汗下之後榮衛虛弱氣不充足形體羸瘦時有盜汗寒熱不常喘嗽痰唾身中臭氣飲食不消肢體疼痛而黃瘦赤不即治之則致危殆

人參湯　治夾勞骨節疼痛渾身壯熱氣力虛乏

人參　白茯　白朮　白芍　桔梗　大茴香

柴菀一兩　柴胡　陳皮　蒼朮　羌活二兩　甘草半兩
秦艽三分　共粗末薑棗水煎二錢不拘時溫服

黃芪鱉甲湯　治傷寒病差後夾勞形體羸瘠或寒或熱病如瘧狀四肢煩疼等症

鱉甲　黃芪一兩　白朮　甘草　陳皮三分　知母
桑白皮五錢　葱白薑水煎五錢食後服

柴胡湯　治夾勞五心煩熱背膊疼痛手足無力不能飲食

柴胡　黃芪　鱉甲　赤茯一兩　秦艽　枳殼去白炒
地骨皮　片芩　葛根五錢　人參　甘草三分
薑水煎三錢服

人參鱉甲湯　治傷寒差後夾勞寒熱往來進退不時頭疼體痛口苦咽乾不思飲食

人參　鱉甲　附子　柴胡一兩　白芍　知母
烏梅肉炒　五味　桃仁炒　桂心　陳皮　羌活
秦艽　川歸五錢　薑水煎三錢溫服

傷寒後勞復

論曰內經謂熱病少愈食肉則復多食則遺此其禁也蓋

傷寒病新差後脾胃尚虛氣血尤弱穀氣未復津液未通若將養失宜輒啖肉食則脾虛不能消釋或因勞形于事皆令邪熱乘虛還入經絡復成大病故名勞復當隨其症候或表或裏依法治之

知母湯　治新差後勞動用力或飢食過傷勞復

知母　鱉甲　柴胡半兩　麻黃　葛根三分　雄鼠糞炒焦五七枚
水煎五錢入豆百粒葱白五寸食後溫服喫葱粥取汗

石膏黃芩散　治食肉勞復如初壯熱頭痛心煩欲吐小

便赤黄
石膏一兩 片芩 山梔 人參 川連 知母 葛根
五錢 共末葱白竹葉湯下二錢空心服日二以差爲度
知母湯 治勞復小腹硬卵縮疼痛欲死
知母 柴胡 麥冬 甘草半分 葱白三莖 水浸一宿
煎至小半入童便二盞豉心半合再煎五六沸入地
黄汁二合更煎微沸空心頓服微利即差
傷寒後骨節煩疼
論曰傷寒後骨節煩疼者由津液不足血脉皆虛餘毒客

于經絡榮衛澀滯于骨節之間故令骨節煩疼診三部脉
細而遲澀者乃其候也
柴胡飲 治傷寒病後骨節疼痛咳嗽不能食口舌乾燥
乍寒乍熱唇口生瘡
柴胡 升麻 人參 白芍 茯神 百合 地骨皮
片芩 麥冬 犀角五錢 鼈甲 石膏一兩 甘草一分
水煎五錢入竹葉生薑食後服日二
百合湯 治差後四肢煩熱骨節疼痛
百合 知母 鼈甲 柴胡 葛根 桑白皮一兩

水煎五錢入生地汁一合食後服日二
羌活湯 治傷寒病差後下焦風虛骨髓疼痛腰脚頑痺
不仁不能久立日漸消瘦
羌活 防風 丹參 白芍 棗仁 牛膝 五加皮
玄參 木通 川歸 檳榔 麻黄 獨活五錢 黄芪
桂心三分 薑水煎五錢空心服日二
傷寒後虛煩
論曰傷寒病後煩躁者有虛煩有穀煩陽氣偏多謂之虛
煩病差後食穀太早新虛不勝穀氣胃內蒸熱謂之穀煩

若陰陽和調則虛煩自已損其穀食則穀煩者差
竹葉湯 治傷寒後虛煩狀似傷寒病但身不疼痛不惡
寒內外皆不可攻者
淡竹葉半把 石膏四兩 人參 甘草五錢 麥冬一兩
半夏湯洗製二分 生薑水煎三錢入粳米百餘粒溫服
梔子豉湯 治傷寒汗後虛煩不得眠劇者必反覆顛倒
心中懊憹 又治傷寒發汗若下之虛煩心中窒痛
又治下利後更煩按之心下軟爲虛煩
山梔十四枚去皮炒 豉四合 水煎三錢不拘時服日二

五苓散　治傷寒中風發熱六七日不解心煩躁悶有表裏症其渴欲飲水水入即吐名曰水逆

豬苓　赤茯　白朮三分　桂心五錢　澤瀉一兩

共末湯下二錢

豬苓湯　治少陰病下利六七日咳而渴嘔而煩不得眠

豬苓　赤茯　阿膠　滑石　澤瀉一兩　水煎三錢溫服

麥冬湯　治傷寒病後餘熱不解或寒或熱四肢瘦弱虛乏飲食不入胸中煩滿悶虛躁等症

麥冬　赤茯　人參　白朮　黃芪　陳皮　地骨皮

一兩　甘草　桂心五錢　水煎三錢溫服

六神湯　治病後虛煩不安

人參　黃芪　白茯　山藥　百合　防風二兩

薑棗水煎五錢不拘時服日二

傷寒後盜汗

論曰汗者心之液傷寒差後眠寢有汗者由心氣偏虛榮衛不足腠疎表弱因寢寐之間汗出故名盜汗久不已日漸羸瘦肢體瘦弱

人參湯　治傷寒病後體氣虛弱夜臥汗出不止頭旋惡心日漸羸瘦不思飲食

人參　半夏　黃芪　麻黃根一兩　牡蠣火煆童便淬三次二兩

防風三兩　生薑水煎五錢溫服

杜仲湯　治病後虛弱夜多盜汗

杜仲二兩　人參　甘草二分　白朮　黃芪　白茯

白芍炒　茯苓一兩　牡蠣　麻黃根一兩半　水煎五錢溫服

白朮散　治盜汗不止

白朮二兩陳壁土炒　為末菖蒲湯下二錢不計時服

粉汗方　治病後盜汗腠理開疎

牡蠣燒紅童便淬八兩　麻黃根一兩水洗焙

共末裹絲中有汗使人傅之

傷寒後驚悸

論曰傷寒後心氣不足風邪乘之則令人精神不寧恍惚驚悸由於憂恐思慮致心氣虛邪氣內乘故神氣不得泰定而生驚悸也

前胡湯　治伏熱在心怔忡驚悸

前胡　茯神　人參一兩　遠志一兩半　丹砂　甘草一分

薑棗水煎服

人參茯神湯　治心虛驚悸恍惚不寧

人參　茯神一兩　陳皮三分　杏仁去皮尖炒一分 [illegible]

生薑水煎三錢服

茯神丸　治心力勞倦四肢羸弱心忪驚悸吵吸短氣補虛

茯神　麥冬　熟地一兩　人參　丹皮　黃芪三分

澤瀉　甘草　牛膝　桂心五錢

共末蜜丸桐子大食前酒下二十丸

傷寒後失音不語

論曰傷寒後失音不語由風寒客于會厭會厭爲音聲之戶邪氣傷之故卒然無音又肺主聲而通于氣人之五臟有五聲皆稟氣而通之若邪客于肺則氣道不調亦令人語無聲音當隨其輕重治之

杏仁煎　治暴嗽失音語不出

杏仁二兩炒研　百合　木通　五味　貝母　紫菀

桑白皮一兩　薑汁五錢　白蜜　沙糖四兩　水五大鍾煎

六味去渣下杏仁薑汁蜜糖沙糖後煎收如傷樣收

貯水煎半匙不拘時服

豆竹湯　治失音不語

黑豆半升　青竹去節如算大四十九莖每莖長四寸洗淨　用水五大碗同

豆煮熟爲度溫三服

羚羊角散　治失音不知人口眼不正舌強

羚羊角一兩　麻黃去根節　石羔五錢　片芩　防風

麥冬　升麻　乾葛三分　水煎五錢溫服日二

二瀝湯　治失音不語

竹瀝用淡竹去節火燒取瀝　荊瀝同上　梨汁二合　陳醬汁半合

各濾過和勻分四服早晚用

桂心湯　治邪氣傷肺失音不語

桂心二兩　石菖蒲一兩　水煎三錢溫服取後汗未退再服

芥子酒熨方　治肺中風冷失音不語

白芥子五合洗乾研　用白酒三鍾煑令半熟以布帛熱包

熨令人熨頸項周遍冷則易之

傷寒後咽喉閉塞不通

論曰咽喉閉塞不通者脾肺壅滯風毒蘊積內搏經絡上攻咽喉也足太陰之脉上膈夾咽而喉則肺氣之所通故脾肺壅熱則咽喉閉塞凡傷寒後餘毒未盡上攻咽喉故

亦令閉塞不通

黃芩湯　治咽喉瘡痛口瘡煩躁頭痛毒氣上攻

黃芩　大青　山梔　甘草五錢　升麻　麥冬一兩

水煎三錢入竹葉食後服日三

升麻湯　同

升麻　木通一兩　白芍　射干　羚羊角五錢　蘆根一兩

水煎三錢食後溫服

葛根湯　治傷寒後咽喉疼痛

葛根　竹茹一兩　倉粳米一合　生薑大棗水煎三錢食

後服

貼喉膏　治喉痛舌強邪熱上攻

白蜜半斤　甘草二兩　猪脂四兩　以脂蜜煉化入甘草煎

赤黑色濾去滓收貯頻取半匙含化

射干煎　治咽喉疼痛閉塞不通

射干半斤研末　猪板脂一斤切　先煎脂化盡下干熬黑色

濾過再熬成煎收貯綵裹彈子大含化

又方　熱病後喉痛閉塞不通毒氣上攻腫病

黃明膠　如掌大一片用水煮軟貼頸外差

傷寒後變成瘧　傷寒後脚氣

傷寒後下利膿血　傷寒後䘌瘡

辟瘟疫令不相傳染

傷寒後變成瘧

論曰傷寒後變成瘧者因病差後外邪未散其臟尚虛因爲勞事致二氣交爭陰勝則振寒陽勝則發熱陰陽更勝則往來寒熱休作有時也一日再發者得汗必解若傷寒八九日得之熱多寒少其人不嘔清便自調者欲自愈也或陽明症煩熱汗出日晡所發熱者脈浮宜解表脈實宜

攻裏又婦人熱入血室發熱而更作寒者皆詳辯之

升麻前胡湯　治變成瘧寒熱躁渴

升麻　前胡半兩　白芍　知母三分　木通　朴硝

烏梅肉　山梔五錢　甘草一錢炙

生薑大棗水煎五錢去滓入生地汁二合煎二三沸

食後服日二

黃芩鱉甲湯　治傷寒後變成勞瘧久不差

片芩　柴胡　山梔　烏梅肉五錢炒　鱉甲一兩醋炙

甘草一分　生薑大棗柳枝尖七枚大豉半合藥五錢入

童便同浸一宿炙早五更煎減半去滓入生地汁一合沸服

茯苓飲　治寒熱不退變成瘧

赤茯　鼈甲　地骨皮二兩　知母　柴胡半兩

枳殼去白炒一兩　水煎五錢去滓入生地汁一合再沸食後良久服如人行五六里再服

傷寒後脚氣

論曰傷寒後脚氣者緣其人腎經本虛風溼毒氣乘虛客入腎腎主腰脚故邪氣沉滯則脚弱而痛雖傷寒已差邪熱未盡風溼毒氣與熱相搏上冲于心肺其狀令人心胸煩滿上氣息急甚者致死診左尺脈洪而數者脚氣也服藥後脈沉而緩者愈

羚羊角湯　治脚氣上冲心膈煩悶

羚羊角　白茯一兩　片芩　半夏薑汁炒　陳皮去白炒

吳茱萸洗炒　檳榔五錢　生薑水煎五錢空心服

紫蘇木香湯　治脚氣冲心心神煩亂嘔逆減食脚膝痠疼

紫蘇　白芍　沉香　木通一兩　木香　赤茯五錢

吳茱萸洗炒　檳榔　陳皮　薑水煎三錢食前服

赤小豆湯　治脚膝腫滿氣急大便秘澀

赤小豆半合　桑白皮　檳榔五錢　紫蘇一兩

水五鍾薑一分煎減半空心分二服

吳茱萸散　治脚氣心腹妨悶脹痛坐臥不安

吳茱萸洗炒一分　木香　川歸　檳榔　郁李仁炒二分

水煎三錢空心溫服日二

傷寒後利下膿血

論曰傷寒後變成膿血利者因本病差後熱毒未散乘虛客于腸胃之間與津液相搏故下利膿血毒氣盛則臟熱而痛兼以溼氣加之則所下如魚腦或如爛肉雞鴨肝之屬又傷寒未解陰病下利便膿血者亦溼熱相搏故也

地榆湯　治熱毒不解日晚壯熱腹痛下利膿血

地榆　川連　片芩　犀角　茜根一兩　山梔五錢

水煎三錢入薤白二寸不拘時服

桃花湯　治傷寒少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利膿血不止

赤石脂四兩　乾薑一分炒　糯米二合半

水煎五錢溫三服得愈止

黃連湯　治熱病差後下利膿血不止

川連　阿膠一兩　茯苓三分　梔子一分

水煎三錢空心服日二

赤石脂湯　治下利膿血腹痛不止

赤石脂　黑乾薑　附子　川歸五錢　白芍一兩

水煎五錢空心溫服日二

傷寒後䘌瘡

論曰傷寒後䘌瘡者因腹中有熱其人少食胃中空虛三

蟲須食或食五臟或食下部隱僻有瘡故名䘌瘡其候齒無色舌上盡白四肢沉重忽忽喜眠若則脣裏有瘡其瘡在上脣裏如粟米心內懊憹痛者此蟲食五臟之症若下脣裏有瘡其人喜眠者此蟲食下部之症若肛爛見五臟者死故名曰䘌瘡

桃仁湯　治傷寒後䘌瘡

桃仁去皮尖炒　槐角子炒　熟艾一兩　大棗十五枚

水煎分三服

槐角子丸　治溼䘌蟲食下部心中煩懊

槐角子炒　苦參一兩　乾漆炒三分　木香　檳榔一兩

桃仁去皮尖炒二兩　熊膽五錢

共末蜜丸桐子大空心荊芥湯下二三十丸

羚羊角散　治心中煩躁脣口生瘡蟲食下部

羚羊角　黃芪　玄參　柴胡三分　草龍膽　升麻五錢

共末用槐角子湯空心下二錢日二

雄黃散　治䘌蟲

雄黃醋研一分　川連　苦參　青葙子半兩　桃仁去皮尖炒研三分

共末空心飲下一錢五分䘌在下部以綿裹少許內之

桃皮湯　治蟲食下部

桃白皮　槐實　槐角子一兩　石榴根皮五錢

大棗水煎五錢空心溫服日二以差為度

天行下部䘌瘡

烏梅肉搗五錢　獨蒜搗一枚　屋塵研三合

用苦酒一升于銅器中共煎候可丸即丸如棗核大內下部中少頃易之差

傷寒不究心仲景則變證不知雜證不識今總錄中變

證備載仲景祖方一無遺漏按方療治神明在人矣本家藏發明仲景傷寒書自郭白雲龐安常成無已後約五十餘家節菴非仲景衣鉢不與焉行將剞劂傷寒集註公諸宇內則學有淵源方有祖法爲醫家大宗匠此余之所厚望於來學也

康熙辛酉花朝靜觀居士程林識於維揚三一齋中

辟瘟疫令不相傳染

論曰凡時行瘟疫皆四時不正之氣感而病者長少大率相似此病苟不辟多致傳染宜方術預防

敗龜板湯　治辟時行瘟疫令不相傳染

敗龜板酥炙五錢　山梔　大青　白芍　羚羊角　馬牙硝　紫苑　前胡一兩　水煎五錢空心溫服日二

蒼耳子散　宜預先服之辟瘴疫時氣

蒼耳子午日乾三兩　爲末空心井華水下二錢

又方

蕪菁不拘多少水洗淨　搗取汁立春後值庚子日合家大小宜溫服一二鍾則永除瘟疫之患

塗傳方　辟瘟疫時氣

雄黃一兩　丹砂　鬼臼　石菖蒲一兩

共末井水調和塗五心及額上鼻中耳門辟瘟甚驗

調中丸　治四時疫癘非時之氣

大黃五兩炒　麻仁一兩研　枳殼炒　白茯苓　白芍藥　前胡　片芩一兩

共末蜜丸梧桐子大空心飲下二十丸微利臥服佳

聖濟總錄纂要卷四終

新安 程 林雲來 纂
關東 劉 英合初
席居中允叔 較
新安 江 湘鄂上 閱

瘧疾門

寒瘧 溫瘧 寒熱往來瘧 痺瘧

諸瘧統論

論曰夏傷于暑秋成痎瘧痎于夏而作也方夏之時陰居于內汗雖入之勢不能動候得秋氣陽爲之動使汗出遇風乃成此疾故名曰痎瘧皆生于風蓄作有時其氣陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽併于陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生于內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故欲冷飲因傷于暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也令人汗空疏腠理開因得秋氣汗出遇風及得之于浴水氣舍于皮膚之內與衛氣並居衛氣者晝行于陽夜行

于陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作日作者氣之所舍淺也作之早晏者隨風府日下一節也是以或先寒後熱或先熱後寒或但熱無寒或本于痰或本于瘴癘或本于鬼神或本于邪氣六經外傳經絡內入五臟症既不同治法亦異凡治瘧者不辨陰陽虛實概以吐藥投之有非痰實而真氣受斃者固多其內經論五臟諸經之瘧本以刺法補瀉其寒熱先後與夫正發早晏又皆不同明指邪氣所傳不可一槩而論今備載諸症本末參以治之輕重要在隨症而施庶幾乎無一曲之蔽也

寒瘧

論曰寒瘧之狀內經謂先寒而後熱病以時作是也蓋傷暑汗出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒其氣藏于皮膚腠理之中秋傷于風則病成矣其症先起于毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱疼寒去則內外皆熱頭痛飲冷是也

檳榔湯 治寒瘧神効

檳榔 常山 桂心 陳皮去白炒 甘草炙一兩

酒水合煎三錢未發時先服

鼈甲常山酒 治瘧先寒戰解卽壯熱

鼈甲醋炙一分 淡竹葉一兩 甘草 常山三分 酒半鍾浸
葉一宿次早加水煎未發時溫服得吐爲效

蜀漆散 治寒瘧

蜀漆水洗去腥焙 雲母火煆一晝夜 龍骨一兩

共末未發時漿下五分

烏梅丸 治寒瘧不止

烏梅肉炒 桃仁去皮尖炒 常山 豉炒三分 升麻

肉蓯蓉酒浸洗 人參 甘草炙 桂心一兩

共末蜜杵丸桐子大空心酒下二十丸至三十丸

虎骨丸 治一切寒瘧無問遠近

虎骨酥炙 人參 甘草 桂心 烏梅肉炒五錢

桃仁去皮尖炒 肉蓯蓉 常山 升麻三分 附子五錢

麝香研一錢 豉炒一合 共末蜜丸桐子大未發時飲下

二十丸

二薑散 治寒瘧不差

黑乾薑 高良薑一兩 同炒黑爲末空心酒下一錢三日

寒瘧塗方

鼈甲醋炙五錢 烏賊魚骨去甲 附子 常山 炙甘草一兩

酒煎五錢次日以酒塗手足幷背上如不發即止發
時飲此酒一鍾

又方

附子一枚生用 爲末用酒和塗病人背心上佳

溫瘧

論曰溫瘧之狀內經所謂先傷于風後傷于寒其症則先熱後寒病以時作是也蓋風爲陽氣寒爲陰氣風氣大勝故先熱而後寒得之冬中風寒氣藏于腎內至骨髓至春陽氣大發邪氣不能自出至夏大暑腦髓爍肌肉消腠理

發洩或有所用力邪氣與汗俱出故氣從內之外其法宜先治其陽後治其陰則瘧疾自除

蘆根湯 治初壯熱後寒戰骨節痠疼口乾煩渴

蘆根 石羔一兩 麥冬 升麻 葛根三分 山梔五錢

水煎五錢入竹葉三片未發前連三服

知母湯 治瘧骨接疼痛時嘔朝發暮解暮發朝解

知母二分 甘草一兩 石羔三兩 桂心五錢 粳米一合

水煎五錢入米一撮候未熱未發時先服

常山飲 治溫瘧壯熱微寒

常山如雞骨者五錢 淡竹葉一把 小麥一合 水浸一宿次早
煎未發時空心溫服 老年久病之人及虛弱者減
三錢服

寒熱往來

論曰陰陽相勝而寒熱互作者以邪氣相并也故氣并於陰則爲寒氣并於陽則爲熱寒則振慄鼓頷以陰實陽虛故也熱則渴而飲冷以陰衰陽勝故也

柴胡桂枝湯 治瘧寒熱往來
柴胡四兩 桂枝 人參 片芩 白芍藥半兩 甘草

半夏一兩 薑棗水煎六錢溫服日二

人參湯 治寒熱瘧時作面色黃
人參 常山五錢 甘草 陳皮去白炒二分
水煎五錢入茶末燈心去滓入酒半鍾未發時先服取吐如未吐再服以痰盡爲度

鱉甲大黃丸 治瘧寒熱往來久不差
鱉甲 大黃生 附子 人參 甘草 常山 蜀漆
白薇各一兩 共末蜜丸桐子大竹葉湯平旦服十五丸良久又服

癉瘧

論曰癉瘧之狀內經所謂但熱不寒陰氣先絕陽氣獨發少氣煩寃手足熱而欲嘔是也得之邪熱留于身中厥逆上冲氣實而不外泄因有所用力腠理開疏風寒客于皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛不及于陰故但熱不寒氣內藏于心外舍于分肉之間令人消爍肌肉名曰癉瘧以單陽無陰故也

白虎加桂湯 治瘧疾陰氣孤絕陽氣獨發脈微少氣煩滿手足熱欲嘔但熱而不寒邪氣內藏于心外舍于分肉之間令人消爍肌肉

石膏研一兩六錢 知母鹽酒炒六錢 甘草蜜炙二兩 粳米炒半合
用汲水一升煮藥五錢入粳米一撮以米爛爲度去滓入桂末三錢再煎取四合作一服稍熱服取汗先寒發熱汗出愈

豉心湯 治癉瘧但熱不寒
豉心一合 雄鼠屎炒二錢 童便半升三升 栗山枝三分
柴胡 鱉甲一兩一分 甘草五錢 烏梅肉七枚一炒 生地汁二合 生薑汁一分 桃枝心 柳枝心各一把

除鼠糞地膽汁小便將藥入小便浸一宿于星月下
次早煎去滓入鼠屎地膽汁煎分三服一日用

石羔湯　治瘴瘧熱甚不差

石羔研一兩　白粳米五十粒　常山二分　水煎五錢入竹葉二七片空心欲發與正發時各一服靜臥勿與人語候過發時再洗手面飲食七日內禁房事及酒煖熱物久瘧不過二劑

車前草湯　治瘴壯熱不止渴欲飲水

車前草　常山　生甘草　升麻　大豉炒五錢　粳米

半合　水浸五錢于星月下露一宿上横刀一把次早五更煎空心温分二服良久即吐吐定以粱粥止之

常山飲　治瘴瘧但熱不寒煩渴不止

常山　生甘草　烏梅肉炒　青蒿五錢　竹葉二十一片

以童便白酒各一大鍾微煎露星月下一夜上横刀一把次早空心温服及當發時各一服以差為度

間日瘧　痰瘧　瘴瘧　勞瘧　久瘧

鬼瘧　瘧母

間日瘧

論曰間日瘧者邪氣著于陰不得與陽氣俱出也衛氣晝行於陽邪氣不得出故必再會而後發是以間日乃作

醇醨湯　治間日瘧

大黃炒三分　常山　甘草炙一兩半　水煎三錢未發先服

常山酒　同

常山一兩　蒜獨頭者一枚　糯米　黑豆百粒　共粗搗以白酒一升浸上件露星月下一宿上横刀一口次早煎未發時三分飲一分如未吐更服一分得吐差

糯米煮散　同

糯米四十九粒　常山　淡竹葉　烏梅肉炒　炙甘草五錢

石羔二兩　共末水煎五錢未發時先服

神聖丸　治間日瘧先寒後熱

黑豆小者廿一粒　白礬細研一錢　大棗三枚飯上蒸去皮核　共研極細須於五月五日或七月七日修合丸如豌豆大丹砂為衣陰乾冷茶清下三丸忌食熱物一伏時　合丸時忌女僧尼姑雞犬

痰瘧

論曰痰瘧之狀胸中不利頭痛振寒佚慄而不能食食即

嘔吐寒去則內外皆熱更作心下支滿痰積胸中氣逆頻嘔故謂之痰瘧

石羔飲　治一切痰瘧

石羔三兩　常山二兩　淡竹葉三兩　生甘草　烏梅肉二兩

粳米半合　水煎五錢空心溫服吐痰差　如熱甚加大黃一兩

犀角散　治痰瘧嘔吐

犀角　升麻　玄參　常山五錢　細辛　甘草生

松蘿　山枝分　水煎五錢空心徐徐溫服取吐痰涎效

痎瘧

論曰痎瘧者以瘧發該時或日作或間日作也夫衛氣流行合于晝夜陰陽邪氣內舍于榮隨衛氣以出入而應于風府其作之早晏皆以時發寒溫揮瘧動作亥時故內經統謂之痎瘧其狀呻欠乃作寒慄鼓頷腰脊痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲

麻黃丸　痎瘧發作有時

麻黃去根節一兩　常山　甘草　知母　大黃生五錢

共末蜜杵丸小豆大未發前空心飲下五七丸臨發再下

鼈甲漬酒　治痎瘧以時發

鼈甲九肋醋炙　附子　甘草一兩　常山二兩　烏賊魚骨去甲二兩　酒三鍾漬藥五錢明早先以酒塗五心次溫飲一二鍾

常山酒　治痎瘧先寒戰後壯熱日發及間日作者

常山　淡竹葉一兩　鼈甲醋炙一兩　甘草三分　共粗搗酒浸五錢於星月下露一宿次早水煎未發時先溫服取吐效

知母丸　治一切瘧

知母　烏梅肉炒二兩半　常山　肉蓯蓉　豉炒二兩

炙甘草　人參　桂心半兩　共末蜜丸梧子大酒下二十丸

抳虎膏　治痎瘧

胭脂　阿魏一大豆許同研　入大蒜肉研和為膏用大核桃一枚劈開去仁取一片以藥填核內發時將藥核覆在手虎口上男左女右令藥着肉以帛縛定過宿乃去

勞瘧

論曰勞瘧者以久瘧不差氣血俱虛病雖間歇勞動即發故名曰勞瘧蓋邪氣日深則氣息愈耗表裏既虛故令人食減肌瘦色悴力劣而寒熱如故也治宜補養氣血

柴胡湯　治勞瘧經久不差

柴胡一兩　人參　黃芪　片芩　甘草　括樓根五錢

薑棗水煎五錢未發時先服日二

祛勞湯　治瘧經年不差寒熱瘦瘦

鼈甲　柴胡　常山　知母　甘草　青蒿　枳殼炒

桂心一兩　木香五錢　薑棗水煎三錢入柳枝心七段葱白三寸煎空心溫未發先服巳發又服

柴胡枳殼湯　治勞瘧經久不差瘡瘉發熱骨節疼痛不下食小便赤澀日漸消瘦

柴胡　枳殼　升麻　麥冬　鼈甲　甘草　桃仁一兩

水煎三錢未發先服日二

常山丸　治積勞寒熱

常山　知母　蜀漆葉　白薇　炙甘草　烏梅肉炒

麥冬　升麻　地骨皮三分　鼈甲　萎蕤五錢　大豉一合炒　石羔一兩　共末蜜丸小豆大空心飲下十丸未發前再服加丸數以差爲度

烏梅丸　治積年虛不差顏色羸瘦無力

烏梅肉炒　人參　桂心　炙甘草　升麻五錢

桃仁去皮尖炒　肉蓯蓉　常山三分　豉一分微炒　共末蜜杵丸桐子大空心飲下二十丸未發前服三十丸

牛膝飲　治瘧經久不差

牛膝生一兩　水煎空心分二服

常山湯　治瘧經年不差

常山　知母　鼈甲　甘草　柴胡　青蒿　枳殼炒

桂心一兩　桃枝心　柳枝心各一把　水煎五錢入葱白莖白各三寸空心溫服日二

烏梅五補丸　治瘧經年不差狀如勞疾

烏梅肉　黃芪　桂心　肉蓯蓉一兩　柴胡　桃仁去皮尖炒　赤茯苓　人參　升麻　川歸酒洗　常山　懷生地一兩　甘草炙半兩　麝香五錢　共末蜜杵丸小豆大空心酒下二十丸加至三十丸

二物湯　治久瘧食少肌瘦

童子小便(半升) 白蜜(一兩) 同入磁罐內煎數沸分三服

久瘧

論曰久瘧者瘧疾經久不差發汗吐下過甚真氣虛耗邪氣淺沉以內搏衛氣不應故積歲月而難治雖有虛痞不可攻治當先其發時用湯液以發汗蓋浸漬薰蒸邪氣方出出則微汗令小便利者表裏俱和則久瘧自差矣

黃芪散 治瘧四肢虛汗出不止

黃芪 牡蠣 人參 知母 麻黃根(各一兩) 共末末發前小麥湯空心下三錢未差又服

車前草湯 治久瘧憎寒壯熱不止渴欲飲水

車前草 常山 升麻 甘草(加錢) 大豉(微炒) 白糯米(少半合) 水浸三錢露星月下一夜上橫小刀一口次早煎空心溫服相次又服良久得吐吐定即食稀粥

枝子湯 治久瘧經年不差

枝子(一兩) 常山(三分) 車前子葉(炙五錢) 粳米(半合) 水煎五錢空心溫服以吐利為度

常山湯 治久瘧不止

常山 烏梅肉(炒一兩) 生甘草(三分) 舊水煎三錢空心溫服發時再服以差為度

鬼瘧

論曰鬼瘧者外邪之所乘也凡人真氣內虛神守不固則鬼邪投間而入故恍惚喜怒寒熱更作若有所持而屢發屢止治宜禳解兼以祛邪安神之劑即愈

獨勝丸 治鬼瘧經久不差

桃仁(一枚大者) 和皮尖劈二片一片書奉勅斬鬼四字一片書奉勅殺鬼四字合作一枚以彩線紮定五更新汲水吞下

三聖丸 治鬼瘧

雄黃 雌黃 大黃(生各一兩) 各研末用井華水浸蒸餅丸小豆大發日清晨取汲水向東方下二丸宜五日午時修合

阿魏雄黃丸 治鬼瘧經久不差

阿魏 雄黃(五錢) 柳枝心 桃枝心(取向東者各十七寸為末) 丹砂(一分外一分為衣) 共末以三家粽角小豆大丹砂丸為衣發日用淨器磨一丸塗中指尖上男左女右未退冷水下一丸

瘧母

論曰瘧母者因病瘧久不差結爲癥瘕是也邪伏于陰故久而成形不治其母雖或時差已而復發其本未除故也治以破結削瘕之劑除其病本則瘧自除

鼈肉煎丸　治瘧久不差結爲癥瘕名曰瘧母

生鼈肉半斤治如食法　片芩　葶藶子微炒　柴胡　蜣螂去頭翅足炒五錢　桃仁湯泡去皮尖另研　大黃生　牡丹皮　紫菀　瞿麥穗去梗　半夏湯洗去滑薑汁炒　人參　黑乾薑　大戟　阿膠蛤粉炒　海藻水洗去鹹汁　䗪蟲炒　鼠婦炒去足

紫朴一分　桑螵蛸炒一兩　石韋去毛淨用羊脂炒焦黃　桂心　射干取葉色青用米泔浸一日　赤芍藥一分　共末取竈下灰三升白酒二升用竹籮盛灰以酒淋取灰汁澄清用汁煮鼈肉令爛絞去肉將汁入藥末同煎成膏試可丸即止丸如桐子大未發前空心酒下二十丸

雄黃丸　治遠年瘧結成癥瘕

雄黃醋煮研　丹砂　麝香五錢　鼈甲醋炙　白薇　虎頭骨酥炙　木香　羚羊角　知母　烏梅肉　麻黃節去根　防風　柴胡　茯神　草龍膽　川歸酒洗　牡蠣童便淬　赤芍藥　猪苓　升麻　檳榔　鼈甲醋炙　玄參　烏梅肉　地骨皮洗淨　山梔　川連　安息香　阿魏醋研入麪作餅炙　葳蕤　桃仁去皮尖炒　龍齒各三分

共末入蜜杵丸如梧子大未發時空心飲下二十丸臨發再下

瘧疾發熱身黃小便不利　瘧痢　瘴氣

瘴瘧

瘧疾發熱身黃小便不利

論曰寒熱發瘧于人名爲癉病瘧而發熱小便不利者身

必發黃此蓋熱氣下迫入于小腸水道既澀故小便不利

常山飲　治手足苦煩發熱渴躁通身悉黃小便不利

常山　柴胡　山梔　甘草一兩　石羔　赤茯　蜀漆炒　鼈甲二兩　水煎五錢入竹葉二七片豉百粒

知母湯　治發熱煩渴咽乾口燥身黃怠惰小水澀

知母　升麻　人參　麥冬　柴胡　犀角　地骨皮一兩　鼈甲　石羔二兩　甘草半兩　赤茯三兩

水煎四錢入豉五十粒

柴胡湯　治大渴煩躁引飲身黃小便不利

柴胡二兩 人參 麥冬 知母 杏仁去皮尖炒一兩
炙甘草五錢 水煎四錢服以利為度
赤茯湯 治發熱煩躁身面黃小便不利
赤茯 片芩 桂心一兩 升麻 甘草 常山
蜀漆炒五錢 水煎五錢服以利為度
赤茯苓湯 同前
赤茯苓 白芍炒一兩 白术土炒三分 木通 瞿麥穗一兩
生薑葱白水煎五錢溫服以利為度

瘧痢

論曰瘧痢者瘧久不差寒熱邪氣內搏腸胃間也其病寒
熱往來利下膿血赤白相雜腸中切痛隨其陰陽而治之
黃連犀角丸 治傷寒病瘧兼痢疾無問下赤白水穀完
出及下鮮血并皆主之
川連 犀角鎊二兩 龍骨火煆四兩 牡蠣醋淬九錢
共末蜜丸桐子大飲下三十丸日二
前胡丸 治傷寒瘧氣急黃并利
前胡 赤茯苓 片芩 白芍 枳殼去白炒五錢 大麻
仁研兩半 大黃生一兩 共末蜜丸小豆大空心飲下十
丸以糖利為度又利服十五丸

瘴氣

論曰傳言瘴氣乃山川毒厲之氣又云江山霧氣多瘴凡
以其氣鬱蒸而然也閱諸方論治瘴氣之法不一或謂其
症與傷寒相類有在表可汗者有在裏可下者有在膈可
吐者或以治瘧法治之者蓋原廣南山川地形瘴氣所生
之因及春夏之交又瘴氣所起之時與夫人染瘴氣拯治
之法悉著于篇庶可考焉且陽生于子盛于巳陰生于午
盛于亥陽不極則陰不萌陰不極則陽不長而廣南位當

巳午則陰陽之氣蘊積于此可知矣天不滿西北地不滿
東南西北陰也土地高厚東南陽也地土卑下而廣南屬
東南則土地之卑下可知矣以土地卑下而陰陽二氣所
蘊積是以四圍之山崇高相環百川之流悉皆歸赴及秋
草木不凋落冬令蟄蟲不伏藏寒熱之毒蘊積不散霧露
之氣易以傷人此岐伯所謂南方地下水土弱益霧露之
所聚也故瘴氣獨盛于廣南然瘴氣所起其名有二孟夏
之時瘴名芳草而終于秋孟冬之時瘴名黃芒而終于春
四時皆能傷人而七八月間山嵐煙霧蛇虺鬱毒之氣尤

甚當是時疾瘴大作不論老少或因飢飽過傷或因榮衛虛弱或冲煙霧或涉溪澗但呼吸斯氣皆成瘴疾其狀頭疼體痛胸膈煩滿寒熱往來咳嗽多痰全不思食發渴引飲或身黃腫脹眉髮脫落此皆毒厲鬱蒸之氣所致夫生于凌者安于凌其土人宜無所慮矣然且日食檳榔蓋檳榔之性破堅毒除蘊積故耳治法先以磁石下收其陰次以丹砂上正其陽陰陽氣正中滿自消然後以檳榔解其餘蘊毒斯愈矣

磁石丸　治瘴氣下收其陰

磁石三兩醋淬七次　研極細醋煮糊丸小豆大溫水下二十丸日二

丹砂散　治瘴氣上正其陽

丹砂三兩研飛明亮者　蜜水下五分日一服

秦艽湯　治山嵐瘴氣如瘧狀

秦艽　柴胡半分　常山一分　糯米一撮　烏梅肉炒二枚

共作一服水煎半分二服取吐利

元氣十補丸　治傷寒瘴氣人虛弱面黃不思食或困或省心腹脹滿痞氣耳鳴

巴戟天　肉蓯蓉　白术　石斛　五加皮一兩　鹿茸去毛酥炙五錢　兎絲子酒煮　人參　栢子仁　甘菊三分

共末蜜丸梧子大空心酒下二十丸日二

香椿散　治瘴氣惡心四肢痛口吐酸水不思食憎寒壯熱發過引飲二廣閩中多山嵐煙霧蛇虺鬱毒之氣當秋七八月之間芒華發時此疾大作俗謂之黃芒瘴又謂之芳草瘴是也蓋人或因饑飽或因虛怯或冲煙霧或涉溪澗遂得此疾謂之黑脚瘴蝦蟆瘴啞瘴其名不一並皆治之

香椿嫩葉三兩酒浸　炙甘草　南壁土取向日者　臘茶一兩

共末酒下二錢如患久者加入柴胡甘遂各五錢空心臨臥服

菖蒲散　治瘴氣久治不差

石菖蒲　川芎　白术炒　蒼术炒　荊芥穗

炒山梔一兩　吳茱萸　甘草　硝石　側柏炒黃

荷葉五錢　共末薄荷湯下一二錢如患熱疾薑棗煎服

煮黑豆丸　治山嵐一切瘴氣

白术　蒼术　甘草　黑豆二兩　共末蜜丸彈子大用

黑豆一合入銚內令平將藥安豆中入水高豆一指許慢火煮乾復暴乾以絹袋盛之用新汲水吞二十粒有患處空心一服如涉遠遇饑水下五十粒至百粒可充饑餒

烏藥湯　治嵐氣一切瘴氣

烏藥炙一斤　半夏半斤薑汁炒　桂心　甘草二兩　馬鞭草半斤　陳皮去白炒　荊芥四兩　右麤末煎三錢服

瘴瘧

論曰人與天地流通萬物一氣故有感于山川毒癘之氣

而為病者瘴瘧是也以其寒熱相似于瘧故名瘴瘧傳謂兩山夾水多瘴霧陰氣多而陽氣少則易為寒熱之疾也

白薇湯　治瘴瘧經百日并一年者

白薇　知母　升麻　龍膽草　炙甘草　蜀漆葉炒　片芩　苦參五錢　常山　大黃微炒一兩　淡竹葉三兩　鱉甲醋炙　豉一合　獨蒜三枚　石羔　赤茯三分　酒水合煎三錢先時及發時各一服仍以藥汁塗手心并面

木香丸　治一切瘴蠱毒等瘧

木香一分　升麻　玄參　豬苓三分　甘草　檳榔

炙鱉甲　犀角五錢　豉一合炒　共末蜜丸小豆大空心酒下三十丸日二

砒霜丸　治山嵐瘴氣寒瘧解邪毒

白砒一分　激花二兩　鐵砧上末四兩水淘淨　共研入麝香少許金銀箔各十片糯糊丸芡實大酒下一丸吐瀉差

常山散　治瘴瘧寒熱往來二三日一發

常山　紫朴一兩　草豆蔻二枚　檳榔　炙甘草五錢　烏梅肉七枚　水煎三錢候冷未發前先服如熱服即吐

保安湯　治瘴瘧久不差

常山　桃仁五錢　知母　青蒿一兩　右麤末煎二錢稍熱服

中暍門

中熱暍　中熱悶絕

中暍統論

論曰盛夏炎熱人多冒涉路途熱毒易傷微者客於陽經令人嘔逆頭眩心神煩悶汗出惡寒身熱發渴卽時不治乃至熱氣伏留經絡歲久不除遇熱卽發俗名冷氣甚者熱毒入內與五臟相併客邪熾盛鬱瘀不宣致陰氣卒絕陽氣暴亡經絡不通故奄然悶絕謂之中暍此乃外邪所

擊真臟未壞若遇藥救氣通則甦但治熱暍不可飲以冷物冷則熱不旋通若外以冷觸則熱蘊積於內反不得宣發故也

中熱暍

論曰熱暍之病由冒犯暑熱邪氣其脈弦細芤遲其狀汗出惡寒身熱而渴身重疼痛小便已則灑灑然毛聳四肢厥冷微勞動則熱口開齒燥經所謂脈虛身熱是爲傷暑此不可汗下若汗下之則惡寒更甚宜以去熱邪藥治之則愈

白虎湯　治中熱暍頭痛汗出惡寒發熱而渴

知母去毛六兩　石羔研一斤　甘草生二兩　糯米六合

水煎五錢空心溫服　一方加人參

小香薷飲　治伏暑吐逆中暍

香薷穗二兩　人參一兩　白扁豆炒五錢

水煎三錢空心溫服

竹茹湯　治中暍煩渴不止

竹茹一合　甘草一分　烏梅肉炒二枚　水煎時時細呷愈

治暑散　治中暑煩渴

人參　白朮一兩　共末空心汲水下二錢

甘露散　治暑氣

川連一兩　吳茱萸洗五錢　同炒萸黑色地上火毒去萸

用連爲末食後茶清或汲冷水下五分

甘露丸　治中暑熱躁悶

寒水石火煅放井中浸七日研四兩　天竺黃　馬牙硝二兩

生甘草一兩　冰片研五錢　共末糯米粥丸芡實大蓮蜜

水下一丸

救生散　治中暑毒煩躁渴悶

胡麻新者三兩微炒黑色　爲末用新汲水下三錢以差爲度凡

暑熱外不可以冷物逼之得冷即死

中暍悶絕

論曰中暍之病令人悶絕者乃熱毒傷于臟也蓋心藏神而惡熱若冒觸暑毒蘊蓄於五臟則陰陽不能升降經絡不能宣通故奄然悶絕然真臟未壞救療有方使呼吸之氣宣通卽甦亦不宜待其自甦又不可使之犯冷若外犯冷則與熱氣相拒令氣反不通而速斃宜慎之

熱暍欲死悶氣方

生地汁一鍾 令旋旋灌之即甦

中暑毒熱暍不省方

上白麪 用熱湯和三錢令人灌之即差

中熱不省人事方

大蒜去皮搗爛 用新汲水調和灌之差

又方

以道泥置中暍人臍使二三人溺其中不可使流去此路上無湯可用乃令人溺取溫有湯不必溺也仲景不云泥及車釭蓋此物必冷暍人忌冷若得熱湯和泥及

火燒平釭可用也

又方

生菖蒲 搗取汁微溫一鍾令人灌之愈

又方

搗泥作小坑子以蜜半鍾傾坑內入新汲水二三鍾攪勻取起放碗內澄清水粲一鍾灌之差

中熱暍死方

取路上熱塵土以壅其心冷復易之候患人氣通乃止

陳皮湯

陳皮去白炒 黑薑炮 炙甘草一兩 水煎三錢稍冷嚥勿頓與之中暍垂死備急救生

霍亂門

霍亂吐利 霍亂嘔吐不止 霍亂四逆

霍亂心腹痛

霍亂統論

論曰三焦者水穀之道路氣之所終始也因風冷或飲食傷內至中焦不和則正氣不守而邪得內干揮霍之間便至撩亂故名霍亂蓋清濁相干于腸胃之間便至撩亂腹

痛即利甚者吐利俱發其不吐不利謂之乾霍亂亦以冷食暴爭於中而不得出也然脉必代者以氣不足也脉大能言者為可治若脉微氣劣而不欲言為難治

霍亂吐利

論曰霍亂吐利者以三焦氣不升降而清濁相干於腸胃五內悶亂先心痛則吐先腹痛則利心腹並痛則吐利俱作治此者當溫中焦為本中焦既和則清濁自分而吐利止矣

藿香湯 治吐利不止

藿香五錢 白芷 砂仁一兩 丁香一分 水煎三錢稍熱服

大豆飲 治吐利不止

大豆 陳皮 香茹 竹茹 前胡 蘆根 枇杷葉

薑水煎五錢服以差爲度

理中湯 治霍亂吐利虛冷

人參 白术三兩 甘草 乾薑二兩 水煎五錢溫服若

胸滿腹痛吐下者加川歸紫朴薑炒各二兩

四順湯 治吐下虛冷厥逆腹痛乾嘔

乾薑 人參 甘草二兩 附子一枚 水煎五錢空心溫

服 一方下甚者加龍骨二兩 腹痛不止加川歸

二兩

香茹丸 治冷熱不調霍亂吐下

香茹半兩 扁豆 木香一兩 丁香皮二兩 益智仁一分

零陵香 藿香五錢 共末糊丸桐子大蘇湯下二十丸

靑金散 治吐逆手足厥冷面青諸藥不效者

硫黃一兩滌作汁 水銀一兩與硫汁滌結成砂了 研細用冷木瓜湯

下二錢米飲下亦可

和氣煮散 治吐下冷熱不和

胡椒 菉豆一兩 人參一分 共末水煎三錢空心稍熱

服日二

霍亂嘔吐不止

論曰霍亂嘔吐不止者胃氣逆故也胃氣逆則氣上而不

下故嘔吐不止也若上下升降陰陽和平而吐自止矣

人參藿香湯 治霍亂

藿香 紫朴二兩 人參 白茯 乾薑 青皮

枇杷葉 半夏薑炒 甘草一兩 丁香五錢 草豆蔻六枚

薑水煎三錢熱服 定嘔逆止心腹刺痛進飲食化

痰益氣

香茹湯 治吐逆不止煩悶

香茹一斤陳者 扁豆 紫朴半斤薑汁炒 水酒合煎五錢沒

水坐頓冷分二服未效再服

紫朴湯 治嘔吐不思食

紫朴二兩薑汁炒 人參 白术 半夏薑炒 陳皮一兩

薑棗水煎三錢空心溫服日二

返魂湯 治嘔逆手足厥冷

食鹽一分 生薑一兩 用童便碗半煎一碗分二服

人參湯　治下焦熱氣逆上嘔吐不止名曰走哺
人參　山枝　片芩　知母　萎蕤一兩　白茯　陳皮
白朮　石羔半兩　薑水煎三錢服日二
四汁煎　治吐嘔不止
生藕汁　生葛汁　木瓜汁一合　生薑汁半合
同慢火煎如餳頻服一二匙含化徐徐津液咽下
藿香散　治吐逆開胃和氣
藿香一兩　人參　丁香五錢　訶勒皮十枚　石蓮心二百枚
糯米三百粒　共末煨生薑大棗煎濃湯下二錢

霍亂四逆
論曰四肢爲諸陽之本陽氣之所通也霍亂吐利陽氣暴厥故四肢逆冷而脉微欲絕也古法治四逆專于通脉茶榮衛流行氣道升降則手足自和逆者順矣
理中湯　治傷寒霍亂嘔逆四肢厥冷煩悶汗出食不化
心腹虛滿拘急短氣
麥冬　乾薑六兩　人參　白朮五兩　附子　白茯三兩
甘草四兩　水煎三錢空心溫服少頃又服
龍骨湯　治吐利手足逆冷

白龍骨　黑附子一兩　黑乾薑　人參　炙甘草一兩半
生薑水煎三錢空心溫服以差爲度
霍亂心腹痛
論曰霍亂心腹痛者由脾胃虛弱客風冷之氣使陰陽不和致水穀相幷清濁莫分變亂于腸胃之間令人心胸煩懊悶亂不安故名霍亂然邪氣上干於陽絡則心痛而嘔吐下搏於陰經則腹痛而瀉利故謂之霍亂心腹痛也
桂心湯　治心腹疼痛煩嘔不止
桂心三兩　紫朴四兩薑汁炒　枳實五兩麸炒

薑水煎三錢溫服日二
抵聖散　治霍亂宿食不消心腹疼痛
紫朴四兩薑汁炒　白朮二兩土炒　人參　白茯　高良薑炒
木香　吳茱萸洗炒　草豆蔻　枳殼　甘草　陳皮去白炒一兩
共末空心沸湯下二錢日二
石菖蒲汁湯　治霍亂心腹痛急如中惡
石菖蒲生者四兩　水洗搗取汁一鍾分四服熱湯和汁溫服
厚朴湯　治霍亂心腹痛煩不止或嘔
紫朴薑汁炒　桂心　枳殼去白炒二兩　白芍炒　檳榔微煨

兩一　生薑水煎三錢空心溫服

縮砂散　治心腹冷痛嘔逆惡心滑泄不止

砂仁　陳麯　白朮　赤石脂　黑乾薑　吳茱萸洗炒

川芎　龍骨兩一　共末熱米飲下二錢

乾霍亂

乾霍亂　中惡霍亂　霍亂乾嘔　霍亂轉筋

論曰乾霍亂之狀中氣喘爭而不吐不利是也蓋腸胃挾實與正氣相搏正氣暴衰神志昏冒上下隔塞白汗自出治之稍緩則不可救

鹽便湯　治不吐不利冷汗自出氣悶將絕

食鹽半匙熬　童便一鍾　和勻溫服少頃吐下即愈

紫蘇丸　治乾霍亂

紫蘇　陳皮　人參　桂心　高良薑一兩　共末蜜丸梧子大　氣滿惡心欲吐不吐乾嘔酒下二十丸日二

人參湯　同上

人參　白茯　紫朴一兩　桂心　甘草　高良薑炒五錢

薑水煎三錢溫服日二

黍米飲　治乾霍亂

黍米二合　水研澄清取白汁呷盡即差

不得吐利方

食鹽一合　汲水一升　同煎令鹽消服之吐出涎沫便愈

如不吐又如上法飲之令吐佳

活命飲　治脾元虛損霍亂不吐利腹脹如鼓心胸痰壅

食鹽一合　生薑　葛根五錢　丁香七枚　炙甘草分

作一服用童便煎溫分二服未差再服

中惡霍亂

論曰中惡霍亂者由客邪內干正氣暴亂使胃中食物不化氣道否澀不得宣通令人心腹卒痛吐利煩悶甚則精神冒昧靡所知識此得之鬼氣所作也

麝醋方　治中惡霍亂

麝香一錢細研　米醋半鍾　共和勻分二服

白朮湯　治中惡吐利手足痲痺轉筋

白朮土炒　人參　木瓜一兩　炙甘草　黑乾薑五錢

生薑大棗水煎三錢溫服日二

霍亂乾嘔

論曰霍亂乾嘔者胃氣逆也本於吐利之後脾胃俱虛三焦不理氣時逆上但嘔逆而無所出故名乾嘔

木瓜湯　治乾嘔

木瓜一枚去瓤　人參　乾薑一兩　紫朴五錢

水煎五錢溫服日二

薤白湯　治乾嘔不止

薤白一把切　水煎二服以知為度

厚朴湯　治胃弱嘔吐不止

紫朴三兩　白朮五兩　人參　白茯三兩　扁豆葉乾二兩

水煎五錢服

霍亂轉筋

論曰霍亂轉筋者緣風冷傷于三焦傳于脾胃脾胃得冷則陽氣不得宣行致四肢筋絡不得舒緩此由中氣不足其候胃悶不安脛筋攣結腨肉緊痛反急于上蓋足陽明之經膀胱之脉寒也然足陽明之脉其支者起胃下口循腹裏下至氣衝中而合以下髀關抵伏兔下入膝臏中下循脛外廉足太陽之經其脉循髀外後廉下合膕中貫腨內是動則病髀不可曲膕如結腨如裂治宜調胃藥溫膀胱則小水得宜寒冷自下胃腑溫和霍亂可愈轉筋之疾無由作也

川椒湯　治轉筋

川椒炒出汗一分　烏梅肉炒七枚　水煎入蜜少許頓服老人亦可

肉豆蔻湯　治霍亂轉筋

肉豆蔻麪裹煨　人參二兩　桂心　吳茱萸洗炒一兩

薑水煎三錢服

雞屎白湯　治轉筋悶絕欲死

雞屎白一合炒　胡椒二十粒　木瓜六兩　白朮　桂心

高良薑一兩　生薑六兩　水煎五錢溫服日二

木瓜湯　治轉筋吐利不止

木瓜一兩　青蒸銅錢四十九枚　烏梅肉炒五枚　水煎分二服

藿香子散　治吐利轉筋煩悶

木香　藿香子炒　人參　陳皮五錢　甘草　石菖蒲一兩　共末冷米飲下二錢頃再下

生薑酒　治轉筋入腹欲死

生薑五兩切片　酒一升煎八合頓服差

雞屎白湯　同

雞屎白（炒一兩研）　水煎二錢頓服勿令病人知

附子湯　治轉筋淋足

附子（一枚）　葱白（半斤）　生椒（湯一裹）　生薑（切各一分）　水一斗煎數沸去滓以鹽漿水解之淋洗立差

鹽搨法　同

食鹽（三合）　水五升煎三升浸青棉布搨轉筋上

苦酒絮裹足法　同

苦酒（二升）　以絮內酒中煮酒裹患處差

又方

木瓜（切一枚）　水煎湯以青棉布浸裹

神聖香薷飲　治胃氣虛霍亂吐利轉筋腹痛

香薷穗（十兩）　川連（微炒）　紫朴（二兩薑汁炒）　白扁豆（炒一兩）

用生薑汁四兩慢炒連朴紫黑色入二味同搗粗末用水合煎五錢用器乘入井中浸冷連進二服至死者亦可救

治轉筋方

糯米（二兩）　人參　生甘草　乾薑（二錢）

共為末用新汲井水下二錢以差為度

聖濟總錄纂要卷五終

聖濟總錄纂要卷之六

程　林雲來　纂

新安　王之策殿揚　較

羅棻亮采臣

江　湘鄂上　閱

泄痢門

水瀉　濡瀉　飧瀉　洞瀉寒中　鶩溏

泄痢統論

論曰脾與胃合其象土外榮肌肉內熟水穀風寒水濕襲於外則留連肌腠傳于脾胃若飲食不節害於內腸胃乃

傷不化糟粕皆能為病所得之源不一故立名多端且久風入中則為飧泄濕勝則為濡瀉寒中則為洞泄暑勝則為鶩溏而又或冷或熱或赤或白或色雜或腸垢或滯下或休息或痢或蟲之類種種不同悉由養攝失宜飲食不慎致腸胃不調邪氣交攻施治之法則有宜調補宜攻化宜收斂宜滲泄各隨所宜以治

水瀉

論曰內經謂諸厥洞泄皆屬于下暴注下迫皆屬于熱蓋為冷熱不調氣不相濟也脾胃怯弱水穀不分濕飲留滯水走腸間禁固不能故令人腹脹下痢有如注水之狀謂之注泄名為水瀉

紫朴散　治一切水瀉冷痢

紫朴　白朮　乾薑一兩　甘草五錢　陳皮三分

共末飲下三錢日二霍亂吐瀉新汲水下

肉豆蔻散　治水瀉無度腸鳴腹痛

肉蔻一兩　薑汁二合　白麪二兩　將蔻為末用汁和麪裹末煨熟飲下二錢

黃蠟丸　治水瀉不止傷冷虛極

硫黃　黃蠟一兩　研硫化蠟和勻丸梧子大汲水下五丸

紫朴散又方　治暴水瀉不止

紫朴一兩　白朮　川連　甘草　赤茯

乾薑　白豆蔻二分　訶勒一兩　共末飲下二錢

訶梨勒丸　治水瀉腸滑不禁

訶勒　龍骨　乾薑　赤石脂一兩

共末糊為丸如梧子大飲下二十丸

止氣散　治水瀉腹痛日夜不止

砂仁　附子　白朮　人參　龍骨

石榴皮　甘草　肉蔻　吳萸　地榆

乾薑　赤石脂（各一兩）　共末飲下二錢

又方　治水瀉水穀不化日夜不止

熟艾（半斤）　慢炒合熟包裹坐之冷再炒

濡瀉

論曰內經云濕勝則濡瀉甲乙經曰寒客下焦傳為濡瀉夫脾為五臟之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣內客于脾

則不能俾助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡瀉

肉豆蔻散　治腸胃受濕濡瀉不止

肉蔻　川連　訶勒（三分）　白朮　甘草

赤茯　乾薑（五錢）　紫朴（一兩）　共末飲下二錢

又方　治腸胃受濕濡瀉不止

紫朴　甘草（一兩）　肉豆蔻（五枚）　共末飲下二錢日二

附桂丸　治濡瀉水痢不止

桂心　附子（一兩）　乾薑　赤石脂（二兩）　共末蜜丸梧桐子大飲下二十丸

白朮丸　治脾胃受濕濡瀉不止

白朮　人參　乾薑（炒黑 一分）　紫朴（用生薑全炒 一兩）

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

生薑黃連散　治水瀉久泄瀉

生薑（四兩）　川連（一兩 切片）　將薑切片與連全入鍋慢炒薑赤色去薑用連為末臘茶下二錢二服止

飧泄

論曰內經云清氣在下則生飧泄又曰久風為飧泄夫脾

胃土也其氣冲和以化為事今清濁交錯風邪之氣得以干胃故冲氣不能化而食物完出夕食司之飧以食難化者尤在于夕故食不化而泄出則謂之飧泄此俗所謂水穀痢也

白朮湯　治風冷入中飧泄不止脈虛而細日夜數行口乾腹痛

白朮　紫朴　熟艾　龍骨　川歸（一兩）

姜水煎三錢溫服

洞泄寒中

論曰內經云謂長夏善病洞泄寒中洞泄者謂食已即泄乃飧泄之甚者此因春傷于風邪氣留連至夏發為飧泄至長夏發為洞泄蓋當春之時陽氣在表為風邪所中入客于經未至臟腑夫風者陽氣也東方木也木能勝土脾胃受之仲夏則陽盛之時以陽邪之氣逢陽盛之時重陽必陰病在脾胃故為飧泄陰生于午至未為甚是長夏之時脾土當旺脾為陰中之至陰故陰氣盛陰氣既盛則生內寒故令人臟腑內洞而泄是為洞泄寒中之病

附子丸 治洞泄寒中注下水穀或痢赤白食已即出食

物不消

附子 烏梅肉一兩炒 川連二兩炒 乾薑半兩炒

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

溫中丸 治脾胃虛寒洞泄不止

附子 乾薑 龍骨 硫黃 肉豆蔻二兩

共末糊丸梧子大食前艾湯下二十丸

大輪散 治脾胃氣寒大腸虛滑日夜不止

附子一枚 肉蔻五錢 乾薑一分 共末空心飲下二錢

鶩溏

論曰脾氣衰則鶩溏蓋陰中之至陰脾也為倉廩之官若脾胃氣虛弱為風冷所乘則陰氣盛陰氣盛則臟寒致糟粕不化故大便色黑狀如鶩溏也又大腸有寒亦令鶩溏

吳茱萸丸 治脾氣不足鶩溏青黑

吳萸 乾薑 陳麹 川歸 赤石脂二分

紫朴一兩 共末蜜丸梧子大飲下二十丸

龍骨黃連湯 治脾氣不足鶩溏青黑

龍骨五色者一兩煅 川連三分薑汁炒 川歸 乾薑

甘草炙五錢 薑水煎三錢空心溫服日二

白滯痢 冷痢 熱痢 赤痢

白滯痢

論曰白滯痢者冷痢之類蓋腸虛受冷留而不去與津液相搏結滯如膿或如凝脂而下故曰滯痢

人參湯 治白滯痢及小便色白

人參 龍骨 白茯 川歸 甘草 乾薑五錢 紫朴一兩 水煎五錢溫服日二

赤石脂散 治白滯痢

赤石脂一兩 乾薑三分 共末飲下一錢未差再服

薑附子丸　治臟寒下痢白膿心腹痛

乾薑　附子　龍骨　訶勒皮一兩　共末飲下二錢

冷痢

論曰下痢其色或青或白或黑者皆冷痢也此因腸胃虛弱寒氣乘之故令人大便痢下青黑若其痢色白而食不消者寒中也當診其脉沉則生浮則死其人素有積寒卽久冷痢有膿也

牡蠣湯　治冷痢腹痛

牡蠣燒赤醋淬　白朮　川歸　乾薑　龍骨煨三兩　赤石

脂一兩　附子炮去皮臍　人參　白芍　甘草五錢　水煎三錢溫服若下膿加紫朴嘔逆加陳皮

肉豆蔻丸　治冷痢青白色黑者

肉豆蔻　炙甘草二兩　水煎二錢溫服日二

訶勒湯　治脾胃虛冷下痢滑泄不思食及一切冷氣

訶勒　紫朴　白朮　甘草　陳皮　草豆蔻一兩

生薑大棗水煎三錢溫服日二

吳茱萸丸　治冷痢下膿血臍腹痛脹滿食不化

吳茱萸　乾薑炮半兩　紫朴　川歸四兩　陳麴　赤石脂

一兩　共末蜜丸梧子大飲下二十丸

赤石脂丸　治多年冷痢飲食不化或青或黃四肢沉重起卽目眩手足逆冷

赤石脂　熟艾兩　乾薑　川椒炒出汗半兩　烏梅肉炒五兩　共末蜜丸梧子大飲下二十丸

四白散　治一切冷痢

白龍骨　白石脂　胡粉炒　枯礬五錢　共研極細飲下二錢

熱痢

論曰凡痢色黃赤並熱也甚則下血汁此由腸胃虛弱邪熱氣乘虛入客于腸間故其症下痢兼黃赤或血雜下腹中熱小便赤澀身熱煩渴故名曰熱痢

生地黃湯　治熱痢不止

生地五錢　甘草一分　地榆三分　水煎二錢空心溫服日二

甘草湯　治夏月暴下熱痢

甘草五錢　生薑一分　白蜜一合　漿水五合煎分二服日二

蒲根湯　治熱痢

蒲根二兩　粟米二合　水煎三錢溫服日二

黃連湯　治熱痢腹痛日夜百行氣欲絕者

川連一斤　附子一兩　白朮　龍骨　赤石脂　乾薑

阿膠　川歸一兩　水煎五錢空心溫服日二

赤痢

論曰熱痢之盛者為赤痢本由腸虛為風邪所傷又挾邪熱血得熱而妄行乘虛必湊滲入腸中與痢相雜其色純赤名為赤痢若腸虛不復則又為久赤痢變成嘔噦疳䘌之候矣

黃柏丸　治痢下黃赤水或黃赤膿四肢煩皮膚冷

川柏　片芩一兩　川連二兩　熟艾五錢　共末蜜三兩蠟一兩化丸梧子大飲下二三十丸

六神湯　治赤痢腹痛或下純血

川連　車前子二兩　陳皮一兩去白炒　山梔　甘草炙

地榆五錢　水煎五錢空心溫服日二

血痢　膿血痢　赤白痢

血痢

論曰邪氣客於血脈之中腸胃虛弱血隨熱行流滲腸間因便血下故名血痢其脈見虛小者生身熱疾數者難治

茜根湯　治痢下鮮血

茜根　川連　地榆一兩　山梔二十枚　犀角一分剉末

水煎三錢入薤白三寸香豉一撮溫服

艾葉飲　治血痢不能止小腹刺痛

艾葉　川連　川歸　龍骨　訶勒皮二兩　水煎二錢溫服

三物散　治一切血痢

胡黃連　烏梅肉　灶下土一兩　共末茶下二錢

葛粉飲　治血痢日夜無度

葛粉　白蜜一兩　汲水四合和勻服

地榆湯　治血痢日夜無度

地榆二兩　甘草五錢炙　水煎五錢溫服日二

人參散　治一切血痢腹痛

人參　肉豆蔻　烏魚骨二兩　共末飲下一錢

通聖散　治血痢腹痛日夜無度

大棗去核　烏梅肉七枚　甘草一尺　乾薑三錢　共末韲棗

水煎三錢服

膿血痢

論曰春傷于風邪氣留連夏爲洞泄若遇熱氣乘之則血隨熱行滲入大腸與腸中津液相搏致積熱結血化爲膿膿血相雜故成膿血痢秋冬診脾脉微澁者是也其脉滑大或微小沉細虛遲者皆生若懸絕或實疾或數大身熱者皆死

黃連丸　治下痢膿血羸瘦

川連　龍骨　苦參　紫朴一兩　熟艾　枯礬　赤石

脂　甘草　陳麹　乾薑五錢　共末蜜丸如梧子大飲下二十丸

柏葉丸　治膿血久痢腹痛

側柏葉　川黃連　阿膠　地榆　川歸五錢　共末蜜丸梧子大飲下二十丸

乾薑丸　治膿血痢日久不止

乾薑　川連　川柏一兩　附子　甘草　熟艾　烏梅肉二分　共末蜜丸如梧桐子大飲下二十丸

二宜散　治新久痢下膿血

川連　吳茱萸二兩　各製爲末赤膿多萸末一錢連末倍之白膿多連末倍于萸末俱飲下

赤白痢

論曰赤白痢者由腸胃虛弱冷熱相乘客于腸間變而爲痢蓋熱乘于血流滲腸內卽赤冷氣入搏津液凝滯則白其候裏急後重數至圊而不能便膿血相雜故名赤白痢重者狀如膿涕而血雜之輕者血膿上有赤脉薄血狀如魚脂腦世謂之魚腦痢

黃連散　治赤白痢腹中痛口乾或作寒熱

川黃連各二分　白朮　片芩　甘草　乾薑　川歸　烏梅肉五錢　阿膠一兩　共末水煎二錢溫服

白朮丸　治赤白痢及水穀冷熱氣痢

白朮　川歸　龍骨　犀角　赤白脂　烏梅二分　紫朴　川連一兩　乾薑　甘草五錢　共末蜜丸梧子大飲下二十丸

烏梅散　治赤白痢久不止腹痛下血脫肛

烏梅肉　川歸　地榆　赤石脂　川連　樗根白皮五錢　乾薑三分　甘草一分　共末飲下二錢

加減薑黃丸　治冷熱赤白痢
乾薑　川連各一兩炒　各末糊丸各收　白痢冷瀉薑丸
三十丸　連丸減半空心飲下　赤痢下血薑丸十
五連丸倍之　赤白相雜薑連各半
龍骨散　治赤白痢腸胃虛滑
龍骨五錢　川連　牡蠣一兩　烏梅肉三分　共末飲下二
錢
阿膠丸　治赤白痢
阿膠　枳殼五錢　川連　白芍　木香半生半炒　訶勒皮

乾薑　甘草一兩　川歸　地榆半兩　共末酒糊丸梧子
大飲下二十丸
黃連散　治赤白膿血痢
川連　龍骨二兩　人參三分　地榆　紫朴　乾薑一兩
片芩一兩　赤石脂半兩　共末飲下二錢
艾葉丸　治赤白痢多痛不可忍
艾葉　木香半生半炒　川連　肉豆蔻三分　地榆一兩
阿膠蛤粉炒　川歸五錢　共末蜜丸梧子大飲下二十丸
阿膠丸　治赤白痢腹痛不止

阿膠三兩　川連二兩　胡粉　川歸一兩　共末糊丸飲下
二十丸
黃連丸　治赤白痢不問遠近
川連　川柏　赤茯　當歸一兩　共末蜜丸如梧桐子
大飲下二十丸
四神散　治赤白痢後重腸痛
川連　乾薑　川柏　川歸一兩　共末烏梅湯下二錢
赤痢加黃柏　白痢加乾薑　後重腸痛加黃連
腹痛加當歸大凡泄痢宜食酸苦蓋酸收苦堅故也

木香散　治一切赤白痢
木香　檳榔　肉蔻一兩　乾薑五錢　共末飲下二錢
和中散　治冷熱痢腹痛裏急
附子　川連一兩　乳香一分　各爲末冷痢熱痢連附末
共一錢乳末一字飲下未止用青皮湯再下一服
赤痢附末五分連末倍之乳末一字白痢附末一錢
連末減半乳末仝前
黑豆湯　治赤白痢服藥不止
黑豆半升炒去皮爲末同合　甘草一兩　用綿裹入湖木三升煎

一升分二服

白礬丸　治赤白痢

白明礬　鉛丹二兩　仝入瓶中封固火煅爲末糊爲丸

如梧桐子大飲下一二十丸

氣痢　休息痢　蠱痢　久痢

氣痢

論曰氣痢者由冷氣停于腸胃間致冷熱不調脾胃不和腹脇虛滿腸鳴腹痛便痢赤白名爲氣痢治宜厚腸胃調冷熱補脾氣痢當自愈

縮砂丸　治氣痢腸胃與腸虛不能制伏日夜無度黃瘦食不生肌困重無力眼目昏澁多年不愈

砂仁　陳皮　川歸　赤石脂一兩　川連二兩　肉豆蔻五錢　共末蜜丸梧子大飲下一三十丸

黃連丸　治久氣痢不止或差或劇

川連　川歸　烏梅肉　訶勒皮一兩　共末蜜丸梧子大厚朴湯下二三十丸日二

豬肝丸　治冷勞氣痢久不差

雄豬肝一具去筋膜切　陳皮　烏梅肉　乾薑　訶梨勒煨取皮　桂心　川歸一兩　川連　紫朴二兩薑炒　大蒜一枚煨熟

共末用肝蒜研糊丸梧子大飲下二十丸

木香丸　治氣痢不止

木香　丁香　砂仁　肉豆蔻一兩　赤石脂　訶梨勒五錢煨　藿香五錢　共末糊丸梧子大飲下三十丸

木香丸　治一切氣痢不止

木香　肉豆蔻　砂仁　赤石脂五錢　共末用棗肉爲丸如梧子大飲下三十丸

香艾丸　治氣痢腹痛臥眠不安

熟艾　陳皮一兩　共末酒糊丸梧子大隨湯下二十丸

烏梅丸　治氣痢不止瘦劣痢成冷勞

烏梅　草蔻　紫朴一兩　甘草　川歸　訶勒皮

肉蔻　乾薑　蓽撥三錢　桂心五錢　豬肝一大葉醋煮研爛

共末肝糊丸如梧子大飲下二十丸

木香砂仁散　治氣痢腹脹虛鳴

木香二兩五錢　砂仁半兩　枳殼　訶勒皮二兩　共末飲下二錢

肉豆蔻散　治氣痢腹脹不下食

肉蔻　訶勒　木香一兩仝上煨半生半炒　甘草　白朮三分

華撥　乾薑五錢　共末飲下二錢

華撥煎　治氣痢久不差及諸痢困弱者

華撥二錢研末　牛乳半升　慢煎共半頓服神効

休息痢

論曰腸中宿挾固滯每遇飲食不節停飲不消即乍差乍發故取名爲休息痢治藥宜加之以治飲消削陳寒痼滯之劑即愈

阿膠湯　治休息痢

阿膠　川連　龍骨一分　艾葉五錢　糯米二合炒　水煎

二錢溫服

黃丹散　治休息痢諸藥無効

黃丹二兩炒　棗肉二十枚去核搗紙包煨研末　川連　枳殼五錢

共末飲下

砂仁丸　治休息痢

砂仁一兩　肉豆蔻五錢　羊肝半斤切　共末拌勻麪包紙裹煨熟研米糊丸梧子大飲下三十丸

黃連湯　治休息痢

川連　龍骨五錢　熟艾　阿膠五錢　水煎三味去滓入阿膠再沸分二服每服後濃煎艾湯飲之

玉液丹　治休息痢

枯礬二兩　硫黃　硝石五錢　全研化研末糊丸小豆大飲下一二十丸兼治腸風下血

砂仁丸　治冷氣腹痛不止休息氣痢勞損消化水穀溫脾胃冷滑下痢不禁

砂仁　附子　乾薑　紫朴　陳皮　肉豆蔻五錢

共末蜜丸梧子大飲下二三十丸

四神丸　治多年休息痢者

川歸　龍骨五錢　川連一兩　烏梅肉二錢　共爲末用蒜

白取汁杵丸小豆大溫水下二十丸

當歸丸　治多年休息痢

川歸　川連　烏梅肉一兩　共末蒜汁丸梧子大厚朴湯下二十丸

金石散　治多年休息痢

石灰風化者　鉛丹一分炒　糯米炒黑一合　將真丹全入鍋慢炒一炊久入米全研末空心飲下二錢

蟲痢

論曰凡下痢膿血間雜瘀黑有片如雞鴨肝與血皆下者蠱痢也此由歲時寒暑不調濕毒之氣襲人經脈漸至臟腑毒氣挾熱與血相搏客于腸間如病蠱注之狀故名蠱痢

茜根飲　治蠱痢下血如雞鴨肝腹痛難忍

茜根　升麻　片芩　犀角　川栢　桔梗三分　白蘘荷葉　地榆一兩　水煎三錢溫服

升麻湯　治毒痢下血片臍下刺痛

升麻　地榆　片芩　茜根半兩　犀角一兩　山梔二十一枚

水煎五錢入生地蘿白香豉溫服日二

久痢

論曰久痢不差則元氣日耗腸胃損傷濕氣散入肌肉浮腫以胃土久虛故也蟲因虛動上食于脂則嘔逆煩悶下蝕腸中則肛門瘡爛久而不差變成疳䘌或下赤汁水血相半腥不可近者是謂五臟俱損五液雜下其病難治

紫朴湯　治久痢經年不差

紫朴　川連　熟艾　乾薑　阿膠炒　石榴皮炒一兩

水煎三錢溫服

茯苓丸　治久痢脾胃虛弱食不消腸鳴痛

白茯　龍骨　川歸　乾薑　川栢　赤石脂三分

陳麴　川連一兩　附子　人參　甘草　共末蜜丸如梧子大飲下二十丸

黑神散　治腸滑久痢神効無比

酸石榴一枚劈四塊火燒煙盡不令作灰瓷盞存性出火毒　研末水煎石榴一瓣取汁下二錢　久瀉亦治

久痢不止

生薑切　砂糖一兩　拌勻紙煨五更初作一服以臘茶嚼下

泄痢門

下痢裏急後重　痢後脫肛　疳䘌　濕䘌

下痢裏急後重

論曰下痢裏急後重者有瘕聚也經所謂大瘕泄者裏急後重數至圊而不能便莖中痛是矣法當和氣血袪蘊滯則脾胃平和飲食腐化膿血自消大腸自固也

當歸黃連湯　治後重下赤白滯下腹內絞痛

川歸　犀角　赤茯三分　川連半兩　甘草五錢　紫朴

地榆一兩　薑棗水煎三錢溫服

聖功散　治冷熱不和下痢赤白臍腹痛裏急後重

乾薑　五倍子一兩　甘草　訶勒皮五錢　共末飲下二錢

白頭翁湯　治熱痢下重

白頭翁　川連　川栢　秦皮三兩　水煎三錢溫服

當歸湯　治冷痢裏急後重

川歸炒一兩　胡椒　乾薑　阿膠一兩　川連　紫朴二兩

共末醋熬膠末爲膏丸梧子大陳皮湯下二十丸

通神丸　治膿血雜痢後重疼痛久不差

没藥　乳香　五靈脂一錢　巴霜五分　共研水丸小豆大木瓜湯下五七丸　小兒減半

痢後脫肛

論曰下痢脫肛者因大腸虛弱冷氣傷滯致不能便痢力于下肛門脫出故名脫肛溫其臟則愈古方有坐湯熨貼之藥皆良法也

黑聖散　治痢久脫肛痛

大蜘蛛一枚入泥合燒黑色勿太過　研末入黃丹少許先用白礬葱椒湯洗拭乾摻藥在軟帛上按托肛頭即不下

猪肝散　治洞瀉脫肛

猪肝一片炙　川連　阿膠　川芎一兩　烏梅肉一兩

艾葉五錢炒　共末酒下二錢

壁土散　治脫肛

故室東壁上土五合　皂莢三枚　共末傅肛上取皂莢灰煖更互熨入

枳實熨方　治積冷下痢脫肛

枳實一枚　石上磨令滑澤鑽安柄子蜜塗炙令煖熨之

冷易肛入即止　一方以猪脂和蒲黃傅肛上手按令入日二三愈

痢䘌

論曰痢有五種久變爲蠱䘌一曰白痢令人皮膚乾燥而無潤澤之氣二曰赤痢令人毛髮枯焦三曰蟯痢令人腰脊強重四曰痢䘌令人下部攣急背強不能俯仰五曰黑痢患者必死令人五臟俱損或下瘀血此盆腸胃俱虛嗜肥甘過度致脾胃緩弱穀氣衰微衛氣虛損腸間諸蟲因虛而動蟲蝕于上則手足煩疼心中懊憹嘿嘿不欲飲

食慾不無方食不知味精神恍惚夜夢倒顛咽喉生瘡齒
齗生黑點指爪黑血俱由胃氣逆則變嘔噦下蝕腸胃便痢
膿血或下瘀黑久不已則肛門爛開漸至危殆

治疳中疳痢面黃瘦

雄黃　川連　熟艾一兩　白蜜一合　水一升煮連艾取
汁入黃末散沸綿濾過入蜜數沸分三服

疳痢久不差羸瘦欲死

官麻一斤　水一斗煎一宿明旦絞汁頓服至日午惟食
水煮飯極重不過三服差

二白湯　治久痢變疳下部生惡瘡惡寒壯熱

桃白皮　槐白皮一升　苦參五合　大棗十枚　熟艾五合

要二月二日取者方出　用水五升煮半入熊膽一棗大攪勻以
一升灌下部餘分三服

治久痢成疳　百方不差

丁香　麝香　川連一分　共末用竹筒吹入下部

溼䘌

論曰凡下痢不止或發之餘爲水溼所乘客于腸胃令九
蟲皆動侵蝕臟腑故爲溼䘌之病所謂䘌者蟲動于臟而
難尋故也謂蟲因溼而動故名溼䘌其症上蝕唇口下食
肛門上唇生瘡是蟲蝕五臟令人心煩懊憹下唇生瘡是
蟲蝕下部令人肛門傷爛若胃虛氣逆則變爲嘔噦甚則
臟腑彼傷齒上下齗皆生瘡齒色暗黑是其候也下痢出
瘀血者不可治

黃連湯　治疳溼䘌蝕口齒及下部

川連四兩　熟艾二兩　苦參　槐白皮三分

水煎五錢重者不過三服

猪膽煎　治疳䘌下部上攻除熱殺蟲

猪膽一枚　米醋五合　煎醋自沸入膽汁再熬滿口飲之
蟲死差

塗方　治疳䘌無問所在皆治

死蝦蟆一隻燒灰　研末麻油和塗患處

丁香散　治疳溼䘌洗發下部

丁香一分　麝香一錢　甘草　犀角三分　共末以鹽椒各
三合豆二合水三升煮乘熱用綿蘸洗發

聖濟總錄纂要卷六終

聖濟總錄纂要卷之七

程　林雲來　纂

新安　巴一曙雲　校

吳從殷尚木　較

呂　垣徵斗

咳嗽門

咳嗽　暴嗽　久嗽　冷嗽　熱嗽　呷嗽

五臟諸嗽

咳嗽

論曰肺主皮毛皮毛先受寒邪乃爲咳嗽五臟六腑又皆禀氣于肺故以其時感寒而受病亦能爲咳形症不同治亦隨異學者審之

桑白皮湯　治咳嗽胸滿氣急

桑白皮　半夏　川貝母　知母　五味子　欵冬花　紫蘇一兩　人參　炙甘草　紫朴五錢

薑水煎三錢服日二

百部煎　治咳嗽久不已

百部汁　生薑汁　生地汁　百合汁如無以藕汁代之　白蜜各一鍾　麥冬汁仝　大棗肉四兩　將諸汁入砂鍋內慢煎下蜜又將棗肉搗爛入汁內收成煎湯化日頻服

貝母散　治咳嗽

貝母一兩　甘草　阿膠五錢　共末空心飲下二錢日二

訶勒散　治咳嗽

訶梨勒皮煨取　爲末每以二錢用雄猪䐗一枚去脂切摻末入烏梅肉一枚令定以芭蕉包紙裹煨熟慢嚼

五味子湯　治咳嗽晝夜增不得眠食即吐逆

五味子　白石脂　桑白皮　百合　麻黃去根節　白蒺藜　杏仁去皮尖　川貝母　柴胡　欵冬花　旋覆花　枳殼炒　紫菀　桂心五錢

薑水煎三錢入糯米一撮溫服

暴嗽

論曰肺感于寒微者即成咳嗽蓋肺主皮毛寒傷膚腠則肺先受之其狀咳嗽語聲嘶破咽喉不利也

杏仁湯　治中冷暴嗽上氣喘逆惡寒出清涕

杏仁　紫菀　片芩　甘草　川歸　陳皮　麻黃

桂心五錢 木香一分 大黃炒一兩半 水煎三錢溫服日二

貝母煎 治暴嗽胸膈不利痰逆喘急

川貝母去心 紫菀蜜炙焙 杏仁去皮尖炒 桑白皮炙一兩

甘草蜜炙 百部去心酒浸炒 五味子炒 白前甘草湯浸焙乾五錢

用水一斗入諸味煎取汁二升濾去滓入生地汁五合麥冬汁五合白蜜三合牛酥二兩慢煎成餳頻頻含化一匙飲下

餳糖煎 治暴嗽肺寒

飴糖 乾薑炒一兩半 豉炒二兩

分二劑煎去滓入糖薑末服

久嗽

論曰肺主皮毛易感風邪寒邪傷于肺則為咳嗽五臟各以其時受之爲五臟之欬久不已傳于六腑六腑不已三焦受之是爲久欬其人咳而腹滿不欲飲食多唾而頤氣逆乃其症也

人參煎 治積年咳嗽

人參一兩 酥油 括樓搗 蜜糖二兩 飯上蒸九次晒乾爲末空心湯下一匙日二

蛤蚧丸 治久咳嗽喘急

蛤蚧一對酥炙 半夏 杏仁去皮尖一兩炒 括樓大者二枚去子取肉蒸研

阿膠蛤粉炒 人參五錢 青皮去白炒一分 乾薑煨二兩

共末蜜丸如小豆空心飲下二十丸

阿膠散 治久咳嗽

阿膠 人參 黃芪 炙甘草 杏仁去皮尖炒 桑白皮炙 紫菀 桔梗一兩 共末用猪胰一枚去油膜切拌末二錢葱白三寸鹽少許溼紙包煨熟細嚼酒下

款冬花散 治肺寒久咳嗽

款冬花不拘多少 爲末燒煙令病人吸之愈

阿膠飲 治久咳嗽

阿膠一兩 人參二兩

共末用豆汁入葱白煎三錢若嗽頻呷

蒺藜貝母湯 治久咳嗽

白蒺藜 川貝母 百合 赤石脂 紫菀 麻黃去節煨 天雄 枳殼半兩 五味 川連 地榆 桑根白皮東引者炙 桂心 貫衆一兩 片芩五錢 旋復花炒二兩

爲末水煎三錢服

冷嗽

論曰形寒飲冷內外合邪因而客之則爲肺咳蓋肺主氣外合皮毛其經環循胃口故內外得寒皆能傷之而爲冷痰嗽其候吸呼氣寒口如飲氷雪嘔吐冷沫胸中急痛甚靜夜甚得温則止遇寒卽發是也

乾薑湯 治冷痰嗽

乾薑 麻黃去根節二兩 桂心 炙甘草一兩 紫菀 五味子五錢 杏仁去皮尖炒二十枚 水煎三錢空心温服

細辛散 治肺寒咳嗽喘滿

細辛 甘草 五味子 乾薑三兩 赤茯苓四兩

共末湯下二錢蜜丸亦可

乾薑飴糖煎 治冷嗽及一切嗽

乾薑炒研末二兩 膠飴糖一斤 化飴糖拌末勻蒸熟頻含化一匙

杏仁丸 治冷嗽呼吸氣寒嘔吐冷沫胸中急痛

杏仁去雙仁皮尖炒香一升 生薑一斤切片焙乾 陳皮去白炒五兩

共末蜜丸如梧子大空心酒下二十丸

熱嗽

論曰熱嗽之狀嗽而少涎由邪熱熏于上焦客于肺經使津液內燥搏于咽嗌喉嚨不利隨其吸呼而咳嗽也

百部丸 治肺氣熱嗽胸膈煩悶

百部 黃芪 杏仁 桂心一兩 天冬 栝樓五兩 馬兜鈴 紫菀 紫蘇四兩 玄參二兩半

共末蜜丸如梧子大烏梅甘草湯下二十丸

阿膠丸 治客熱嗽止嗽化痰

阿膠 人參 硼砂二分 丹砂 甘草五錢 冰片二錢

共末蜜丸如芡實大含化一丸日二

華蓋湯 治上喘咳嗽兼治膈熱

桑白皮 陳麴炒香 桔梗炒一兩 人參 百合三分 杏仁去皮尖炒 炙甘草五錢 水煎三錢溫服日二

涼膈散 治肺熱咳嗽

甘草生二兩 雄猪膽汁浸五日炙香爲末蜜丸如梧桐子大薄荷湯下二十丸

馬兜湯 治肺熱嗽氣急喘悶

馬兜鈴微炒 桑白皮炙兩 苦葶藶紙炒 炙甘草五錢 半夏薑汁製三分 薑水煎三錢空心溫服

呷嗽

論曰呷嗽者咳而胸中多痰結于喉間與氣相擊隨其吸呼呀呷有聲故名呷嗽宜調順肺經仍加消痰破飲之劑

射干丸　治久呷嗽喉中作聲發即偃卧不得

射干一兩　半夏　陳皮　百部　款冬　細辛

乾薑　五味子　貝母　白茯　皂莢子去皮炙

郁李仁一兩　共末蜜丸如梧子大空心飲下二十丸

杏仁丸　治呷嗽有聲

杏仁去皮尖炒　甘草炙一兩　大黃蒸　牙硝熬五錢

共末蜜丸如梧子大空心甦湯下二十丸

紫菀杏仁煎　治肺臟氣積呷嗽不止因肺虛損致勞疾相侵或胃中冷膈上熱者

紫菀二兩　酥一兩　杏仁去皮尖半升　貝母　薑汁三兩

大棗去皮核半斤　五味子　人參　白茯　甘草

桔梗　地骨皮洗一兩　白蜜一斤　生地汁五合

共末與蜜汁同煎百沸器盛蒸三五次成飴煎仰卧含化一匙日二

五臟諸咳嗽

論曰內經謂肺咳之狀咳而喘息有音甚則唾血心咳之狀咳而心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺肝咳之狀咳而兩脅下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿脾咳之狀咳而右脅下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則咳劇腎咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳涎五臟之咳久而不已乃傳六腑六腑之咳內經論之詳矣

前胡湯　治五臟諸咳嗽

前胡　五味　生地　澤瀉　半夏二兩　貝母

麻黃　人參　山藥　白术　白茯　杏仁　甘草

葛根　烏梅去核炒一兩　每水煎三錢空心溫服

五靈脂湯　治肺咳嗽及諸嗽

五靈脂　馬兜鈴一兩　人參　五味　甘草炙

桑白皮蜜炙　陳皮去白炒　杏仁去皮炒五錢

每水煎三錢空心溫服日二

人參桔梗散　治心咳嗽咽喉腫痛

人參一兩　桔梗炒四兩　白茯　牛旁子炒二兩　甘草炙兩半

共末薑湯空心下二錢日二

木乳散　治肝咳嗽兩脇下滿　木乳即皂莢樹根皮

木乳酥炙三兩　杏仁去皮尖炒　貝母去心二兩　甘草炙一兩

共末薑橘湯下二錢

半夏陳皮湯　治脾咳嗽

半夏　陳皮　杏仁一兩　赤茯　柴胡　麻黃一兩

生薑　甘草五錢　水煎三錢空心溫服

四味散　治腎咳嗽

補骨脂炙　牽牛子半生半炒　杏仁一兩　郁李仁五錢

共末茶下二錢

黃芪散　治大腸咳嗽

黃芪　人參　白茯　桑白皮二兩　甘草三兩

共末湯下二錢

半夏桔梗湯　治脾肺寒熱努咳痰盛嘔逆

半夏　桔梗　桑白皮　膽南星二兩

薑棗水煎三錢溫服

阿膠散　治肺胃不調久咳不差

阿膠　甘草　桔梗炒　桑白皮五錢　細辛一錢

共末空心薑湯下二錢日二

鹿角膠湯　治大腸咳嗽

鹿角膠　杏仁去皮尖炒研　甘草　半夏薑汁製

麻黃去根節二兩

薑水煎三錢空心溫服

人參丸　治脾胃虛弱痰壅咳嗽

人參　木香　訶梨勒煨取皮一分

共末蜜丸梧子大空心飲下二十丸

咳嗽上氣

咳嗽上氣　咳嗽吐膿血　咳嗽失聲　風冷聲嘶

論曰諸氣皆屬於肺肺氣和平則升降自若若爲寒邪所傷則肺氣壅塞不得宣通故咳嗽而上氣其症咳嗽多喘

喘甚者面目浮腫久而不已肺氣虛極風邪停滯令人胸背痛以至唾膿血也

潤肺丸　治積年咳嗽上氣涎吐稠黏五心煩躁不思食肺經留熱

阿膠　熟地　人參　山藥　五味　白茯　遠志

防風一兩　麥冬　貝母　杜仲　丹參　茯神　柏子仁

百部五錢　共末蜜丸如彈子大水煎一丸服

香豉豆湯　治三十年咳嗽上氣

豉炒五錢 細辛 杏仁 甘草 吳茱萸洗炒一兩 紫菀
二兩 共末蜜為丸如梧桐子大含化日二
郁李仁煎 治積年上氣咳嗽不得臥
郁李仁去皮二兩 水二升研如杏酪去滓煑令無辛氣入
酥二棗許和匀空心頻頻溫服
檳榔湯 治上氣腹脹胸脅痛咳嗽不下食
檳榔十四枚 白蜜二合 生薑 酥三兩 乾薑一兩 枇杷
葉一把去毛蜜炙 水三升煎一升去滓入酥蜜再沸分三
服

柴胡桑皮湯 治咳嗽上氣促急心躁寒熱四肢煩痛夜
甚
柴胡 桑白皮 天雄 枳殼 大腹皮 麻黃去根節
羌活半兩 川黃連 甘草 桂心 川歸一兩 白梅去核
四枚 片苓 旋復花五錢 薑水煎三錢服
紫菀湯 治咳嗽上氣
紫菀 欵冬 枳殼 桔梗一兩 赤芍 赤茯 陳皮
百合半兩 大腹二枚 水煎三錢服
四神散 治肺氣不和上氣咳嗽

百部 白薇 川貝母 欵冬花二兩 共末蜜丸如梧
子大空心桑白皮湯下二十丸
地黃煎 治上氣咳嗽肺氣壅熱不和
懷生地一升 麥冬汁 天冬汁 生薑汁五分 玄參
柴胡 黃牛酥 赤茯苓五兩 五味子 欵冬花 紫
菀 黃芪 川貝母 桂心二兩 杏仁去雙仁皮尖炒五兩
人參二兩 共末將酥汁蜜慢煎入末和勻熬成煎用磁
瓶盛貯飯上蒸頻服一二匙湯下 內有白蜜五兩
咳嗽唾膿血

論曰咳嗽唾膿血者由肺感寒氣咳嗽傷于陽也心主血
肺主氣血隨氣上逆故咳而有血寒邪壅熱于肺間津液
相搏凝滯蘊結故化為膿因咳而咯吐膿血也
百部丸 治咳嗽上喘吐膿血胸膈不利咽喉腫痛
百部 天冬 貝母 桔梗 紫菀 欵冬花二兩
共末蜜丸如梧桐子大甘草烏梅湯下二十丸
桑白皮湯 治咳嗽吐膿血痰涎
桑白皮 麥冬 欵冬花一兩 貝母 甘草 黃明膠
五錢 水煎三錢溫服

萊菔子湯 治咳嗽唾膿血痰涎
萊菔子五錢研 白蜜 牛酥 桃仁 杏仁二味同去皮尖别研
成膏一兩 飴糖一兩 熬酥蜜入飴糖膏酥成煎湯化一匙
蛤蚧湯 治咳嗽咯血吐膿
蛤蚧 人參 貝母 杏仁 甘草 知母 鹿角膠
葛根 桑皮 枇杷葉一兩炙 水煎三錢溫服
五味子湯 治咳嗽吐膿血連胸膈痛
五味子 生地 桔梗 桑皮 紫菀 續斷 赤小
豆 甘草五錢 水煎三錢入竹茹一丸煎溫服

薤白湯 治久咳嗽肺虛吐血將成勞病
鱉甲 阿膠 甘草 鹿角膠二兩 水煎三錢入薤白
三寸服
栝樓湯 治咳嗽咯血喘滿肺痿
栝樓二枚去穰入蛤粉少 葛根 防已 杏仁 貝母 馬兜
鈴 甘草 阿膠二兩 水煎三錢入蜜少許溫服
杏仁湯 治肺氣壅熱咳嗽上氣吐膿血
杏仁 桑皮 柴胡三分 甘草 桔梗 紫菀 麻黃
去根節 款冬 川連 茜根 半夏五錢 薑水煎三錢

溫服
咳嗽失聲
論曰咳嗽失聲者蓋肺氣上通於喉嚨喉嚨者肺之系肺
感寒微者成咳嗽咳嗽不已其氣奔迫窒塞喉中故因而
失聲也
杏仁煎 治咳嗽失聲語不出
杏仁一升去皮尖炒研 五味子 木通 貝母 紫菀一兩
桑白皮五兩 薑汁 飴糖一升 分三劑每水四鍾煎去
滓入杏汁糖三之一成煎貯器中含化一匙

補肺人參湯 治氣虛咳嗽言語聲嘶飲食減少日漸消
瘦
人參 黃芪 熟地 桂心一兩 白朮 紫蘇三分
乾薑 杏仁 紫菀 五味五錢 鹿角膠一兩 棗水煎
三錢溫服
通聲散 治咳嗽聲不出
五味子 款冬 人參 木通 細辛 竹茹 石菖
蒲 牛酥三兩 杏仁 白蜜 薑汁一升 棗肉二升
桂心三兩 水煎諸味去滓入酥汁蜜棗慢熬稠酒下一

匙日三

紫苑丸　治肺感風冷咳嗽聲嘶

紫苑　貝母　款冬　桂心半兩　杏仁　甘草一兩

陳皮　人參　白茯　百部一兩　共末蜜丸如梧子大

空心飲下三十丸

風冷聲嘶

論曰共風冷聲嘶者共聲嘶嗄不通暢也蓋肺象金金主聲音人五臟有五聲皆稟肺氣而通之今風冷乘于肺經則氣道不調故聲音不出而嘶嗄也

杏仁煎　治風冷失聲語音不出

杏仁去皮尖研　桂心二兩　五味子　貝母　細辛

紫苑一兩　共末水煎去滓入蜜飴糖薑汁杏膏慢煎酒下一匙

石菖蒲散　治風冷傳肺氣塞不通聲嘶不出

菖蒲　五味子　細辛　陳皮　紫苑　乾薑五錢

訶梨勒　杏仁一兩　共末酒下二錢

通聲辛甘煎　治肺氣虛為風寒所傷語聲嘶嗄氣息喘急不通痰逆上氣咳嗽

與酥　白蜜　飴糖　薑汁　百部汁　棗肉一斤二

杏仁一升研　用微火慢煎成煎酒下一匙

諸氣門

諸氣　上氣　上氣喉中水雞聲

短氣　陽厥

諸氣統論

論曰內經云百病所生生于五臟肺之所生獨主於氣不足有餘蓋由虛實故所病不同其症亦異怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣逆也喜則氣和榮衛通利故氣緩也悲則心系急肺布葉舉使上焦不通榮衛不散熱氣在內故氣消也恐則精怯怯則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行也寒則腠理閉氣不行故氣收也熱則腠理開榮衛通汗大洩故氣洩也驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂也勞則喘息汗出內外皆越故氣耗也思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結也

七氣丸　治寒熱愁怒驚恐恚氣

大黃二兩半　人參　半夏　細辛　柴胡　乾薑

吳茱萸　桔梗　菖蒲五錢　赤茯　川芎　甘草

石膏　桃仁去皮尖炒　川椒炒三分
共末蜜丸如梧子大飲下三十丸　一方加桂心
麝香丸　治一切氣逆胸膈否悶中脘不快痰癖留滯嘔
吐惡心肢體倦不思飲食
麝香　丹砂　紫朴　木香　肉蔻五錢　半夏
檳榔二兩　丁香　乳香一兩　桂心三分
共末用薑汁煮半夏末爲膏丸小豆大陳皮湯下二
十丸
藿香湯　治諸氣不調胸膈痞滿升降不勻

藿香　紫朴　乾薑一兩　甘草　青皮三分　桂心五錢
枇杷葉一兩
生薑大棗水煎五錢空心溫服日二

上氣

論曰凡人一日一夜共一萬三千五百息呼隨陽出氣於是升吸隨陰入氣於是乎降一升一降陰陽交通氣乃和調所謂上氣者蓋氣上而不下升而不降喘息有聲是也本于肺臟之虛復感風邪肺脹葉舉諸臟氣又上冲而壅遏此所以有上氣之候也

地黃煎　治上氣之急
生地汁五升　生薑汁　牛酥半升　白蜜一升　淡竹葉半升
杏仁二兩半去皮尖　炙甘草　貝母去心　蘇子二兩　赤茯苓
紫菀半兩
水四升煮竹葉苓茯蘇菀去滓入汁蜜熬成煎重湯
熬攪稀飴含化一匙
款冬花湯　治上氣咽中不利
款冬　五味子　半夏二兩　射干　細辛　紫菀一兩
麻黃二兩

每薑水煎三錢空心溫服
酥蒜煎　治上氣喘急
酥半斤　大蒜三枚
以酥煮蒜熟去蒜入薑汁成煎頻服一匙
雙仁丸　治上氣喘急不安
桃仁　杏仁俱去皮尖炒
爛研水和生麪爲丸如梧桐子大薑蜜湯下二十丸

上氣喉中如水雞聲

論曰肺主氣上通于喉嚨肺經客寒則喉嚨不利痰唾凝

結氣道奔廹喘息有聲聲如水雞

半夏丸　治上氣咳嗽喉中作聲坐臥不得

半夏　紫菀　桑皮一兩　百部　款冬　射干　陳皮

五味　貝母　皂莢炙　赤茯三分　杏仁半兩　細辛五錢

共末蜜丸如梧子大薑棗湯下二十丸

射干湯　治咳而上氣喉中如水雞聲

射干　半夏　五味　款冬　紫菀二兩　細辛

麻黃　生地四兩

大棗水煎五錢溫服

短氣

論曰短氣不足以呼吸者肺虛也倚息短氣不能臥其形如腫者飲也短氣上喘氣道促急者肺虛而衆邪實也如是者不可槪而論之

紫蘇湯　治卒短氣

紫蘇二兩　陳皮五錢

大棗酒水煎三錢溫服

枸杞湯　治短氣

枸杞

薑棗水煎三錢溫服

陽厥

論曰內經云有病怒狂者生于陽也陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥夫陰陽木可徧勝則氣逆陽厥者陰陽而氣逆不調也蓋陽氣暴折則鬱而不散故多怒而狂怒則氣上故頸脉動而大疾者爲陽厥之症也其治奪食卽已蓋食入於陰長氣於陽陽盛故厥逆怒狂奪食者所以平其氣也

鐵落飲　治陽厥善怒除煩下氣

鐵落卽爐皂鐵落是也

● 每服重湯溫一鍾飲之

竹瀝石膏湯　治陽厥多怒狂躁不安上攻頭頸

竹瀝　石膏半兩　山梔　生地　玄參　赤茯

升麻　知母三分

薑水煎三錢入竹瀝服

犀角丸　治陽氣徧勝氣厥多怒如發狂狀心胸煩滿忿忿多怒頸脉疾動

犀角　防風　甘草一兩　枳殼　石膏五錢　升麻

萎蕤三分
共末蜜丸如梧子大飲下二十丸
定神丸　治陽厥怒狂
白茯　遠志　人參　防風　梔子仁一兩　甘草一兩
龍骨兩半　牡蠣　棗肉一兩
共末蜜丸如梧子大湯下二十丸
羚羊角湯　治陽厥氣逆善怒狂妄不常
羚角　五味子　沙參　棗仁　茯神　遠志
萎蕤一兩　龍骨煅五錢
爲粗末每水煎三錢服日二

積聚門

積聚　肥氣　伏梁　痞氣　息賁
賁豚

積聚統論

論曰積者五臟所生氣之所積名曰積其始發有根本其痛不離其部由陰氣所生也聚者六腑所成氣之所聚名曰聚其始發無根本其痛亦無常處由陽氣所生也然又有癥瘕癖結者乃積聚之異名也症狀不一原其病本大約相類但從其所得或診其症狀以立名爾且癥者爲隱現腹內按之形症可驗也瘕者爲瘕聚推之留移不定也癖者癖側于脅肋結者沉服結強于內然有得之于食有得之于水有得之于憂思恚怒有得之于風寒種種不一凡使氣血沉滯留結而爲病者治須漸磨潰削使氣血流通則病自愈矣

積聚

論曰經云病有積有聚何以別之夫積者陰氣也聚者陽氣也陰沉而伏陽浮而動故氣之所積名曰積氣之所聚

名曰聚然積者五臟所生聚者六腑所成積之爲病其始發有常處其痛不離其部上下有終始左右有所窮盡聚之爲病其始發無根本其痛亦無常處上下無留止此積聚之分別也

鱉甲丸　治腹內積聚心肋氣滿時吐清水惡寒不下食
鱉甲醋炙　大黃炒　檳榔二兩　人參　附子　前胡
白朮　黑乾薑　枳殼　防葵　川歸　桔梗　甘草一兩　食茱萸　紫朴三兩
共末入蜜杵丸如梧子大空心酒下三十丸

萬靈丸　治積聚滯氣胸膈否悶心腹刺痛
雄黃　陳皮去白炒　大黃　白丑一兩　肉蓯蓉　京三
稜煨　杏仁　巴豆去皮心油　乾漆炒烟　青皮五錢　訶勒
皮三分　天南星薑製　木香　藿香葉　白朮炒一分　胡
椒半分　共末薄荷汁糊爲丸如小豆大　傷食薑湯下
三五丸　傷酒薑湯下十丸

大五積丸　治五積胸膈否悶腹脅脹滿宿食不消積氣
成塊心腹痛不能飲食
硇砂　芫花　乾漆炒烟一兩　木香仝後木　巴豆去皮心油

皂莢去皮子炙　烏頭去皮臍二分仝上五味入醋二升熬膏　大黃炒　京
三稜煨　鱉甲醋炙　川歸　陳麴　青皮去白炒一兩　桂
心三分　共末用膏丸如小豆大茶酒任下五七丸欲疏
利服十丸

十味五積丸　治五積氣嘔吐酸水心腹脹悶不思食
沉香　陳皮去白炒　甘松　京三稜五錢　芫花醋炒焦
牽牛搗取末　木香　甘遂連珠者　大戟　蒲黃一兩
共末糊爲丸如梧子大用陳皮湯空心下二三十丸

木香丸　治五種積聚成塊
木香　檳榔　人參　郁李仁　訶勒皮　大黃三兩微煨
蘇子　白芍　赤茯　枳殼去白炒　黑乾薑　硝石二兩
共末入蜜爲丸如梧子大酒下二三十丸

牛膝芍藥丸　治積聚癥癖氣塊
牛膝　白芍藥　大黃炒　桔梗　赤茯苓　訶梨勒
皮取　柴胡　紫朴薑炒三兩　枳殼　檳榔　陳皮去白炒一兩
共末入蜜杵丸如梧子大空心大棗湯下二三十丸

肥氣

論曰凡人積氣在左脇下如覆杯有頭足者名曰肥氣乃

肝之積也蓋肝藏血故陰多而陽少發爲積氣由肺病傳
肝肝傳脾脾以季適王而不受傳是邪氣留于肝故積爲
積氣久不愈令人發欬逆痎瘧連歲不已此陰盛陽虛故
也

蓬藁根湯　治久積結癖氣不散左脇下如覆杯吐酸水
面色黃此名肥氣并女人血瘕
蓬藁根　懷生地二兩　川歸　赤芍藥兩　丹皮
枳殼炒　桂心三分　生薑焙乾三錢　水煎三錢空心溫服二日

青蒿汁湯　治久積肥氣寒熱痎瘧

青蒿汁一合 生藕汁 童便半合 常山 柴胡三分
烏梅肉炒 鼈甲醋炙 炙甘草一分
水煎五錢去滓入三汁少許沸服日二

酸棗仁丸 治肝積肥氣久不已變成寒熱核瘧令人熱多寒少小便赤澀咳逆
酸棗仁生 蘇子 木通 薏苡仁 黃芪
枳殼麩炒 木香 坐拏草 升麻 大黃
麥門冬 赤茯苓一兩 共末入蜜杵丸如梧子大麥冬湯下二三十丸日二

石韋丸 治肝積肥氣
石韋去毛 京三稜 附子 陳皮 川椒去目炒 吳茱萸炒一 共末入蜜杵丸如梧子大荊芥湯下二三十丸

伏梁

論曰內經謂病有少腹盛上下左右皆有根名曰伏梁裹大膿血居腸胃之外不可治治之每切按之致死又曰人有身體髀股䯒皆腫環臍而痛病名伏梁此風根也夫氣之所聚名曰聚氣之所積名曰積聚陽氣也故無留止積陰氣也故有形狀伏梁心之積也起于臍上故小腹盛上下左右皆有根裹大膿血居腸胃之外故環臍而痛此為風水之病使身體髀股皆腫名曰伏梁以其若梁之隱於伏也其症有淺深居臍上為逆以邪氣之逆上行也居臍下為從以邪氣之順下行也治法不可動動之為水溺濇之病故曰論在刺法中

鼈甲湯 治伏梁積氣
鼈甲醋炙 白芍 京三稜 大腹皮一兩 懷生地
柴胡 川歸一兩半 桂心 生薑三分
水煎三錢入木香少許服日二

桃奴散 治伏梁積氣
桃奴 暴乾為末空心溫酒下三錢未差再服

訶梨勒丸 治發積伏梁氣
訶勒皮二兩 檳榔 大黃炒二兩半 防葵 柴胡 枳殼去白炒 羚羊角 川連 赤茯苓 生薑一兩半 子芩
木通一兩 共末入蜜杵為丸如梧子大空心飲下二三十丸日二

痞氣

曰凡積氣在胃脘覆大如盤者脾積也痞結不通故名

痞氣此本肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王而不受邪氣留于脾故結爲積久不愈令人四肢不收發爲黃疸使飲食不爲肌膚所以然者脾藏肌肉之氣能與胃行其津液以榮養四肢若爲積氣所留則不能榮養故有四肢不收飲食不爲肌膚之症也

平氣丸　治脾積痞氣腹脅膨脹心胸悶痛不思食

檳榔一枚微煨　京三稜　砂仁　胡椒五錢　青皮炒一兩

烏梅肉炒半兩　巴豆二錢去皮心油

共末糊爲丸如小豆大薑湯下三丸

白朮湯　治脾積痞氣脅肋滿悶

白朮　紫朴薑汁炒　桂心　柴胡三兩　炙甘草一兩

檳榔十枚微煨　生薑水煎三錢空心溫服日二

勻氣湯　治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食

大腹皮二枚全用　白朮　桂心　牽牛半生半炒　麥糵　紫

朴薑汁炒　郁李仁半生半炒　甘草　陳麴一兩　高良薑五錢

生薑大棗水煎五錢空心溫服再服

息賁

論曰凡積氣在右脅下覆大如杯者肺積也氣上賁衝息有所妨名曰息賁此本心病傳肺肺當傳肝肝以春適王而不受邪氣復賁于肺故結爲積若久不已令人灑淅寒熱喘咳發肺癰所以然者肺主氣外合于皮毛今肺氣留積故有咳喘寒熱肺癰之病

枳實湯　治肺積息賁上氣冲胸滿咳逆

枳實麩炒黃　木香　檳榔　炙甘草　葶藶紙炒　吳茱

萸炒五錢　杏仁去皮尖炒二兩　薑棗水煎三錢空心溫服日二

桑白皮湯　治肺積息賁上氣脹滿咳嗽涕吐膿血

桑白皮　麥門冬一兩半　桂心　甘草五錢　陳皮炒

皂莢一兩去皮炙　生薑水煎三錢溫服日二

半夏湯　治肺積息賁咳嗽

半夏薑汁炒　細辛　桑白皮　前胡半兩　訶梨勒煨

桔梗炒　人參　川貝母　白朮土炒　甘草　柴胡一兩

生薑大棗水煎三錢空心溫服日二

賁豚

論曰凡積氣發于小腹上至心下若豚狀或上或下來往無時者腎積也蓋腎水乘心其狀賁衝如豚名曰賁豚此本腎病傳心心以夏令適王而不受邪氣復留

于腎故結爲積久不已令人喘逆骨痿少氣所以然者腎
藏骨髓之氣若其氣留積不能榮養骨髓故變爲喘逆骨
痿之病也

四味丸　治久積賁豚氣時攻膀胱痛
川椒炒出汗　附子　肉蓯蓉　蘹香子一兩
共末蜜丸如梧桐子大酒下

桃仁丸　治腎積氣賁豚
桃仁去皮尖二兩研用酒二升煎成膏　木香　青皮去白炒　蘹香子
炒　桂心五錢　檳榔三分　黑乾薑一分
共末膏丸梧子大酒下三十丸

化氣沉香湯　治腎積
沉香　木香　人參　附子　黃芪　烏藥　甘草
五味　大茴　牛膝　石斛　陳皮　高良薑　巴戟
天　桂心五錢　生薑水煎三錢溫服日二

李根白皮湯　治賁豚氣沖心汲汲短氣發作有時
李根白皮炙八兩　人參　附子　甘草二兩　半夏七兩
赤茯　黑乾薑　桂心三兩　水煎三錢溫服日二

吳茱萸湯　治賁豚氣上沖心胸逆滿
吳茱萸一兩　人參　甘草　半夏四兩　桂心
薑棗水煎服

木香散　治一切風及腎臟賁豚氣上沖心胸滿悶
木香一兩　白芷　沉香　杉木節　蓬莪茂　蘹香子
炒　桂心　青皮五錢　木瓜　枳殼炒三分
共末薑湯下二錢

磁石散　治賁豚冷氣上沖昏亂四肢軟弱不收
磁石　木香　檳榔　肉豆蔻一兩
共末葱白酒下二錢日二

壓氣木香丸　治賁豚氣上沖胸膈
木香　丁香　肉豆蔻　白豆蔻　吳茱萸炒五錢
沉香三分　青皮一分　麝香二錢
共末用硇砂豬膽汁和丸梧子大酒下二十丸

木香檳榔散　治腎積氣不散結伏賁豚發即上沖心胸
令人喘逆骨痿少氣等疾
木香　檳榔　白芷　沉香　磁石　大茴　川芎
訶勒皮　牡蠣五錢　桂心　陳皮三分
共末生薑鹽湯下二錢

諸癥　結瘕　痃氣　酒癖

諸癥

論曰積氣在人腹中久不差則牢固推之不移者癥也此由寒溫失宜飲食不節致臟腑氣虛弱食飲不消按之其狀如杯盤牢結久不已令人體瘦而腹大至死不消診其脉弦而堅其狀不轉動者此其症也

鱉甲丸　治諸癥塊衝心氣滿不下食手足煩悶

鱉甲　訶勒皮各二兩　人參　炙甘草　防葵　大黃微炒

白朮各半兩　郁李仁　桂心　杏仁去皮尖一兩研成膏

共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十丸

夾食丸　治癥癖食氣食勞五臟痰逆

乳香　木香　川歸　肉蔻　乾薑　京三稜煨

附子　丹砂　青皮　巴豆去油一兩　紫菀　鱉甲醋炙二兩

丁香　共末入蜜杵丸小豆大丹砂為衣酒下三五丸

結瘕

論曰結瘕者積聚之類也聚積久不散謂之結浮流腹內按抑有形謂之瘕結之症候形體瘦瘁飲食不作肌膚退陰寒冷溼之氣則發而腹脅塊硬隱隱然痛者是也瘕之症候腹中氣痛動轉橫連脅下有如癖氣遇脾胃有冷陽氣不足而發動者是也

紫葛丸　治結瘕腹脹堅硬如石肚上青筋浮起

紫葛　郁李仁一兩　木香　桔梗　訶勒皮三分

大黃炒一兩半　紫菀三分　牽牛子五錢半生半炒

共末入蜜杵丸梧子大木通大棗湯下二十丸

痃氣

論曰痃氣謂臍腹左右緊硬而痛橫逆如臂取象如弓弦之急故謂之痃氣蓋因寒溫失宜房勞過度真陽虛憊陰冷內生所以水飲入於胃而不能銷鑠流於脅下經久不去遂成痼疾若遇陰寒或食冷物則作痛久之則不能飲食致肌膚消瘦

訶梨勒丸　治痃氣腑脅滿大腸帶澀

訶勒　桂心　白芍　大黃炒　甘草　烏藥

防葵一兩　鱉甲二兩

共末入蜜杵丸如梧子大薑湯下二三十丸

附子草蔻丸　治痃氣急痛嘔吐酸水

附子　草豆蔻二兩　桂心　吳茱萸一兩　木香五錢

桃仁三兩去皮尖炒 丁香三分

共末入糊丸梧子大薑橘湯下二三十丸

大黃丸 治痰氣急痛嘔吐酸水大便不通滿悶

大黃二兩用酒二升熬成膏 丁香 檳榔各三分 木香

訶梨勒煨去核皮 桂心各一兩

共末同煎杵丸小豆大酒下二三十丸

京三稜丸 治五積痰癖氣塊

京三稜 木香 青皮 檳榔 石三稜 雞爪三稜五錢 肉豆蔻二枚 硇砂三分

共末用薑汁糊丸梧子大薑湯下二三十丸

緩中丸 治痰氣急痛腹脹胃脘痛不下食嘔逆

乾薑 甘草一分 人參 附子 白芍 陳皮 檳榔

桂心 枳殼 鱉甲 半夏 紫朴五錢 剉水煎服

酒癖

論曰胃弱之人因飲酒過多酒性辛熱善渴而引飲過氣道否塞酒與飲俱不化停在胸脇結聚其癖其狀按之有形或按之有聲脇下弦急脹滿或致痛悶肌瘦不能食因酒得之故謂之酒癖

乾薑丸 治酒痰癖水飲不消兩脅脹滿時嘔吐腹中水聲

乾薑 葛根 枳殼各一兩 白朮二兩 陳皮三分 甘草五錢炙 共末入蜜杵丸梧子大飲下三四十丸

栝蔞散 治酒癖脅下脹滿不能下食

栝蔞實一兩 陳麴五錢炒香 共末空心葱白下二錢日二

聖濟總錄纂要卷七終

程世佐燧四
新安 程量入上愼 校
程志治齊先
程 瑶石鈕

吐血門

吐血　吐血不止

吐血統論

論曰吐血病有三種一則緣心肺蘊熱血得熱則妄行下流入胃胃受之則滿悶氣道貢衝故令吐血二則虛勞之人心肺內傷恚怒氣逆肝不得藏血乘虛而出因怒氣逆甚則嘔血三者緣酒食過飽胃間不安或强吐之氣脈貢亂損傷胃心血隨食出此名傷胃

黃芪散　治吐血

綿黃芪　白芨　白斂　黃明膠炒 四兩　共末空心飲下二錢

絲雲散　仝前

百合　人參　側柏葉　阿膠炒 二兩　共末空心飲下二錢

神效鹿角散　治吐血咯血

鹿角膠　川柏炒 五錢　杏仁二十一枚 去皮尖　共研入白麪水下二錢

阿膠散　治咯血吐血

阿膠　白芨　白芷　白斂　川柏蜜炙 一兩　共末飲下二錢

藕汁茯苓散　治吐血不止

生藕汁　白茯苓　懷生地　炒黑蒲黃等分　以三味共末調藕汁下二錢

補肺煮肺散　治吐血咯血等

杏仁一百二十枚 去雙仁皮尖研極爛　百合四兩　葱白三莖　熟糯米三合　共和勻用猪肺一具去筋管膜仝煮熟蜜湯下

異攻散　治吐血不差

人參一兩　研極細五更時打雞子淸和服二三錢

黃藥子散　治吐血

黃藥子　防已等分　共末用小麥湯下一錢吐甚者一服減二服止

艾灰散　治吐血

艾葉　燒灰存性爲末新汲水空心下二錢

竹葉芍藥湯　治吐血衄血大小便出血

淡竹葉六合　赤芍　甘草炙一兩　阿膠三兩　川歸半兩

水煎五錢溫服日二

地黃藕汁飲　治心肺熱極喘悶吐血

生地汁　生藕汁　生薑汁　小薊根汁　生牛旁子汁　生白蜜等分　共和勻徐呷數口

地黃飲　治吐血不止

懷生地取汁一兩　鹿角膠炙一兩　童便五合煎沸入汁末十數沸分三服

吐血不止

論曰藏氣高于肺而主氣藏氣通于心而主血藏氣散于肝而藏血是三者或因憂愁思慮與夫恚怒氣逆傷之則氣亂而血妄行下入于胃胃受之則脹滿其氣貢衝于上故吐血不止也

白金散　治吐血肺元受損

上白麪　石菖蒲一兩　共末空心水下二錢舁弄氣薔汁蜜水下

白斂湯　治吐血路血不止

白斂三兩　阿膠炒二兩　用酒水合煎三錢去滓入生地汁半合沸服

生犀桔梗散　治吐血似鵝鴨肝晝夜不止

生犀角　生桔梗一兩　共末空心溫酒下二錢晚下一錢

補肺百花煎　治吐血不止兼咳嗽

生地汁　生藕汁一升　生薑汁半升　乾青柿五枚研作糊

黃牛乳一升　胡桃肉十枚　大棗二十枚研　好白酒一升仝上數味煎如餳入後藥

黃明膠五錢炙研　杏仁去皮尖研三兩　秦艽五錢研末　仝上合煎減半入蜜四兩養成煎空心用糯米飲下一二匙日三服酒下亦可

阿膠湯　治吐血不止

阿膠炒研　熟艾二兩　白芍　地榆四兩　小薊根五兩

水煎五錢

上馬騣湯　治心肺蘊熱恚怒氣逆便血妄行日夜不止

土馬騣燒灰二 人參 白茯 秦艽 炙甘草 枳實
麩炒 懷生地酒洗 柴胡一兩 水煎五錢空心溫服日二

嘔血 唾血 舌上出血 汗血

嘔血

論曰憂愁思慮則傷心恚怒氣逆上而不下則傷肝蓋心主血肝藏血二臟俱受傷則血溢妄行流散不止氣逆則嘔吐而出血也

三汁飲 治吐血嘔血衄血等
麥冬汁 生地汁 生藕汁 熟冷水各一鐘 白藥一兩

和勻溫服一二鐘以差為度

生地黃湯 治憂愁恚怒嘔吐出血煩悶少氣胸中痛
懷生地半斤 阿膠炒粉研 炙甘草半兩 用大棗水煎五錢空心溫服日二

荊芥穗飲 治嘔血不止
荊芥穗 山梔仁 片芩 蒲黃一兩 水煎五錢空心溫服晚再服以差為度

唾血

論曰邪熱蒸于肺則損肺恚怒氣逆傷于肝則損肝肺肝傷動故令人唾血如唾中有若紅縷者屬肺臟如脇下先若痛而後唾鮮血者屬肝經俱可折而治之

紫菀散 治肺氣內傷邪熱熏積欬唾有血
紫菀 川歸 川芎 附子 款冬 五味子 白朮
桂心 生地 甘草 細辛 側栢葉 杏仁去皮尖炒研
貝母一兩 共末入蜜少許和滾湯空心下二錢晚再下

蒲黃散 治唾血不止
蒲黃生一兩 研羅細末用冷水和三錢空心下日二

舌上出血

論曰心主血在竅為舌若心臟蘊熱血得熱而妄行或溢于心之竅故有舌上出血之症甚者出如涌泉

升麻湯 治心臟有熱舌上出血勢如涌泉
升麻 茜根 小薊根半兩 熟艾炒 凝水石三兩
水煎三錢去滓入生地汁半合再沸服日二

阿膠散 治舌上出血不止
阿膠炒粉研末 黃芪蜜炙 蒲黃一兩 共末用生地汁空心下二錢

熟艾葉湯 治心臟熱舌上出血及一切失血

熟艾葉 用糯米全炒 松黄 側柏葉 炙一兩 水煎三錢空
心溫服日二

汗血

論曰内經云臟經通于心血脉之氣行焉又曰肝藏血故人臥血歸于肝然血雖藏于肝而妄則行之若肝心二臟俱傷于邪則血隨心液爲汗而出是爲汗血也

人參湯 治肝心二臟傷邪汗血

人參 赤芍 白朮 甘草 桂心 一兩 川歸 淡竹茹 川芎 子芩 二兩 水煎三錢空心溫服日二

胂白散 治血汗從膚腠中出

人中白 用瓦上炙乾研成末入麝香末少許和勻空心酒下二錢

如聖散 治汗血不止

郁李仁 去皮尖研爛用梨取汁下一錢日二

竹茹湯 治吐血汗血尿血

竹茹 人參 白芍 生地 甘草 川歸 桔梗 炒

川芎 桂心 一兩

水煎三錢空心溫服以差爲度

鼻衄 衄不止 大衄 衄衊

鼻衄

論曰脾移熱于肝則爲驚衄是木剋土也蓋脾土熱氣移于肝木則神魂驚恐而血行不由其道夫肺主氣開竅于鼻血隨氣上今血既妄行故于鼻出而爲衄也

生地藕節湯 治邪熱上攻鼻衄

懷生地 生藕節 一兩 水煎五錢空心溫服以差爲度

蒲黄散 治鼻衄

蒲黄 椶櫚 燒灰存性 川歸 阿膠 亂髮灰 柏子仁 燒研一錢 共末用藕節汁空心下二錢 如肺損傷吐血生地汁下 腸風下血樗根皮湯下 女人赤白帶艾葉湯下日二服

貼背膏 治上焦肺壅熱鼻衄

京三稜 大者一枚 溼紙包煨熟乘熱爛搗用醋煮糊貼背上第三椎骨

貼鼻方 同前

鹿角膠 用沸湯浸軟一薄片貼鼻頞上差

紫耳方 治肺壅熱鼻衄

玄胡索　爲末綿包塞耳內左衄塞右右衄塞左左右

俱衄兩耳俱塞

吹鼻方　同前

石榴花（取白葉者）　陰乾爲末用少許吹鼻中即差

葱白汁　同前

葱白汁　以汁入酒少許點二三匙滴入鼻中愈

衄不止

論曰榮衛之行常與胃氣相隨則氣與血未嘗一刻相離蓋肝藏血肺主氣榮衛和平則氣血調順若人臟腑有熱

熱乘血氣血性得熱流溢妄行夫肺開竅于鼻故其發爲鼻衄衄不止者職處血盛故也內經又云脾移熱于肝則爲驚衄蓋脾土也肝木也今脾移熱于肝則木不能制土明矣肝藏血其神魂故爲驚衄之病

髮灰散　治衄不止

亂髮灰（一錢）　人中白（炙研五分）　麝香（研一字）

共研用少許吹鼻中立愈

車前子散　治衄血不止欲死者

車前子　牛耳內垢（等分）

用車前子爲末與垢同研和成梃子塞耳中差

柳枝散　同前

柳枝（寒食日收者一兩）　人參（一分）　共末空心溫水下二錢日二

人參蓮心散　治血衄不止

人參（一錢）　蓮子心（一分）　共末空心溫水下二錢以差爲度

玉粉散　治鼻衄日夜不止頭痛心煩

石羔（研）　牡蠣（炮研）　共研極細溫水下二錢日二

二花散　同前

酸石榴花　黃蜀葵花（一兩）　共末水煎三錢溫服日二

棗灰散　治衄不止

生棗（取爛斑或中心者七枚連皮燒灰末）　入麝少許研勻酒下三錢日二

法紙散　治衄血不止

衄血時　以紙接血將紙焙乾燒灰溫水和服但不可與病人知

燈心散　同前

燈心（一兩爲末）　丹砂（一錢飛過）　共末空心飲下二錢須再服

大蒜貼足　治衄血不止諸藥無效者

大蒜（去皮）　研爛用帛攤錢大左竅出貼左足心右竅

出貼右足心兩鼻並出二足並貼血止急洗去

通神散　治衄不止心神悶亂頭旋欲倒

亂髮燒灰　伏龍肝一兩

共末用溫水空心下二錢頃再服

苧花湯　治血衄不止

苧花　用水煎濃汁二碗分二服如無花以根代之

大衄

論曰大衄者口耳皆出血是也蓋血爲榮而藏于肝氣爲衛而生于肺肺開竅于鼻三者相爲流通若熱氣乘血熱盛則氣血妄行與衛氣錯溢于上竅故鼻衄不已而口耳皆出血也是名大衄

南天竺飲　治血妄行九竅皆出服藥不止者

南天竺草生剉一大把　山枝三十枚　生薑一兩　燈心一把

炙甘草五錢　大棗肉五枚　用水一大碗煎至半空心溫服

苦參湯　治大衄口耳皆出血不止

苦參　川連一兩　山枝七枚　大黃半兩微炒

水煎五錢去滓入生地汁服

阿膠湯　治大衄不止

阿膠一兩炒研　蒲黃五錢

水煎三錢去滓入生地汁服急用帛紮兩乳

白龍骨散　治大衄不止

白龍骨煅　爲末用少許吹鼻中立止

生地飲　治大衄出血血上心胸氣急勞熱

懷生地一兩　子芩　赤芍藥　青竹茹三兩　蒲黃各三

地骨皮五兩　水煎五錢空心溫服晚再服以差爲度

衄衊　汗血

論曰內經謂膽移熱于腦則辛頞鼻淵傳爲衄衊瞑目夫血得熱則涌溢得寒則凝泣若膽受胃熱循脉而上乃移熱于腦蓋陽絡溢則血妄行在鼻爲衄在汗空爲衊衊者皆熱厥血溢之過也今之治衄衊者專于治血不知血之行留氣爲之本猶海水朝夕兩潮乃陰陽之氣使然也明夫經絡順逆則血與氣俱流通而無妄行之患矣

青竹茹湯　治熱盛所致衄血汗血

青竹茹　子芩　懷生地二兩　白芍藥　麥門冬

蒲黃一兩　水煎五錢空心溫服以差爲度

地黃散　治血汗不止

懷生地 阿膠炒研三兩 蒲黃二兩

共末空心飲下二錢日二

刺薊湯 治熱氣上行衄血汗血

刺薊 紫蘇二兩 川連 犀角 懷生地一兩

水煎五錢溫服

獨聖湯 治血熱妄行或衄或嗽

子苓 用酒浸微炒水煎七錢空心溫服立差

脚氣門

風毒脚氣 脚氣痺攣 脚氣疼痛不仁

脚氣統論

論曰風毒中人隨處皆能為病偏著于脚何耶蓋五臟經絡心肺起于手十指肝腎脾起于足十指地之蒸溼毒氣足先受之久而不差漸至四肢腹背頭項古人所謂微時不覺痛滯乃知所以謂之脚氣其症不一或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下利或二便秘塞不通或胸中忡悸不欲見明或精神昏憒或善忘語錯或壯熱頭疼或身體冷痛或時覺轉筋或小腹不仁或髀腿頑痺或緩縱不隨或脚或不腫或百節攣急凡是之症皆脚氣候也治法固多唯孫思邈云不得大補亦不得大瀉故須湯劑為治法之最學者宜加意焉

風毒脚氣

論曰內經謂暑勝則地熱風勝則地動溼勝則地泥寒勝則地裂寒暑風溼之氣皆本乎地人或履之所以毒亦易中于足也因病從脚起故謂之脚氣況五臟流注脾與腎肝之經絡皆起足指故有風毒脚氣之病其症或見食嘔吐或腹痛下利或便溲不通或胸中驚悸不欲見明或言語錯忘或頭痛壯熱或身體冷疼轉筋壓腫痛痺緩縱其

狀不一治不可緩稍緩氣上入腹或腫或不腫胸中逆滿上氣肩息者死不旋踵寬者數日必死不可不急治也但看心下急氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脉促短而數嘔吐不止者死故不可緩也

木瓜虎骨丸 風毒脚氣疼痛少力筋脉拘急行步艱難

木瓜 虎脛骨 沒藥 當歸 麒麟竭 骨碎補

木香 自然銅醋淬七次 敗龜板 楓香 安息香重湯煮熬

桂心 甜瓜子一兩 地龍二兩 乳香五錢全沒藥麟竭研入木瓜內用黑豆一斗水浸安木瓜于中蒸爛研膏

共末蜜丸入酒少許丸梧子大木瓜湯下三十丸日二

大續命湯　脚氣痺攣不隨風毒攻四肢壯熱如火頭項攣急氣冲胸中

當歸　人參　防風　麻黄去根節　石膏二兩　芎藭

杏仁炒黄　赤芍　黄芩　炙甘草　桂一兩

薑水煎四錢

越婢湯　風毒脚痺攣行步不遂

麻黄　石膏四兩　白朮二兩　附子　炙甘草一兩

薑水煎四錢

木香散　脚氣緩弱大肉頑痺肢節疼痛

木香二兩　牛膝　萆薢　羚角　陳皮　杏仁　獨活

升麻　杜仲　秦艽　桂一兩　車前五錢

薑水煎三錢日三

犀角丸　風毒脚氣上冲散入四肢虛腫無力

犀角二兩　白朮　檳榔　人參　川芎　赤茯　羌活

木香　防風　石斛　牛膝一兩

蜜丸梧子大酒下二十丸日二

五柔丸　腎虛冷腎風或頭風兼風毒脚氣

大黄一斤蒸三次　前胡二兩半　白芍　半夏　茯苓

葶藶紙炒　赤茯　細辛　當歸四兩

蜜丸梧子大飲下五七丸日二以利爲度

蘆根湯　風毒脚氣昏煩壯熱頭疼嘔吐口乾

蘆根生半兩　赤茯　葛根　知母　淡竹葉　麥冬三分

炙甘草五錢　水煎五錢日二

淋渫方　風毒脚氣腰膝痛痺腫行履不得皮膚如小蟲行

羊桃　蒴藋　蒺藜　蒼耳　海桐皮　柴胡　白茯

柳木蠹末　木紅花一兩

水五斗煎二斗去滓淋洗愼避風冷

淋洗方　風毒脚氣腰膝痛痺腫行步不得皮膚如蟲行

水萍　附子　露蜂房　茵芋二兩　川椒一兩　蒴藋四兩

水五斗煎取汁二斗避風淋洗

脚氣痺攣

論曰脚氣痺攣者寒氣多也寒留於筋脉結而爲病則筋急不能轉側行步艱難甚則不可屈伸也

肉蓯蓉丸　風冷脚氣冷搏筋脉痺攣不仁

蓯蓉 牛膝 天麻 黃芪 何首烏 木瓜各十兩酒五斤浸一日曬入後藥 狗脊 續斷 萆薢三兩

共末用木瓜三枚剜空入青鹽一兩閉口飯上蒸研膏入上件和丸如乾加酒糊丸梧子大鹽湯酒任下三十丸

秦艽湯 腳氣行步痺攣

秦艽 枳殼 白朮 丹參 羌活 人參 柴胡 陳皮 紫蘇 薏仁 桑皮兩半 防風 石斛 大麻仁 炙甘草二兩 水煎五錢日二

石南丸 腳氣攣痺去風溼活血脈益元氣

石南 白朮 牛膝同上酒浸 天麻 防風 枸杞 黃芪二兩 鹿茸 桂半兩

共末用木瓜一枚去皮瓤蒸爛搗膏入糊丸梧子大酒下三五十丸

大腹湯 腳氣痺攣寒搏筋脈不能轉側

大腹四枚 防巳 青皮 木通 羌活 紫蘇 萆薢 川芎 地骨 訶勒皮五兩 木香五錢 五加皮二兩酒浸炙

薑棗水煎三錢日二

腳氣疼痛不仁

論曰腳氣疼痛皮膚不仁者蓋人之氣血得溫則流通遇寒溼則凝澁今腳氣之疾緣風寒溼毒客於氣血榮衛虛弱不能宣通故有腳氣疼痛痲痺之症

牛膝丸 下經氣弱風溼毒氣與氣血相搏皮膚不仁足痛不能履地上攻眼目迎風流淚

牛膝 山萸兩半 防風 羌活 烏頭 川芎 地龍炒 檳榔一兩 共末酒糊丸梧子大鹽湯下二十丸

趁痛膏 腳氣腫痛行履無力及打撲傷折痛

烏頭生 乾薑生 五靈脂生一兩 浮麥一分炒黑

共末用醋一鍾入藥三錢熬成膏攤紙上傳患處又以麩醋炒熱裹貼痛處如患腳氣先燒熱磚將藥在磚上腳心踏之引腳中氣消腫止痛

敗龜散 腳氣及筋骨疼痛

敗龜醋炙 白芥子研 芸苔子研 木別子去殼研 自然銅醋淬七次五錢 地龍炒 硫黃一兩

共末用末與麩醋和貼

牛膝丹參酒方 腳氣入冬即苦腳痺弱或筋骨疼不能

屈伸皮膚痛痺不仁手脚指節腫滿悶或四肢腫腰
膝直

牛膝　丹參　薏仁仁七　地八兩　白术　生薑　五加皮五兩　側子　赤茯　萆薢　防風四兩　獨活　石斛九兩　茵芋葉　人參　天雄　石南葉炙　川芎三兩　細辛　升麻二兩　磁石醋淬七炙一斤　桂三兩　白酒五斗浸服

柴胡湯　風寒溼毒脚氣痛皮膚不仁緩弱痛痺足脛腫滿心下急大便澁

柴胡　猪苓　紫蘇兩半　防已　陳皮　郁仁炒

大麻仁炒一兩　桑皮二兩半　水煎五錢日二

脚氣上氣　脚氣腫滿　脚氣心腹脹滿

脚氣冲心煩滿

脚氣上氣

論曰風溼毒氣之中人多從下起定先受之故名脚氣毒氣循經上入於肺則氣道奔廹升降不順故令上氣喘滿

桑白皮湯　脚氣面目腫上氣脹臥不得氣欲絕

桑皮炙二兩　陳皮一兩　葶藶炒研二兩

共末水煎麄散湯入末三錢再沸溫服頃又服當利一二行臟氣下即差三五日服一次

大腹湯　脚氣脹滿

大腹四枚連皮　杏仁三七枚炒　童便水煎三錢日二

枳實散　脚氣上氣

枳實炒二兩　白术　赤茯二兩　桂四兩

共末酒下二錢日二

烏豆湯　洗脚氣上氣撞肘喘冲心痛

烏豆　水五斗煮汁二斗半入甕中浸足令人從膝上向下淋洗百遍病者不過再洗差服後丸

加減木香丸　洗脚後服

木香　白芍　枳殼　大黃炒二兩　檳榔四枚　桂五錢

共末蜜丸梧子大酒下十五丸日二漸加至三十丸大便利為度

杏仁煎方　脚氣乘肺上氣喘促

杏仁炒　百合一分水二月令研細　生芐　麻黃　射干五錢

共末入百合汁中煎一升去滓日服二合此藥不得久停惟旋合

木香檳榔丸　脚氣冲心煩悶上氣喘滿

木香三分　檳榔五錢　葱水煎三錢去滓下紫雪二錢攪
汁中合童便一合 紫雪治脚氣最妙方在虛勞門
淋洗豌豆湯　脚氣擡肩喘
豌豆二升　葱白十根　川椒三分　水五斗煮半令人從膝
上淋洗下百遍患極者洗三次效
脚氣腫滿
論曰脚氣風溼毒氣客搏腎經腎者胃之關也關門不利
則聚水而生病水性就下故令腎氣不化小便不利溼氣
之氣下注足脛腫脹不消故謂之脚氣腫滿

赤茯苓湯　脚氣上攻身體腫滿小便赤澁
赤茯　防巳　桑皮　陳皮半兩　旋復五錢　杏仁
麻黃去根節　白朮　紫蘇一兩
水煮黑豆汁鍾半煎藥五錢煑半分
旋復花湯　脚氣腫滿上冲心胸煩悶氣急
旋復　犀角一兩　前胡　杏仁　桑皮　紫蘇
赤茯半兩　煑水煎三錢
大豆湯　脚氣足脛胕腫上氣徧身痰脹風引
大豆半合炒香　附子三兩　枳殼　澤瀉　陳皮四兩　炙甘
草　赤茯苓　防風二兩　水煎黑豆取汁煎藥三錢日
三若腫痛止去大豆澤瀉
脚氣心腹脹滿
論曰風毒之中人也必先中脚久而不差徧及四肢其氣
浸溢則腹脅脹滿小便不利氣喘息高者其病爲重也
訶梨勒丸　治脚氣疼痛發熱腫悶上攻心腹脹滿吐逆
訶勒皮　木香　防巳　大腹連皮　紫蘇一兩　白芍
杉木節　羌活　沉香五錢　水煎五錢日二
羚羊角丸　脚氣心腹妨悶兩脅虛脹不思食漸覺心滿

氣隔不通
木香　防風　升麻二兩　大麻仁　赤茯三兩　旋復
羚角　伏神二兩　獨活二兩半　大腹七枚連皮
共末蜜丸梧子大酒下四十丸日一服　如腹內先
冷加附子二兩　大腸秘澁加大黃半兩炒　氣滿加檳
榔二兩　心胸煩熱加麥冬三兩　筋急攣痛加牛膝二兩
皮膚風痒心下妨悶加枳殼半兩炒　臟氣虛弱加黃
芪二兩
前胡飲　脚氣攻心腹脹滿嘔吐不下食

前胡 生薑 羚羊角 半夏 大黃炒 赤茯五錢
枳殼三分 水煎五錢去滓下朴硝一錢
松節湯 腳氣入腹心腹脹急煩躁腫痛
松節炒黃 桑皮 紫蘇一兩 炙甘草五錢 檳榔三分
水煎三錢入燈心生薑童便日二
腳氣衝心
論曰腳氣衝心之狀令人胸膈滿悶上氣喘急甚者嘔吐是也蓋風溼毒氣初從足起縱而不治上入于腹小腹痺痺不仁毒氣上沖是謂腎水尅心火故名腳氣沖心孫思邈云凡小覺病候有異即須大怖畏决意急治之不可緩以腫爲候亦有不腫者正謂此也

吳茱萸湯 腳氣沖心煩悶腹脹氣急欲死
吳茱萸 木瓜 檳榔二兩
水煎五錢入竹葉一把以快利爲度
獨活湯 腳氣沖心
獨活 犀角 石斛 側子 川芎 防風 當歸
防已 炙甘草二兩 丹參 白芍三兩 赤茯四兩 桂半兩
薑水煎五錢日三凡服一二劑後隔五日一服若覺腹內氣散兩脅有力行動無妨宜常服香豆酒
香豆酒方 同前
香豆一升 酒三升浸隨量頻飲覺利多即止
吳茱萸檳榔湯 腳氣毒氣攻心欲死者
吳萸炒四升 檳榔七枚 木瓜 陳皮一兩 厚朴二兩
竹葉水煎三錢
木瓜湯 腳氣風溼毒氣攻心煩悶手足脈絕
木瓜 吳萸等分 水煎三錢頃又服
犀角湯 腳氣若風熱輕但毒氣入胃唯心胸煩熱索水溉胸面乾嘔好叫氣欲斷絕者

犀角 木香 人參 羚角 竹茹 沉香 射干
麥冬 赤茯二兩 雞舌香 麝香一兩另研 石膏三兩
水煎四錢去滓入麝末五分再沸服頃又服覺眼明心怡是效若嘔逆不下食加半夏二兩 生薑一兩 陳皮半兩
木香湯 腳氣攻心悶絕欲死
木香 檳榔一兩 赤茯 郁仁 牛膝 大黃炒 吳萸 桂三兩 水煎桑皮木通汁入藥三錢服如重又服

木香湯方入 脚風毒攻心悶亂狂躁口乾氣欲絶或秘澁
青木香 生黑豆皮二兩 大黃炒 紅雪一兩即紫雪
水煎五錢入紅雪三錢分二服頃再服當下燥糞
烏頭湯 風毒脚氣攻心心悶倒仆失音不語困甚者
烏頭一升水四升煎汁二升 甜竹葉一把 桑皮三兩 大腹七枚
用豆汁浸藥一日次早煎分二服頃再服已死者斡
開口灌之愈及灸脚心七壯男左女右
麻仁湯 脚氣冲心上氣二便澁小腹急痛
大麻仁微炒 赤小豆半升

水七升煎二升半分三服過二日又一劑
朴硝湯 脚氣攻心悶絶
朴硝 白芍 柴胡 旋復 紫蘇五錢 大腹 桑白
皮炙三分 檳榔二枚 生薑一兩
作三貼水煎去滓入朴硝二錢分二服
礬石湯 脚氣冲心
白礬二兩 漿水一斗五升煎浸脚良
九味木香丸 脚氣冲心胸膈煩滿喘急嘔吐
木香 訶勒 枳殼 桂二兩 白芍 柴胡半兩 厚朴

薑汁炒 檳榔二兩半 大黃炒二兩
共末蜜丸梧子大酒下二三十丸
脚氣語言蹇澁 乾溼脚氣 脚氣變成水腫
脚氣語言蹇澁
論曰風毒脚氣語言蹇澁者脾腎氣虚風溼中其經絡也
腎之經循喉嚨挾舌本脾之經挾咽連舌本散舌下二經
爲風溼所中故令舌本强硬語言蹇澁也
大八風湯 脚氣上攻心脾語言蹇澁
當歸 大豆三兩 白芍 烏頭 黃芩 遠志 獨活

五味 防風 川芎 麻黃 人參 秦艽 乾薑
甘草 杏仁 石斛 白茯 升麻 紫菀 黃芪
桂二兩 酒水煎三錢
桂心湯 風毒脚氣痿痺不仁語言蹇澁
桂心三分 麻黃 當歸一兩 防風 升麻 犀角
檳榔二兩 黃芩 赤茯半兩 漿水煎二錢
乾溼脚氣
論曰脚氣有乾溼之異者蓋陰陽所以分也在臟爲陰在
腑爲陽然皆由風溼毒氣乘虚而入其症大同小異故乾

脚氣之狀血脉痞澁皮膚痛痺脛細痠疼食減體瘦臟腑秘滯上冲煩悶溼脚氣之狀脚先腫滿或下注生瘡肌汗流下兩脚疼上攻心腹咳嗽喘急面浮膝腫見食嘔吐

四根湯　年深十九種乾溼脚氣

桑麻根節心　松木根節心　栢木根節心　杉木根節心並細剉炒各一兩　肉蓯蓉酒浸二兩　五靈脂　石龍芮炒一兩　天雄炮裂去皮臍二兩　紫檀香　地龍炒　木香各一兩　麝香五錢　乳香　沒藥一兩　共末木瓜酒下二錢日三

立應湯　乾溼脚氣冲注四肢

大腹一兩　木香　防巳　紫蘇　白芍　羌活　訶勒皮　木瓜　杉木節一兩　沉香一兩　水煎五錢日二

四斤丸　乾溼脚氣差後常發令永不發

牛膝　木瓜　蓯蓉　天麻一斤　酒五升浸一日曬乾為末用浸酒熬膏丸梧子大酒下三十丸

杉木節湯　乾脚氣頭痛腰脚痠疼心躁渴悶汗出氣喘

杉木節一升　橘葉一升　大腹連皮七枚　童便三升　同煎取半分二服如一服快利便止唐柳宗元乾脚氣夜半痞絕左脅有塊如大石且死困天寒不知人三日家人皆號哭榮陽鄭洵美傳此方服之半食間氣通立愈

防巳湯　乾脚氣脚膝腫滿

防巳　猪苓　郁仁　檳榔三分　木通　枳殼　紫蘇五錢　赤茯　炙甘草一兩　每水煎四錢

海桐皮散　溼脚氣及腎臟風下注滿脚瘡疼痛膿水出

海桐皮　草烏鹽炒　地龍炒　蒺藜炒各一　共末酒下二錢日二

脚氣變成水腫

論曰昔人論脚氣謂脾受陽毒即熱痛腎受陰溼即寒痺是知脚氣之病脾腎得之為多今變成水腫者亦繇脾腎俱虛之蓋腎虛則不能行水脾虛則不能制水故水氣散溢滲于皮膚流于四肢所以通身腫也

葶藶丸　脚氣成水腫上氣氣急咳嗽二便苦澁所服利水藥反利大便小便反澁

葶藶三兩　防巳　炙甘草一兩　杏仁　貝母一兩半

為末棗肉丸梧子大大棗桑皮粳米飲下三十丸小便未快加十丸

賓榔散　脚氣浮腫漸變成水心腹脹滿二便不通氣急
喘息

白檳榔五枚　大腹皮七枚　木香一兩　大腹綱剉二味
爲末用童便一鍾煎大腹一枚香末二錢去滓入檳
榔末三錢再沸服日二

猪苓湯　脚氣兼水氣膈氣通身腫滿氣急小便不通坐
臥不得

猪苓　防巳　赤茯三分　木香　郁仁　澤瀉二兩
桑皮炙五兩　大腹和皮七枚　水煎五錢服下小便立効三日

脚氣大小便不通　江東嶺南瘴毒脚氣
脚氣雜治膏藥淋渫

脚氣大小便不通

論曰脚氣二便不通者中風溼之氣搏于脚膝上攻胸腹務肋填滿榮衛痞膈三焦之氣升而不降所以傳導變化皆不能出而二便不通蓋腎氣化則二便利脚膝者腎之候今脚氣上攻則腎氣不得化腎氣不化致二便不通也

桑白皮湯　男女風毒脚氣及徧身拘急刺痛二便赤澁
不思食嘔逆或寒熱

桑皮　木通　青皮　紫蘇　羌活兩　荆穗
蘹香子根　木瓜　獨活　枳殼二兩　大腹十枚大者三
韮葱水煎三錢日二

檳榔湯　脚氣腫滿坐臥不得上氣冲心二便秘澁

檳榔七枚　木香　郁仁二兩　桑皮炙　木通二兩
水煎三錢去滓入牽牛末一錢二便利氣快爲度

江東嶺南瘴毒脚氣

論曰内經謂南方者其地下水土弱霧露之所聚也江東嶺南大率如此春夏之交山水蒸鬱風溼毒氣爲甚足或

感之遂成瘴毒脚氣其候脚先屈弱漸至痺疼膝脛微腫小腹不仁頭痛煩心痰壅吐逆時作寒熱便溲不通甚者搶心而勢迫治不可緩支法存所以留意經方偏善斯術者豈非江左嶺表此疾得之爲多歟

犀角湯　江東脚氣小欲動作漸覺心悶脚脛瘦疼煩熱
不止

犀角　木香　前胡一兩　竹茹三分　麥冬半兩
大腹皮三枚全用　用水煎五錢

羚羊角湯　江東脚氣盛發上冲肝胃胸膈妨悶意氣不

暢目乾目不知人

羚角 犀角半兩 木香 升麻 旋復一兩 麥冬

大腹五枚 枳殼 前胡一兩 水煎五錢快利為度

旋復花飲 乍處嶺南未伏水土食飲不宜兼卑溼脚氣發動時復心悶面目脚膝浮腫氣乏脣口青黑胸膈煩熱見食吐嘔心腹妨痛冷氣結聚如有此疾急服

旋復 前胡 郁仁一兩 半夏 赤茯二兩 大腹五枚全

吳萸三分 薑水煎五錢日二要疎利加檳榔末

犀角湯 脚氣之疾先起嶺南稍來江東皆由卑溼得之

或微覺疼痺或二脛腫滿行起痺弱或上入腹不仁或時作冷熱皆其候也若先覺此症食嘔不下氣上逆者宜急服

犀角 旋復一兩 赤茯 陳皮一兩半 紫蘇半握

薑棗水煎五錢豆一合

獨活酒 嶺南脚氣發動地氣鬱蒸熱毒風盛脾肺常有風熱

獨活 生地二兩 海桐皮二兩 惡實根半斤 桂一兩

黑豆皮生 大麻仁一升炒 生白酒三斗浸頻服

脚氣雜治膏藥淋渫等

論曰脚氣症候不一隨症用藥備載于前然有一方兼治數症者有膏酒淋傳者皆昔經驗用之多效今復詳類于後

木瓜丸 脚氣諸疾

木瓜四枚 乳香二兩 甘菊一兩 青鹽一錢 將瓜去瓤子入末封固蒸研丸梧子大酒下五十丸日三汗香為驗并膝脚等疾皆治

桑葉煎 脚氣皆用諸方苦脚弱宜服

白桑木用生桑搥者揉擻枝切一石 水一石煎五斗又加水五斗煎去滓慢煎成膏約一升即止收貯頻含化一匙服七日覺四肢通暢頻頻泄氣已後兩脚或腫勿怪乃是得藥力病差之候

牛膝酒 脚氣極冷着厚衣蓋覆不覺煖

牛膝 生地半斤 紙包泥裹又用紙包泥固乾灰火養半日又以火燒一伏時取出漬酒服

蒜酒 初覺似有脚氣宜服

蒜二升切炒 桃仁一升去皮尖炒 豆一升炒香 酒一斗浸服

石斛酒　脚氣痺弱筋骨疼痛

石斛四兩　人參　丹參　川芎　杜仲　白朮

黃芪　五味子　防風　陳皮　甘草炙　白茯

乾薑　山萸　當歸　桂二兩　牛膝三兩　酒五斗浸服

菝葜酒　脚氣屈弱積年腰脊攣痺及腹內堅結

菝葜五斗水石半煮七斗　麯十斤用上汁二十浸二日　白糯米一石淘

蒸攤入汁麯拌勻內甕中常法取酒服

脚氣發心膈悶宜此方

取新磚二塊　中心鑿孔如毬子大勿令透過將火燒紅

用醋潑之便入川椒于孔內以物蓋著溫幾以脚踏

磚上立愈

麻黃熨足方　久蘊風熱足多令麻痹痛難行夜常轉筋

如風所吹皆脚氣之症

麻黃炒二斤令極熱以帛包貯熨二足勿透氣良久脚

上有汗候麻黃溫不用却着棉襪無令風吹如此數

次永除病本

芥子膏　風溼脚氣腫痛無力

白芥子　蓖麻　木別　芸苔子　白膠香一兩

胡桃五枚　搗千杵成膏如彈子大塗患處

黑豆煎　脚氣

黑豆五升　桑皮五兩水三升同豆煮汁　羌活　蒺藜　吳萸

海桐皮五錢　共末入汁煎行酒下

聖濟總錄纂要卷八終

聖濟總録纂要卷之九

程　林雲來　纂
黃吉士庶常
新安　方顯晉安止　較
江　湘鄂上　閱

膈氣門

五種膈氣　膈氣咽喉噎塞　膈氣嘔逆不下飲食　膈氣痰結

膈氣統論

論曰胸中者氣之府呼吸升降之道也陰陽升降順理則氣道通利胸中乃治喜怒寒熱不調則氣聚于胸而爲膈氣人膈氣有五憂膈恚膈氣膈寒膈熱膈是也憂膈之病胷中氣結煩悶津液不通飲食不下羸瘦無力恚膈之病心下苦實嘔輒噫醋心食不消心下痞澀積結在于胸中大小便不利氣膈之病胸脇逆滿咽塞不通惡聞食臭寒膈之病心腹脹滿咳逆膈上苦冷脾腹常鳴食不生肌熱膈之病臟有熱氣五心中熱肉爛生瘡骨煩四肢重脣口乾燥身體頭面手足或熱腰背疼痛胸痺引背水穀不消

不能多食羸瘦少氣此五膈爲病之症也人之和氣一有憂思恚怒寒熱飲食悉皆傷之致陰陽不和臟腑生病氣痞于胸膈之間故曰膈氣諸方之論不一又有十膈症各不同其發之原不越于此也

五種膈氣

論曰人之胸膈升降出入無所凝滯命曰平人若寒溫失節憂恚不時飲食乖宜思慮不已則陰陽拒膈胸脘痞塞故名膈氣曰憂曰恚曰氣曰寒曰熱五種雖殊其爲膈病則一

建中丸　治男女五種膈氣及一切氣不思食

白豆蔻　胡椒　甘草　陳皮　高良薑　蘹香子各一兩　紅豆蔻　人參　川芎　蒟醬　黑乾薑　藿香葉五錢　共末入蜜杵丸芡實大酒下二丸薑湯下亦可

備急沉香散　治霍亂吐瀉氣逆結胸膈氣刺痛不思食

沉香　丁香　京三稜　黑乾薑　蓬莪茂五錢
肉豆蔻　人參　木香　赤茯苓　藿香葉　桂心一兩
高良薑　甘草　胡椒一分　共末用鹽點茶下二錢

五膈丸　治五種膈氣噎塞胸中滿悶不下食
白朮　木香　陳皮去白炒　訶勒皮　桃仁去皮尖炒
昆布洗去鹹一分　桂心　大黃　半夏湯洗炒　枳實麩炒
檳榔煨微　琥珀一兩研　共末入蜜杵丸如梧子大薑棗
湯下三十丸
人參白朮湯　治膈氣咽塞憂結不散
人參　白朮　甘草　京三稜　訶勒皮　陳皮去白炒
木香　桂心　檳榔　草豆蔻　赤茯苓　枳殼炒五錢
生薑水煎三錢溫服日二

人參丸　治膈氣咽喉噎塞不下食
人參　檳榔　紫朴薑汁炒　枇杷葉一兩　半夏薑炒五錢
共末糊丸如梧子大薑湯下二三十丸日二
導氣散　治膈氣咽塞不下
虎頭骨　人參　紫朴　羚羊角　蓽撥一兩　共末飲
下一錢
昆布丸　治膈氣噎塞不下食
昆布洗淨燒灰一兩　搗杵頭細糠一合　共研用老牛涎一合
生栝蔞汁一合慢煎入蜜攪成膏與末杵丸芡實大
每用一丸含化嚥下

膈氣嘔逆不下食

論曰膈氣嘔逆不下食者由胃氣不足風熱乘之或憂恚
氣結不得宣通故令膈脘痞滿氣塞胸中縱能食而卒不
下或入胃中多致不消與留飲相擊則變為嘔逆也
丁香丸　治膈氣嘔逆不下食壅悶惡心
丁香二十一枚　木瓜　木香一兩　檳榔一枚微煨　肉豆蔻一枚
青皮去白炒七枚　半夏薑炒一分　共末入蜜杵丸梧子大薑
湯下廿丸

人參赤茯丸　治膈氣嘔逆不下食或憂恚氣不宣通
人參　赤茯苓　細辛　白芍藥　枳殼去白炒　黑乾
薑　桂心　炙甘草一兩　檳榔　訶勒皮半兩　共末入
蜜杵丸如梧子大用酒下二十丸　如覺有物在喉
中即丸三五丸如彈子大津嚥含化一丸
五膈丸　治胃氣素弱因于憂恚膈氣虛弱嘔逆不思飲
食
人參一兩　附子　川椒　細辛　遠志　乾薑五錢
炙甘草　麥冬　桂心二錢　共末入蜜杵丸如彈子大

食後含化一丸津液嚥下覺胸中氣逆卯服一丸日
三

膈氣痰結

論曰膈氣痰結者謂結痰在胸膈之上喉間噎塞咳唾稠濁氣滿胸中妨害飲食蓋緣脾肺久虛氣道痞澀不能升降水飲停結聚而爲痰久不差則變虛弱上喘之病

木香丸　治膈氣痰結嘔吐酸水

廣木香　青皮　白朮　桂心　益智仁　肉豆蔻煨一兩　吳茱萸　細辛　黑乾薑五錢　共末用酒煮陳米

糊丸如小豆大生薑湯下十五丸至二十丸日二

抄紅散　治膈氣痰結嘔逆吐食

紅麴炒　人參　丁香　白茯　藿香五錢　共末飲下二錢日二

五膈丸　治膈痰結胸中不利

赤茯苓　陳皮　桑白皮　紫蘇一兩　檳榔煨八枚　紫朴薑炒一兩　生薑焙二兩　旋復花一兩半　共末入蜜杵丸如梧桐子大飲下二三十丸

嘔吐門

嘔吐　乾嘔

嘔吐統論

論曰人之陰陽升降三焦調順脾胃和勻乃能腐熟水穀變化糟粕傳瀉行導下走腸間若脾胃虛冷水穀不化則陰陽痞膈三焦不調濁陰之氣不能下行冲奔于上故發爲嘔吐然吐逆之病有得之于膈實者有生于中滿者有發于下焦者種種不同悉本于胃氣逆則嘔吐蓋胃者水穀之海三焦者乃水穀之道路胃氣宣通則上焦如霧中焦如漚下焦如瀆命曰平人若胃氣虛弱水穀運化停滯

三焦格拒升降不勻其氣虛滿得食則嘔而又有朝食暮吐暮食朝吐者有食巳即吐者有嘔吐穀不得前者有但嘔而無所出者有先嘔却渴者有先渴却嘔者有嘔家本渴而反不渴者治求其本各有不同假令內格拒逆食不得入是有火也病嘔而吐食久反出是無火也舉此二者乃知嘔吐之名則一而治藥之法各興雖治有冷熱有虛實之別要在安胃氣爲本使陰陽升降呼吸平均嘔吐之病順而愈矣

嘔吐

論曰嘔吐者胃氣上而不下也譬之空瓶小口傾溉不入乃升氣所礙人病嘔吐其理如此蓋脾胃氣弱風冷干動使胃飲停積飲食不化胃氣虛脹心下淡淡其氣上逆故令嘔吐也

厚朴丸　治脾胃虛寒痰盛嘔吐

紫朴去皮一斤薑汁炒　半夏半斤　生薑三斤取汁又入水二升搗紋汁　將汁合朴拌共入砂鍋內慢火煮乾爲末棗肉丸如梧子大酒下二十丸

藿香散　治脾胃虛寒痰盛嘔吐不止飲食不化

藿香　紫朴一兩　桂心　炙甘草五錢　青皮三分去白炒

枇杷葉一分去毛炙　乾薑半兩　薑棗水煎三錢服

七寶湯　治脾胃虛冷嘔吐痰涎胸膈痞悶不思食

人參　白茯　甘草一兩　大腹皮全用　半夏二兩麴製

草豆蔻四枚煨　訶勒皮五枚　薑棗水煎三錢服

濟急丸　治脾胃虛寒痰飲留滯嘔吐不止

附子大者一枚剜空　丁香四十九枚入附子孔內封　以薑自然汁浸附子於器中重湯煮乾爲末每服一錢津液嚥下

和胃湯　治食飲不下嘔逆痰水兩目虛脹

人參二兩　赤茯苓半兩　半夏　茅草根一兩　木通

青竹茹三分　甘草五錢　薑棗水煎三錢空心服

人參半夏丸　治嘔吐不下食頭痛

人參　半夏湯泡七次薑汁製二兩　前胡一兩　鉛丹五錢水飛過

共末蒸大棗去皮核杵成丸如梧桐子大空心薑湯下二十丸晚再服

乾嘔

論曰嘔而欲吐吐而無所出故名乾嘔此由陰陽不和胃中虛弱氣逆上行不能下降故有乾嘔之症

麝香平氣丸　治胃氣虛弱乾嘔心胸痞悶痰逆惡心吞酸噫食腹脇疼痛和脾胃進飲食辟除邪氣

麝香　木香　沉香　肉豆蔻　乳香生薑汁煮研成膏

丁香　丹砂　桂心　紫朴薑汁炒　半夏薑汁製　檳榔一兩

共末入膏糊丸如梧子大空心飲下二十丸

四倍散　治胃氣不和乾嘔惡心

訶梨勒一兩煨取皮　人參二兩　白茯四兩　白朮陳土炒入飯上蒸兩

共末鹽湯調二錢或薑棗水煎服之大補虛損

安中散　治乾嘔

小麥四兩炒 甘草炙 陳麯五錢 乾薑一兩炒

右爲末空心棗湯下二錢日二除邪熱和胃氣進飲食

桂苓湯 治乾嘔煩悶不下食

桂心 人參 白朮 乾薑五錢 砂仁 紫朴一兩

陳皮 甘草二分 薑棗粟米水煎三錢服

和安湯 治胃氣上逆乾嘔不止

陳皮一兩去白炒 甘草二兩炙 乾薑五錢炒

薑水煎三錢空心服

參粟湯 治乾嘔不下食

人參一兩 半夏湯泡七次四兩 生薑五大片 陳粟米二兩

右入碢慢炒搗爲粗末薑棗水煎三錢空心服

胡椒湯 治胃氣上逆乾嘔煩悶

胡椒二十一粒 木香二錢 熟糯米一合

右炒熟分三服水煎空心下

痰飲門

痰癖 支飲 留飲

痰飲統論

論曰人之有形藉水飲以滋養水之所化憑氣脈以宣流蓋三焦者水穀之道路氣之所終始也若三焦調適氣脈平均則能宣通水液行入于經化而爲血灌溉周身設三焦氣澀脈道閉塞則水飲停滯不得宣行因之聚成痰飲爲病多端古方論痰飲有四痰飲懸飲溢飲支飲是也若其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲水流脇下咳唾引痛謂之懸飲飲水流行歸于四肢當汗出而不汗體身疼重謂之溢飲其人咳逆短氣倚息不得卧其形如腫謂之支飲此飲疾之大概也然又有五飲及水在五臟病各立名不同與夫聚而不散日流飲癖于脇肋下日癖

飲流移不定日流飲沉伏于內日伏飲因酒多而成名日酒癖因寒多所致即日冷痰因熱邪所傷即日熱痰病雖多端悉由三焦不調氣道否澀而生病焉是以氣行即水行氣滯即水滯故知飲之爲病在人最多善治者以宣通其氣脈爲先則水飲無所凝滯所以治痰飲者當以溫藥和之蓋人之氣血得溫暖則宣流也及結而成堅癖則兼以消痰破飲之劑攻之堅癖自消痰飲自愈

痰癖

論曰痰癖之病由三焦氣不升降水飲停滯留于脇下寒

氣乘之則令脇肋堅脹按之瀝瀝有聲有時而痛妨害飲
食久不施治令人肢體羸瘦謂之痰癖

枳殼丸　治痰癖脇肋刺痛匀氣寬膈

枳殼　人參　五味子　柴胡(五錢)　甘草　石斛
訶梨勒(兩)　共末蜜丸如梧子大飲下三十丸

消飲白术丸　治痰癖及飲酒停痰積聚不利嘔吐目昏
耳聾腸中水聲

白术　半夏(薑汁搗餅炙乾二兩)　枳殼(去瓤炒兩)　乾薑(炒二兩)
共末蜜丸如梧子大空心飲下三十丸

支飲

論曰水飲停積胸膈不能消化支乘于心故名支飲其狀
令人心下築悸咳逆喘息飲食不下身體虛浮形如水腫
是也

參茯丸　治支飲不消胸膈滿悶

人參　赤茯　膽南星(二分)　半夏　生薑　胡椒(一兩)
將生薑南星半夏搗成餅慢炙黃與藥共末糊丸如
梧子大薑湯下二十丸

甜葶藶丸　治支飲氣喘不得息

甜葶藶(微炒)　木香　半夏(薑汁製)　共末薑汁糊丸如
梧子大空心薑棗湯下二十丸

檳榔丸　治支飲胸膈否滿悶

檳榔　肉豆蔻(麵包煨五錢)　半夏(薑汁製)　青皮(去白炒)
乾薑(炒黑一兩)　共末薑汁糊為丸如小豆大薑湯下五丸
以差為度

留飲

論曰留飲之病得于三焦壅否氣脉凝澀致飲水不消留
聚胸膈之間令人否滿短氣脅下脹滿喜渴數飲是其候
也

赤茯湯　治膈間留飲嘔逆頭眩短氣多渴

赤茯　柴胡　白术　枳殼　檳榔(一兩)　杏仁
半夏(三分)　人參　旋覆花(五錢)　薑水煎三錢空心服

半夏湯　治留飲不除胸中痰冷

半夏(五兩)　人參　附子　桂心　甘草　赤茯(二兩)
白术(三兩)　薑水煎三錢空心服日二

枳實湯　治留飲不消心下否堅時復作痛

枳實(麩炒二兩)　白术(土炒三兩)　桂心(一兩)

薑水煎三錢空心服日二

沉香茯苓丸　治留飲

沉香一兩　白茯苓　半夏薑汁製　人參去蘆　丁香二兩　甘草　陳皮去白　肉豆蔻煨　檳榔五錢　共末蜜丸如梧子大薑湯下二十丸溫脾胃利胸膈和氣血

蓽撥煮散　治留飲食癖

蓽撥　炙甘草　大腹皮　丁香　訶梨勒　乾薑炒五錢　白朮　草豆蔻　陳皮去白炒一兩　桂心三分

共末薑水煎三錢服

痰飲門

冷痰　熱痰　膈痰結實　膈痰頭痛

冷痰

論曰氣爲陽陽不足者不能消爍水飲遏脾氣虛弱氣道否膈則聚飲而成痰浸漬腸胃上爲嘔逆吞酸下爲洞泄寒中久不已則令人消瘦倚息短氣妨害飲食昔人治痰飲多以溫藥和之爲此故也

半夏湯　治冷痰癖飲胃脘否滿煩逆不止

半夏湯泡七次薑製二兩　人參　白朮　附子　甘草　赤茯　桂心二兩　薑水煎三錢服日二

吳茱萸湯　治胸中寒痰心下煩滿欲吐不下食

吳茱萸洗炒　人參　半夏薑汁炒　桂心二兩　甘草一兩

薑棗水煎三錢空心溫服日二

半夏湯　治胃中冷痰嘔逆消食溫胃止逆

半夏　杏仁　陳皮二兩　桂心　甘草一兩　木香　乾薑五錢　薑水煎三錢空心溫服

吳茱萸湯　治胃中冷痰吐酸水胸中不快

吳茱萸湯洗炒　附子　半夏薑汁炒二兩

用薑水煎三錢空心溫服

丁香半夏丸　治胃中冷痰利胸膈和脾胃進飲食

丁香一兩　半夏薑汁炒二兩　人參　木香　藿香五錢　肉豆蔻煨二枚　陳皮五錢

共末薑汁糊爲丸薑湯下二十丸

法製半夏　治冷痰利胸膈一切諸痰並治

半夏八兩湯泡酒浸一日　白礬四兩　丁香皮　草豆蔻三兩

仝入酒浸春夏七日秋冬十五日取夏洗過焙乾每嚼五六粒茶酒任下

熱痰

論曰熱痰者由氣滯壅塞津液不通熱氣與痰水相搏聚而不散若咽喉乾燥或寒或壅頭目昏重咳唾稠濁面目赤熱是其症也

鵝梨煎丸　治熱痰涼心肺利胸膈解毒補元益氣

鵝梨大者二十枚去皮查取汁　皂莢十挺去皮水揉取汁　懷生地黃八兩水搗取汁　薄荷生搗取汁　白蜜八兩仝上　人參　白茯苓　木香　肉蓯蓉　白蒺藜炒去刺　牛膝　半夏一兩　雲白朮　羗活三分　檳榔三錢　山藥　青皮去白炒

防風　炙甘草　桔梗三分

共末搗膏爲丸如梧桐子大荆芥湯下二十丸

千金散　治熱痰壅盛胸膈不利

半夏薑汁製　蛤粉五錢　甘草　羗活　凝水石三錢煆過

共末水下三錢空心服以利爲度

丹砂丸　治熱痰壅盛虛煩躁渴

丹砂半兩爲衣　膽南星　枯礬一兩　炙甘草五錢　半夏二兩薑汁製末作糊

共末用薑汁糊爲丸如梧桐子大丹砂爲衣每服薑湯下二十丸

麥冬湯　治胸間熱痰不思食

麥冬　人參　前胡　葛根　犀角一兩　桔梗五錢　蘆根二兩

水煎五錢空心服日二

膈痰結實

論曰膈痰者氣不升降津液否澀水飲之氣聚于膈上久而結實故令氣道奔迫否滿短氣不能眠臥甚者頭目旋運常欲嘔吐是也

金箔丸　治膈痰結實咽喉不利咳嗽喘息

金箔五十片　牛黃　麝香五分　冰片　珍珠無油而白者入豆腐

中水硼砂飛研一錢　丹砂一兩　甘草二兩　馬牙硝一錢

共末蜜丸如芡實大金箔爲衣人參湯或薄荷湯下一丸

半夏丸　治膈痰結實滿悶喘逆化痰

半夏五兩薑汁製　皂莢五挺去皮揉水煮半夏　生薑五兩與半夏搗作餅炙乾

爲末蜜丸如梧子大薑湯下二十丸

犀角湯　治膈痰結實頭目昏運不思食咳嗽煩渴

犀角　人參　片芩　柴胡一分　麥冬　白茯　升麻五錢　甘草半分

煎水煎三錢空心服

膈痰風厥頭痛

論曰膈痰風厥頭痛者謂膈上有痰氣不下行復感風寒因之風痰相結其氣厥逆上攻于頭故令頭痛亦有數哉不已連額痛者蓋風寒在于骨髓故也

玉露丸　治風痰氣厥攻擊頭痛胸膈不利嘔逆少食

半夏薑製炙搗　白附子　膽南星二兩　氷片一分　枯礬三分

共末薑汁糊爲丸如小豆大薑湯下二十九

菊花散　治風痰氣厥頭疼昏眩

甘菊一兩　防風五錢　白附子　枳殼三分　甘草一分

共末空心茶下二錢

犀角半夏丸　治風痰攻冲頭痛

犀角　半夏　木香　桔梗二兩　人參　天麻一兩

檳榔煨　青皮去白炒三兩　丹砂飛過一兩

共末薑汁糊爲丸如小豆大空心薑湯下二十丸

此藥能利咽膈和胃進飲食去風痰

金箔犀角丸　治風痰氣厥攻擊頭痛痰逆惡心

金箔　犀角　膽南星　枯礬一兩　丹砂飛過一兩

丁香　木片　麝香一分　天麻五錢　半夏生薑製二兩

共末用大棗肉爲丸如梧桐子大空心薑湯下二十丸能逐風墜化痰涎

川芎湯　治胸膈風痰氣厥上攻頭痛嘔吐痰飲

川芎　獨活　防風　細辛　藁本　旋復花

蔓荊子一兩　石羔　甘草　荊芥穗五錢

每薑木煎三錢服

前胡飲　治痰嘔逆頭目不利

前胡　赤茯　人參　陳皮去白炒　枇杷葉去毛炙

旋復花　半夏一兩　薑木煎三錢空心服日二

消渴門

消渴　消渴煩躁　消渴小便白濁

三消統論

論曰消癉者膏粱之疾也肥甘之過積爲脾癉癉病既成乃爲消中皆單陽無陰邪熱偏勝故也養生之士全其腎氣則其水火互于適平若乃以慾竭其精以氣耗其真所受乎天者既已微矣復飫肥甘或醉醇醪貪餌金石以補益引溫熱以自救使熱氣熏蒸虛陽暴悍腎水燥涸無以上潤于心肺故內外消鑠飲食不能滋榮原其本則一推

其標有之一曰消渴以渴而不利引飲過甚言之二曰消中以不渴而利熱氣內消言之三曰腎消以渴而復利腎燥不能制約言之此久不愈能爲水腫癰疽之病宜慎此者服藥之外當以絕嗜慾淡滋味爲本

消渴

論曰消渴者渴而引飲乃復溲少是也得之五石之氣內燥津液竭氣不化故渴甚而溲少也久之不治則經絡壅澀留于肌肉變爲癰疽腫毒瘡瘍之候

桃紅散　治三消渴病

石膏　鉛丹　赤石脂　白石脂　括樓根一兩

炙甘草五錢　共末空心溫水下二錢日二

沃焦散　治三消渴病飲水無度小便短少

泥鰍魚十條陰乾去頭尾燒灰研　荷葉陰乾研

共研勻用新汲水下三錢日二不思水即止

葛根丸　治消渴日飲水數斗不止

葛根　附子　括樓根　鉛丹炒一兩

共末入蜜杵丸梧子大用葛根湯下二三十丸

神應丸　治消渴津液內耗飲水不休溲少

桂府滑石飛過　寒水石研五錢　用雞子一枚取孔去黃將清和末如膏入殼封固外以鹽泥包裹曬乾煨赤以藥細研大人飲下二錢小兒五分

止渴括樓飲　治因好熱麪炙煿及熱藥并乳石三焦氣竭心肺乾熱口乾舌焦飲水無度小便數多心欲狂亂服此急救

括樓一枚要黃熟者去皮用瓤并子　冬瓜中樣大者一枚去蒂入括樓瓤子

用黃土泥裹瓜半指厚陰乾以火燒通赤去泥就熱將瓜爛研絞汁約七八合入蜜二兩和勻稍冷分作三服臟腑熱竭即不思水小便自無如括樓未熟時獨燒冬瓜服之亦妙

生津丸　治消渴疾津液內耗飲水不止溲少

青蛤粉　白滑石飛過一兩　共研勻用黃顙魚涎和丸小豆大陳粟米飲下二三十丸日二

猪脊骨飲　治消渴久不差

雄猪脊骨五寸　炙甘草　黑乾薑半分　大棗肉二十枚

用水三升煎二升發時和滓水不拘時服以差爲度

竹龍散　治消渴引飲不止溲少服之止渴利便

牛膝丸　治消渴下元虛損經久不止
牛膝五兩為末　生地汁五升　以汁浸末夜浸日曬汁盡為度入蜜杵丸梧子大酒下三十丸久服壯筋骨駐顏
色黑鬚髮
蔃魚丸　治消渴飲水不止
生蔃　切片焙乾為末用鯽魚膽汁和丸梧子大米飲下七丸至十丸
鷄膍胵散　治久渴不差旬日見效
鷄膍胵黃皮　鷄腸五具炙　鹿角膠　白龍骨煅

白石脂一兩　桑螵蛸二十枚炙　土瓜根三兩　川黃連
牡蠣童便淬　苦參二兩半　漏蘆炙一兩
共末空心飲下二錢日二
黃連牛乳丸　治消渴
川連一斤去鬚　麥冬兩　牛乳　生地汁　生藕汁四兩
二味共末用乳汁煎沸杵丸梧子大空心飲下二三十丸日二
竹葉湯　治消渴飲水不輟多至數斗
甘竹葉切　大麻仁炒　赤秫米各一升　鹿蹄四隻湯泡去皮

五靈脂醋化濾去沙石　黑豆五錢　共末用冬瓜湯下二錢無瓜時用藥與子煎湯日二小可渴只用一服差差後不可服熱惟宜服八味丸仍用五味子代附子
八味丸　治消渴愈後服發時服之俱妙
懷熟地四兩　山藥　山萸肉　白茯苓　牡丹皮二兩
澤瀉　五味子　桂心一兩
共末入蜜杵丸梧子大鹽湯下二三十丸
甘露散　治消渴飲水不止
豬胞十枚燒者　剪破洗淨以火燒烟止研末空心酒下一二錢日二

生津液梅蘇丸　治消渴膈熱煩躁
白烏梅　紫蘇　烏梅肉五錢　人參一分　炙甘草一兩半
訶勒皮一兩　百藥煎三兩　麥冬三分　共末用黃蠟汁和丸芡實大津化一丸嚥下　暑月行路止渴甚妙
人參煎方　治消渴
人參一兩　葛根二兩　共末發時用燖豬湯一升入末三錢蜜二兩慢煎取汁三合白磁如餳收貯夜飯後含化一匙津下重者不過三服

毛骨細研 白茯苓一兩 薤白切二兩

共分八服先以水三鍾煎麻仁竹葉取汁入藥煎一

鍾微微飲之渴止爲度

消渴煩躁

論曰消渴煩躁者陽氣不藏津液內燥故令煩渴而引飲

且躁也內經謂諸躁狂越皆屬于火蓋以心腎氣衰水火

不相濟故也

蘆根湯 治消渴心脾中熱煩燥不止下焦虛冷小便多

羸瘦

蘆根一斤 括樓根 牡蠣煅粉 黃芪二兩 知母三兩

生麥冬六兩 水煎三錢空心溫服日二

翠碧丸 治煩渴不止咽乾躁熱昏悶

青黛 麥冬 葛根 懷生地二兩 括樓根三分 寒水

石煅二兩 膽星 知母五錢 共末用陳米糊丸梧子大

金箔爲衣煎人參竹葉湯下十五丸至二十丸日二

天冬煎方 治消渴煩躁引飲無度驚悸不安

生天冬去心半斤 白蜜五兩煉

用水五鍾煎天冬至三鍾以汲水淘數次別以熱水

一鍾入蜜攪勻浸天冬五日每食後食天冬一兩差

白茅根飲 治丹石并熱藥發動毒氣不宜心肺躁熱煩

渴飲水不止旋作小便久之即爲癰疽腫毒

白茅根 麥冬半兩 白茯苓三兩 桑白皮二兩 露蜂房炙黑一兩

共粗末如黍米大水煎四錢淡竹葉十二片大

棗二枚溫服日二

消渴小便白濁

論曰消渴飲水過多久則滲漏脂膏脫耗精液下流胞中

與水液渾濁隨其所之與小便利下凝脂故謂之消渴小

便白濁也

腎瀝湯 治消渴小便白濁如脂

白羊腎一對去脂膜切 五味 杜仲 生薑 黃芪半兩

懷生地一兩 人參五錢 大棗五枚 磁石三兩打碎洗去黃水綿裹煎

藥分二劑先以水四升煎腎與磁石二升入藥再煎

入合去滓分二服

山茱萸丸 治消渴飲水極多肌體瘦弱小便如米泔脹

膝冷痛諸方不能治者

山萸肉 括樓根 苦參 土瓜根 龍骨研半兩

川連三兩 共末用生括樓汁搗丸梧子大飲下二三十丸日二

川連丸 治消渴飲水不知休小便如脂舌乾口渴

川連 括樓根五兩

共末用生地汁搗丸梧子大牛乳下三十丸

肉蓯蓉丸 治消渴下焦冷小便如脂油

肉蓯蓉 丹皮 川歸 五味子 巴戟天 地骨皮

白龍骨 韭子 甘草 懷熟地 澤瀉一兩 磁石二兩醋淬七次

赤石脂 人參半兩 白朮 禹餘根煅三分 桑螵蛸炙四枚

共末入蜜杵丸梧子大牛膝湯下二三十丸日二

久渴 消渴後成水 消渴後成癰疽

消中 消腎

久渴

論曰消渴之病本於腎氣不足下焦虛熱若病久不愈者邪熱蘊積榮衛滯澀精血衰微病多傳變宜知慎忌凡忌有三一飲酒二房室三鹹食及椒麪炙煿又消渴病經百日以上者當忌針刺若妄針灸則瘡上漏水變成癰疽矣

腎瀝湯 治久消渴飲水不絕

遠志 赤茯 人參 川歸 龍骨 澤瀉 懷熟地

川芎 片芩 桂心二兩 五味三分 麥冬二兩半 羊腎一對

用水三鍾煮羊腎取汁煎藥五錢入薑棗溫服日二

升麻黃芩丸 治久渴不止

升麻 片芩 麥冬五兩 人參 生地三兩 苦參八兩

括樓根七兩 川連 川栢五兩

共末用牛乳和丸梧子大飲下三四十丸

消渴後成水

論曰脾土也土氣弱則不能制水消渴飲水過多脾土受濕而不能有所制則泛溢妄行于皮膚肌肉之間聚為浮腫脹滿而成水也

瞿麥穗湯 治消渴欲成水氣面目膝脛浮腫小便不利

瞿麥穗 澤瀉 滑石飛過五錢 子芩 大黃炒一分

桑螵蛸炒十四枚 防巳三分 水煎三錢溫服頃又服

赤茯苓湯 治消渴後頭面腳膝浮腫胃氣虛弱不能下食心胸不利或時吐逆

赤茯 人參 白朮 前胡 紫蘇一兩 陳皮 檳榔

木香 桂心三分 甘草五錢 薑棗水煎三錢服

消渴後成癰疽

論曰消渴則隨飲而出皆作小便由少服乳石所致久則榮衛損傷精血不足肌膚減耗石氣獨熾隨附經絡津液内竭經絡凝澀榮衛不行熱氣留滯故變爲癰疽此當精窮治法恐毒氣不出穿通臟腑也服熱毒助陽藥日一治

玄參散 治渴利後經絡痞澀榮衛留滯壅熱結成癰疽

玄參 犀角 木香 沉香 芒硝 黃芪 羚羊角一兩 甘草三分 共末空心溫水下二錢日二

磁石散 治消渴後經絡壅熱結成癰疽

磁石引鐵者醋淬二十次一兩研 生地 黃芪 地骨皮三分

檳榔 五味子 桂心 枳殼五錢

共末溫水下三錢日二

石膏湯 治消渴後成癰疽

石膏 知母兩半 括樓根生去皮半斤搗取汁如無以乾者四兩代之

犀角一兩 升麻二分 土瓜根生去皮半斤搗取汁如無以乾者四兩代之

水煎藥三錢入小麥少許去滓入二汁各半合溫服日二

桑白皮湯 治消渴後心肺氣獨盛結成癰疽

桑根白皮東引者蜜炙半斤

用水煎三錢空心溫服日二以差爲度

消中

論曰消中者不渴而多溲一名内消以邪熱薰鑠五臟然後外及肌肉形體也得之少年餌石房室太甚真氣耗憊石氣孤立結于腎則腎實腎實則消水漿故不渴而小便利多不得潤養五臟使所食之物皆消爲小便治宜滋腎水養津液則差

天冬丸 治初得消中食已如飢手足煩熱背疼悶小便白濁

天冬去心二兩半 雞內金三具微炙 知母 土瓜根 五味子微炒兩半 桑螵蛸十枚炙 鹿茸去毛酥炙 澤瀉 赤石脂兩半 牡蠣童便淬兩 苦參一兩

共末入蜜杵丸梧子大飲下二十丸

薺苨湯 治内消所食物皆化作小便兼治強中

薺苨 大豆 人參 白茯 石膏 葛根 括樓根 子芩 甘草 知母 磁石煆淬二兩 水煎五錢溫服日二

牡蠣丸　治消中食已即飢手足煩熱背脚疼悶小便稠濁

牡蠣（醋淬）　赤石脂　括樓根　肉蓯蓉（一兩）　知母　澤瀉（去毛）　天門冬　土瓜根　桑螵蛸（炙）　五味子

鹿茸　川連　子芩（三分）　懷熟地（一兩半）

共末入蜜杵丸梧子大飲下三十丸日二

猪肚黃連丸　凡消渴變爲消中者飲食到胃腑即時消化小便多而色白飲食逾人而不覺飽者是爲消中

雄猪肚一枚（洗去脂膜）　川連（去蘆五兩爲末）　以大麻子仁二合研

水四升調如杏酪汁煮肚候爛入連末密縫蒸極爛乘熱擣丸梧子大暴乾飲下三四十丸臨臥再服

肉蓯蓉丸　治消中與氣耗憊小便無度

肉蓯蓉（一兩）　人參　五味子　巴戟天　炙甘草　括樓根　地骨皮　丹皮　澤瀉　懷熟地　韭菜子（炙三兩）　桑螵蛸（十枚）　禹餘糧（燒紅醋淬二七次）　龍骨　赤石脂　磁石（醋淬二七次兩半）

共末入蜜杵丸梧子大牛乳汁下三十丸

消腎

消曰消腎者由少服石藥房室過多精血虛竭石勢孤立腎水燥涸渴引水漿下輸膀胱小便利多腿脛消瘦細小小便數或赤似血色骨節痠疼故名曰消腎

地黃湯　治消腎腿脛消瘦細小小便數似血色臟腑虛冷

懷熟地　麥冬（二兩）　桂心　炙甘草　川續斷　白蒺黎（炒五錢）　黑乾薑（一兩）　水煎三錢溫服日二

山茱萸丸　治消腎自腰以下瘦弱無力小便數不禁

山萸肉　牛膝　桂心　韭菜子（炒一兩）　黃芪（蜜炙）　肉蓯蓉（酒洗）　杜仲（鹽酒炒斷絲兩半）

共末入蜜杵丸梧子大黃芪湯下二十丸日二

人參鹿茸丸　治消腎肢體瘦弱無力小便數

人參　黃芪（蜜炙三分）　鹿茸（一兩）　括樓根　桑螵蛸（炙一兩）　兎絲子（酒煮兩半）　杜仲（鹽酒炒）　山萸肉（三分）　雞䏶胵黃皮（炙四枚）

共末入蜜杵丸梧子大棗肉湯下三四十丸日二

磁石湯　治消腎小便白濁如凝脂形體消瘦

磁石（六兩擣如米粒分作二十貼煎用絹包入同煎）　黃芪（炙）　杜仲（鹽酒炒）　人參（兩半）　懷熟地（二兩）

水三鍾先煮羊腎一對切片煮取汁二鍾入磁石一

分再煎鍾半用汁煎藥四錢服日二

金銀箔丸　治消腎口乾眼澀陰痿手足煩疼小便多

金箔　銀箔一百片　葛根　白茯苓　懷生地三兩

肉蓯蓉　天冬　麥冬二兩半　川連四兩　括樓根

丹砂二兩飛　黑乾薑　五味　巴戟天　澤瀉一兩半

共末入蜜杵丸梧子大丹砂爲衣空心飲下二十丸日二

人參附子湯　治消腎飲水無度腿膝瘦細小便白濁不差

人參　附子　青黛五錢

水煎楮葉二片取汁煎二錢溫服日二

聖濟總錄纂要卷之十

程　林雲來　纂
新安　方一燧宏度
方順德公茂　較
江　湘郢上　閱

水病門

水腫　十水　風水　石水　大腹水腫

論曰內經謂腎者胃之關也關門不利故聚水以從類上下溢于皮膚而爲胕腫胕腫者聚水而生病也其狀目窠上微腫若新臥起然頸脉微動時作咳嗽股冷膚腫口苦舌乾不得正偃正偃則咳清水不得臥臥則驚而咳甚則

小便黃澁以手按腫處隨手而起如裹水之狀是也以脉別之脉沉者水病也洪大者可治微細者難治水病有不可治者五唇黑傷肝一也缺盆平傷心二也臍出傷脾三也足下平滿傷腎四也背平傷肺五也蓋脾腎氣虛三焦閉塞至陰之氣內蓄戶陽之氣不得宣通如是則水道不利飲濕攻脾散于肌肉而爲水腫之病矣

水腫

論曰水腫之病以脾胃氣虛不能制水水溢妄行溢于皮膚其証股冷膚腫將作咳嗽不得安臥小便黃澁以手按腫處隨手而起是也

妙香散 治一切水氣四肢腫滿

烏藥生 青皮 良薑 蘹香子一兩

水煎三錢溫服

煖腎散 全前

巴戟天 甘遂炒一分 木香 葶藶 沉香一分

陳皮 芫花醋炒 麥蘖五錢 膩粉一錢 澤瀉一分

檳榔二枚一生一熟 共末用猪腰切滲末二錢紙包煨先食粟米葱粥半碗吃腰又食粥臨臥服至五更大小便下赤黃惡物愈

大黃湯 治水腫腹滿

大黃醋炒 桑白皮二兩 人參 甘草

桂心 細辛一兩 水煎五錢入棗二枚去滓入白餳一匙沸服日三利小便三五升差

檳榔丸 治水腫

檳榔炙炮 附子 防巳 紫朴 吳萸

乾薑 葶藶炒紫 杏仁 甘草 椒目 赤茯

栝蔞仁 海藻 麻黃去根節 白朮 黃芪

桂心半兩 共末蜜丸梧子大飲下二十丸二便利爲効

十水

論曰十水之病腫從脚起上氣而咳名爲白水其根在肺腫從面目起名爲清水其根在肝腫從腹內起名爲黃水其根在脾腫從脚趺起名爲黑水其根在腎腫從心起名爲赤水其根在心腫從腹起名爲氣水乍實乍虛乍去乍來其根在大腸腫從頭面起至足名爲垂水其根在膽腫

從內起堅塊四肢小腫名爲石水其根在膀胱腫從四肢起腹大名爲風水其根在胃腫從腹內起名爲裏水其根在小腹凡此十水生于臟腑各從其根究其所本則肺與腎而已故內經云其根在腎其本在肺皆積水也又曰津液充郭其魄獨居精孤于內氣耗于外形不可與衣相保益腎氣虛弱水氣脹滿上攻于肺肺氣孤危腎爲水害子不救母故陰精損于內陽氣耗于外三焦不瀉水道不通水滿皮膚身體痞腫治之之法備見內經故曰平治於權衡去菀陳莝微動四極溫衣繆刺其處以復其形開鬼門

潔淨府積以時服五陽已布疏滌五臟則精自生形自盛
骨肉相保巨氣乃平

賜名神助散　舊名浮腫散　治十種水病百方不愈面
目四肢俱腫氣息喘急眠臥不安小便赤澀腹脹氣
悶水不入口垂命欲絕者

椒目二兩微炒　豬苓　澤瀉各四兩　牽牛五兩炒香　葶藶六兩炒

共末蔥木煎三錢入蔥白三莖酒半鍾稍熱下良
久喫蔥白粥一碗酒一鍾面東熱喫至子後二便通
利喘定腫減間日再服百日盡消

補藥木香丸　取下水氣

木香　青皮各一錢　莪朮二錢

共末糊丸梧子大湯下十丸

靈保丸　治十水

滑石二兩　膩粉一兩　共研木瓜汁丸小豆大五更飲下
七丸日只一服服七日覺臍腹攪痛小便多爲効忌
鹽百日覺効便服補脾胃藥

再蘇丸　治十種水氣大通三焦此方仙經所載天台山
金壇石室中鐫記但令人忌口無不差者

大戟炒　甘遂炒　桂心　乾薑　春大麥麪炒

巴豆去油麪炒　大黃炒

共末蜜丸小豆大茶下十丸取利爲度

桑白皮飲　治氣水面目浮腫胸滿短氣小便不利

桑白皮　赤芍　郁李仁　百合半兩　木通二兩

大腹皮五枚　水煎五錢空心溫服日二

風水

論曰內經云腎者北藏也腎主水故人勇而勞甚則腎汗
出腎汗既出復感于風內不得入于臟腑外不得出于皮
膚客於玄府行于皮裏傳爲胕腫本之于腎名爲風水其
脉自浮其外症骨節疼痛而惡風且身腫如裹水之狀頸
脉動時咳者是也金匱方云脉浮而洪浮則爲風洪則爲
氣風氣相搏身體洪腫汗出乃愈惡風者爲風水不惡風
者小便通利上焦有寒其口多涎此爲黃汗二者之症不
可不察

麻黃石羔湯　治風水徧身洪腫骨節疼痛惡風汗出不
仁

麻黃去根節六兩　石羔八兩　白朮三兩　附子一枚　甘草二兩

薑棗水煎服

大豆湯　治風水一身腫滿短氣欲絶

杏仁三兩　防風　白术一兩半　赤茯　防巳　麻黄去根節　甘草二兩　黄芪兩

水煎五錢入大豆酒一合日三利小便愈

防巳湯　治風水脉浮浮爲在表其人或頭面汗出而表無他病但腰巳下腫

防巳　白术二兩　甘草一兩　黄芪二兩半　薑棗水煎三錢空心温服日二如　喘加麻黄去根節　身重胃中

不和加桂心　心下久寒加細辛毎服藥取汗愈

石水

論日腫從内起堅塊四肢遊腫名爲腎水其根在膀胱蓋腎主水與膀胱膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣今腎水則膀胱氣弱膀胱氣弱則不能化氣而隱滯不能行水液停結于臍腹間故其症胸腹鼓滿按之如石臍下脹痛其脉沉遲身體發熱四肢頭面皆腫也

桑白皮湯　治膀胱石水四肢瘦

桑皮二兩　白术　射干　赤茯　猪苓二兩　澤瀉炒

澤瀉炒　防巳一兩　水煮大豆半合取汁煎三錢温服日二

椿白皮湯　治石水四肢細瘦獨腹腫大狀如懷孕心中妨滿食卽氣逆

椿皮　桑皮　防巳半兩　白术　射干　赤茯一兩

澤瀉炒　大豆炒五錢　水酒合煎三錢温服

杏仁丸　仝

杏仁去皮尖炒　苦瓠去瓤皮炒一兩　共末糊丸梧子大飲下二十丸水出爲度

大腹水腫

論日内經云水病下爲胕腫大腹又日上下溢于皮膚故爲胕腫其症腹大四肢小陰下溼手足逆冷腰痛上氣咳嗽煩疼是也蓋三焦閉塞水道不通流溢皮膚榮衛否澁内連腹膜則至陰内動脹急如鼓得病之本多因大病之後或積虚勞損或新熱食畢入水自漬及浴冷水水氣不散理宜然也

牛黄丸　治大腹水腫氣息不通症候危篤者

牛黄五錢　昆布　牽牛　海藻　桂心一兩　椒目

葶藶炒紫三分
共末蜜丸小豆大飲下十丸小便利爲度
蘇合香丸　治水氣腹大腫
蘇合香　水銀木香煮一伏時後入研　白斂末一兩
共研蜜丸小豆大空心飲下十丸
丹參酒　治久患大腹病其狀四肢細瘦腹大有勞苦則
腔腫滿食則氣急此病服下利藥不差宜用此酒以
散除風溼利小水
丹參　鬼箭羽　白朮土炒兩半　知母　赤茯苓一兩
秦艽七分　猪苓　海藻水洗　獨活　桂心三分
共爲粗末以白酒五升浸五日每服一鍾日三

水腫欬逆上氣　水氣偏身腫滿　水蠱
膜外氣
水腫欬逆上氣
治曰內經謂腎爲水腫肺爲喘呼氣逆不得臥蓋腎主水
肺主氣腎虛不能制水水氣脹滿上乘于肺肺得水而浮
故虛而咳嗽古方有云腫從脚起上氣而欬名曰白水其
病在肺

猪苓防已煎散　水腫上氣
防已　澤漆葉　澤瀉五兩　白朮　丹參　赤茯
桑白皮　陳皮　木通三兩　郁仁五合
水煎五錢入生薑日三小便利爲度
防已湯　水氣欬逆上氣四肢浮腫坐臥不安
防已　甜葶藶炒五錢　木通　桑白皮　赤茯一兩
陳皮二兩　澤漆五錢　郁李仁微炒　百合一合　水煎五錢
鯉魚湯　水腫腹大喘欬胸脅滿不得臥
鯉魚去鱗腸一斤　紫菀　桂三兩　防已　黃芩

硝石研　人參兩　先煮魚取汁五升每二鍾
煎末五錢日三
雌雞湯　胸中喘嗽逆水氣身腫利小便
雌雞一隻白者　白朮　半夏一兩　澤漆二兩　炙甘草半兩
粗搗篩用東流水五升煮雞取汁入藥五錢薑棗赤
小豆煎服日三夜一
澤漆根湯　水在肺令人咳喘上氣腹大脚腫目下如臥
蠶微腫不得臥小便難少而數胸滿隱痛此水氣迫
肺宜利小便

澤漆根生四兩 人參 麥冬 炙甘草 赤茯一兩

鯉魚一尾大一斤水三升煮魚汁煎三錢日三以二便利爲度未利稍增寒加生薑

水氣徧身腫滿

論曰腎主水脾胃主土土尅水胃爲水穀之海其氣虛不能傳化水氣使水氣浸漬水臟又脾得水溼之氣土衰不能制水氣溢歸于腎腎虛三焦不瀉經絡閉塞故水氣溢于皮膚傳流四肢所以通身腫也其候上氣體重小便黃澁腫處按之隨手而起是也

木通湯 徧身腫

木通 苦葫蘆半兩 防巳 澤瀉三分 豬苓 海蛤一兩

酒水煎五錢入葱白溫服當下小便數升腫消

鯉魚湯 水病通身洪腫

鯉魚一斤 澤漆微炒 人參半兩 杏仁炒五錢

共末水三升煮魚以汁煎末三錢日三小便利乃止

海蛤丸 水腫腹滿四肢瘦喘促小便澁妨悶

海蛤研二兩 木香 防巳 厚朴 訶勒皮 旋復花一兩 桂五錢

共末蜜丸梧子大大腹皮湯下二十丸

枳實湯 水氣

枳實去白炒 白朮 升麻 炙甘草 紫菀 知母 桑白皮 赤茯 黃芪 秦艽 麥冬 黃芩等分

葱白水煎三錢

白朮湯 水氣湯腹腸脹滿

白朮 人參 赤茯 炙甘草 水煎五錢服

平補鹿茸丸 水氣平愈體瘦如昔

鹿茸炙 蓯蓉酒洗 地黃 兎絲子酒炒 栢子仁一兩

白茯 黃芪 防風 遠志 車前子 五味子

桂五錢 蜜丸梧子大飲下三四十丸

水蠱

論曰水腫之狀腹膜腫脹皮膚粗黑搖動有聲此由脾胃氣虛溼氣淫溢久不治則害人如蠱之毒故謂之水蠱

大黃湯 水蠱二便不通急脹壅塞

大黃濕炒半兩 麥冬三分 川連 甘遂微炒 茅根一兩

貝母二分 水煎二錢

瞿麥湯 水蠱腹脹滿急小便不通縱有少而黃赤

瞿麥穗 車前 滑石 茅根 甘遂炒 苦參等

水煎二錢日三

分水氣海蛤丸　水蠱腹脹喘欬
海蛤(五錢，煅)　凝水石　滑石(一兩)　膩粉　粉霜(一錢)
白丁香(五十枚)　共末麪和作餅子紙包煨熟為末糊丸
菉豆大酒下二十丸
鼠尾草丸　水蠱
鼠尾草　馬鞭草(各五斤)　水五斗煮二斗取汁再煎成
膏為丸小豆大以輕粉為衣飲下三丸
惡實丸　水蠱身體洪腫
惡實(微炒)　為末糊丸梧子大飲下十丸勿再破

瓠瓤煎　同前
瓠瓤(一枚)　水二升煮一炊去滓煎堪丸即丸小豆大飲
下十丸取小便利後勿飲水作小豆羹食之
楮枝煎　蠱病水腫
楮枝(一斤)　水五升煎半取汁入黑豆末半升煎成頻服
一匙
膜外氣
論曰諸家方書論水病甚詳未嘗有言膜外氣者唐天寶間有徒都子者始著膜外氣方書本末完具自成一家今并編之然究其義本于肺受寒邪傳之腎腎氣虛弱脾土又衰不能制水使水溼氣散溢于皮膚之間氣攻于腹膜之外其病令人虛脹四肢腫滿按之沒指是也
徒都子論病本
膜外氣者或謂之水病起于他疾不可常定或因患瘧或因積勞或因腎臟中風或因肺臟傷冷或因膈上氣或因衝熱遠行或因酒肉中所得如于肺終于腎或因咳嗽或多涕唾或因蓄聚冷氣壅塞不散遂使肺臟邪氣攻心冷氣化為水流溢膀胱在大腸膜外所以切脈不能知針灸

不能及益人腎為命本不可虛也本固枝葉茂本虛即枯槁況四時衰旺皆乘腎臟之氣腎損則五臟皆衰是致胃閉而脾不磨氣結而小便澁輕重之候在大小便耳若小便不通則氣壅攻擊腹內衝出膜外化而為水使人手足頭面浮腫若二便微澁則微腫極澁則極腫二便俱不通三日即徧身洪腫則陰亦腫夫陰腫有二有腫而小便自出者有腫而小便澁者又有莖囊連小腹臍背腫者此並為死候宜速治之若患此腫病亦不常定或先于足面目浮腫或先腰肋微腫或先手足小腫其候或消或甚三五

日稍愈又發亦以小便通澁爲効積漸變成洪腫女人得
之與此略同凡患此疾令人腹脹煩悶胸膈氣急此由肺
脹甚至喘如牛吼坐臥行立不得或中夜逆氣攻心胸重
者一二年方死有一二月死者若將息失度慢食毒物十
日半月即甚也愚醫多以針灸出水爲功又以鯉魚赤小
豆爲藥又令病人飲黄牛尿服商陸根反有所損少有差
者大抵此病尤忌針灸華陀云患水病勿遇良醫第一不
可針灸言氣在膜外已化爲水水由即引出腹中氣水盡
則死有此病疾者宜向陽行坐遇陰雨則愈覺壅滯病中

常須存火服藥後夜臥覺胸膈熱甚宜含紅雪與好茶之
類愼勿飲酒及冷藥茶冷水若渇宜喫五噎湯錄在卷後
尤忌鹽生冷醋滑

江鎭湯　膜外水氣

木通　訶勒皮　防已　赤茯　陳皮一兩

水煎五錢覺熱喫好茶

紫蘇煮散　膜外水氣

紫蘇　防風　白术　桑皮等

共末水煎覺熱去白术加甘草功効如前方　又有

蛇蠱狀如水病相似四肢如故小便不甚澁但腹急
腫而蠱脹不下食凡醫多悞作水氣治之宜只細詳
審

聖濟總錄纂要卷十終

聖濟總錄纂要卷之十一

程　夏允大
新安　程曆冲士喆　較
程量越自遠
程　浚雋人

黃疸門

黃疸　急黃　陰黃　酒疸　穀疸
胃疸　黑疸　女勞疸　黃汗　三十六黃

黃疸統論

論曰疸病症有五種一曰黃疸二曰黃汗三曰穀疸四曰酒疸五曰女勞疸　黃疸者徧身面目悉黃如橘　黃汗者身體黃腫汗出如蘗汁不渴狀如風水　穀疸者食畢頭眩心中怫鬱不安而發黃　酒疸者心中懊痛足脛滿小便黃而發赤斑黃黑由大醉當風入水所致　女勞疸者一身面目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大熱房室過度　此五者症狀雖異大率因酒食過多水穀相並積於脾胃復為風濕所搏熱氣鬱蒸所以發黃為疸　其症食已如飢曰胃疸　額上黑足下熱曰黑疸　其因傷寒時氣後變成黃者緣陽明病無汗小便不利熱瘀在裏心中懊憹身必發黃若被火額上微汗出但小便不利亦發黃其狀如橘色腹微滿此由寒溼不散瘀熱在于脾胃故也　又有九疸三十六黃其症其名悉各不同治皆有法具載後章凡黃病當利其小便疸而渴者其病難治疸而不渴其病可治

黃疸

論曰內經謂目黃者曰黃疸又曰安臥脉盛謂之黃疸其外症身體面目及爪甲小便盡黃其內症食已如饑此由

酒食過度脾胃有熱復為風溼所搏瘀結不散熱氣鬱蒸故發是疾若面色微黃身體或青赤黑色皆見者與純熱之症不同當于溼家求之諸黃疸發于陰部其人必嘔發于陽部其人必振寒而發熱也

茵陳蒿湯　治黃疸目黃小便如血心煩躁口苦頭痛
茵陳蒿　麥冬　山枝仁三分　木通　柴胡　括樓根一兩　炙甘草五錢　水煎五錢入竹葉二七片溫服日二

木通湯　治黃疸脾胃積熱皮肉皆黃煩躁口苦小便赤澀

木通　瞿麥穗一兩　懷生地半兩　大青　赤茯苓
白茅根　秦艽三分　水煎五錢溫服日二
黃連湯　治黃疸面目徧身皆黃小便盡黃
川連　大青　人參　地骨皮　茵陳蒿　山梔仁炒
子芩　柴胡　芒硝一兩　大黃炒二兩
水煎五錢溫服日二
桃根湯　治黃疸面目一身如金色及一切疸病
桃根皮東引者一把如釵股者佳勿見風及雞犬女人　水煎取汁空心頓
服如服中黃色未退將飲酒一杯

白鮮皮散　治一切黃疸面目皮肉如金色小便赤黑口
乾煩渴
白鮮皮二兩　芒硝　大黃三兩　土瓜根　茵陳蒿
栝樓根　白芍　川連　柴胡　山梔半兩　子芩一兩
真珠三十枚燒赤研　大青半兩　共末用白茅根取汁下三錢
取利至曉不利再服服了以葱豉粥投之取利為効
柴胡湯　治黃疸身面黃口渴
柴胡五錢　炙甘草一分　白茅根一把
水煎溫服未差再服

秦艽煮散　治面身目爪甲小便俱黃
秦艽一兩　用牛乳二鍾半煎一鍾半分二服未差再服
茵陳蒿丸　治一切黃疸并小便如金色及身皮皆黃者
茵陳蒿四兩　大黃　片芩　山梔仁三兩　共末入蜜杵
丸梧子大空心飲下二三十丸日二
吳藍飲　治黃疸身瘇發熱汗出而渴汗著衣正黃
吳藍　白芍　麥冬　白鮮皮　山梔仁　桑白皮炙
防巳二兩　水煎五錢溫服日二
急黃

論曰諸發熱心頓定必發為急黃所其卒然發黃心滿氣
喘命在頃刻故名急黃也有初得病身體面目即發黃者
有初不知是黃死後變黃者但先有其症當急治之此由
脾胃有蓄熱及客氣鬱蒸又因熱毒所加故發為斯病也
茵陳蒿湯　治急黃小便赤黃如梔子汁色心中煩悶
茵陳蒿　子芩　山梔仁　川連　大黃微炒　白鮮皮
一兩　貝齒一枚　朴硝研五錢
水煎五錢去滓入朴硝五分沸服日二
茵陳川連湯　治天行急黃身目如金色

茵陳蒿 川連 子芩 大黃炒一兩 人參 炙甘草五錢

水煎五錢空心溫服日二

龍膽草湯 治急黃面目身體如金躁欲飲水

龍膽草一兩 石羔二兩 木通 土瓜根 大黃微炒一兩半

白茅根 朴硝研 犀角一兩 山梔五錢

水煎三錢去滓入朴硝末五分沸服

黑豆煎 治急黃煩熱口乾徧身悉黃

黑豆一升 用水五大鍾煎汁二鍾入生地汁藕汁麥冬汁白蜜各二合酥半合慢煎成膏含化一匙日三夜一

陰黃

論曰陰黃者面黃頭痛不發熱不欲聞人聲音此由陽伏于陰邪氣熱盛沉潛散于肌肉身黃如橘故謂之陰黃若人有言下之後身目發黃者當於寒經中求之此其類也

秦艽湯 治陰黃不欲聞人言語小便不利

秦艽一兩 赤茯苓 炙甘草 旋覆花五錢

用牛乳煎四錢溫服

茵陳蒿散 治陰黃身面如橘色小便不利

茵陳蒿二兩 白朮 豬苓 赤茯苓三分 桂心五錢

澤瀉去毛一兩 共末空心水下二錢日三

半夏湯 治陰黃小便色不變欲自利腹滿而喘者必噦

半夏湯泡七次炒一兩 人參 葛根二兩

生薑水煎四錢溫服日二

赤小豆散 治陰黃

赤小豆 丁香各二十一粒 麝香研一錢 瓜蒂二枚

青橘皮灰二錢 共末熟水下一錢日二以吐爲度又取少許吹鼻中有黃水出効

酒疸

論曰胃虛穀少醉以入房因犯風邪胃中熱毒隨虛入裏小便黃赤溼毒內聚心下懊憹疼痛黃發肌肉則身目發黃或發赤斑足脛浮腫或下之早則變爲黑疸令人心如病饑大便黑與皮膚不仁治法宜先去溼毒後分小水

茵陳蒿湯 治酒疸心中懊痛小便黃赤

茵陳蒿 葛根 赤茯苓五錢 升麻 秦艽一兩

括蔞根二分 山梔仁半分

水煎三錢溫服日二以差爲度

艾葉湯 治酒疸身目俱黃心中懊痛

艾葉生一把如無用乾者　麻黃去根節二兩　大黃炒半兩

用酒煎四錢入大豆半合空心溫服日二

凝水石散　治酒疸小便不利或飲少溲多如白泔色

凝水石煅　白石脂　栝樓根一兩　知母　桂心

兔絲子酒浸二兩　共末空心飲下二錢日二

小麥飲　治酒疸

生小麥　用水煎二一合取汁頓服未差再服

追毒飲　治酒疸徧身發黃

狗脊去毛酒蒸一兩　白芥子　炙甘草一分

用酒一升煎半升分二服以利下為度未利再服

大黃湯　治酒疸心懊痛脛腫溲黃面發赤斑

大黃炒二兩　山梔仁　枳實炒一兩　大豉炒三合

水煎四錢溫服日二

穀疸

論曰夫饑飽甚則胃中滿塞穀氣未化虛熱薰蒸遂為穀疸其症心下懊悶頭眩心忪怫鬱發煩小便不利身黃如橘是也

茵陳蒿湯　治穀疸食則目眩心忪怫鬱不安久久發黃

茵陳蒿　柴胡一兩　子芩　龍膽草　枳實二兩麸炒

大黃炒　山梔仁　升麻三兩　水煎五錢溫服日二

若病人虛羸氣弱去大黃用懷生地五兩山梔仁四兩

苦參梔子丸　治穀疸

苦參　子芩　山梔仁　龍膽草一兩　共末用雄豬膽汁和丸如梧子大空心飲下二十丸日二

胃疸

論曰已食如饑者胃疸也夫胃熱則能消穀今已食如饑者以胃氣但熱而無陰也然胃為足陽明陽明之脈絡屬于心陽明得熱則心火上行陽奕過矣故單陽成癉心嘈雜而身面黃小便赤色也

瀉熱湯　治胃中有熱食已如饑不生肌肉面色萎黃

生大黃　麻黃去根節　子芩四兩　甘草　陳皮去白

杏仁去皮尖研　赤茯苓　石膏煅　澤瀉二兩

水煎三錢溫服日二

蘆根湯　治胃熱壅盛食已如饑面黃口燥

蘆根　麥冬　栝樓根一兩　甘草　知母　赤茯苓三分

生薑水煎三錢入小麥一撮竹葉生地一分溫服日二

赤茯苓湯　治胃積熱食已即饑面黃肌瘦胸滿脇脹

赤茯苓　陳皮　澤瀉　桑白皮炙三兩　白芍藥

白朮四兩　石羔研八兩　人參　桂心二兩　半夏薑炒六兩

生薑水煎四錢溫服

犀角湯　治胃實熱嘔逆不下食

犀角屑　葛根二分　麥冬　枇杷葉去毛炙一兩

生薑水煎三錢服

黑疸

論曰諸黃疸酒疸女勞疸久不已皆變爲黑疸其狀小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱大便黑是也黃本脾病脾者土也脾病不已傳其所勝腎斯受之腎爲水藏其經足少陰其色黑病在腎故小腹滿色黑大便黑足下熱是皆足少陰經受病之症

當歸湯　治諸疸久不差變成黑疸小腹滿身黃額黑

川歸二兩　桂心六兩　麥門冬　大黃一兩炒　黑乾薑

黃芪炙　茵陳蒿　子芩　赤茯苓　炙甘草

石羔研　川連　白芍藥　人參二兩

共十四味剉如麻豆大用生薑水煎三錢空心溫服日三　一方無黃芪

土瓜根飲　治諸疸變成黑疸諸醫所不能治者

土瓜根　水煎取汁每日空心服半鍾其病隨小便出即愈須強壯人可半鍾羸瘦人只一合無生者剉乾者一兩水煎服

女勞疸

論曰脾腎素有積熱或緣大暑醉飽房勞過度引熱歸腎逆氣交攻小水不利小腹堅脹濕毒流散于肌肉之中則四肢身面發黃故謂之女勞疸然其症又有額上黑微汗出手足心熱薄暮即發膀胱急小便自利者各宜隨其症而治之

硝石礬石散　治女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱房室傷損濕毒散于肌肉

硝石　礬石燒枯一兩　共末空心飲下一錢覆衣取汗隨利下小便色黃大便色黑差未差再下

犀角湯　治女勞疸及勞氣熱渴額上汗出手足熱小便赤澀

犀角　龍膽草一兩　升麻　炙甘草五錢　麥冬去心三分

生薑大棗水煎三錢去滓入生地汁一合再沸服二升

髮灰散　治女勞疸身目俱黃惡寒發熱小腹滿急小便難

亂髮（雞子大一丸）　豬脂（半斤）　用油慢火煎髮令髮消盡溫水下一匙不拘時頻服以小便利爲度

黃汗

論曰黃汗者汗出沾衣色正黃如櫱汁故名曰黃汗由脾胃有溼熱伏留薰發肌肉散而爲汗其症使人身體浮虛骨節疼痛發熱汗出而不渴是其候也

黃芪苦酒湯　治黃汗身腫發熱汗出而不渴狀如風水汗沾衣色黃如櫱汁脉沉由夫汗出入水中浴水從汗孔入而得之

黃芪（蜜炙五兩）　白芍藥　桂心（二兩）　用苦酒二鍾煎五錢空心服之當心煩苦酒阻故也日二服

吳藍湯　治黃汗身重發熱汗出而不渴狀如風水汗出衣黃

吳藍　防巳　白鮮皮　山梔仁　桑白皮　麥冬（去心）　白芍（兩半）　水煎三錢溫服未効再服

茵陳蒿湯　治黃汗身熱不退大小便不利

茵陳蒿　木通　黃芪　赤芍藥　赤茯苓　炙甘草（一兩）　大黃（炒二兩）

水煎五錢溫服須臾再服以二便通利爲度

山梔栝樓丸　治黃汗身熱大小便不利

山梔仁　栝樓根　苦參（一兩）　共末用醋浸雞子二枚和丸梧子大水下三十丸日三四服

蔓菁子散　治黃汗如櫱汁沾衣身虛浮

蔓菁子　爲末用井華水空心下二錢日二以差爲度

三十六黃

一心黃　二肝黃　三脾黃　四肺黃
五腎黃　六鬼黃　七姦黃　八血黃
九人黃　十髓黃　十一瘧黃　十二急黃
十三氣黃　十四癎黃　十五白黃　十六陰黃
十七臍黃　十八驚黃　十九風黃　二十走精黃
二十一酒黃　二十二雞黃　二十三蜒蚰黃　二十四火黃
二十五走馬黃　二十六房黃　二十七黑黃　二十八屋黃
二十九木黃　三十爪黃　三十一腸黃　三十二猶黃

三十三氣黃　三十四豬黃　三十五土黃　三十六蝦蟆黃

右三十六黃有烙法有灸法有方法中多奇證大約是瘟疫中壞證必有之惡候也然三法俱難用故不刊載今存其名以備醫家博覽

胸痺門

胸痺　胸痺噎塞　胸痺心下堅痞急

胸痛

胸痺統論

論曰虛極之人爲寒邪所客氣上奔迫痺而不通故爲胸痺其症堅滿痞急或胸中愊愊如噎塞或胸背皆痛或胸滿短氣咳唾引痛煩悶白汗出或心痛徹背或肌痺皮痛是皆閉塞而不通也夫脉當取太過與不及陽微陰弦則胸痺而痛又云胸痺之病喘息咳唾背痛短氣寸口脉沉而遲關上緊是皆胸痺之候也

胸痺

論曰胸痺之病其脉陽微而陰弦陽虛則知在上焦陰弦故令胸痺心痛古方用理中湯取緩其中氣則可也然背者胸之膂或築或悸或渴或腹痛或寒或腹滿其候不一治當隨症加減

理中湯　治胸痺

人參　白术　炙甘草　炮乾薑一兩　水煎五錢温服頃又服　若築者此腎氣動也去白术加桂心　臍上築生多者去白术加生薑　下多者復用白术　悸者加白茯苓　渴者加白术二兩　腹中痛加人參一兩　寒者倍乾薑　腹滿去白术加附子服後以稀粥投之取汗

括樓實湯　治胸痺

括樓實一枚打碎用　枳實五枚麩炒　半夏四兩薑炒

水煎五錢入薤白五寸生薑三片煎温服日二

半夏湯　治胸痺心下堅痞急痛徹背短氣煩悶白汗出

半夏薑汁炒二兩半　括樓實一枚　薤白切二合

生薑水煎五錢入薤白服日二

胸痺噎塞

論曰胸痺噎塞之病以胸中痞結不通故有噎塞之症蓋寒氣客于五臟六腑因虛而發上冲胸膈則氣痞而不通甚則爲噎塞也

裩布丸　治心胸氣悶喉中噎塞

裩布三分洗燒焙　木香　赤茯　枳實麩炒　檳榔五錢半生半炒

訶梨勒五錢煨去皮　甘草　乾薑各一分　共末入蜜杵丸如梧子大空心溫酒下二三十丸日二

赤茯苓湯　治胸中氣壅噎塞

赤茯苓三兩　炙甘草一兩　杏仁四十九枚去皮尖炒研

水煎三錢溫服日二

胸痺心下堅痞急

論曰體虛之人寒氣客之氣結胸鬱而不散故爲胸痺其

候心下堅滿痞急甚者疼痛搶心如刺手不得犯治之當辨至微始不可忽也

五物湯　治胸痺心下堅

陳皮去白炒　白芍　川歸五錢　木香一分　桔梗一兩

生薑水煎五錢服

桔梗湯　治胸痺心下氣堅滿痞急刺痛不可俛仰氣促咳吐引痛不能飲食

桔梗炒　陳皮二兩炒　甘草一兩　栝樓實一枚炒

生薑大棗水煎五錢入薤白五寸空心溫服日二

五味丸　治胸痺心下堅痞急

附子　黑乾薑三兩　桂心　檳榔　訶勒皮一兩

共末入蜜杵丸如小豆大酒下二三十丸日二

白豆蔻湯　治胸痺心下堅痞急

白豆蔻　人參　木香　桂心五錢　黑乾薑　京三稜醋煮　炙甘草　陳麴一兩　陳皮　大麥糵炒香二兩

生薑水煎三錢入鹽少許溫服日二

胸痛

論曰胸痛者胸痺痛之類也此由體虛挾風又遇寒氣加

之則胸膺兩乳間刺痛甚則引背胛或徹背膂咳唾引痛是也

桔梗黃芪湯　治胸膺痛

桔梗二兩　人參　川芎　甘草　蘇葉五錢　川歸

莪茂　沉香一兩　水煎二錢溫服日二

白朮枳實散　治胸痺

白朮土炒　枳實麩炒　陳麴一兩炒　共末酒下二錢日二

柏實散　治胸痺

柏子仁一兩炒　桂心半分　共末飲下二錢日二

卷十一終

聖濟總錄纂要卷之十二

新安 程 林雲來 纂
閩東 劉 英含初
海昌 陳 燮則子奇 較
新安 江 湘郢上 閱

心痛門

心痛 卒心痛 久心痛 肝心痛
脾心痛 胃心痛 腎心痛 厥心痛

心痛統論

論曰心痛諸候皆由邪氣客于手心主之脉蓋少陰心之經五臟六府君主之官也精神所舍諸陽所合其藏堅固邪氣未易以傷是以諸邪在心多在胞絡者心主之脉也其候不一 有寒氣卒客于臟腑發卒痛者 有陽虛陰厥痛引喉者 有心背相引善瘈傴僂者 有腹脹歸于心而心痛甚者有急痛如針錐所刺者 有其色蒼蒼終日不得太息者 有臥則從心間痛作愈甚者 有發作腫聚往來上下痛有休止者 或因于飲食或從于外風中藏卽虛邪氣客之痞而不散宜通而塞故爲痛也君主

與心不痛若痛卽實氣相搏手足厥冷非治藥之所及不可不辨也

心痛

論曰心爲君主之君神明出焉正經不受邪其支別之絡脉爲風寒邪氣所乘令人心痛蓋風邪之氣痞而不散內干經絡則發爲心痛乍減乍甚乃其症也

木香湯 治心痛如錐刀刺

木香 川歸 桔梗 鱉甲 檳榔煨 吳茱萸炒一

薑水煎三錢服

薑黃散 治心痛不可忍

薑黃炒 川歸一兩 木香 烏藥炒五錢

共末吳茱萸醋湯下二錢

莎草根散 同前

香附根炒去毛入醋炒 丁香炒一兩 共末酒煎一錢熱下

人參湯 同前

人參兩半 吳茱萸一兩醋洗炒 薑棗水煎三錢日二

五靈脂散 治心痛

五靈脂研 男人熱酒下一錢女人當歸湯下一錢

莪术飲　同前

蓬莪茂生用　水醋煎三錢熱服

鉛丹丸　治心痛及腹痛

鉛丹　白礬各一兩　同研入瓶中封蓋火煅赤研飯丸梧子大心痛薑湯下十丸腹痛醋湯下十丸

參香散　治心痛不下食脇下刺痛壅悶

人參　木香　白芍　半夏　大腹　華撥各三分

高良薑　丁香　川芎　青皮　桂心五錢

共末空心薑湯下二錢

木香湯　治心疼氣刺痛不下食

木香五錢　白术　白芍　枳殼　陳皮　桂心三分

甘草一分　薑水煎三錢服

丁桂丸　治心痛不可恐

丁香　乾薑七錢　枳殼　川歸　紫朴　桃仁　檳榔

桂心一兩　川芎二分

共末蜜丸梧子大空心酒下三十丸薑湯下亦可

吳萸生薑湯　治九種心痛

吳茱萸湯泡七次炒　生薑切片焙乾一兩　人參三分

大棗水煎三錢空心熱服須再服

卒心痛

論曰卒心痛者本於臟腑虛弱寒氣卒然客之其狀心如寒痛不得息千金治寒客心痛而用大黃黃芩治心痛徹背而用烏頭附子之類治藥相反如此而在用之隨宜而已

川芎丸　治卒心痛不可恐

川芎　川歸　良薑　桂心五錢　紫朴一分

水煎三錢服日二

半夏丸　同前

半夏　細辛三分　人參　附子　乾薑一分

共末醋糊丸小豆大酒下五丸日二

紫桂煮散　治暴心痛

桂心　良薑　川歸一兩　紫朴三分薑汁炒　吳茱萸五錢洗炒

共末薑棗水煎一錢五分服

三聖散　治卒心痛不可恐

附子　莪茂一兩　胡椒五錢

共末熱酒下一錢女人醋湯下

神應丸　治暴心痛危篤者
石灰風化　乾薑一錢　共末滴水丸豌豆大用葱白一寸
剌開入川椒七粒溼紙包煨熟湯細嚼醋下七丸
高良薑散　治暴心痛
高良薑　白芍藥一兩　共末空心酒下二錢
久心痛
論曰心爲諸臟之長神之所舍也其正經不可傷傷之則
旦發夕死夕發旦死是爲眞心痛不可復治其久成痛者
由風冷邪氣乘于心之支絡停滯不去發作有時故經久
不差也

薑黃散　治久心痛不可忍
薑黃炒　川歸一兩　木香　烏藥五錢
共末吳茱萸湯下二錢
木香散　同前
木香半生半炒　白芍　川歸　細辛　炙甘草　吳茱萸
一兩　桂心　檳榔　乾薑五錢　共末薑鹽湯下二錢
丁香湯　同前
丁香　胡椒炒一分　陳皮　桂心　炙甘草　藿香子

炒一兩　水煎三錢服
遠志湯　同前
遠志　菖蒲一兩　水煎三錢空心服
桃仁煎方　同前
桃仁四十九枚去皮尖炒研成膏　分三服湯下日二未差又服
吳茱萸湯　同前
吳茱萸湯洗炒五錢　水煎空心頓服
肝心痛
論曰肝心痛色蒼蒼如死灰狀不得太息是也蓋肝在色
爲蒼而足厥陰之脉貫膈布脅肋今肝脉虛受邪傳爲心

痛故其色蒼蒼而不澤拘攣不得太息也
細辛湯　治肝心痛胸膈氣滯四肢厥逆兩脅痛
細辛　桃仁　人參　附子　川歸　前胡　柏子仁
川芎　陳皮　木香　白茯　桂心三分　吳茱萸湯洗炒五
錢　薑棗水煎三錢服
紫菀丸　治肝心痛連脅不得太息
紫菀　木香　白朮　川歸　桔梗五錢　桂心
郁李仁三分　共末蜜丸小豆大檳榔湯下二十丸

脾心痛

論曰脾者居中州爲孤臟以灌四旁脾氣盛則四臟皆得所養今脾虛受病氣上乘心故爲痛特甚古方謂如針錐所刺而痛廹急者是爲脾心痛之候

木香寬中散　治脾心痛泄瀉不止

木香　肉荳蔻　白茯苓　人參　甘草　陳麯　訶梨勒一兩　附子　草荳蔻　白荳蔻　麥蘖五錢

共末薑湯下二錢

訶梨勒湯　治脾心冷痛不可忍霍亂吐瀉

訶勒　甘草　白荳蔻　陳皮　紫朴　良薑　乾薑　白茯　神麯　麥蘖一兩　水煎三錢入鹽少許

厚朴湯　治脾心痛

紫朴　人參　吳茱萸一兩　薑棗水煎三錢溫服

食茱萸湯　治脾心痛兼吐水

食茱萸洗炒　白朮　乾薑一兩　薑水煎三錢空心服

胃心痛

論曰胃爲水穀之海沖和之氣藹焉固而保之則邪不能襲若經氣虛風冷傷則來於心之絡脈痛歸於心而腹脹是爲胃心痛也

六氣湯　治脾胃傷冷心腹痛霍亂吐瀉

良薑　陳皮　白朮　甘草　大茴　桂心

薑水煎三錢

高良薑散　治胃氣極冷卒病心痛吐逆寒痰飲食不下

高良薑三兩　酒浸濕紙包煨熟爲末酒下二錢

腎心痛

論曰腎心痛者心痛與背相引善瘛瘲如物從後觸其心身傴僂者是也蓋少陰之脈貫脊屬腎其直者上貫肝膈

入肺中其支者從肺出絡心注胸中今腎虛逆氣乘心故其痛與背相引善瘛瘲如物觸其心也

烏頭丸　治腎寒氣逆上奔心痛引背

烏頭一兩　川椒　桂心三分　乾薑　赤石脂五錢

共末蜜丸梧子大酒下二十丸日二

桃花散　治腎心痛如物從背觸心牽引傴僂

桃花取片焙半升　苦參半兩　共末酒煎三錢服

巴戟天丸　同前

巴戟天　人參　附子　青皮　肉蓯蓉　蘹香子炒

兩　檳榔五錢　共末用羯羊腎二對入鹽五錢溼紙包
煨熟研入蜜丸梧子大鹽湯下二十丸

高良薑湯　治腎寒氣逆上乘心痛

高良薑　紫朴　桂心三兩　川歸二兩

薑水煎三錢熱服日二

厥心痛

論曰手少陰心之經也心爲陽中之陽諸陽之所會合若諸氣虛少陰之經氣逆則陽虛而陰厥致令心痛是爲厥心痛

當歸散　治厥逆冷氣上攻心痛

川歸　陳皮　枳殼　桂心　桔梗　檳榔一兩　赤芍

人參　木香五錢　共末空心薑棗湯下二錢

草豆蔻湯　治厥逆冷氣上攻心痛不食

草豆蔻半兩　良薑　桂心　川歸一兩　紫朴二兩薑汁炒

薑棗水煎三錢稍熱服頃再服

麝香湯　治厥心痛氣痛

麝香　木香　吳茱萸一兩　桃仁三十五枚去皮尖炒　檳榔三枚煨　共末童便水煎三錢去滓入麝末三分服日二

九種心痛　停飲心痛　蟲心痛

冷氣心痛　中惡心痛　惡疰心痛

心掣

九種心痛

論曰九種心痛者曰蟲曰疰曰風曰悸曰食曰飲曰冷曰熱曰去來者是也治病必求其本今九種心痛其名雖異而治藥各有其法蓋正氣和調則邪不能入若或虛弱外邪乘之則種種皆能致疾善醫者惟明攻邪以扶正則九種之病其治一理也

木香煮散　治九種心痛

木香　柴胡　陳皮去白炒　吳茱萸一兩　檳榔

郁李仁炒　白芍　川歸五錢　麝香五分研

共末水煎五錢去滓入麝末少許空心溫服日二

厚朴湯　治九種心痛

紫朴薑汁炒　檳榔　白芍　柴胡　食茱萸　川歸酒炒一兩　郁李仁三分　水煎五錢空心溫服日二

弭痛丸　治九種心痛不止

木香　川歸　五靈脂　高良薑　蓬莪茂一兩

共末入蜜丸梧子大空心木香湯下二三十丸

不換金散　治九種心痛滯氣

玄胡索　蓬莪茂　威靈僊　鬼箭羽　蒲黃

苦楝根一兩　共末空心酒水合煎三錢溫服日二

無比丸　同前

高良薑　赤芍藥　黑乾薑　縮砂蜜　桂心一兩

共末米醋糊丸彈子大萊菔子湯下一丸

萬靈丸　治九種心痛及滯氣

石菖蒲二兩九節者　爲末醋麪糊丸梧子大丹砂爲衣男子鹽湯空心下五七丸女人醋湯下日二

停飲心痛

論曰心爲火其氣炎上飲爲水其性趨下若榮衛和平臟腑調適則水液下行不能逆害心火若水飲停滯於胸中火氣不能宣通則陽虛陰盛其病心中淡淡欲吐而痛者是爲停飲心痛也

半夏湯　治痰飲在心久不散痛不可忍

半夏　乾薑三分　高良薑　桂心　旋復花五錢

檳榔半生半炮　木香　丁香一分　薑水煎二錢溫服

旋復花湯　治痰飲在心下不散痛不可忍

旋復花微炒　桔梗一兩　半夏一兩半　柴胡　檳榔二兩煨

薑水煎服頃又服

又方

桂心　紫朴三分　吳茱萸洗炒五錢　共末酒下二錢

蟲心痛

論曰諸蟲在人身中若臟腑平調則自安其所若臟氣虛弱或因食肥甘過度致動腸胃間諸蟲往來上攻于心終則令人心痛痛有休止腹中熱喜吐涎出是蚘心痛也速宜治之不治蟲貫心則能殺人

烏梅丸　治蚘厥嘔逆心痛不可忍

烏梅三百枚水洗淨去核　附子　人參　細辛六兩　川椒去目炒四兩

桂心六兩　川連一斤去蘆炒　川歸四兩酒　乾薑十兩　川栢蜜炙六兩　共末以酒二升浸梅一宿取肉蒸爛搗如泥入蜜杵丸梧子大飲下三十丸

木香湯　治三蟲心痛面色黃不下食

木香　檳榔　陳皮三分　薏苡根一兩

水煎三錢服頃又服

檳榔散　治蚘咬心痛不止

檳榔　川椒炒一兩　共末空心米飲下二錢日二

狗脊丸　治蟲心痛兼氣痛

狗脊去毛酒蒸一分　陳皮去白炒二兩　吳茱萸洗炒五錢　檳榔半兩

蕪荑仁三分　共末蜜杵丸梧子大陳皮湯下二三十丸

皂莢丸　治心痛如蟲咬

皂莢炙黃去皂子　杏仁去皮尖炒研一兩　先以皂爲末入杏仁

搗丸小豆大發時空心米飲下七丸

乾漆湯　治蟲心痛如咬

乾漆炒一兩　胡椒

用白水煎一錢入葱白一寸麝香末少許服

冷氣心痛

論曰風邪冷氣傷於心之絡脉皆能致痛若陽氣偏虛宿挾寒冷滯氣又因飲食傷動而致心痛則其病喜溫而惡寒其氣慘而不舒甚者四肢厥冷氣攻心而發痛也

八味桂心丸　治冷氣心痛不能飲食

桂心一兩半　人參　白朮　陳皮　吳萸　桔梗　高良薑　川歸一兩　共末入蜜丸梧子大酒下二十丸

防風湯　治虛冷氣胸滿短氣心痛嘔吐

防風　赤茯　甘草一兩　人參半兩　桂心三兩　半夏

乾薑二兩　薑棗水煎三錢空心溫服日二

三味桂心湯　治冷氣冲心痛

桂心五錢　川歸三分　吳茱萸洗炒一兩

共末入蜜丸梧子大早晚鹽湯下二十丸

中惡心痛

論曰心者君主之官神明出焉心神安靜則邪無得而干若心氣不足精神衰弱邪惡之氣因得干正連滯心絡令

人氣不升降卒然心痛如刺悶亂欲絕者中惡心痛也

赤芍藥湯　治中惡心痛不可忍

赤芍炒　杏仁去皮尖炒二兩　桔梗炒二兩半

水煎三錢空心溫服日二

丁香白芍湯　治中惡心痛不可忍

丁香　白芍　檳榔煨　吳茱萸洗炒一兩　白朮三分

水煎三錢服

犀角散　治中惡心腹刺痛服之去惡氣

犀角　木香五錢　麝香一分　共末空心薑湯下二錢

沉香散　治中惡心痛不可忍

沉香　赤芍　桔梗五錢　濱榔　芒硝一兩　酸石榴皮炒五錢

共末水煎五錢入葱白五寸空心溫服日二

惡注心痛

論曰凡人將理失度陰陽俱虛氣血不足復因風寒水溼客忤邪惡之氣乘虛入於肌體流注經絡伏留臟腑毒擊心包絡時發疼痛積滯日久轉相注易故曰惡注心痛

當歸湯　治惡注脅連心痛

川歸一兩　木香三分　麝香一錢　檳榔五枚煨

水煎五錢去滓入麝末一字溫服以利為度

桃枝湯　治惡注心痛不可忍氣逆奔走連胸脇如刀刺及蚘蟲咬心痛不止

桃枝向東南引者去皮一把　水煎空心稍熱服日二

心掣

論曰內經謂一陽發病少氣善欬善泄其傳為心掣夫心君火也三焦相火也蓋人氣血和平三焦升降則神明泰定三焦既病故上欬下泄少氣致心火胥應而不能共動若掣者乃其症也

調中湯　治心掣胸中少氣善欬善泄

白朮　人參　赤茯　川歸　乾薑一兩　甘草

五味子一兩　桂心半兩　水煎三錢溫服日二

赤茯苓煮散　治心掣胸中氣少水穀不化泄利氣逆

赤茯　紫朴　人參　川芎　甘草　麥糵一兩

乾薑五錢　共末水煎三錢溫服日二

當歸散　治心掣少氣善欬善泄腹痛上攻

川歸　枳殼　赤芍　桂心　陳皮　桔梗一兩　木香

人參五錢　共末薑棗湯下二錢

心腹門

心腹痛　腹痛　久腹痛　腹脹腸鳴切痛

腹內結強　䐜脹　臌脹　脅痛　息積

心腹痛

論曰臟腑氣虛風寒客之邪正相搏故上冲於心絡而為心痛下攻於腹膜而為腹痛上下攻擊則心腹疼痛其或陰氣凝結久而不散內攻腸胃則為寒中脹滿泄利之症

獨活湯　治心腹冷痛

獨活　人參　白茯　甘草　陳皮　乾薑　吳茱萸

白芍　川芎　防風　桂心　黃芪二兩　川歸半兩
用羊肉煮取汁入薑棗煎三錢空心服日二
桔梗散　治心腹痛食冷物即發及吐惡水
桔梗　麥冬　白茯　檳榔半兩　人參　白芍　紫朴
陳皮　枳殼一兩　桂心三分　共末鹽薑湯下二錢
沉麝丸　治一切心腹痛不可忍
沉香　麝香　丹砂　血結　沒藥一兩　木香五錢
共末甘草煎膏丸梧子大薑鹽湯空心下三五丸

調中丸　治心腹一切冷氣刺痛
人參　白茯　白朮　甘草五兩　黑乾薑四兩
共末入蜜丸梧子大空心酒下二三十丸日二
小建中湯　治腹中虛寒心腹切痛
桂心三兩　白芍酒炒兩半　甘草炙五錢
薑棗水煎去滓入飴糖稍熱服日二　此藥能治腹中虛寒補血調氣尤止腹痛常人見其藥性溫平未必肯用然腹痛按之便痛重按却不甚痛者此正是虛痛若重按愈痛而堅者當有積也氣痛不可下下之愈痛此虛寒症也尤宜服此藥外臺治虛勞腹中痛夢遺失精四肢痠疼手足煩熱口燥及女人小腹痛亦用此藥張仲景金匱要畧陽脉澀陰脉弦法當腹中急痛先與此藥不差者宜小柴胡湯主之此二湯皆主腹痛

腹痛

論曰臟腑內虛寒氣客之與正氣相擊故令痛也又有冷積不散乍減乍甚爲久腹痛者若重遇于寒則致腸鳴下利蓋腹爲至陰之所居又爲陰邪客氣所搏故也
人參湯　治腹痛刺疼除寒冷溼痺

人參　附子　甘草一兩　川歸　黑乾薑　大黃炒一兩
水煎三錢空心溫服日二
人參丸　治腹中冷痛
人參　茯神　木香　甘草　牡蠣　遠志　黃芪炙
桂心五錢　共末大棗肉丸梧子大麥冬湯下二十丸
赤石脂丸　治心腹積冷腹痛短氣胸背痛脅下有冷氣不能飲食如刀錐刺及蟲食痛針灸不差狀如鬼神往來
赤石脂　附子　人參　遼細辛　烏頭　黑乾薑一兩

眞珠五錢豆腐水煑研　桂心一兩

共末入蜜杵丸梧子大飲下十丸

呉茱萸湯　治寒冷氣腹痛

呉茱萸　人參　川歸　半夏薑汁炒　桂心一兩

炙甘草五錢　小麥一合　薑棗水煎三錢空心溫服

久腹脹

論曰久腹脹者冷氣結于腹内與臟氣相搏積久而不散也蓋腹爲至陰之所居脾胃爲倉廩之官今寒氣在内與臟氣相搏停積不散故爲久脹脾胃既虛則難以腐熟水

穀故脹久不已則令人變飲澀之疾

厚朴湯　治腹脹煩悶食不消

紫朴　人參　白朮　沉香　桔梗　檳榔　桑白皮炙　丁香皮一兩

共末糊丸梧子大陳皮薑湯下五十丸日二

木香丸　治久腹脹無力不思飲食

木香　陳皮　白朮五錢　檳榔一兩　萊菔子炒二兩

共末入蜜杵丸梧子大空心薑湯下二三十丸

腹脹腸鳴切痛

論曰腹者至陰之所居若寒氣所傷則陽衰陰盛于是有腹脹腸鳴切痛之病此脾弱胃虛氣脹痞滿加之冷氣與正氣交爭故也不已則變爲下利之症

白朮湯　治腹脹腸鳴切痛發作有時

白朮　赤茯　人參　川歸　陳皮　桔梗　呉茱萸

桂心一兩　甘草　細辛五錢　紫朴二兩

薑棗水煎三錢溫服

高良薑湯　治脾虛腹脹腸鳴切痛食少無力

高良薑　丁香五錢　人參　桂心三分　草豆蔻　訶勒

皮一兩　陳皮去白炒　紫朴半兩　甘草一分

棗水煎三錢溫服日二

丹參湯　治腹脹腸鳴不下食

丹參　白茯　細辛　桔梗　紫朴薑汁炒　食茱萸一兩

甘草五錢　薑水煎三錢溫服日二

附子粳米湯　治腹寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿

附子　半夏　甘草一兩

薑棗水煎三錢入粳米一撮空心溫服

腹内結強

論曰血氣溫則流通寒則凝結結瘕者風冷邪氣結于腹
中也凝結而不散與正氣相擊上下流走虛按之有根狀
如覆杯食寒則腹中硬痛妨害飲食留滯經久則變結瘕

丁香皮煎方　治寒氣結瘕日久不消

丁皮　白朮　川歸　陳皮　檳榔　蓬黃　京三稜
甘草一兩　每薑棗水煎三錢溫服

白朮散　治冷氣不散腹內結瘕堅硬疼痛

白朮　人參　白茯　紫朴　陳麴　麥糵　吳茱萸
川芎二兩　共末空心飲下二錢日二

平胃丸　治腹內結強不可俛仰飲食不化

杏仁二十枚去皮尖炒　玄參　葶藶炒二兩　川芎　桂心一兩
丹參三兩　共末入蜜杵丸梧子大空心飲下十五丸日二

䐜脹

論曰內經謂濁氣在上則生䐜脹此陰陽反作病之逆從
也夫清陽為天濁陰為地二者不可相干今濁氣在上為
陰氣干擾清陽之氣鬱而不散所以䐜塞脹滿而常若飽
也

桔梗丸　治虛冷氣滿䐜脹不飲食雖食不消化嘔逆惡
心虛滿腹內雷鳴下氣

桔梗　白朮　人參　白茯　甘草　陳皮　吳茱萸
枳殼　紫朴　乾薑一兩　桂心三分
共末蜜丸梧子大酒下三十丸

人參湯　治虛冷腹脹及嘔逆醋心脅胃不能食而黃

人參　白茯　白朮　紫朴二兩　桂心　陳皮一兩
半夏二兩半　甘草三分　生薑水煎三錢溫服日二

穀脹

論曰內經謂有病心腹滿旦食則不能暮食名為穀脹夫

水穀入口則胃實腸虛食下則腸實胃虛若乃飲食不節
寒溫失宜胃滿氣逆聚而不散大腸無以傳導故心腹逆
滿氣穀而脹也旦食不能暮食者則以至陰居中五陽不
布水穀化遲而然也

雞屎醴方　治旦食不能暮食

雞屎炒香熟　為末空心醇酒下二錢弱人一錢

牡丹皮湯　治穀脹

牡丹皮　鱉甲炙二兩　枳殼　紫朴　郁李仁半兩　桃仁
二十一枚炒　桑白皮　檳榔一兩二　大黃一兩炒

薑水煎三錢溫服

桔梗丸　治臓脹不下食

桔梗　白茯　白朮　人參　炙甘草　陳皮　紫朴

枳殼　吳茱萸　乾薑一兩　桂心三分

共末蜜丸梧子大酒下三十丸

赤茯苓湯　治臓脹不下食

赤茯苓　木通二兩　吳茱萸　紫苑　郁李仁一兩

白芍炒一兩半　檳榔三枚　水煎三錢溫服日二

脅肋痛

論曰脅肋痛者足厥陰肝經虛寒氣乘之也足厥陰肝經

其支脉起于足大指叢毛上循陰股入腹貫膈布脅肋寒邪之氣乘虛則傷于經絡邪氣與正氣相搏故令脅肋痛也

大黃附子湯　治脅下偏痛發熱脉弦寒也當以溫藥去寒

大黃醋炒香一兩半　附子三枚　細辛一兩

水煎三錢稍熱服日二

半夏湯　治胸脅氣不利腹脹急痛

半夏薑汁製七次一兩半　桂心　檳榔一兩

生薑水煎三錢溫服日二

吳茱萸丸　治胸脅冷氣妨悶切痛不下食

吳茱萸湯泡洗醋炒乾　川歸一兩　麝香研五分

共末入蜜麝杵丸梧子大空心酒下二十丸

息積

論曰内經謂病脅下滿氣逆二三歲不已病名息積夫消息者陰陽之更事也今氣聚于脅下息而不消積而不散故滿逆而為病然氣不在胃故不妨于食特害于氣而已治法不可灸刺宜服藥導引藥不可獨治者蓋導引能行

積氣藥力亦藉導引而行故也

桔梗湯　治息積脇下氣逆妨悶歲久不已

桔梗　人參　白朮　枳實　川歸　鼈甲九肋者醋炙

乾薑一兩　桂心　甘草　吳茱萸湯洗醋炒五錢　大麥糵炒香一兩半

共末入蜜丸梧子大空心酒下二三十丸日二

赤茯苓湯　治息積脅下氣逆滿悶

赤茯苓　桂心　陳皮炒一兩半　高良薑一兩　甘草一分

大腹皮五錢　吳茱萸三分　水煎三錢空心溫服日二

白朮丸　治息積脅下滿悶喘息氣逆消散導引

白术陳土炒　枳實麥麩炒　桂心半兩　人參　陳皮去白炒
甘草蜜炙　桔梗炒一兩
共末入蜜杵丸梧子大空心酒下三十丸日二

腰痛門

腰痛　卒腰痛　風溼腰痛　腰痛強直不能俛仰　腰脚冷痺痛

腰痛統論

論曰腰痛有五一者陽氣不足足少陰氣衰令人腰痛二風寒著腰風痺腰痛三腎虛勞役傷腎腰痛四墜墮傷腰

名腎腰痛五寢臥溼地腰痛凡此皆本于傷腎葢腎主腰脚腎傷則腰痛也內經云腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣

腰痛

論曰腰者一身之要屈伸俛仰無不由之或風寒所客或腎氣傷損使筋脉拘急動搖轉側不得故腰痛也

人參湯　五種腰痛

人參　杜仲　川芎　桑寄生　桂心一兩　白芍三兩
當歸　白术　木通　玄參　熟地三分　丹皮
獨活五錢　水煎三錢日三

寄生湯　五種腰痛不能轉側

桑寄生　附子　川芎　獨活　杜仲　狗脊　桂一兩
人參　炙甘草五錢　白术　白芍　石斛　牛膝三分
水煎三錢日二

杜仲酒方　腎虛腰痛

杜仲　丹參八兩　川芎五兩　酒一斗五升浸服

卒腰痛

論曰卒腰痛者謂氣脉凝滯經絡壅澁或舉動傷腰故卒

痛也宜通行氣脉調順經絡平補腎臟則病可愈

牡丹湯　卒腰痛

丹皮　牛膝　續斷　萆薢　桂心一兩　酒水煎三錢

杜仲湯　勞動傷腰卒痛

杜仲　羌活　川椒　秦艽　石斛　續斷　括蔞根
丹皮　白芍　五加皮　當歸　桂一兩　酒水煎三錢

風溼腰痛

論曰夫腎氣虛弱風寒溼氣著于腰間則令腰痛葢腰爲腎府腎經留滯風溼不得發散注于腰脚故起坐立行皆

痛甚則浮腫故名風溼腰痛

羌活湯　風溼腰痛

羌活　杜仲　乾薑　五加皮　桂三分　附子　巴戟天一兩　牛膝半兩　共末蜜丸梧子大酒下三十丸

羚羊角湯　風溼著于腰脚骨節冷痛搖轉不能

羚角　羌活　牛膝一兩　白芍　棗仁　升麻半兩　虎脛骨　山栀　防風二兩　水煎五錢

腰痛強直不得俛仰

論曰腰爲腎之腑足少陰腎之經也其脉貫脊屬腎抵腰

勞傷之人腎氣既衰陽氣不足寒溼內攻經絡拘急所以腰髖強直而痛不能俛仰也

郁李仁煮散　腰痛強直不可俛仰

郁仁　檳榔　朴硝一兩　白芍　當歸三分　木香　訶勒皮五錢　共末水煎三錢日三

五加皮湯　同前

五加皮　白芍　杜仲　蘆根　萆薢五錢　水煎三錢

巴戟天酒方　治腰痛強直不得俛仰

巴戟天　牛膝　石斛一兩　羌活　當歸　生薑半兩

川椒一分　酒八升浸服

牛膝酒方　治風冷傷腰筋骨疼痛

牛膝　虎脛骨　枳殼　羚角一兩　酒五升浸服

石斛酒方　腰痛強直不可俛仰

石斛二十四兩　白茯　五味子　丹參　杜仲　黃芪　萆薢二兩　人參　枸杞半兩　天冬　生薑三兩　山藥　牛膝　山萸二兩　苡仁　防風　細辛一兩　酒五斗浸服

羌活酒方　同前

羌活六兩　獨活二兩　五加皮三兩　生地汁一升　黑豆

小者一升炒　酒二斗浸服

腰脚冷痺痛

論曰痺之爲病在骨則重在皮則寒在肉則不仁在筋則屈而不伸在脉則血凝而不流腰脚得之謂之冷痺痛亦由風寒溼氣雜合而成也蓋腎主腰脚其經爲寒邪冷氣所客注于腰脚則膝脛髀腨腰脊冷痛肌肉不仁而腰脚俱痛也

桂心丸　腰脚冷痺痿痺不仁

桂心三分　附子　杜仲　牛膝　丹參　續斷一兩

乾薑五錢 蜜丸梧子大酒下三十丸

杜仲酒方 治腎虛冷或感寒濕腰脚冷痺疼痛

杜仲 川椒 川芎 天雄 防風 羌活 萆解 炙甘草 秦艽 乾薑 桂一兩 細辛 石斛 地骨皮 續斷 五加皮三分 桔梗半兩 酒浸服

巴戟天酒方 治風冷寒濕傷著腰脚冷痺疼痛

巴戟 羌活 牛膝 石斛二兩 川椒五錢 生薑 當歸三兩 酒浸服

牛膝丸 治腰脚痺疼膝已下冷不得屈伸

牛膝三兩 附子 川椒 石斛 狗脊 乾薑 桂半兩 蜜丸梧子大酒下三十丸

獨果丸 治腰膝沉重及勞傷腰痛脚氣等疾

果等分者 蒸熟煉蜜丸梧子大酒下四五十丸日二服

聖濟總錄纂要卷十二終

聖濟總錄纂要卷之十三

程 林雲來 纂
新安 徐偉芳英尚 較
方顧仁田友
江 湘鄂上 閱

虛勞門

肝勞 心勞 脾勞 肺勞 腎勞

虛勞統論

論曰虛勞之病因五臟則爲五勞因七情則爲七傷勞傷

之甚身體疲極則爲六極所謂七傷者一曰大飽傷脾脾傷則善噫欲臥面黃二曰大怒氣逆傷肝肝傷則少血目暗三曰強立舉動久坐濕地傷腎腎傷則少精腰脚痛厥逆下冷四曰形寒飲冷傷肺肺傷則氣少咳嗽鼻鳴五曰憂愁思慮傷心心傷則苦驚喜忘善怒六曰風雨寒暑傷形形傷則髮落肌膚枯槁七曰大恐懼不節傷志志傷則恍惚不樂此七者勞傷之因也故名七傷所謂五勞者一曰肺勞令人短氣面腫鼻不聞香臭二曰肝勞令人面目乾黑口苦目視不明三曰心勞令人忽忽喜忘大便苦難

肨或溏洩口中生瘡四曰脾勞令人舌本苦直不能嚥唾五曰腎勞令人背難以俛仰小便黃赤時有餘瀝陰痛生瘡小腹滿急此五者勞氣在五臟也故名五勞所謂六極者一曰氣極令人內虛五臟不足邪氣多正氣少不欲言二曰血極令人無顏色眉髮墮落忽忽喜忘三曰筋極令人數轉筋十指甲皆痛苦倦不能久立四曰骨極令人痠削齒苦痛手足煩疼不可以立不欲行動五曰肌極令人羸瘦無潤澤飲食不生肌膚六曰精極令人少氣吸吸然內虛五臟氣不足毛髮落悲傷喜忘此六者勞傷之甚身

體瘦極也故名六極又五勞七傷六極之外變症不一治法皆以補養為宜形不足者溫之以氣精不足者補之以味氣味相得合而服之以補精益氣此其要也

肝勞

論曰恚怒氣逆上而不下則傷肝肝勞則面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨臥其則筋急而爪枯目暗無所見毛悴色夭者難治

芍藥飲　肝勞不足補虛

白芍　丹皮　枳實　荊芥穗三分　熟地

青箱子　黃芪　炙甘草　白茯苓　白附子

山枝　防風兩半　細辛五錢　竹葉水煎

前胡湯　肝勞虛熱目赤難開煩悶熱氣上冲瀉肝除熱

前胡　山枝　大青　細辛　秦艽

乾姜　决明子　片芩一兩　車前子一合　石羔一兩

竹葉一兩　水煎欲利加芒硝

茯苓湯　肝勞熱恐畏不安精神悶怒不能獨臥氣錯越

白茯　人參　防風　炙甘草　遠志

牡蠣　栢子仁五錢　龍骨二分　蜜丸梧子

大酒下二十丸

青龍丸　治肝傷健忘目視不明面目青白常多恐懼

龍骨　羌活　秦艽一兩　茯神　羚角

甘菊　青箱子　白附子　丹砂三兩　蜜丸梧子

大人參湯下三十丸

心勞

論曰心勞病者補脾氣以益之脾旺則感于心人逆夏氣則手太陽不長心氣內洞順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂內格病則生矣其候令人善怒

不樂大便鴨溏口瘡久不差耳枯而鳴不能聽遠皮毛焦
色夭者死于冬
遠志湯　心勞多煩躁脊膂妨悶面色時變乍赤乍黑或
笑或歌
遠志　白芍　犀角一兩　人參　知母五錢
赤茯　麥冬兩半　片芩　前胡　水煎五錢頃時
又服
磁石湯　心勞熱耳焦多鳴不能聽遠
磁石　人參　白朮　赤茯　白芍

大青　菖蒲兩半　赤石脂一兩　竹葉水煎
補心麥冬丸　心勞多驚悸心氣不足
麥冬　天冬　熟地　川連　遠志
升麻兩半　菖蒲　人參　白茯一兩　桂五錢
蜜丸湯下開心氣多記不忘
獺肝丸　心勞熱胸膈聚痰頭目微痛肌膚漸覺消瘦
獺肝　川連　柴胡　鱉甲　地骨
升麻　天靈蓋　貝母兩半　天冬　知母
犀角　茯神　紫苑　胡黃連　前胡

杏仁　百合　麻仁　炙甘草　生地
檳榔三兩　蜜丸飲下日二
朱雀湯　心氣勞傷
雄雀十枚用肉　人參　棗肉　赤茯　紫石英
小麥一兩　赤小豆一合　炙甘草一分
丹參　遠志　紫苑五錢　水煎
脾勞
論曰飲食勞倦則傷脾脾傷則善噫欲臥面黃舌本苦直
不得嚥唾皆脾勞也宜補益肺氣則感于脾矣

七香散　脾勞腹脹憂思不樂大便滑泄不思食肌肉瘦
人參　白朮　白茯　白芍　陳皮
桔梗　紫苑　蘹香子　白芷一兩　蒼朮五兩
乾姜二兩　柴胡兩半　共末用豬腎切一對入鹽一錢
末三錢紙包煨飲下
羊腎丸　脾勞臟腑滑泄夜多盜汗腹虛鳴困倦少力
羊腎　艾葉糯米粥拌焙乾末五錢　木香　肉蔻
蓯蓉一兩　丁香五錢　棗肉丸酒下
蘹香子丸　脾勞肌膚瘦瘁黃色焦黃四肢無力腳膝疼

痛大便不調或風勞上攻頭眩目暗肌體沉重昏憒嗜臥
皆宜急服

蘹香子　附子　川椒　牛膝　蓯蓉
青鹽　巴戟天 二兩　共末羊腎三對煮研蜜丸酒
下

黃芪湯　脾虛勞傷

黃芪 二兩　棗肉　白石英　木通　白石脂 五
炙甘草　藁本 一分　水煎

肺勞

論曰肺勞者因形寒飲冷遊秋氣所致其症短氣面腫鼻不聞香臭胸中結滯氣乏聲嘶咳嗽呀呷痰唾稠黏或吐膿血或咽喉乾咳不能唾上氣喘滿漸至衰瘁寒熱時作飲食減耗皆肺勞之症

補氣黃芪湯　肺勞飲食減少氣虛無力手足顫掉而浮
喘嗽

黃芪　白朮　人參　五味　麥冬
熟地　茯神　陳皮　阿膠　桂 一兩
牛膝　白芍　當歸 三分　炙甘草 五錢　用薑棗

水煎

鱉鱉煎丸　肺勞咳嗽日久

大鱉 三個醋洗蘸酒煮取肉再入酒熬成膏　桔梗　柴胡
青蒿子　人參　附子　炙甘草　知母
秦艽　鱉甲　共末入蜜煎丸梧子大酒下日二

白虎湯　肺氣勞傷

龍骨　人參　白茯　白石英　百合
磁石　桑白皮　玄參 五錢　大豆 一合　酒水煎

蛤蚧丸　肺勞咳嗽

蛤蚧 一對　天冬　生地　麥冬 一兩　貝母 四兩
款冬　紫菀 一兩　杏仁 三合　蜜丸梧子大薑湯下

腎勞

論曰腎勞者勞傷腎也腎傷則少精腰背痛難俛仰小便不利時有餘瀝陰痛囊濕生瘡小腹滿急厥逆下冷皆其候也經所謂強力入房久坐濕地傷腎者其一端耳

羊腎湯　腎勞虛損寒熱耳鳴好睡善欠腰腳痿弱

羊腎 一對　白朮　白茯　磁石　黃芪
乾姜 一兩　桂 三分　水煮腎汁煎五錢

遠志丸　腎勞虛勞痞鬱悸小腹拘急面色黧黑白濁腰
脊痛
遠志　杜仲　白茯　枳殼　桂五錢
熟地　兔絲子一兩　共末蜜丸梧子大酒下三十
丸
冷勞　熱勞　氣勞　急勞　風勞
冷勞
論曰冷勞者由脾胃久積風冷之氣不能灌溉四旁潤養
身體致腑臟俱虛陰陽衰弱其狀食不化心腹痞滿嘔吐

吞酸面色萎黃甚者心腹常痛大腸泄利手足逆冷骨節
痠疼口漸羸瘦是也
木香丸　治冷勞便利不調腹脹嘔逆困乏少力
廣木香　附子　肉豆蔻　乾薑　陳皮去白炒
麥門冬　郁李仁一兩　熟艾　鱉甲醋炙
柴胡　陳麯炒二兩　紫朴薑炒二兩　鍾乳粉　桂心五錢
共末用雄猪肚一具去脂膜細切入好米醋三升煮
極爛研細入末搗丸梧子大空心溫酒米飲任下二
十丸

猪肝丸　治冷勞腹痛下利面色萎黃四肢無力
雄猪肝一具去脂切片入米醋三升煮肝　紫朴薑汁炒　乾薑炒黑
陳皮去白炒　川連一兩　枯白礬　柴胡二兩　附子
桂心五錢　共末將肝爛搗如泥入白麪五匙沸湯煎
三五沸和肝末同搗丸梧子大空心酒下十丸日二
熱勞
論曰熱勞之病心神煩躁面赤頭疼眼澁唇焦身體壯熱
煩渴不止口舌生瘡食飲無味肢節痠疼多臥少時出盜
汗日漸消瘦是也

鱉甲丸　治熱勞羸瘦壯熱盜汗煩渴
鱉甲醋炙　柴胡　秦艽二兩　生地黃汁
生薄荷汁如無用乾者　生青蒿汁　生薑汁各一鍾慢熬
成膏共末入膏搗丸梧子大空心米飲下二十丸日
三服
人參湯　治熱勞心神煩躁肢體痠疼不能食
人參　茯神　赤芍　棗仁　甘草
知母　生地　枳實　栝蔞根　白薇一兩
水煎三錢空心溫服日二

蛤蚧丸　治熱勞煩躁面赤口乾脣燥骨節疫疼盜汗咳嗽痰壅力乏氣促

蛤蚧酥炙　人參　黃芪蜜炙　麥冬　胡黃連

甘草　地骨皮　知母鹽酒炒　柴胡　懷生地

鼈甲醋炙　紫菀　桑白皮五錢　細辛

杏仁去皮尖炒研一分　共末入蜜杵丸小豆大空心米飲下二十丸臨臥再下三十丸

青蒿飲　治暴勞熱四肢煩疼手脚心熱咽乾虛渴食少宜退熱

青蒿　甘草　龍骨　麥冬　知母

柴胡一兩　桃枝心一把　柳枝心一把　童便合

水煎四錢入葱白薤白各三寸空心溫服

地黃煎　治熱勞五心煩熱煩渴不止

生地汁　青蒿汁　生薄荷汁　童子便

白酒各一升入汁慢火熬　秦艽　鼈甲醋炙　柴胡去蘆二兩

丹砂飛過　麝香另研半分　共末入煎杵丸小豆大丹砂爲衣空心酒下二十丸日二

氣勞

論曰氣勞者由喜怒不節憂思過甚榮泣衛除穀氣不治故氣血爲之乾涸不能榮養肌肉使形體瘦瘁面色萎黃胸脇痞滿飲食減少羸瘦困乏故名氣勞

沉香湯　治氣勞心胸不利日漸消瘦四肢沉倦無力飲食無味骨節疼痛小便赤澀榮衛不和

沉香　川芎　桂心　檳榔　川歸

乾薑五錢　人參　草豆蔻　枳實　白茯苓

前胡八錢　黃芪二分　柴胡　訶勒皮　附子

甘草　五味子一兩　半夏薑汁炙二兩

生薑大棗水煎三錢空心溫服日二

天冬丸　治氣勞咳嗽喘慾下焦虛損上焦煩熱肌瘦

天冬　麥冬　熟地　鼈甲二兩　人參

牛膝　黃芪　山藥　杏仁　白茯苓

五味子　石斛　枸杞　訶勒皮一兩

沉香　紫菀　肉蓯蓉酒洗去甲二分　共末入蜜搗丸如小豆大空心煎大棗湯下二十丸日二

人參陳皮湯　治氣勞心胸煩悶痰涎壅塞不思食頭目昏眩

人參　陳皮　白芍　前胡　柴胡

鼈甲　枇杷葉炙三分　半夏　白茯苓一兩

大腹皮一枚全用　薑棗水煎三錢空心溫服

急勞

論曰急勞之病其症與熱勞相似而得之差暴也緣禀受不足憂思氣結榮衛俱虚心肺壅熱金火相刑臓氣受剋或感外邪故煩躁體熱頰赤心忪頭痛盜汗咳嗽咽乾骨節痠疼久則肌肉消爍咯涎吐血皆其候也故名急勞

青蒿飲　治急勞煩躁壯熱四肢無力痠疼

青蒿三兩　山梔　甘草五錢　地骨皮一兩

桃枝心　柳枝心各一兩　烏梅水煎三錢空心溫服

猪肝丸　治急勞瘦瘁日晚寒熱驚悸煩渴

雄猪肝二具去筋膜切片　生甘草十五兩為末　將肝與末拌勻入童便五升浸一伏時慢炙乾搗丸梧子大空心飲下二三十丸日三

葱白飲　治急勞潮熱盜汗肌肉消瘦

葱白　薤白　炙甘草七寸　青蒿心七枚

杏仁去皮尖炒七粒研　用童便浸一宿煎服

皂莢丸　治急勞咳嗽痰涎食少無力

猪牙皂一兩去皮炙　蝦蟆一枚要青黄色者去腸挂風處陰乾

麝香一錢另研　各研末和勻入羊腸內扎定碗盛安甑內蒸極爛研杵極細為丸約有二百餘粒每服熟水空心下二三丸避風取汗良久瀉血汗出去衣被用白粥將息調養合藥用五日或天德日忌見女人雞犬

風勞

論曰風勞者即肝勞之類也蓋肝主風風善行而數變無所不至勞傷之人氣血俱虚風邪易侵或遊行皮膚或沉

滯臓腑其病令人手足痲痺筋脉拘急頭旋目暗好怒多驚夢見衣縷臥語狂呼爪甲枯目黯黑是其症也故名風勞

敗龜板湯　治風勞氣虚咳嗽發熱

敗龜板醋炙　白芍　防風　川歸

海桐皮　虎骨酥炙　木通五錢　桂心　木香

酸棗仁　黄芪　麻黄去根節　大腹皮全用

牛膝一兩　水煎五錢入青蒿烏梅肉少許空心溫服

一方加熟地柴胡一兩

天麻散　治風勞氣虛不順
天麻　附子一兩　甘草　烏頭二兩　麻黃三兩
蕪荑仁炒　柴胡　秦艽　前胡　鼈甲
青蒿四兩　將藥粗搗末用雄猪脊骨一条白酒一斗
仝煮乾去骨爲末空心酒下三錢日二
茵陳蒿散　治風勞七種冷氣六極等疾脾胃虛寒不思
飲食痟利休息利二便秘澁及屢年不差者
茵陳蒿　人參　白术　石斛三分　白蕪荑
吳茱萸洗炒一兩　白芍藥　桂心　防風

桔梗五錢　紫菀　柴胡去蘆二分　犀角三分　共末用猪
肝一具切片去膜分三服每入末五錢慈白食鹽少
許拌勻濕紙包煨香熟細嚼酒下
虛勞咳嗽　虛勞痰飲　虛勞寒熱
虛勞潮熱　虛勞盜汗
虛勞咳嗽
論曰虛勞咳嗽者以肺傷胃弱榮衛衰微氣不溫充故也
肺主氣爲五臟之蓋其脉環循胃口肺臟勞傷則令人咳
嗽上氣或吐膿血寒熱潮作面赤口乾偏臥喜汗不能飲
食肌膚消瘦是也
蛤蚧湯　治虛勞咳嗽嘔吐痰涎胸膈不利喘急壅滿呀
呷有聲飲食不進
蛤蚧一對酥炙　人參　白茯　桑白皮一兩
杏仁去皮尖五兩　甘草五錢　每水煎二錢空心溫
服
阿膠丸　治虛勞咳嗽發熱羸瘦
阿膠　懷熟地　山藥　羚羊角　茯神
百合　地骨皮　五味五錢　麥門冬　人參

牡丹皮　遠志三分　蛤蚧一對酥炙　栢子仁炒　共末蜜杵
爲丸如彈子大木煎一丸細呷日二
虛勞痰飲
論曰虛勞之人陽氣不足水飲下咽入于胃腑不能流傳
致多痰飲其候胸膈痞悶稍息短氣怠惰嗜臥心下悸動
咳嗽痰木不欲飲食是也治宜調順三焦升降陰陽使氣
道流通痰飲自化
人參半夏湯　治虛勞脾不和痰飲留滯心胸煩悶嘔吐
痰涎頭昏目眩不思飲食

人參　半夏薑汁炒　赤茯一兩　大腹皮二枚
前胡　白芍　陳皮去白炒　柴胡　鱉甲醋炙三分
枇杷葉去毛炙　薑水煎三錢服

虛勞寒熱

論曰虛勞寒熱者以臟腑久虛陰陽交爭榮衛不足以致陽氣勝則熱陰氣勝則寒陰陽相勝故寒熱互作

秦艽丸　治寒熱虛勞四肢無力面色枯悴
秦艽二兩　黃芪　桂心　白芷　柴胡
鱉甲　肉豆蔻　桔梗一兩　人參　荊芥穗

麥冬　甘草　川歸　海桐皮　白芍
熟地　枳殼　木香　沉香　棗仁
檳榔五錢　薑水煎二錢空心溫服

前胡湯　治虛勞榮衛不和寒熱消瘦肢體煩疼頭目昏眩飲食無味多困少力
前胡　人參　羌活　獨活　枳殼
柴胡　桔梗炒　鱉甲一兩　甘草五兩　石羔
旋復花兩半　水煎三錢溫服

柴胡湯　治虛勞寒熱羸瘦不下食
柴胡　白茯三兩　人參　麥冬兩半　白术
枳殼二兩炒　生薑大棗水煎三錢空心溫服日二

虛勞潮熱

論曰虛勞潮熱者潮作有時也此由陰陽不和氣有偏勝其候頭面煩赤體熱潮躁臥寐不安是也

柳枝湯　治虛勞煩躁少力痰嗽面頰紅赤潮熱盜汗飲食無味五心煩熱百節疼
柳枝　柴胡　鱉甲一兩　木香　甘草
青皮　大黃炒五錢　水煎四錢入青蒿小麥溫服

羚羊角湯　治虛勞潮熱五心煩躁口乾咽喉不利
羚羊角　人參　白茯苓　柴胡　鱉甲醋炙
麥冬　棗仁去殼炒　地骨皮　羌活　懷生地
陳皮去白炒　知母　炙甘草　葛根　黃芪一兩
薑水煎三錢空心溫服日二

柴胡湯　治虛勞榮衛不和潮熱盜汗面黃痿瘦四肢骨節疼痛多困少力飲食少
柴胡　知母　甘草　鱉甲醋炙一兩　秦艽兩半
大棗水煎三錢空心溫服日二

鱉甲猪肚丸　治虛勞潮熱脣紅頰赤呼吸氣粗口乾盜汗大小便秘澁飲食減少困之

鱉甲九肋醋炙　柴胡　廣木香　青蒿　懷生地一兩　川連酒炒二兩　青皮炒五錢　共末用雄猪肚一具去脂用醃採洗淨入末藥于肚內扎定蒸極爛入石臼中搗千杵丸梧子大空心飲下二三十丸日二

虛勞盜汗

論曰寐寢之間汗出盜人氣血久則津液枯耗謂之盜汗此蓋虛勞之人陽氣外虛風在肌表腠理虛疎心氣不足故也不治則榮衛衰損肌肉消瘦變爲羸瘠

麻黃根湯　治虛勞盜汗不止四肢困乏無力

麻黃根　牡蠣童便淬　黃芪各等分　水煎三錢入葱白三寸溫服

黃芪湯　治虛勞盜汗不止及陽虛自汗

黃芪蜜炙　人參一兩　麻黃根二兩　牡蠣童便淬三兩　地骨皮五錢　大棗水煎三錢空心溫服日二

車前子散　治虛勞盜汗咳嗽潮熱

車前子炒五錢　木賊草炒　兔絲子酒浸一分

椒目炒一兩　共末用生猪肉精者一兩切片入末二錢拌勻濕紙包煨熟服

虛勞咳唾膿血　虛勞嘔吐血　虛勞不得眠

虛勞咳嗽膿血

論曰虛勞之人氣血久耗寒邪借熱伏結上焦內傷心肺殘賊榮衛心主血血爲榮肺主氣氣爲衛榮衛不調金火相剋其病難治惟因咳嗽間有膿血者津液腐也宜潤養上焦滋益榮衛則病緩而可已

蔞甤湯　治虛勞咳嗽咯吐膿血

蔞甤　百部　人參　知母　桑皮一兩　阿膠　馬兜鈴　麥冬　白茯五錢　水煎三錢入烏梅肉生薑

蛤蚧湯　治虛勞咳嗽咯吐膿血

蛤蚧　貝母　杏仁去皮尖炒　知母　鹿角膠　人參　枇杷葉去毛炙　桑白皮　甘草各[illegible]　葛根一兩　共末水煎二錢溫服

白前飲　治虛勞咳嗽上氣壅熱咯吐膿血

白前二兩　桔梗　桑白皮一兩　白茯苓

杏仁兩半　甘草一兩　水煎服

通神湯　治虛勞咳嗽不止肺氣損傷咯吐膿血痿瘦

白茯　枳實　人參　甘草　秦艽

柴胡一兩　生地兩半　土馬騣二兩　水煎二錢溫服

虛勞嘔吐血

論曰血與氣相隨而行外養肌肉內榮臟腑若臟腑勞傷則血液妄行損輕則隨吐而出損極則血下于胃因嘔而出胸膈氣逆甚乃吐血蓋虛勞之人臟氣內傷故也

香膠散　治血勞內傷吐血

阿膠　鹿角膠　枳實各半兩糯米炒　人參

荷葉　黃藥去皮麩炒　蒲黃生一兩四味全末　全研藕汁下一錢日二

人參散　治肺臟虛勞吐血

人參去蘆五錢　黃蜀葵一兩　共末空心米飲下一錢晚再下

獨聖散　治虛勞咯血吐血不止

楓香脂不拘多少研　用人參糯米飲空心下一錢日二

箬葉散　仝上

箬葉燒灰一兩　麝香研一錢　仝研勻用人參阿膠湯下一錢日二

虛勞不得眠

論曰老人臥而不寐少壯寐而不臥者何也少壯者血氣盛肌肉滑氣道通榮衛之行不失其常故晝日精而夜寐也老人血氣衰肌肉枯榮衛之道澁五臟之氣相搏其營氣衰少而衛氣內伐故晝不能精夜不得寐也虛勞之人氣血衰少榮衛不足肌肉不滑其不得眠之理與老人同

半夏湯　虛勞煩躁不得眠

半夏二兩　白茯四兩　糯米炒黃一合　生薑水煎三錢溫服日二

陳皮湯　治虛勞晝夜不得眠短氣食不下大病後虛熱痰冷

陳皮一兩　半夏五錢　川芎分半　甘草半分　薑水煎五錢入竹茹一丸日二

酸棗仁煎　治虛勞心熱憂懼不得眠

酸棗仁二兩半炒　乳香二兩炙去油　牛黃一分另研

丹砂五錢飛過　糯米二合炒　白蜜四兩　共末用白酒半觔入

蜜與末慢火煎如稀餳勿令焦收貯空心酒下一匙
日二

酸棗仁丸　治虛勞心煩熱口乾憂懼不得眠

酸棗仁一兩微炒　地榆葉微炙五錢　共末入蜜杵爲丸
如小豆大空心米飲下三十丸晚再下茶下亦可

虛勞失精

論曰經云腎者主蟄封藏之本精之處也蓋腎受五臟六腑之精而藏之氣盛則虛瀉有常虛勞之人精臟已虧邪氣乘之則藏者不固或于夢寐便致漏失無常其症小腹强急陰頭寒冷目痛髮落脉數而散芤動微緊是其候也

韭菜子散　治虛勞傷損小便失精及夢泄等症

韭菜子一兩　麥冬一兩　川芎三分　兔絲子酒煮一兩
車前子一合微炒　白龍骨煅三分　共末酒下三錢日
二

韭菜子丸　治虛勞漏精

韭菜子炒　兔絲子　天雄　車前子　龍骨一兩
黑乾薑　桑螵蛸炙　鹿茸三分　共末蜜丸梧子大黃
芪湯下二十丸

白龍骨散　治元氣虛弱精神不禁腰脊疼痛

白龍骨　肉蓯蓉　補骨脂一兩　兔絲子酒煮五錢
韭菜子炒五錢　共末酒糊丸梧子大空心酒下三十丸

正陽丸　治陽氣虛損下元冷極精洩不禁小便頻數腰脚無力飲食減少困乏

白馬莖酥炙　鹿茸二兩　附子　肉蓯蓉一兩
巴戟天　石楠　葫蘆巴　牛膝　五味子三分
韭菜子　石斛五錢　木香兩半　共末蜜丸梧子大酒

下二十丸

金鎖丸　治虛勞失精久服補骨髓去腎邪

巴戟天　白龍骨　山萸肉一兩　韭菜子四兩
共末蜜丸梧子大空心酒下二十丸

固氣不二丸　治虛勞元氣衰弱精氣滑泄夢中遺洩

乾柿　雞頭古雞頭粟下尖也　金櫻子　遠志一兩
共末用烏雞子汁杵丸梧子大空心酒下二十丸日
二

韭菜子散　治虛勞夢洩日漸消瘦

韭菜子炒一合　人參　大棗　黑乾薑
黃芪　赤芍　白龍骨炒　半夏薑汁炒　川歸
甘草一兩　共末入蜜杵小豆大空心酒下三十丸日
二
鹿茸丸　治虛勞腎氣虛乏失精腰脚無力小便數
鹿茸　補骨脂二兩　附子　牛膝
桑螵蛸　杜仲鹽酒炒　山藥　兎絲子　桂心
黃芪　肉蓯蓉酒浸　懷熟地　遠志一兩
白龍骨　澤瀉　黑乾薑　防風　牡蠣童便淬三分

共末入蜜杵丸梧子大空心酒下二三十丸日二
虛勞小便白濁　白淫　筋極　氣極
脉極即血極　肉極即肌極　骨極　精極六極詳總論中

虛勞小便白濁

論曰虛勞小便白濁者腎氣勞傷胞絡內冷氣道不宣通也腎主水腎虛則胞冷而津液停滯故令小便白濁如米脂而下

澤瀉散　治大虛損內傷腎氣不足小便濁
澤瀉　白龍骨　車前子　桑螵蛸炙　狗脊一兩
共末酒下二錢

七聖丸　治虛勞下元虛冷小便濁精滑不禁
原蠶蛾　牛膝　白石脂　白龍骨　桑螵蛸五錢
肉蓯蓉　山藥一分　共末酒煮糊丸梧子大空心酒
下二十丸日二

黃芪丸　治虛勞有熱虛煩口乾腰胯痛便濁如米泔
黃芪　茯神　羚角　牡蠣　甘草一兩半
川連　括樓根二兩　苦參半兩　雞膍胵黃皮五枚炙
共末入蜜杵丸梧子大飲下三十丸

人參湯　治腎虛引飲便濁腰痛
人參　五味子　川芎　川歸　遠志
澤瀉　桑螵蛸　桂心　熟地一兩　白芍
片芩　白茯　雞膍胵黃皮炙五枚　麥冬二兩
水煮羊腎一對取汁入薑棗煎藥五錢溫服日二

白淫

論曰內經謂思想無窮所願不得意淫于外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫夫腎藏精以堅為事志意內治則精全而嗇出思想外淫房室太甚則固者搖矣故使

淫泆不守隨溲而下也然本于筋痿者宗筋弛縱故也

金鎖丸　治下元虚冷小便白淫夢遺

原蠶蛾　韭菜子　補骨脂二兩　白龍骨

牛膝　桑螵蛸　山茱萸　兎絲子　肉蓯蓉一兩

共末入蜜丸梧子大酒下三十丸

秘真丸　治精氣不固白淫不止

白龍骨　砂仁五錢　訶勒皮五枚　丹砂一錢　共末

用糯米粥丸梧子大丹砂爲衣空心熱酒下二三丸

不可多服　若大便不通欲通用葱白湯點茶服之

卽通

龍骨湯　治白淫遺泄無故自出

龍骨五兩　人參　白茯　甘草　熟地

桂心　牡蠣二兩　水煎五錢空心溫服日二

石斛散　治陽氣虚憊白淫不止

金釵石斛一兩　巴戟天　兎絲子二兩

杜仲鹽水炒　桑螵蛸炙兩半　共末空心酒下一錢日二

筋極

丹參湯　治筋實極腳下腫滿而痛不能遠行腳心如割

筋陷折痛不可忍

丹參　木通　生地　麥冬　麻黃去節根

川芎　杜仲　牛膝　續斷　地骨皮

禹餘粮醋淬七次　桂心　川歸一兩　牡蠣童便淬

甘草五錢　每水煎五錢溫服日二

地黃煎丸　治足厥陰經有餘筋實極足下滿痛四肢筋

急

生地汁六升　天冬汁二升　生薑汁

白蜜　鹿髓　黃牛酥　棗肉取膏各三合

醇酒升半　茯神分半　枳殼　川芎二分　金釵石斛

黃芪炙一兩　甘草炙一兩　上六味共末先將煎三汁與酒

并煎減半入蜜髓酥膏仝熬如稠糖再下六末重湯

不住手攪勻丸梧子大空心酒下三十丸

氣極

甘露丸　治肺臟氣極風熱所傷津液不通

甘草炙　懷生地　天冬　大黃蒸一兩　遠志

桑白皮炙　防風　地骨皮　羌活　秦艽三分

羚角　胡黃連五錢　共末入蜜杵丸梧子大空心

薑湯下二十丸日二

脉極

鎮心丸　治脉極驚悸

丹砂　鐵粉　人參　遠志五錢　茯神一兩

虎睛一對　琥珀餅　牛黃　米片一分　金箔

銀箔廿張　共末入棗肉杵丸梧子大丹砂為衣金銀

湯空心下十丸服之安五臟

桑皮沐頭湯　治脉極虛寒鬢髮墮落

桑白皮一升　用井華水漬一宿煑湯沐鬢髮極佳

柏葉沐頭丸　治脉極虛寒鬢髮墮落

生柏葉一兩　附子五錢　豬膏五錢　共末入豬膏

丸作二十丸每用一丸入沐湯中洗頭令髮長不落

肉極

防風湯　治肉極肌肉變色舌強陰縮腳膝痠弱

防風　獨活　白茯兩半　人參　川芎

五加皮　乾薑　桂心　甘草　川歸一兩

附子五錢　共末酒煎四錢空心服

石南散　治肉極實熱身上如鼠走風痺脣口壞皮膚變

色

石南一兩　山藥二兩　山萸　升麻　萎蕤兩半

石羔　黃芪二兩　真珠　天雄炮化

甘菊　甘草五錢　共末酒下二錢

骨極

酒浸芍藥散　治骨極骨髓中痠痛

白芍　生地　鹿骨酥炙二兩　酒一斗浸晒為末酒

下三錢日二

木瓜湯　治骨極腰脊痠痛風虛氣衰不能久立腦髓痠

痠服之補虛損壯元陽

木瓜五枚去皮子切片用硇砂十兩取霜井蒸收貯每用二兩入後藥　雄雀四十隻去頭足入藥

賣鍋取肉入乾藥用椒末各二兩全瓜用酒二升慢熬膏　附子　兔絲子三兩

木香　沉香　天雄去皮臍製　羌活兩半　補骨脂炒一兩

白蒺藜　石斛　天麻酒煮　肉蓯蓉酒浸洗

大茴炒三分　共末入膏丸梧子大鹽湯下三十丸

精極

地黃飲　治精極臟腑俱損偏身虛熱骨節煩疼

生地汁　麥冬汁　白蜜二合　竹瀝一合　炙甘草兩半

片芩　石羔二兩　麻黃去根節一兩　人參
川芎兩半　桂心半　川當歸一兩　水煎五錢去滓入
汁蜜竹瀝分二服
地黃煎　治精極臟腑虛竭骨節煩疼精泄不止益氣養
神駐顏色調血脉
生地汁五斤　白酒一斗全汁　巴戟天
鹿茸　桑螵蛸炙　肉豆蔻去皮膏　附子　黃芪蜜炙一兩
蛇牀子　石斛　補骨脂炒　青木香　陳皮
牛膝　五味子三分　沉香　枳殼去白炒

蓽沉茄五錢　肉蓯蓉二兩　共末入地黃膏爲
丸如梧桐子大酒下三十丸

聖濟總錄纂要卷之十四

程　林雲來　纂
新安　查士標二瞻
　　　吳嘉枚个臣　較
江　湘郢上　閱

骨蒸傳尸門

虛勞五蒸　骨蒸肺痿　傳尸骨蒸　傳尸勞

虛勞五蒸

論曰虛勞骨蒸者本熱勞之氣熱著氣血深連骨髓使受

五臟久而不已各隨其臟氣之虛熏蒸而爲疾　骨蒸本
于腎其證早涼晚熱煩躁寢不安飲食無味小便色赤喘
息無力腰疼脚冷手心常熱蒸盛之時內變爲疳蝕人五
臟　脉蒸者本於心其證日增煩悶擲手出足翕欲飲水
唾白沫睡語驚恐脉數蒸盛之時亦變爲疳臍下悶或暴
下不止　皮蒸者本於肺其證大喘鼻乾口燥舌上白胎
小便如血蒸盛之時胸滿兩脅下脹背膊疼臥不安咳嗽
勞傷臟則唾血　肉蒸者本於脾其證體熱如火煩躁無
汗心腹彭脹食即欲嘔小便如血大便秘澁蒸盛之時身

赤臥不安　肝蒸者肝氣虛也肝虛則血無所藏血無所藏肝亦無所養使榮氣痼竭虛陽內蓄其證外寒內熱亦名內蒸按之附骨即內熱甚骨肉自消飲食無味皮燥不澤蒸盛之時目晾妄怒時驚四肢漸細足趺腫起
凡此五蒸與熱勞之病大同小異其治法有不同者蓋蒸病內著骨髓蒸發皮膚也昔人論蒸有二十三證細而推之臟腑之病變態多端皆在於虛不必拘之

豬肚黃芪丸方　治骨蒸虛勞傳尸肺痿欬嗽不止困重羸瘦飲食無味頭痛口乾涕唾稠黏渴不止者

犢豬肚一具以童子小便煮令熟細切焙乾搗爲末　知母剉焙　蕤蕢仁炒各二兩
紫菀去苗　大黃炒　檳榔煨　蒼朮米泔浸焙　鱉甲去裙襴醋炙
百部　地骨皮　黃芩去黑心　桔梗　貝母
茈胡　白茯苓　黃連　龍膽　人參
黃芪各一兩　右十九味搗羅爲末鍊蜜丸梧子大每服空腹溫酒下二十丸

地骨皮湯方　治五蒸
地骨皮　白茯苓　麥門冬　茈胡各一兩半　赤芍藥
甘草炙令赤各一兩　右六味搗篩每服五錢水煎食後分溫二服

茯苓湯方　治心蒸苦心驚悸慄男子因讀書損心氣傷思慮損心吐血心煩多忘失精神或身體瘙痒風癬或胸中氣滿
白茯苓　麥門冬　款冬花　獨活　檳榔各六兩
桂　防風　防己各五兩　甘草炙　枳殼四兩
地骨皮去土十兩　右十一味剉如麻豆大每服五錢以水二盞先煎山澤銀取水一盞半入藥并生薑半分切大棗三枚擘破同煎溫服早晨日晚各一

麥門冬飲方　治心蒸心中煩躁手足熱疼欲露其體驚悸怵惕咽乾虛渴面色萎黃失前忘後婦人血氣衰弱多傳此疾
麥門冬二兩　白茯苓　人參　龍齒
遠志各三兩　甘草炙一兩　防風　地骨皮各三兩
羚羊角一兩鎊末　共九味剉如麻豆大每用五錢以水二盞入山澤銀一分棗二枚同煎取一盞分溫二服若大患煩熱渴燥者入淡竹瀝一合煎服若曾經吐血亦治勞如上法一劑無不差

鱉甲湯方　治男子女人骨蒸熱勞皮肉消瘦面萎黃不思飲食夜多咳嗽涕唾稠黏骨節疼痛憎寒壯熱心腹氣脹坐臥不安發如瘧狀女人血風勞等疾

鱉甲去裙襴醋炙令黃二兩　秦艽二兩　紫菀一兩半　芘胡三兩

訶梨勒皮炮一兩半　牡蠣　麻黃去根節　犀角

知母　升麻　甘草炙　梔子仁　檳榔剉

木香　當歸　桔梗　大黃炒　桑根白皮剉

黃連　桃仁炒　人參　桂　萎蕤

芎藭各一兩　右二十四味擣篩每服三錢棗一枚烏梅

一箇生薑三片同煎熱服

鱉甲湯方　治虛勞骨蒸肌瘦盜汗潮熱咳嗽或衄亡血肢體倦怠飲食不下及室女勞熱經血不行時發潮熱煩燥虛渴

鱉甲九肋大者一枚浸一宿去裙襴脊骨更酥醋炙令赤用二兩半　人參

芘胡各二兩　白茯苓　地骨皮　枳殼　生乾地黃

牡丹　百部　芍藥　牛膝　貝母

黃芩　栝蔞根　當歸　山梔仁　桔梗

陳橘皮　麥門冬　天門冬　紫菀　白朮

桂去麤皮　桑白皮　檳榔各三分　大黃一　甘草炙各半兩

京三稜一兩五錢　草豆蔻去皮五枚　天靈蓋酥炙黃一兩

共三十味擣為麤末每服五錢生薑半分棗三枚同煎相熱服空心臨臥服　按方中勞證用天靈蓋甚多且物人所不忍其意為傳尸殺虫也今擇其方可用者亦備一二餘俱不取

鱉甲豬肚丸方　治骨蒸唇紅頰赤氣粗口乾遍身體熱或多虛汗大腸秘澁小便赤黃飲食全少

鱉甲去裙襴醋炙　柴胡　木香　青蒿

生乾地黃各一兩　黃連二兩　青橘皮去白半兩　共七味

擣羅為末用豬肚一枚去脂膜淨洗入藥末在內繫定蒸令爛熟入臼少許再杵為丸如菉豆大每服十五丸溫水下食前日午臨臥各一服

紫雪方　治骨蒸瘧疾瘟疫寒熱瘴病五尸五注心腹絞刺蠱毒魅鬼一切熱毒腳氣悶亂攻衝煩熱口中生瘡狂陽叫走及解諸毒兼金石草藥熱毒發黃瘴熱疼痛一切熱病方與和劑局方略不同　原方黃金壹百兩

金十五兩　銀十五兩　寒水石　石膏　磁石

滑石各三斤　右四石藥同擣碎後以金銀共六味一處

以水一石煮取一斗去金銀并石滓入後藥味
木香一兩 犀角五兩 丁香四兩 沉香五兩 甘草炙
升麻 玄參各一斤 右七味除前六味外用水三
斗煮取一斗絞去滓淨與前藥汁相和即內芒消五
升細研入藥汁慢火同煎手不住攪之可有一斗餘
即投入盆器內盛欲凝內木飛丹砂末三兩麝香末
一兩一分同砂如粉變和勻蓋覆之二日成霜雪矣
暴乾以新瓷或餅內密封盛貯之有病即取强人服
一錢冷水和服以意隨人强弱增損之脚氣病或增
服石藥發動毒悶者服之水和半錢如神凡服之即

仰臥以物搘腰令高使藥向胸府間若患眼赤及熱
痛者以冷水和之點眼大小眥初著微痛少時淚出
自定日三五次用夜亦如之即無不效口內瘡熱瘡
含如杏核許令消痛止 按局方有紫雪即此也藥品有遺之殊然亦少增者如之

骨蒸肺痿

論曰骨蒸肺痿者由榮衛虛損蘊熱熏蒸上焦傳播胸膈
使人肺熱葉焦發爲肺痿其證咯唾膿血胸滿短氣欬嗽
不止多痰或如膠涕或吐之不能出時發寒熱肌體羸瘦
是其候也

白前湯方 治骨蒸肺痿咳嗽涕唾如膠脊背煩熱
白前 桑根白皮炙 麥門冬各一兩半 旋覆花半兩
木通炒二兩 甘草炙一兩 右六味擣篩每用五錢水煎分
溫二服空腹食後各一

皂莢飲方 治骨蒸肺痿咳嗽咯血病重者
皂莢一挺長一尺煮炙黃去皮 白錫一兩 生薑半兩 乾棗
七枚去核 右四味除錫外細剉入錫以酒一升煮取半

升每食後溫服二合

治骨蒸肺痿欬嗽方
白蜜 熟羊脂 熟羊髓 熟猪脂 生薑汁
地黃汁各二升 右六味依次第下於鍋中慢火煎不住
手攪煞至四分減一即止貯瓷器中遇美食中著一
兩匙日三四服

治肺痿骨蒸咳嗽上喘呀呷有聲方
青羊肺一具煮熟去筋膜薄切焙乾 葶藶子米醋浸暴乾微炒 二味擣
羅爲末鍊蜜丸如梧子大每服七丸空心米飲下加

至十九以知爲度

傳尸骨蒸

論曰傳尸之病由相尅而生毒氣內傳五臟漸至羸極死則復傳其家屬一人故曰傳尸其初得病半臥半起者名曰殗殜氣急欬者名曰肺痿骨髓熱者名曰骨蒸內傳五臟者名曰復連忽而不療乃至絕後假如男子因虛損得之其源先從腎起初受尸氣兩脛痠疼腰脊拘急行步腳弱食減耳鳴夢洩陰汗腎病不已次傳于心則驚悸少氣夢見先亡時有盜汗食飲無味口瘡好臥唇頰赤白五心

皆熱朝輕夕重心病次傳于肺則氣滿咳嗽喘急口燥四體微弱肌膚枯槁䩄起如麩或刺痛如蟲行鼻乾不聞香臭聞惡氣欲吐肺病不已次傳於肝面無顏色坐常顰眉視不及遠目昏睛黃或赤澀痛惟欲合眼又不得睡肝病不已次傳于脾則兩脅虛脹食不消化時復溏利腹肚痛脹唇舌焦乾髮無光澤上氣喘息利赤黑汁傳變至此不可復救蓋傳五臟已盡故也

麝香散方　治男子婦女傳尸骨蒸冷熱五勞

麝香研五分　甘草去病人中指大煨男左女右　東引桃枝　東引柳枝

石榴皮各一握　青蒿　犀角半兩　阿魏

柴胡各一兩　葱白　薤白各七莖　右十一味除麝香外剉碎同用童子小便二升半浸一宿別入檳榔末三錢同煎至一升半去滓分溫三服男病女煎女病男煎勿令孕婦六畜見初服訖如人行五里又進一服恐惡心可含白梅病在上即吐在下即瀉出各惡物如蟲類及頭髮馬尾狀兼身如蟻行瀉後以葱粥及軟飲補之仍服後方茯神湯調和五臟避風一月若遠年重病不過兩劑其吐下蟲腹紅色可治黑者或

差或否白色者不可治也

茯神湯方　治傳尸骨蒸先服麝香散取蟲後服此方補五臟

茯神　人參　遠志　甘草炙　陳橘皮

當歸　龍齒　熟乾地黃各一兩　五味子

麥門冬　桂各一兩半　黃芪二兩　右十二味每服五錢入棗七枚生薑五片同煎空心溫服日三

珍珠丸方　治傳尸骨蒸咳嗽上氣痰喘寒熱四肢瘦弱

珍珠末　獺肝　茯神　貝母　韭胡

龍腦 黃連 芍藥各一兩半 白檳榔一枚 旋覆花各一兩

右十味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後溫水下日再

黑虎丸方 治傳尸骨蒸勞

乾蝦蟆一枚去腸足分為兩片以辛生一十味炙黃 蜈蚣一對各取一下并去頭足炙酥炙黃

麝香研 天靈蓋酥炙 雄黃研 白狗糞炒黃

麝香研各一兩 烏驢蹄炙乾二兩 乳香半兩 猪膽一枚取汁于碗中慢火煨

右十味擣研九味為末合勻細以猪膽汁同黑文武火熬米飯為丸如梧桐子大先吃熱粥一椀次以芋根香水沐浴次以沙糖麝香少許調冷水一盞投藥一丸於星月下浸一宿平旦空腹服之厚被蓋臥應是傳尸冷勞者脊骨中出白蟲或由赤蟲若骨蒸則汗出腰脚疼痛不遂脚下出汗如膠漆為風氣水病從汗一粒若小兒無嘗可服半粒如前法有蟲出鼻內如線狀是效

烏雞丸方 治傳尸勞尸疰骨蒸眼目昏澁面色青黑咽喉噎塞痰涕咳嗽或痃癖攻刺疼痛胸膈滿悶時或恚怒或多感傷情思不樂夢寐虛驚精病滑泄失血悄寒潮熱盗汗肩背拘急腰脊股節煩疼四肢少力不喜飲食小便黃色大便不通乍進乍退服取蟲藥後宜服此

黃連 附子去皮臍各二兩 柴胡 白附子

當歸 秦艽 槐膠 甘草炙 蓯蓉酒浸切焙

續斷 遠志 巴戟天各一兩 乳香

陳橘皮 雄黃研 丹砂研各半兩 丁香 乾薑炮各一分

右十八味擣研極細先養雄烏雞一隻以雄黃三兩為末分作三十分每日拌飯餵月日用大麻子一升餵盡宰治去毛及觜爪并腸肚留心肝將前藥末入在雞腹內以麻線縫定再用無灰酒一斗銀器石鍋內用文武火煮令雞熟取出除去粗骨將雞并腸內藥同細研更將雞骨焙乾擣羅為末同研藥和入臼中杵千百下丸如梧桐子大每服二十丸以暖酒吞下空心日午臨臥各一服

傳尸勞

論曰傳尸勞者骨蒸之病流傳五臟也其證殗殜半臥半起旦即醒然午後微熱情常不悅心多驚悸夜即盜汗夢與鬼交兩頰紅赤脣如血色睡不得臥欲食不能食或喘

急咳嗽心胸滿悶背髆煩疼兩目精明四肢無力脊膂拘
急膝脛痠疼兩肋虛脹時或微利鼻乾口燥漸至尫羸雖
死在須臾精神尚爽是其候也治之若緩猶如水涸不覺
其死

蘇合香丸方　治肺痿客忤鬼氣傳尸伏連殗殜及卒得
心痛霍亂吐利時氣諸瘧瘀血月閉痃癖丁腫驚邪氣狐
魅瘴癘諸疾

蘇合香　白朮　丹砂　沉香　訶梨勒肉
丁香　木香　莎草根　白檀香　乳香

蓽撥　犀角鎊　安息香各一兩　麝香研　龍腦研各半兩

右十五味搗研為末鍊蜜和丸如雞頭實大每服
丸溫酒或人參湯嚼下一名白朮丸此藥大能安氣
血卻外邪凡疾自內作不曉其名者服此往往得效
雖治氣注氣厥氣逆氣不和吐利榮衛阻塞尤有神
功人家不可無此藥以備急難辟疫尤驗倉卒求人
參不得白湯亦可勿用酒古方雖云用溫酒下口多
不效昔有人病瘵日漸羸瘠至于骨立肌熱盜汗勞
狀皆具凡服八九兩所苦都差一方用牛黃半兩古

方本無乃後人加之

諸疝門

寒疝　心疝　厥疝　寒疝心腹痛
七疝　蠱病

寒疝

論曰寒疝為病陰冷內積衛氣不行結於腹內故遇寒則
發其狀惡寒不欲食手足逆冷繞臍痛白汗出

蓬莪茂湯方　治寒疝四肢逆冷氣弱汗出

蓬莪茂一兩　乾薑半兩　附子去皮臍一兩　芎藭三分　桂一兩

白朮三分　檳榔一兩　芍藥一兩

共八味剉如麻豆每服三錢水煎溫服不拘時

人參湯　治寒疝冷痛氣弱汗自出不欲食

人參　白茯苓各一兩　蜀椒去目炒　乾薑各半兩
附子去皮臍　檳榔　青橘皮湯浸去白　白朮各一兩

右八味剉如麻豆每服三錢水煎溫服不拘時

烏頭湯　治寒疝滿逆手足不溫徧身疼痛

烏頭大者五枚去皮尖生用　白蜜一斤　桂心二兩

三味先以慢火煎蜜及烏頭候蜜減半去烏頭別煎一

處以水三盞煮桂候減半濾去桂將桂汁共和別煎
取二盞許服時每用半盞溫服未知再服共知如醉
狀得吐爲中病也

高良薑湯　治寒疝卒痛積聚不散上衝心胸與陰相引
痛則汗出

高良薑　檳榔　木香　當歸各一兩半　吳茱萸炒一兩

右五味擣篩每服三錢水煎溫服

心疝

論曰內經門診得心脉而急病名心疝小腹當有形也心

爲牡藏小腸爲之使故曰小腹當有形也藏病必傳于府
今心不受邪病傳于府故小腸受之爲疝而痛小腹當有
形也世之醫者以疝爲寒溼之疾不知心氣之厥亦能爲
心疝心疝者當兼心氣以治之

當歸湯　治心疝心痛虛冷煩悶

當歸　乾薑　赤芍藥　黃芪　蜀椒去目　人參
半夏爲末薑汁作餅子焙乾　附子去皮臍　青橘皮去白　甘草炙
一兩　厚朴薑汁炙一兩　桂心半兩　右十二味㕮咀如麻豆
每服三錢水煎溫服不拘時候

牡丹丸　治心疝心痛如錐所刺

牡丹皮　桂心　芍藥　烏頭去皮臍　細辛
甘草炙　木香　吳茱萸湯浸焙乾　檳榔各一兩

右九味擣羅爲末鍊蜜爲丸梧桐子大每服二十丸
溫酒下不拘時

蓬莪茂煮散　治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪茂　檳榔　附子　甘草炙　桂心各一兩
胡椒半兩　蓽茇　白朮各三分　右八味擣羅爲散每服二
錢水煎溫服

橘皮益智湯　治疝冷在內陰氣交攻心痛如刺

青橘皮去白　益智去皮　烏頭去皮臍　威靈仙去土各一兩

右四味剉如麻豆每服三錢生薑三片鹽少許同煎
溫服食前日二

厥疝

論曰內經謂黃脉之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣
名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風夫疝藏疾
隱而難見陰沈而伏也今脾虛風寒客于腹腹之間不能
與胃通行水穀之氣結而成積使氣道厥逆而痛故謂之

厥疝也

山茱萸丸　治厥疝上搶心腹冷痛

山萸　吳萸炒　食萸　楝實麸炒　馬蔺花　懷香子

青橘皮　橘紅炒　京三稜　乾薑各二分　附子一枚重半兩者去皮臍

右十一味擣羅爲末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸酒或鹽湯下空心服

木香湯　治厥疝逆上攻腹冷痛

木香　檳榔　烏頭　細辛　當歸　吳萸炒　枳殼麸炒　甘草炙各一兩　共八味㕮咀如麻豆大每服三錢水煎溫服

寒疝心腹痛

論曰疝者痛也本緣寒氣內積陽衰陰盛不得散釋寒邪相得攻擊或上搶心或腹內疼刺發即俱痛故名寒疝心腹痛也

人參湯　治寒疝心腹痛胸脇支滿不下食汗出嘔逆

人參　白茯苓　檳榔　木香　芍藥　芎藭　當歸

桂心　青橘皮去白各一兩

共九味每服三錢水煎溫服不拘時

蜀椒湯　治寒疝心腹痛不可忍

蜀椒去目炒二百粒　附子一枚去皮臍　粳米半盞　乾薑半兩

半夏湯洗七徧去滑切擣十二枚　甘草炙一兩　共六味㕮咀如麻豆每服五錢入生薑半分棗二枚同煎溫服

地黃湯　治寒疝心腹痛汗出厥冷

生乾地黃三兩　甘草炙　白茯苓　人參　當歸各二兩

羊肉去脂切三斤　右六味前五味細剉將羊肉用水二斗煮取汁一斗去羊肉入諸藥煮取七升入葱白一把棗十四枚再煎取六升絞去滓溫服一盞不拘時

當歸湯　治寒疝心腹疼裏急

當歸三兩　生薑五兩　羊肉去脂膜切作片一斤　三味以水一斗煮取五升去滓每服一盞不拘時日三夜一

七疝

論曰疝病有七厥逆心痛足寒飲食即吐者名厥疝腹中氣滿心下盡痛氣積如臂者名堅疝寒飲則腹中盡痛者名寒疝腹中乍滿乍減而痛者名氣疝腹中痛在臍傍者名盤疝腹中痛在臍下有積聚者名胕疝小腹與陰相引而痛大便難者名狼疝凡此七疝皆寒氣內積血氣

發泄不得通利冷劇則痛故皆謂之疝難經曰任之為病
其內苦結男子為七疝女人為瘕聚蓋以此也

桃仁湯　治諸疝

桃仁（去皮尖雙仁）　吳茱萸（炒）　陳橘皮（去白）　海藻（洗去鹽）
白茯苓　羌活　蒺藜子（炒去角各三兩）
共七味每服三錢生薑一棗大同煎溫服

厚朴丸　治七疝肢體寒厥腹堅痛滿悶

厚朴（薑汁炙）　附子（去皮臍）　蘹香子（炒）　白朮　桂心
乾薑　枳殼　青橘皮　芎藭　烏頭（去皮臍）　木香
當歸（各一兩）　右十二味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大
每服二十丸溫酒下薑湯亦可

蠱病

論曰經謂脾風傳之腎病名疝瘕小腹冤熱而痛出白一
名蠱夫脾受風邪傳于腎經邪熱內爍故其證小腹冤熱
而痛其精失守故其證溲出白液病名曰蠱以邪熱內爍
其精不守久而弗治適以喪志也水之精為志志喪則精
從之左傳謂惑以喪志為蠱者如此

大建中湯　治蠱病小腹急痛便溺失精

黃芪　遠志　當歸　澤瀉（各三兩）　芍藥　人參
龍骨　甘草（炙各二兩）　八味剉如麻豆每服五錢生薑三
片棗二枚水煎溫服

澤瀉丸　治蠱病小腹冤熱而痛精氣不守溲便白出

澤瀉　補骨脂（炒）　巴戟天　五味子　石斛
芍藥　人參　甘草（炙各一兩）　共八味為末鍊蜜丸如梧
桐子大每服三十丸溫酒或鹽湯下空心日午臨臥
各一服

乾地黃丸　治蠱病精氣不守便溺出白小腹冤熱而痛

熟乾地黃（二兩）　鍾乳粉（半兩）　龍骨　菟絲子（酒浸一宿別擣）
磁石（火煅醋淬七遍）　芍藥　黃芩（各一兩）　右七味擣羅為末
酒煮麪糊丸如梧桐子大每服二十丸酒或鹽湯下

陰疝門

陰疝　陰疝腫縮　陰疝卒腫痛　控睾

陰疝統論

論曰疝者痛也邪氣聚于陰令陰器腫大而痛者陰疝也
一名癩疝其類有四即腸癩卵脹氣癩水癩是也世俗云
疝氣亦云小腸氣或曰膀胱氣原其病本緣腎氣通於陰

與膀胱爲表裏胞囊者膀胱之候此二經不足下焦受寒
皆能致陰卵腫大或發疝痛故通稱爲陰疝若寒溼之氣
有逆於小腸者卽小腸控睪而痛陰丸上下謂之腸㿗寒
氣客於經筋足厥陰脉受邪脉脹不通邪結於陰卵謂之
卵脹腎虛之人因飲食不節喜怒不時津液內溢下流于
腎寒氣結聚不散謂之氣㿗水氣盛則津液內結謂之水
㿗水㿗氣㿗病生於標故鍼灸可治其疾易愈腸㿗卵脹
病生於本邪氣入深其治難差

陰疝

論曰黃帝鍼經曰足厥陰之脉環陰器抵小腹是動則病
丈夫㿗疝卽陰疝也腎慾勞傷腎水涸竭無以滋榮肝氣
故留滯內結發爲陰病陰疝之病世俗論陰疝者爲腎餘
氣外不知邪實又本於肝經云治法當爲邪氣之實補肝
經之虛

蒺藜子湯　治陰疝
蒺藜子 炒去角　附子 去皮臍　山梔子仁 各一兩
右三味㕮咀如麻豆每服五錢水煎溫服食前服

昆布丸　治陰疝腫大偏墜
昆布 洗去鹹　海藻 洗去鹹　蒺藜子 炒去角　蕪荑仁 炒一
檳榔 各一兩半　枳殼 去瓤麩炒　大麻仁 研各二兩　木香
黃芪 剉　訶藜勒 去核炒各三分　陳橘皮 去白炒　桃仁 去皮尖雙
仁 炒　兔絲子 酒浸一宿別搗各一兩　共十三味擣研爲末和勻
鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心食前溫酒或
鹽湯下

沙參丸　治疝氣
沙參 二兩　昆布 洗去鹹　蘹香子 炒各半兩　三味爲末酒煮
麪糊丸如梧桐子大每服二十丸空心食前溫酒下

二氣丸　治陰疝上而不下臍腹疼痛
石硫黃 研　黑鉛 各一兩　二味先以鉛於銚內鎔成汁
次下硫黃俟焰透移下候冷取出研爲細末糊和丸
如梧桐子大每服三十丸酒下

葫蘆巴煮散　治陰疝攻痛
葫蘆巴　沉香　馬藺花　蓬莪茂 煨　蘹香子 炒香一兩
半　楝實 取肉麩炒　木香　蒲黃　檳榔 剉　桂心 各一
兩　附子 去皮臍三分　甘草 炙半兩　共十味擣羅爲散每
服三錢水酒同煎空心食前溫服

葫蘆巴丸　治陰疝氣攻疼痛

葫蘆巴　補骨脂炒　白豆蔻去皮　萆薢　青橘皮

蘹香子　附子炮去皮臍　肉蓯蓉酒浸　兎絲子　牛膝酒浸

梓心　防風各一兩　右十二味爲細末酒煮麪糊丸如菉豆大每服二十丸空心生薑鹽湯下

癒病丸　治陰疝攝痛不可忍

韭子炒　芎藭　二味等分爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下

陰疝腫縮

論曰陰疝腫縮者寒邪客于厥陰之經而陽氣不能自溫故令諸筋拘急陰器緊縮而疼痛也肝者筋之合也筋者聚于陰器而絡于舌本脉不營即筋縮急筋縮拘則引卵與舌故舌卷卵縮也皆厥陰爲病也

雞翅散　治陰疝腫縮

雞翅右左都用不拘多少燒灰　一味細研爲散每二錢溫酒調下不拘時

雄黃洗　治陰疝腫縮

雄黃研　甘草各一兩　礬石研二兩　三味擣研爲末每用藥一兩熱湯五升通手洗腫處良久再煖洗

車前子塗　治陰疝腫縮

車前子不拘多少　一味擣羅爲末湯調塗腫處

蔓菁子散塗　治陰疝腫縮

蔓菁子不拘多少　一味擣羅爲散溫水調塗腫處或絹帛傅之以差爲度

陰疝卒腫痛

論曰陰卒腫痛者腎氣虛弱基受邪氣傳入陰中冷熱相搏故卒然而痛也痛甚則邪勝邪勝則熱勝熱勝則腫皆卒然而作也

雞翎散　治陰卒腫痛

雞翎一大莖燒灰　蛇牀子一兩　二味擣羅爲散每服一錢溫酒調下如左邊腫即取雞右翎右邊取左邊翎

木香散　治陰卒腫痛攻注臍腹悶

木香半兩　赤茯苓一兩　牡丹皮三分　防風半兩　檳榔一兩

澤瀉三分　郁李仁一兩湯浸去皮炒　七味擣羅爲散溫酒調下

雄黃淋洗　治陰腫

雄黃　白礬　甘草炙各一兩　三味爲散每用藥一兩以

水一斗煎取三升通手淋洗至冷候汗出差

黑豆熨 治坐久卑溼忽陰囊虛腫氣上築

右方以米醋炒黑豆青布袋盛熨心腹更以椒葱湯淋煠腰膀厚衣蓋下部然後服諸藥

治陰腫偏著一邊連小腸痛不可忍

右方以蘹香苗葉取汁一斗服之日三四服其滓貼腫處

控睾

論曰甲乙經曰小腹控睾引腰脊上衝心肺邪在小腸也

又曰小腸病者小腹痛腰脊控睾而痛夫小腸者連心系屬于脊貫肝肺絡心系其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既盛則有厥逆之證其氣上衝肝肺客冷散於胸結于臍控引睾丸上而不下痛引小腹甚則衝於心胸蓋其經絡之所系屬然也

蘹香子散 治小腸受邪控睾痛引小腹

蘹香子炒 蓽澄茄 楝實一方用巴豆同炒去豆不用 木香各一兩半 葫蘆巴 青橘皮去白各一兩 檳榔半兩

共七味為散每服一錢溫酒調下空心食前日二

吳茱萸散 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛腰背不伸

吳茱萸湯洗炒 楝實剉九枚 巴豆十四箇搥令微破二味同炒候入楝實黃焦色去巴豆茱萸不用楝實去核用 沉香半兩 木香 馬藺花 蘹香子炒各一分

右七味除巴豆茱萸不用外擣羅為散

每服二錢炒葱酒調下空心夜臥發時服

木香丸 治小腸受寒氣控睾牽痛

木香一兩 石南 肉蓯蓉酒浸切焙別為末 牛膝酒浸切焙別為末

菖蒲 蘹香子炒 楝實炒各二兩

共六味除蓯蓉牛膝二味別作末外擣羅為末以酒

一升熬蓯蓉牛膝成膏和丸如梧桐子大每服三十丸空心食前以紙裹葱白一寸煨熟細嚼溫酒下

聖濟總錄纂要卷十四終

聖濟總錄纂要卷之十五

程　林雲來　纂
新安　程之𧶘象六
　　　程芝稑蘭穎　較
　　　江　湘鄂上　閱

大小便門

大小便關格不通　小便不通　小便不禁

大小便統論

論曰脾胃大小腸膀胱者倉廩之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而入出者也蓋營受水穀之真精榮衛之根源大小腸膀胱得以變化皆營爲之本是以小腸爲受盛之官水穀之末分也及其化物歸于膀胱而爲溺轉于大腸而爲糟粕必由氣化則能出矣或陰陽之氣不平寒熱相勝或氣實窒而不通或氣虛損而遺泄或燥而結或熱而秘皆陰陽不和之病也治此者勿徒以寒熱爲治必酌滌蕩熱劑枯燥反傷和氣耗其精血津液若關格不通三焦約病責以榮行之否塞若疾後數便與失志者治必澁之病又以津液不足止可滑以利之潤以滋之苟濫以攻劑

則糟粕不通眞氣受弊不可不知也

大小便關格不通

論曰大小便不通者陰陽關格三焦約之病也陰陽和平三焦升降則水穀糟粕以時傳導今陰陽偏盛氣否于中則榮衛因之以不行故氣結于腹內脹滿不通而大小腸俱閉塞也

芒硝湯方　治關格不通脾腸妨悶大小便不通

芒硝二兩半　冬葵子炒二合　滑石三兩

三味除芒硝外㕮咀每服五錢水煎再入芒硝末半錢更煎空心溫服

茱萸湯方　治腹急脹滿關格大小便不通

吳茱萸湯浸炒　大黃　當歸　桂心　赤芍藥　甘草炙　芎藭各二兩　人參　細辛各四兩　桃白皮一斤　乾薑一兩　雄黃三分　珍珠末半兩與雄黃同細研　右十三味將十一味搗篩每服三錢水煎再入雄黃珍珠末一字酒半盞更煎三沸空心服之

車前子湯方　治大小便俱不通

車前子五兩生用　木通四兩　黃芩　郁李仁湯浸去皮尖雙仁研如膏

子065-270

各三兩 右四味將前三味搗篩與郁李仁拌勻每服五
錢入芒消半錢同煎服

猪脂酒方 治大小便不通

猪脂半斤細切 一味以酒一升微煮沸投猪脂更煎二
沸分為二度食前溫服未通再服

髮灰散方 治大小便不通

亂髮一兩淨燒灰 一味細研每服三錢溫水調食前服日
三以通利為度

茯苓丸方 治大小便不通

赤茯苓 芍藥 當歸 枳殼 白朮 人參各五兩
大麻仁 大黃剉各三 共八味為末煉蜜丸如梧桐子
大每服十五丸至二十丸空心煎茅根湯下

治大小便不通腹脹堅脹蒸下部方

蓮葉二兩 葱三七莖并鬚用 皂莢一挺炙剉 生姜一兩切 共四
味以漿一斗二升煮十餘沸并滓分兩度用旋盛入
小口瓷缸中坐缸口上薰蒸冷則易之未通再傾藥
于桶斛中添熱水坐蘸下部即通

小便不通

論曰腎臟不足氣不傳化膀胱有熱水道不宣故小便不
通也令人小腹脹滿其氣上衝心腹彭亨甚則喘急不能
升降內經曰膀胱不利為癃者如此也

滑石散方 治小便淋澀疼痛不通

滑石 海金沙 木通等分 三味為散每服二錢煎燈
心湯調下

松煙散方 治小便不通

墨上好者研半錢 酒半小盞 葱白二莖 膩粉研半錢 四味
同煎至七分放溫去葱白頓服即通

獨蒜塗臍方 治小便不通

獨顆大蒜一枚 梔子仁三七枚 鹽花少許 三味爛搗攤
紙上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通

治小便不通久即成淋方 以琥珀搗研成粉每服二錢
濃煎萱草根汁調下空心或食前服葱湯調下亦佳

杏仁散方 治卒不得小便

杏仁去皮尖雙仁十二錢 一味炒黃研細末米飲調下立差

牛膝湯方 治小便不通莖中痛及女子血結腹堅痛

生牛膝一握根莖葉 黃芩半兩 當歸一兩 三味細剉每服

五錢水煎溫服

桑螵蛸湯方　治小便不通

桑螵蛸炙三十枚　黃芩二兩　二味細剉用水三盞煎分溫二服相次頓服

治小便不通臍下急痛脹悶欲絕鹽熨方

鹽二斤　一味鍋中炒令極熱布帛裹熨臍小腹以小便通快為度

石韋湯方　治小便不利

石韋去毛　瞿麥穗　冬葵子各二兩　滑石五兩　共四味擣羅為散每服二錢溫水調食前服

治小便不通方

蓬莪茂　樸香子　茶葉各半兩　三味擣羅為散水煎入鹽二錢葱白二寸同煎空心服

小便不禁

論曰內經言膀胱不約為遺溺亦腎虛不能約制水液故便利多甚則下焦傷竭其氣不固而小便不禁也

蓯蓉丸方　治腎臟虛冷腰膝無力小便不利不禁或溺白色

肉蓯蓉淨刷去皺皮酒浸二宿薄切焙乾二兩半　杜仲去粗皮炙紫色橫剉二兩半

黃耆三兩　韭子水淘去浮者焙二兩焙乾　桂心二兩　牛膝酒浸二兩

山茱萸二兩　右七味擣羅為細末鍊蜜丸和更入臼內涂酥杵令勻丸如梧桐子大每日空心煎黃耆湯下三十丸至晚再服

鹿茸散方　治腎臟虛腰臍疼冷夜遺小便

鹿茸去毛酥炙令黃　烏賊魚骨去甲炙各二兩　當歸　白芍藥

龍骨研　人參　桑寄生各一兩　桑螵蛸一兩用炒破慢火炙令黃

右八味擣前七味為末更與龍骨同研令勻細每服

一錢酒溫調服日三

兔絲子散方　治小便不禁

兔絲子酒浸一宿焙乾別研細如粉一兩　蒲黃炒　黃連各一兩半

肉蓯蓉酒浸一兩　五味子　雞膍胵黃皮炙黃色兩半　共六味先擣四味為細散再入兔絲子粉與蒲黃同研勻細每服兩錢酒調食前服日三

黃耆散方　治小便不禁

黃耆　莉脊去毛　牡蠣煅　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩　萆薢

牛膝酒浸　赤石脂研　山茱萸各二兩半　土瓜根三兩　右

九味先擣羅入味為散更與赤石脂同研勻每服一
錢酒調食前服至午間夜臥各一服加至二錢

雞腸散方　治小便不禁日夜無數

黄雄雞腸四具切破淨洗炙黄　肉蓯蓉酒浸　苦參　赤石脂研
白石脂研　黄連各五兩　共六味擣四味為散更與赤
白二石脂同研勻細每服二錢酒調食前服日二夜一

鵲巢散方　治小便不禁

重鵲巢中草一斤燒作灰細研如粉　薔薇根皮去皮五兩　二味先
擣薔薇根為散每服三錢水煎去滓再入鵲巢灰二

二錢空心服

小便利多　小便出血

小便利多

論曰腎者主水膀胱為腑今腎氣不足膀胱有寒不能約
制水液令津滑氣虚故小便利多久不差則腎氣傷憊眞
元耗損腰脊痠痛身體寒顫羸乏之病生焉

覆盆子丸方　治元臟虚弱臍腹疼痛膝脛少力百節痠
疼昏倦多睡小便頻濁頭旋痰唾背脊拘急飲食無
味澀順臟氣補益下經

覆盆子　黄耆　肉蓯蓉　烏藥　五味子　石斛
補骨脂　澤瀉　蓽澄茄　沉香　巴戟天一兩　芎藭
當歸　赤芍藥　山茱萸各三分　兔絲子二兩酒浸二日
熟乾地黄一兩半　共羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服
二十丸加至三十丸食前溫酒下米飲鹽湯亦可

八味補骨脂丸方　治小便滑數

補骨脂　巴戟天去心　桑螵蛸炒　兔絲子酒浸三日別研
牛膝酒浸切焙　乾薑半兩　熟乾地黄一兩　枳殼麩炒去瓤二分
共擣羅為末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十

丸空心食前溫酒下粟米飲亦可

雄黄丸方　治小便滑數

雄黄研如粉一兩半　乾薑半兩剉入鹽四錢同炒黄色　共擣研為末用
乾蒸餅為末入水内拌和擣熟丸如菉豆大每服十
丸加至二十丸空心鹽湯下

牡蠣丸方　治膀胱虚寒小便數

牡蠣　獨活　狗脊去毛三分　肉蓯蓉一兩　龍骨半兩　共
為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯下空
心食前

治小便頻數及引飲不止糯米簽方　取純糯米簽一手大臨臥炙令轉熱啖之以温酒送下不飲酒人湯下多啖彌佳行坐良久待心空便臥一夜十餘行者服之即止或言假火氣温水道不然也大抵糯稻止縮水凡人夜飲酒者夜輒不溺此糯米之力也昔有人病渴垂死有人用糯稻稈及根斬去穗取中心淨器中燒作灰每用一合許湯一碗沃浸良久澄去其滓嘗味如薄灰汁乘渴令頓飲之是夜減飲水七八升此亦糯稻縮水之一驗也

小便出血

論曰內經謂悲哀太甚則胞絡絶絶則陽氣動中數溲血又曰胞移熱於膀胱則癃溺血二者皆虛熱妄溢故溲血不止也治宜去邪熱調心氣

金黃湯方　治小便出血水道中澀痛

鬱金　瞿麥穗　生乾地黃　車前葉　芒硝　滑石

每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓温服不拘時候

車前葉湯方　治小便出血

車前葉　茜根　黃芩　阿膠　地骨皮　紅藍花一兩

每服五錢匕水一盞煎至七分温服不拘時候

人參湯方　治小便出血

人參　生乾地黃　白芍　桔梗　當歸　甘草　桂心　芎藭一兩　淡竹茹二兩　每服四錢匕水二盞煎至一盞温服不拘時候

阿膠湯方　治腎客熱連心小便出血疼痛

阿膠　黃芩各三分　甘草炙半兩　生地黃絞取汁　車前葉絞取汁　藕節絞取汁各四合　生蜜一鍾　將前藥擣篩同後

四味攪勻每一大匙水一盞煎至七分温服

栢葉湯方　治小便出血不止

栢葉　甘草　阿膠　黃芩　竹茹　生乾地黃各一兩

共擣篩每服四錢匕水一盞半同煎至八分去滓温服不計時候

地黃湯方　治小便出血

生乾地黃　兎絲子酒浸一宿焙乾別研　白芷　冬葵子炒

當歸　芎藭　敗醬　赤茯苓　蔓荊實　蒲黃一兩

共為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煎粟米

飲下日三服

車前子散方　治小便赤色或小便鮮血

車前子　木通　澤瀉　當歸　桑螵蛸　桂心　滑石 各等分　共為散每服二錢匕煎冬葵根湯下

治小腸尿血方

指甲 半錢　頭髮 一分　二味燒灰研勻空心溫酒調一錢匕頓服

大便秘澀　大便不通　結陰便血

大便秘澀

論曰大便秘澀其證皆榮衛不調陰陽之氣相持也若風氣壅滯腸胃乾澀是謂風秘胃蘊客熱口糜體黃是謂熱秘下焦虛冷窘迫後重是謂冷秘或因病後重亡津液或老弱血氣不足是謂虛秘或腎虛小便過多大腸枯竭渴而多秘者亡津液也或胃實燥結時時作寒熱者中有宿食也治法須宜和順陰陽然疏風散滯去熱除冷導引補之法不可偏廢當審其證以治之

麻仁丸方　治大便秘難

大麻仁 研膏別搗　大黃 炒各二兩　厚朴 生薑汁炙二兩　枳殼 去瓤麩炙二兩　共搗三味為末與麻仁同研鍊蜜和杵令勻丸如梧桐子大每服二十丸空心溫水下以利為度

麻仁丸方 又方　治三焦不和臟腑虛結胸膈痞悶大便秘澀

大麻仁 研膏四兩　大黃 半生半熟四兩　白檳榔　山茱萸　兎絲子 酒浸另研　車前子　桂心　羌活　山藥　枳殼　防風 各一兩半　木香 一兩　郁李仁 去皮研膏四兩　共研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸溫水下

威靈仙丸方　治大腸冷秘

威靈仙 不拘多少　搗為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十

五丸生薑米飲下

附子散方　治大便冷秘

附子 炮裂去皮臍　削去外面留中心如棗大碾為細散每服水調下一錢匕

葱膠湯方　治年老虛弱大便秘滯

阿膠 十片　葱 一握　用水二盞同煎膠烊取一盞溫服之立效

大黃丸方　治脾胃不和內有壅滯大便秘難

大黃　赤芍藥 三兩　厚朴 二兩薑汁炙　枳殼 一兩半　大麻仁

別研如膏五合　共擣四味爲末與麻仁同研勻煉蜜和杵丸
如梧桐子大每服十丸至十五丸食前溫水下以通
利爲度
滑石散方　治大便不通腹脹氣急妨悶
滑石細研二兩分二貼　手足指甲剪患人自身者燒爲灰研分二貼　取滑
石末一貼以水一盞半煎至八分去滓調爪甲灰一
貼空心服至辰再服
葵酥湯方　治大腸閉澀大便不通
冬葵子二合　牛酥二兩如無猪脂代　將葵子擣篩分四貼每

貼以水一盞半至五分去滓下酥半兩再煎一二沸食
前冷服
摩臍方　治大便不通腹脹
杏仁湯浸去皮尖　葱白三莖去鬚葉細切　鹽一分　三味同研
如膏每取如酸棗大討心摩臍上三百轉須臾即利
如利不止以冷水洗手即定
治病後津液燥少大便不通腸結方
糯米二合炒灰存性研　猪膽一枚取汁　沙糖少許　和研如膏內
少許入下部立通

治卒大便不通或熱結或風秘及婦人產後大便不通等
方
皂莢切去皮炙令黃熟爲末　白梅肉五枚　蜜少許　將梅肉并蜜
拌和皂莢如棗大以綿紙裹引內下部中須臾即通
郁李仁粥方　治大便不通
郁李仁一兩去皮細研分二服用　煮薄粥一碗臨熟時下郁李仁
煮三兩沸傾出空心吃便通再服一分以通利爲度
治下部窒塞大便不通方
烏梅五枚　內湯中漬軟取肉熟擣之丸如彈子內下部

中即利
結陰便血　詳痔門腸風下血
論曰經謂結陰者便血一升再結二升三結三升夫邪在
五臟則陰脉不和陰脉不和則血留之結陰之病以陰氣
內結不得外行血無所稟滲入腸間故便血也
地黃煎丸方　治結陰便血
生地黃汁　小薊汁各一升　沙糖一兩同上二味熬成膏　地榆根
阿膠炙令燥　側栢各二兩　除以上三味外擣爲末入膏
中和丸如小彈子大每服一丸水一盞煎至六分和

淬溫服

神應必效丸方　治便血無度

阿膠二兩　當歸焙　烏賊魚骨去甲　白芍藥　劉寄奴各一兩　共爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空心米飲下三十丸加至五十丸

龍骨餅子方　治臟毒血不止

龍骨　烏賊魚骨去甲各等分　爲末每服一錢匕入鷄清一枚用白麪同和捏作餅子三枚煻火內煨熟細嚼溫米飲送下空心食前服

石榴散方　治結陰瀉血不止

醋石榴皮　陳橘皮去白　甘草　乾薑炮　四味等分焙乾擣羅爲散每服二錢匕陳米飲調下日三服

地榆散方　治結陰瀉血

地榆　桑耳　甘草　赤芍藥各三兩　艾葉二兩　黃芪六兩　熟地黃　伏龍肝各四兩　爲細散每服二錢匕米飲調下食後臨臥服

金屑丸方　治便血一切血妄行

棗子雌黃不計多少入在棗內綿繫定補煎爲用黑銚一兩中鋸成小塊入湯內同煮自早至晚不住添熱湯取出研細以盞盛飯上蒸過　以煮藥棗取肉和丸如梧桐子大每服三丸煎黑鉛湯下便血甚者三服差矣

金虎丸方　治結陰失血

黃蘗一兩去粗皮用鷄子清塗炙　爲末滴水丸菉豆大溫水下七丸

諸淋門

卒淋　冷淋　熱淋　氣淋　血淋

膏淋　石淋　勞淋

諸淋統論

論曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣位處下

焦與腎表裏分別清濁主出而不納若腑臟氣虛寒熱不調使氣不化而水道不宜故爲淋閟之病矣　諸淋之證大體緣腎臟氣虛膀胱有熱唯冷淋爲異善治此者當熟察之

卒淋

論曰卒淋者緣下焦有熱傳入膀胱其候卒然小腹急痛小便淋澀痛故謂之卒淋蓋下焦在臍下當膀胱上口主分別清濁主出而不納以傳道也今熱在下焦故其病如此

瞿麥湯方　治卒淋通利小腸

瞿麥半兩　木通　赤茯苓　陳橘皮去白各一兩　滑石一兩碎
冬葵子一合炒　甘草半兩炙　桑根白皮各半兩　共八
味擣篩每服三錢入葱白二寸同煎溫服

茅根飲方　治卒淋結澀不通利

茅根　木通各二兩　石韋去毛拭　黃芩　冬葵子　當
歸　芍藥　滑石碎各一兩　亂髮雞子大燒灰　共九味擣
篩每服三錢水煎溫服不拘時

黃耆飲方　治膀胱虛熱小便卒暴淋澀

黃耆　人參　白茯苓　旱蓮草　滑石研各一兩　桑白
皮　黃芩　枳殼麩炒　芒硝　共九味擣篩每服三錢
水煎溫服

黑金散方　治卒淋不通

好細墨燒一兩　一味為散每服一錢溫酒調下不拘時候

茯苓湯方　治小便卒淋澀

赤茯苓三兩　滑石四兩碎　石韋去毛　瞿麥穗　蒲黃各二兩
榆白皮二兩　冬葵子二合　共七味擣篩每服五錢水煎
溫服食前

冷淋

論曰腎與膀胱為表裏下通於胞宜行水道腎臟虛弱冷
氣客於下焦邪正交爭滿於胞內水道不宣故其狀先寒
慄然後便溺成淋謂之冷淋也

菝葜飲方　治冷淋寒顫澀痛

菝葜　土瓜根　黃耆　地骨皮　五味子各二兩　人
參　牡蠣煅各一兩半　石膏四兩　共八味擣篩每服五錢
水煎溫服

黃耆丸方　治腎虛膀胱冷淋不利

黃耆剉　黃連　土瓜根各二兩半　玄參三兩　菝葜　鹿
茸去毛酥炙各二兩　牡蠣一兩　桑螵蛸　人參　五味子各一兩半
右十一味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二
十丸鹽湯下不拘時

兔絲石脂散　治冷淋

兔絲子酒浸別研　白石脂　牡蠣煅研各一兩　桂心　土瓜
根各一兩　右五味研為散每服二錢煮麥粥飲調下空
心食前服

兔絲子散方　治冷淋小便多或不禁

兎絲子酒浸一宿別搗一兩 蒲黃 黃連一兩 硝石半兩 肉蓯蓉酒浸一兩 鷄膍胵黃皮炙一兩半 五味子一兩半 共七味擣羅爲散每空腹溫酒調下三錢服日二

熱淋

論曰三焦者水穀之道路也三焦壅盛移熱於膀胱流傳胞內熱氣併結故水道不通利而成淋也其狀溲便赤澁或如血汁故謂之熱淋

滑石散方 治熱淋小便赤澁疼痛

滑石研二兩 括蔞根三兩 石韋炙去毛半兩 三味擣羅爲散每服一錢煎小麥湯調下不拘時

車前子散方 治熱淋結澁不通

車前子炒 牛膝各一兩 桑根白皮二兩 蒲黃一兩 共四味擣羅爲散每服二錢煎葱湯調下不拘時

四汁飲方 治熱淋小便赤澁疼痛

蒲萄自然汁 蜜 生藕自然汁 生地黃自然汁各五合 四味和勻每服七分一盞銀石器內慢火煎沸溫服不拘時候

瞿麥湯方 治心經蘊熱小便淋澁赤痛

瞿麥穗三分 茅根 冬瓜子各半兩 葵子 木通一分 黃芩六錢 竹葉一把 滑石研一分爲末分作三貼 共八味除滑石外擣篩分作三劑每貼用水三盞煎去滓入滑石末一貼攪勻分溫二服食前

氣淋

論曰腎虛則不能制小便膀胱挾熱則水道澁腎虛膀胱熱則胞內氣脹小腹堅滿因至淋澁之疾也其候出少喜數尿有餘瀝亦曰氣癃診其脉少陰脉數者則爲氣淋

木通湯方 治氣淋結澁不通

木通一分 木香半兩生用 細辛一分 草豆蔻三枚 人參半兩

赤茯苓三分 桃仁去皮尖雙仁半兩 肉豆蔻二枚去殼 共八味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時

桑白皮湯方 治氣淋結澁溲便不利

桑白皮一兩半 茅根二兩半 木通 乾百合各一兩 四味擣篩每服三錢水煎溫服不拘時候

海金沙散方 治氣淋結澁不快

海金沙別研二兩 滑石研 甘草 山梔子仁各一兩 四味將甘草梔子仁爲散入餘藥再研勻每服一錢茶

清調下不拘時

通神散方　治氣淋結澀不通

粟米一合　故筆頭二枚燒灰　馬藺花七粟燒灰　三味爲散溫酒調下二錢如不可忍者連服三服

貝齒湯方　治因氣成淋小便痛或溲血或如豆汁

貝齒一枚研　冬葵花研半合　石膏一兩半　滑石一兩　右四味㕮咀如麻豆大每服五錢水煎再入猪肪脂少許再同煎數沸空腹溫服

血淋

論曰心主血氣通小腸與膀胱俱行水道下焦受熱則氣不宣通故溲便癃閉而成淋也熱甚則搏于血脉血得熱則流行入于胞中與溲便俱下故爲血淋也

白茅根湯方　治血淋小便出血疼痛

白茅根　芍藥　木通　車前子各三兩　滑石碎　黄芩各一兩半　亂髮燒灰半兩　冬葵子微炒半兩　共八味擣篩每服三錢水煎溫服日三

鷄蘇湯方　治血淋

鷄蘇一兩半　石膏碎　淡竹葉切　木通　甘草生

滑石　小薊根各一兩　生地黄半斤　共八味擣篩每服六錢水煎空心服

鷄蘇飲方　治血淋不絕

鷄蘇苗　竹葉各二兩　滑石　木通各五兩　小薊根一兩　生地黄六兩　共六味㕮咀如麻豆大每服五錢水煎溫服不拘時以利爲度

治血淋方

車前子葉生搗汁三合　生地黄汁三合　二味相和煎三沸食

膏淋

論曰膀胱爲滲泄之腑腎氣均平則溲便清腎既虛不能制其肥液故與俱出色若脂膏故謂之膏淋又曰肉淋

磁石丸方　治膏淋小便肥如膏

磁石三大兩煆醋淬七徧　肉蓯蓉酒浸切焙　澤瀉　滑石各一兩　共四味爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下不拘時候

沉香丸方　治膏淋

沉香　肉蓯蓉酒浸　黄耆　瞿麥穗　滑石　磁石火煆

醋淬三七徧各一兩　右六味擣羅為散末鍊蜜丸如梧桐子大
每服三十丸溫酒下不拘時

滑石湯方　治膏淋小便肥濁
滑石　白茯苓　白朮　木通　熟乾地黃　赤芍藥
五味子各一兩　共七味擣篩每服三錢水煎溫服不拘
時

石淋

論曰淋者淋病而有沙石從小便道出也蓋由腎氣虛損
則飲液停聚不得宣通膀胱客熱則水道澀痛胞內聚積

故令結成沙石隨小便而下其大者留礙水道之間痛引
小腹令人悶絕也

人參散方　治沙石淋
人參　木通　青鹽研　海金沙別研各分　莎草根炒去毛半兩
右五味除海金沙青鹽外擣羅為散合研勻每
服二錢空心米飲下

海金沙散方　治沙石淋澀疼痛不可忍
海金沙　滑石　石膏　木通　井泉石研　甘草炙
右六味等分擣研為散煎燈心湯調下二錢不拘時候

葵菜散方　治沙石淋重者取出根本
葵菜二兩　一味為散每服一錢米飲調下服畢用地椒
煎湯浴連腰浸洗

獨聖散方　治沙石淋
黃蜀葵花炒一兩　一味研為散每服一錢食前米飲調
下

木通湯方　治沙石淋
木通　滑石各一兩　冬葵子二兩　三味擣篩每服五錢
水煎溫服

鼈甲散方　治沙石淋
鼈甲去裙襴燒灰存性　一味擣羅為散每服三錢空心溫酒
調下

茅根湯方　治沙石淋
茅根細切一斤　葛花為末一兩　露蜂房為末一兩　三味分作三
服每服以水三盞煎溫服

勞淋

論曰人因勞傷腎經腎虛膀胱有熱氣不傳化小便淋瀝
水道澀痛勞倦即發故謂之勞淋小腹引痛者是其候也

地黃湯方　治勞淋結澀不通
熟地黃　人參　石韋各一兩　滑石二分　桂心　車前子　甘遂炒　王不留行　冬葵子炒　木通各半兩
右十味搗篩每服三錢水煎溫服不拘時候

兎絲子丸方　治腎勞虛損溲便不利淋瀝不已
兎絲子酒浸別搗　人參　黃蓍剉　滑石　木通剉　芍藥　車前子各一兩　黃芩三分　冬葵子炒一合　右九味爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸食前溫酒或鹽湯下日二

石韋散方　治勞淋日夜數起小便不利引陰中痛
石韋去毛　滑石　瞿麥穗　王不留行　冬葵子各等分
右五味爲細散每服二錢食前葱白湯調下

九蟲門
九蟲　蚘蟲　寸白蟲　蟯蟲　五臟蟲
三蟲

九蟲統論
論曰蟲與人俱生而藏於幽隱其爲害也益本於正氣虧弱既食生冷復感風邪所以種種變化以至蕃滋初若不足畏而其甚可以殺人善攝生者薄滋味節嗜欲蚤去三尸防患於未然彼九蟲亦將銷鑠於冥冥之中惟未進此道而援藥則盍無使滋蔓益有藥存焉

九蟲
論曰九蟲一名伏蟲長四分二名蚘蟲長一尺三名白蟲長一寸四名肉蟲狀如爛杏五名肺蟲狀如蠶六名胃蟲狀如蝦蟇七名弱蟲狀如瓜瓣八名赤蟲狀如生肉九名蟯蟲狀如菜子至微細者是九蟲皆依乎腸胃之間若腑臟氣實則不能爲害及其虛也發動變化侵食氣血寖成諸病不可不察也

雞子丸方　治九蟲
雞子去殼二枚　好漆四兩濾過　蠟三兩　粳米粉半斤　四味先取漆蠟入銅鐺中用慢火煎攪令得所次入粳米粉又攪令勻煎令凝候可丸即取鐺中置生黃土堆上纔候稍溫即下雞子又攪令得所再置火上煎令可丸如小豆大宿勿食空腹煎粟米飲下二十丸小兒五丸

石榴枝湯方　治九蟲動作腹中刺痛口吐清水面色黑

黃及蟲心痛者

東引石榴枝(三兩) 木香 陳橘皮(湯浸去白) 吳茱萸(湯洗焙炒)(各半兩) 大黃(炒) 芍藥(各二兩) 薏苡仁(二兩半) 共七味㕮咀如麻豆大每五錢水煎溫服空心

南粉散方 治腹中諸蟲令人腹痛多食泥土及泄者

南粉(二錢細研) 五更初用生油調下至食時蟲出盡

蚘蟲

論曰蚘即九蟲敘所謂長蟲者今此析而治之蓋較之他蟲害人之爲多觀其發作冷氣腧腹撮痛變爲嘔逆以至

心中痛甚如錐刺背人謂蚘厥貫心能殺人則所以治之不可緩也

茈胡湯方 治蟲心痛

茈胡(一兩半) 當歸 食茱萸(各一兩) 芍藥(一兩半) 檳榔(二枚) 郁李仁(洗去皮二分) 厚朴(去粗皮生薑汁炙一兩) 右七味擣篩每服三錢水煎食前溫服日三

桑根白皮湯方 治蚘蟲心痛

桑根白皮(三兩乾者) 醋石榴皮(一兩) 白蕪荑(炒) 檳榔(炮) 厚朴(去粗皮生薑汁炙各半兩) 右五味擣篩每服三錢入生薑一塊同煎空心服至曉再服

萆薢散方 治蚘蟲發作

萆薢(炒) 白蕪荑(炒) 狗脊(去毛剉各一分) 三味爲散每服二錢溫酒調下欲服藥先隔宿吃牛肉乾脯一片次日空心服藥蟲下即差

薏苡根湯方 治蚘蟲

薏苡根(一握去土) 一味擣篩水煎分溫二服空心先吃餳少許然後溫服

檳榔煎方 治蚘蟲

檳榔(炮剉五枚) 酸石榴根皮(入土五寸東引者去土細剉一斤) 二味先將檳榔擣篩與石榴根各均分作三度用每度用水二升半煎至一升綾去滓入粟米一合煮如粥平旦空心頓喫利下蟲即效

蠶蛹汁方 治蚘蟲

蠶蛹 取繰絲蠶蛹四合爛研生布絞取汁空心頓飲之非繰絲時即須依時收取蠶蛹暴乾擣羅爲末用時以意斟酌多少和粥飲服之

論曰寸白蟲乃九蟲之一種狀如絹邊葫蘆子因臟氣虛風寒溼冷伏於腸胃又好食生膾乾肉等所以變化滋多難於獨治說者謂食牛肉飲白酒所致特一端爾亦未必皆緣此

香附丸方　治葫蘆蟲

木香一分為末　附子生去皮臍為末　硫黃研各半兩　三味先將蜜陀僧末半兩入醋熬成膏然後入三味藥末一處和丸如小豆大每服十五丸溫酒下食前服

檳榔散方　治寸白蟲

石榴根　陳橘皮去白　桑根白皮各一兩　三味細剉分作三服每服水一盞半煎取一盞去滓五更初調檳榔末二錢至欲明不瀉至晚又一服如蟲毋未下再服或瀉不止喫冷粥止之

食榧實散方　治寸白蟲

生榧實四十九枚去皮　右一味於每清旦空腹食七枚七日後食盡其蟲即化成水矣

乾脯湯方　治寸白蟲

乾脯一片如手大　石榴根東引者一握　右二味並細剉以水四升浸一宿明日平旦煎至一升去滓分三服空腹先嚼乾脯一片卻服藥如人行十里又一服每服藥後以手按患人腹上藥力易行其蟲自下凡服藥取月一日至五日已前蟲頭向上服良

黑鉛散方　治寸白蟲果取不盡久令人面黃心中如飢

黑鉛沙子畫家銀沙是也　一味研極細每服二大錢五更初肉汁調頓服至平明取下蟲立差

玉粉散方　治寸白蟲

定粉一兩　右一味研極細每服二錢用生麻油調於五

更初頓服至曉蟲下

蟯蟲

論曰蟯蟲甚微細若不足慮者然其生化衆多攻心刺痛時吐清水在胃中侵蝕不已日加羸瘦甚則成痔瘻疥癬癰疽諸瘡害人若此絕其本根勿使能殖則毒而治之所不可忽

桃皮湯方　治蟯蟲蚘蟲及痔䘌蝕下部生瘡

桃木皮乾者去粗皮　槐子微炒各一兩半　艾葉半兩

三味擣篩每服三錢入棗一枚同煎空心食前夜臥

各一服

艾汁方　治蟯蟲攻心如刺吐清水

生艾葉（取嫩心切一升）

一味擣絞取汁兩盞許宿不食平旦先嚼乾脯少許後頓飲汁不能盡即兩日服

槐皮丸方　治蟯蟲在胃人漸加羸弱

槐皮（乾者）　桃仁（去皮尖雙仁生用）　楝實（去核生用各半兩）

三味擣羅爲末鍊豬脂丸如人指大以綿裹導下部中

治蟯蟲咬人下部癢方

水銀（一兩）

一味用蒸棗膏和丸如人指大綿裹臨臥內下部中一宿內藥時常留綿帶子在外

熬漆丸方　治蟯蟲在胃令人漸羸

好漆　醇酒　白蜜（各半斤）

三味於銅器中和勻微火熬令可丸丸如雞頭大每服一丸宿勿食空腹溫酒下蟲未下再服

五臟蟲

論曰五臟蟲者緣臟氣衰弱熱薰蒸荀卿之傳所謂肉腐出蟲魚枯生蠹理固如此其名狀之異見於九蟲敘可辨而察也

雷丸丸方　治心臟勞熱傷心有長蟲名曰盤長一尺貫心爲病

雷丸（炮過灰火）　陳橘皮（湯浸去白）　桃仁（去雙仁皮尖麩炒各一兩一分）

貫衆（大者去鬚半兩）　狼牙（連苗淨擣一兩半）　白蕪荑　青葙子（炒）

乾漆（炒令烟出各一兩）　亂髮（如雞子大一兩燒灰）

共九味除亂髮燒灰外八味擣羅爲末然復與亂髮灰同研令勻鍊蜜和更於鐵臼內塗酥杵令勻熟丸如梧桐子大每服空心溫酒下十五丸至晚再服米飲亦得

麥門冬丸方　治肺勞熱生蟲其形如蠶令人欬氣喘或謂憂膈氣膈恚膈寒膈熱膈皆從勞氣所生名曰膏肓病鍼灸不至

麥門冬（去心十兩）　蜀椒（去目及閉口者炒出汗一兩）　人參（一兩一分）　遠志（去心）　附子（去皮臍）　細辛（各一兩半）　甘草（炙一兩半）　乾薑（炮一兩）　桂心　百部（焙）　白朮　黃耆（剉細各一兩一分）　杏仁

去皮尖雙仁炒乾炒令黃半兩
右十二味擣羅爲末鍊蜜和更於鐵臼內塗酥杵令
勻熟丸如酸棗子大含化稍稍嚥津
桑根白皮酒方　治肺勞熱生蟲在肺爲病
桑根白皮東引者取一升　狼牙其連苗處淨刷去土三兩　吳茱萸根皮東引者淨刷去土五升
右三味細剉用酒七升煮至二升去滓分作三服每
日空腹一服
茱萸根丸方　治肝勞生長蟲爲病恐畏不安眼中赤

東引行吳茱萸根去土二兩　蠟三兩　雞子五枚去殼取黃用　粳
米蓋
右四味除蠟并雞子外各擣羅爲末先以銅鍋內煎
蠟鎔即下茱萸末米粉雞子黃煎令煎可丸即丸如
小豆大早晨煎粟米飲下五十丸小兒服二十丸蟲
出即差
前胡湯方　治脾勞有白蟲長一寸在脾爲病令人好嘔
胸中欬欬即嘔而不出
前胡　白朮　赤茯苓　枳殼去瓤麩炒　旋復花去梗炒

細辛　常山　松蘿各一兩半　杏仁去皮尖雙仁炒　龍膽去蘆各一兩
右十味擣篩每服五錢竹葉十片淨洗細切同煎去
滓空心溫服吐之即差若腹中熱滿入芒硝半錢梔
子仁一兩黃芩二兩半苦參一兩
茱萸根浸酒方　治脾勞勞熱有白蟲在脾中爲病令人
好嘔
吳茱萸根東引者一尺　麻子八升淨揀　陳橘皮去白炒二兩
右三味先擣碎橘皮麻子如泥然後拌茱萸根用酒

一斗浸一宿慢火上微煎後去滓分作五服每服空
心溫服蟲即下欲合藥時忌言合殺蟲藥
貫衆散方　治腎勞熱四肢腫急有蟯蟲如菜中蟲生於
腎中
貫衆大者一枚去鬚　乾漆炒令烟出二兩　吳茱萸水洗七遍焙乾一兩半
白蕪荑炒　槐白皮乾者一兩　杏仁去皮尖雙仁炒黃半兩　胡粉炒令黃色一兩
右七味除別研粉外擣羅爲散更與胡粉同研令細
每服二錢空腹用井華水調服日晚再服

三蟲

論曰三蟲亦九蟲之數曰蚘曰赤曰蟯是也其發動諸病較之他種爲甚蚘蟲又曰長蟲長一尺動則吐清水心痛貫心則死赤蟲狀長似生肉動則腸鳴蟯蟲至細微形如菜蟲居腸間多則爲痔極則爲癩或生諸癰疽癬瘻瘑疥而其變甚多三蟲爲患如此古人必析而治之意亦深矣

鼈甲丸方　治三蟲發痛面目黃不下食

鼈甲去裙襴醋炙黃二兩　白术一兩半　陳橘皮去白一兩　木香

狗脊去毛各一兩半　檳榔四兩　吳茱萸水浸二宿每日三次換水洗去涎氣炒一

兩

右七味擣羅爲細末煉蜜和爲劑置臼內入酥杵令勻熟丸如梧桐子大每日空腹煎青橘皮湯下三十丸晚食前再服

天門冬煎方　治三蟲保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利水便及諸聚中偏風溼痺強骨髓

天門冬去心生用十斤　白蜜七兩

二味先取天冬細切爛擣如泥用酒一斗和絞取汁幷蜜攪令勻銅器中重湯上煎仍用竹篦攪候如餳

每服如彈丸大空腹溫湯服之或用生地黃汁一盞同煎更妙

亂髮灰散方　治三蟲

亂髮淨洗如雞子大燒灰　丹砂研如麵一兩

二味同研極細每服一錢醋調空腹服之

雚蘆散方　治三蟲神效

雚蘆微炙二兩

一味擣羅爲細散每服二錢隔宿勿食於清旦用羊肉濃汁調服之蟲自下

檳榔湯方　治三蟲

檳榔三枚灰火煨過

一味擣篩用水三盞煎至一盞半去滓分三服空腹日午近夜各一服其蟲盡下或葱白鹽豉同煮飲之亦佳

諸尸門

諸尸　遁尸　飛尸　尸疰

諸疰門

諸疰　風疰　走疰　鬼疰　氣疰

卒魘不寤　中惡　卒死　尸厥
鬼魅　鬼擊

諸尸統論

論曰人身中有三尸諸蟲與人俱生常忌血而惡能害與鬼神通毎接引外邪與人爲害謂之尸病其狀沉沉默默不的知所苦而無處不惡或心腹痛脹或磥塊踊起或攣引腰脊或精神錯雜變狀不一有飛尸者有伏尸者復有遁尸沉尸風尸之異久不已停注留滞及死又注易傍人則爲尸注之病矣

諸尸

諸尸病因不一其最重者惟五尸若得之疾速如飛走狀者名飛尸停遁不消者爲遁尸沉痼在人臟腑者爲沉尸衝風則發者爲風尸隱伏積年不除者爲伏尸唯此五尸之氣變態多端各各不同大率皆令人沉沉默默痛無常處五尸之外復有尸氣雖各有證然其爲病大同小異而已亦可通一法治之

雄黄丸方　治五尸癥積及中惡心痛蠱注鬼氣

雄黄　丹砂　礬石　牡丹皮　巴豆去皮心膜炒研去油　附子　藜蘆炙去蘆頭各一兩

右七味爲末鍊蜜丸如小豆大毎服二丸米飲下食前服

雄黄丸方又治卒中飛尸遁尸沉尸風尸腹痛脹急不得氣息上衝心胸及攻兩脅或磥塊踊起或攣引脊腰

雄黄研　大蒜各一兩

右二味爛搗丸如彈子大毎服一丸熱酒化下須臾未差更服尸疹者常宜預收此藥

惡氣散方　治五尸鬼注百毒

桂心　乾薑

右二味擣羅爲散毎服三錢炒鹽一錢温水同調下

蒺藜子丸方　治中五尸腹急痛不喘息上衝心胸及攻兩脅或磥塊踊起攣縮引腰脊

蒺藜子炒去角一兩

右一味爲末鍊蜜丸如小豆大毎服二十丸食後水下

遁尸

論曰遁尸謂尸伏埋柒注連滞在於胸腹肓膜之間等常如無病若因喜怒不節飲食傷動其隱之疾發則心腹脹

痛連及脇脅氣喘促急不得安臥者是其証也

木香湯方　治初得遁尸鬼疰心腹中刺痛不可忍

木香三分　鬼箭羽一兩　桔梗一兩　丁香三分　陳橘皮去白炒用一　紫菀去苗土炒一兩　當歸一兩　白檳榔火煨十四枚　桃仁湯浸去皮尖雙仁炒黃色十四枚

右九味擣篩每服五錢水煎溫服日二服不計時候

熨方　治遁尸飛尸及風毒腫流入頭面四肢

芥子一斤蒸熟搗

一味爲末以雞子二兩拌之分作兩處用陳布袋盛之更換蒸熱以熨痛處

飛尸

論曰飛尸者其狀令人心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心胸是也此病忽然而至疾如飛走故謂之飛尸

走馬散方　治飛尸入腹脹滿刺痛氣息喘急

巴豆二枚去皮心　杏仁二枚去皮尖

二味以綿纏椎令極細投熱湯二合指取白汁分三服飲之食頃當下老小量加之

雄黃散方　治一切飛尸鬼疰身痛如刺

雄黃　甘草炙　黃芩各半兩　梔子　芍藥各一兩

共五味爲散每服以溫酒調下二錢再服不拘時

尸注

論曰尸注者尸病注易於人也多因哭泣感染尸氣流注身體令人寒熱淋瀝沉沉默默不的所苦而無處不惡或腹痛脹滿喘急不得息上衝心胸傍攻兩脅或磥塊踊起或攣引腰脊或舉身沉重精神不爽每更節令愈加煩滯不治者死死則注易傍人故名尸注

虎掌丸方　治尸注寒熱往來不思飲食心腹刺痛

虎掌炒　丹砂各半兩　白茯苓　龍齒各一兩　蓬莪茂煨剉　當歸各一分

右六味爲末用酒煮阿魏麪糊丸如梧桐子大每服二十丸烏梅湯下

神效蜜陀僧散方　治臨尸哭泣尸氣入腹沉滯腹脇有時發動取勞積

蜜陀僧半斤煅醋汁淬研極細取六兩　訶梨勒用一兩去核生　京三稜二兩煨搗末

三味合研令勻每服二錢用煮麪濃湯下常服不食

臥一服餘時切餅湯服三夜次夜當下惡物不下第三夜加生牽牛子末一錢同調下

杏仁丸方　治尸注

杏仁去皮尖雙仁炒　亂髮灰各一分

二味研勻和丸如小豆大每服五丸豬膏酒調下

諸注統論

論曰諸注者邪氣所注也皆因精神衰弱經絡空虛傷於風寒暑溼飲食勞倦或感生死之氣或挾鬼物之精初爲中惡客忤卒死諸尸之類雖或暫差必有邪氣伏於經脉

流傳腑臟深入骨髓經久不已皆成注病變狀多端時發時差令人昏悶無不病處若因風寒暑溼之邪所注者則爲風寒注涼注冷注溫注之病若因飲食勞倦之邪所注者則爲食注飲注酒注水注之病若因生死之氣而爲其邪所注者則爲喪注哭注轉注之病若因挾鬼物之精而爲邪所注者則爲鬼注邪注尸注殃注之病犯土禁爲注者爲土注産後得注者爲産注虛勞所成注爲勞注邪氣外淩爲泄注凡此諸注以受病之因爲名也邪注于肺則爲氣注邪注於勞則爲血注久注不已傷損骨髓則爲骨注凡此諸注以病之所在爲名也又有石注者言其牢強如石不走注者言其遊走無常凡此諸注以病之形變爲名也各類雖多各有形證合而言之皆注病也治注病者欲辨是非但覆紙於病處燒髮令焦投於紙上若變枯紙者注氣引之也不枯者非注也審知其因隨證治之無專門者診脉浮大者可治細而數者難治

諸注

論曰諸注者邪氣停而爲病也蓋由經絡空虛傷於風寒暑溼或因飲食勞倦或因大病後氣虛邪氣流注或感死

氣或犯鬼邪皆至是疾其狀變易不同各隨其本而治之也

赤芍藥丸方　治五尸注

赤芍藥一兩　吳茱萸湯洗焙乾炒　丹砂研　烏頭去皮臍

蜀椒去目并閉口者炒出汗各半兩　乾薑三分　桂心一兩

共七味擣羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服十丸空心溫酒下日三

風注

論曰風注者由體虛風邪之氣客於榮衛邪氣行遊連滯

停注故名風注其狀皮肉掣振痛無常處一年之後則有頭髮墮落頸項掣痛骨拉解鳴目疼鼻酸牙蚛之證又十二風所注不同溫風所注頭痛欲解發汗風所注頭痛體熱骨節兩強柔風所注遊腫在腹或在手腳水風所注咳食服臥汗出九風所注腦轉肉裂目系痛惡聞人聲絕風所注暴倒仆口有白沫顛風所注披髮狂走遇物擊破狂風所注叫呼罵詈獨語談笑蔚風所注口噤面喎四肢不隨纈風所注體生瘡着毛墮落蛀風所注癢痺如蟲螫癢或疼或痛濕風所注舉身戰動或鼻塞其狀雖異其為邪氣停注則一也

安息香丸方　治一切風注痛

安息香研　乳香研各兩　白膠香研　地龍去土炒研為末各半兩　胡桃仁剝一枚　沒藥研一分　桃仁去皮尖雙仁研七枚

共七味同研勻為細末酒煎為丸如彈子大每服一丸溫酒化下

羌活湯方　治風注心腹刺痛上攻胸背

羌活三分　大豆炒一合　桑根白皮一兩半　陳橘皮去白三分　芎藭一兩　大腹并子帶二分

右六味擣篩每服三錢水煎溫服良久再服

走注

論曰走注者風邪客於衛氣也風善行而數變衛氣之行慓疾滑利邪正相搏則注溢皮膚去來擊痛遊走無常故名走也

蒸熨方　治走注風毒疼痛流移不定

芥子一斤蒸熟搗為末　鉛丹二兩

二味和勻以疎布袋盛分二處更互蒸熨痛處

枳殼丸方　治走注疼痛如錐刺皮膚風氣心腹四肢疼痛

枳殼去瓤麩炒　厚朴薑汁炙各一兩　犀角半兩　桑根白皮一兩　檳榔二兩煨　柴胡一兩半　半夏湯洗焙乾為末汁和作餅暴乾　大黃醋拌炒各一兩

共八味為末煉蜜丸如小豆大空心酒下二十丸

鬼注

論曰鬼注者忽因鬼邪之氣排擊當時即病心腹刺痛悶絕倒仆如中惡狀餘熱不歇停積彌久有時發動連滯不已乃至於死死則注易傍人故謂之鬼注

玉壺丸方　治鬼注風冷飲食不消心腹脹滿攻刺心痛大便不通治萬病并千金方外臺秘要

雄黃研　丹砂研　礬石煅　附子去皮臍　藜蘆　巴豆去皮心炒研去油各一兩

右六味為末鍊蜜和丸如小豆大每服二丸米飲下取快利為度小兒以意減之

八毒丸方　治鬼注中惡心痛積癖蠱注鬼氣

雄黃研　珍珠研　礬石煅　牡丹皮　巴豆去皮心炒去油各一兩　附子去皮臍三兩　藜蘆二兩　蜈蚣去頭足炙一枚

共八味研為末鍊蜜丸如小豆大每服米飲下二丸得吐為效

太極鰻鱺魚煎方　治鬼注傳尸五勞七傷

鰻鱺魚洗切寸淨二斤　附子去皮臍一兩　柴胡三分　芍藥　貝母去心　鱉甲去裙襴醋炙　當歸切焙　知母　荊芥穗各一兩　蕪荑仁一分　木香二分　秦艽　青蒿子小便浸一宿　黃耆　木通各一兩

共十五味除鰻鱺魚外擣羅為末分作三貼每貼以鰻魚一觔清酒三斤於銀器內煮爛去滓入藥末一貼重煎如稀餳以淨器盛空心溫酒下一錢服了夜用被蓋出汗加至一匙

氣注

論曰氣注者邪氣傳注蘊伏於肺也肺主氣而通行表裏若為注氣所傳則其病隨氣遊衝擊痛上喘奔急飲食不下是為氣注之候

厚朴丸方　治一切氣注大腸結澀背膊刺痛氣注四肢及食物不消奔豚氣逆

厚朴薑汁炙一兩　桂心　大黃醋炒各二兩　桃仁浸去皮尖雙仁炒三兩

四味為末研勻鍊蜜為丸如小豆大每服三十丸米飲下食後臨臥服微利即效一方加附子一兩去皮臍

桃仁飲方　治注氣肩膊刺痛不移

桃仁去皮尖雙仁炒　酸棗仁炒　人參　赤茯苓　桂心　丁香　甘草炙

共七味等分擣篩每服五錢水煎臨臥頓服

木香散方　治卒注氣

木香　當歸　白朮　桂心　白茯苓各一兩

共五味擣羅爲散每服二錢沸湯點服不拘時日二

卒魘不寤

論曰其寤者魂交其覺也形開老弱數驚恐心氣妄亂精神慴懾志有搖動則有鬼邪之氣乘虛而來入於寢寐使人魂魄飛蕩去離形體故魘不得寤也久不寤以致死必須得人助喚并以方術治之乃蘇若在燈光前魘者是魂魄本由明出喚之無忌若夜暗處魘者忌火照火照則神魂不復入乃至於死又人魘須遠呼不得近而急喚恐神魂或致飛蕩也

小定心湯方　治形體虛羸心氣怯弱多魘善忘

茯神一兩　甘草炙　芍藥　乾薑　遠志　人參

桂心各二兩

右七味剉如麻豆大每服五錢棗二枚同煎溫服日三

又方

右方以蘆管吹兩耳并其人頭髮二七莖作繩內鼻孔中割雄雞冠取血以管吹喉咽中大良

治卒魘方

右方以鹽灌之多少在意

又方

右方以雄黃如棗核繫在腋下令人終身不魘

治卒魘不寤方

右方用伏龍肝末或末雄黃或末桂心以蘆管吹入兩鼻孔中

治卒魘死方

右方以井底泥塗死人目令人垂頭就井呼姓名即活此法靈異莫測

又方

右方勿以火照但痛齧其足後跟及足大指爪甲即活齧其踵不覺者宜用礬石散方見卒死門

中惡

論曰志弱心虛精神失守忤犯邪惡令人心腹暴痛悶亂如死無所覺知故曰中惡又曰卒忤蓋陰陽否隔氣道厥逆上下不通陽氣散亂故令人不知也氣還則生不還則死久不已則變注

麝香散方　治卒中惡心腹刺痛去惡氣

麝香一分 犀角屑 木香各半兩

三味研為末散攪勻每服二錢空心熱水調下日再

未止更服

又方

韭根一握切 烏梅十四枚 吳茱萸湯浸焙乾炒二兩半

三味以漿水五升煮以病人櫛內其中三沸櫛浮者

生沉者死煮取三升時飲之

治中惡氣欲絕不省方

右方以皂角生為細末內鼻孔中一方用細辛等分

取屑如胡豆大吹兩鼻

治中惡氣欲絕方

右方取新牛糞絞汁若無新者即以乾者汁服

卒死

論曰卒死者緣人有三虛一謂乘年之衰二謂逢月之空三謂失時之和賊風鬼邪之氣乘虛而入故令陰氣偏竭於內陽氣阻隔於外二氣壅閉不得升降厥氣上行而懸絕也氣還則復生不還則死內經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危蓋謂是也

扁散治卒死方

溼牛馬糞絞取汁灌入口中令入喉若口噤者斡開灌之不可灌者抑折一齒下之若無新馬糞以水或人屎和乾者絞取用之

又方

半夏末如大豆許吹鼻中

治卒死而壯熱者方

白礬半斤

煮令消漬腳令沒踝

治卒死而目閉者方

騎牛臨其面擣薤汁灌耳中又末皂莢吹鼻

尸厥

論曰內經謂邪客於手足少陰太陰足陽明之絡五絡俱竭令人身脈皆動而形無知其狀若尸故曰尸厥蓋五絡皆會於耳中苟為邪所客則其氣逆厥上下懸閉五絡閉結而不通故俱竭而令人狀若尸作為治法宜當先刺其足中指爪甲上各一痏後刺大指內側端卻韭葉後刺手心主少陰銳骨之端各一痏立已不已以竹管吹兩耳使

氣脉踈通內助五絡然後以藥石治之

治尸厥脉動而無氣氣閉不通故忽然如死方

右方以菖蒲末吹入兩鼻中又以桂末著舌下

治尸厥方

鬄左角髮方寸燒灰以醇酒一杯飲之不能飲者灌之立已

鬼魅

論曰心者精之合神之舍也心氣不足精神衰弱邪氣乘虛而感則爲鬼魅其狀令善愁不常情思如醉或狂言驚

怖向壁悲啼夢寐多魘與鬼交通病苦乍寒乍熱腹滿短氣不能食診其脉人迎氣口乍大乍小乃鬼魅所持之候也

治妖魅病人不言鬼方

鹿角 鎊屑

一味擣羅爲細散每服一錢匕言則差

治鬼迷不寤方

雄黃 研如粉

一味吹入病人兩鼻中差

辟諸邪祟附著及小兒驚哭恐悸方

安息香

一味取一皂子大焚令烟起邪自去

鬼擊

論曰精足則神王精耗則神衰精神耗衰血氣虛弱則邪氣易襲故鬭邂逅鬼邪相遇則爲鬼擊之病其得之無漸卒著人如矛戟所傷令人胸脇腹滿急痛不可按抑或即吐血或下血輕者獲免重者或至不救治宜符禁之法兼辟邪安正之劑

升麻散方

升麻 獨活 桂心 各半兩

三味爲散每服一錢溫酒調下

治鬼排擊方

熟艾 雞子大三枚

一味以水五盞煎取二盞去滓頓服之

又方

以濃酒吹灌鼻中

又方

以鹽一兩水三盞和攪飲之并以冷水潠之須臾得吐即差

治卒中鬼擊方

雞冠血

一味瀝口中令下咽仍破鷄以搨心下冷卽棄於道傷得烏鷄尤佳

聖濟總錄纂要卷十五終

聖濟總錄纂要卷之十六

程　林雲來　纂
新安　程　特吹萬　較
程　稽輿山
程　洪丹問

臟腑虛實門

肝脹　肝氣逆面青多怒

肝脹

論曰肝脹之狀千金謂脅下滿而痛引少腹蓋厥陰之經起于大指抵少腹挾胃貫膈布脇肋脈經曰肝病者必兩脇下痛引少腹是也夫肝受邪則令氣血不通故脇下脹滿引少腹而痛也

桂苓湯　肝受邪氣兩脇下痛牽引少腹胸脇脹滿

桂心　赤茯　栢仁　防風　細辛　犀角三分

鼈甲二兩　白朮　枳殼　獨活　桔梗五錢　甘草一分

棗水煎三錢空心溫服以知為度

三補散　治肝受邪氣客于肝經攻脹兩脇滿悶引少腹痛四肢厥逆拘急

赤茯苓七兩 桂心 蜀漆 石菖蒲二兩 柴胡
紫石英 山茱萸 丹砂一兩 赤芍三分
共末酒下二錢
山茱萸湯 治肝受邪氣由脇脹滿筋脉拘急痛引少腹
山茰 川芎 山藥 木瓜 川歸 五味 黄芪
白术 生地一分 獨活 棗仁二錢
大棗水煎五錢空心溫服

肝氣逆面青多怒

論曰肝在色為青在志為怒故其氣逆則面青多怒蓋本

臟氣逆于內干之則多怒而面青也
防風湯 治肝氣壅逆肢體沉重面色青時欲嗔怒甚則
恍惚狂言心神不守
防風 半夏 秦艽 麻黄 獨活二兩 川歸
遠志 人参 白芍 防巳 甘草 片芩 升麻一兩
石羔五錢 薑棗水煎五錢去滓入麝末少許熱服
秦艽散 治肝氣逆面青多怒身難屈伸頭目眩運
秦艽 人参 附子 白术 川椒 桔梗 乾薑
人冬 川歸一兩 山茰 防風 白 前胡

麻黄去根節 五味 甘草五錢 烏頭 細辛三分
共末酒下一錢日二

膽腑門

膽虛 膽實 膽虛不得眠 膽熱多睡 膽癉口苦

膽虛

論曰足少陽膽經不足者膽虛也虛則生寒寒則其病恐畏不能獨卧口苦善太息嘔膽汁心下淡淡如人將捕之狀嗌中介介數唾頭眩痿躄足指不能搖坐不能起僵仆目視䀮則膽氣虛虛則精神不守其氣上溢循其所在而

生病也
中正湯 治膽氣虛寒不足常多恐懼頭眩痿厥心下淡淡四肢不利僵仆目黄
茯神 羌活 黄芪 懐熟地 酸棗仁一兩 栢子仁炒研 防風 甘菊三分 人参 白芍藥 川歸酒洗
炙甘草五錢 水煎三錢空心溫服以差為度
人参湯 治膽氣虛寒不足精神不守眼目昏眩奔氣在胸脹卧多恐不安
人参 桂心一兩 白茯 棗仁 知母 石羔半兩

甘草八錢　薑水煎五錢空心溫服日二

膽實

論曰膽實則爲有餘有餘則生熱故其症若腹中氣滿飲食不下咽乾心脇痛不能轉側足外反熱是爲陽厥及頭疼目銳眥痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀俠癭皆謂膽氣實足少陽壅滯故也

半夏東流水湯　治膽腑氣實生熱腹中氣滿飲食不下口燥咽乾頭重惡寒脇肋脹痛

半夏兩半 薑汁炙　棗仁　生地二兩　片芩　赤茯

遠志兩　用東流水二鍾煎五錢入秫米生薑溫服

瀉熱湯　治膽實熱精神不安

龍骨　棗仁　片芩　竹茹　升麻　茯神　伏龍肝

甘草　水煎三錢溫服日二

膽虛不得眠

論曰膽虛不得眠者膽爲中正之官足少陽其經也其經不足復受風邪則膽寒故虛煩而眠臥不安也

千里流水湯　治膽寒虛煩不得眠

半夏　麥冬三兩　白茯四兩　人參　片芩　遠志

萆薢　桂心　甘草　酸棗仁二兩 炒　集驗外臺有生薑無遠志

以千里水五大鍾入秫米半合煎候沸揚千遍澄清鍾半入藥五錢薑半分再沸空心溫服

五味子湯　治膽氣虛冷頭痛心中驚悸眠臥不安常如人將捕之狀精神不守

五味子　白茯　人參　遠志　川芎　熟地

棗仁微炒　麥冬分　桑寄生五錢　大棗水煎三錢服

棗仁丸　治膽氣虛熱不眠

棗仁　地榆一兩　丹砂　人參　白茯　石菖蒲五錢

共末蜜丸小豆大空心米飲下二三十丸

山藥丸　治膽氣虛冷精神不守眠臥不寧頭痛目眩常懷恐畏不能獨處

懷山藥　酸棗仁　茯神　栢子仁　山茱萸三分

共末蜜丸小豆大空心酒下三十丸米飲亦可

人參散　治膽虛眠臥不安多驚悸

人參　白茯一兩　丹砂飛過　茯神五錢

共末米飲下一錢或用蜜丸梧子大飲下亦可

乳香散　治膽風不得眠精神恍惚

乳香（炙去油研） 馬頭腦骨（燒灰研一兩） 酸棗仁（微炒二兩）

共末空心酒下二錢以差爲度

膽熱多睡

論曰膽熱多睡者蓋膽府清淨決斷乃所自出今肝膽俱實榮衛壅塞則清淨者濁而擾矣故精神不守而多睡也神既昏憒是以常寢卧

半夏湯　治膽熱精神不守昏困多睡

半夏（薑汁炒二兩） 懷生地（五兩） 赤茯 遠志（二兩） 棗仁（生用半兩） 黃芩（一兩） 長流水三鍾煎秫米半合取汁入藥五錢溫服

黃連湯　治膽熱口苦神昏多睡

川連 片芩 赤茯 麥冬 升麻（一分） 水煎三錢溫服

棗仁湯　治膽風毒氣虛實不和昏困多眠

棗仁（生用研一兩） 臘茶（薑汁塗炙微焦二兩） 水煎二錢溫服

膽癉

論曰經謂有病口苦名曰膽癉夫膽爲中正之官清淨之腑十一臟之所取決咽爲之使若數謀慮不決則膽虛氣上溢而口爲之苦膽主藏不瀉今數謀不斷則清淨者濁而擾矣故氣上溢而其症爲口苦也經所謂是動則病口苦以氣爲是動也

麥冬湯　治膽氣虛逆口中常苦煩躁引飲

麥冬 片芩 大黃（炒） 地骨皮 炙甘草 羚羊角（鎊） 升麻 茯神（一兩） 水煎三錢入竹茹半分溫服

黃連丸　治膽氣熱口苦

胡黃連（一兩） 青羊角 蛇黃（炙研如粉五錢） 熊膽 青黛（研一分） 共末用黃牛膽汁和丸或羯羊膽亦可丸如菉豆大食後淡竹葉煎湯放溫下七丸至十丸

心臟門

心中寒　心健忘　善笑

心中寒

論曰心中寒者心痛徹背背痛徹心如蟲注之狀蓋心爲陽藏中寒則寒必甚其心背徹痛則寒邪乃藏深矣

赤石脂丸　治心中寒心痛徹背背痛徹心

赤石脂（半兩） 人參 細辛（一兩） 桂心 烏頭（二分） 黑乾薑（二兩） 川椒（炒五錢） 共末入蜜丸梧子大飲下十丸日二未効漸加丸數

吳茱萸丸 治心中寒心背徹痛

吳茱萸湯洗醋炒一升 桂心 川歸二兩 共末入蜜杵丸梧子大酒下三四十丸臨卧再下

心健忘

論曰健忘之病本乎心虛若血氣衰少精神昏憒故心志動亂而多忘蓋心者君主之官神明出焉苟爲怵惕思慮所傷或憂愁過損驚懼失志皆致是疾故曰憂愁思慮則傷心心傷則善忘

安神定志人參湯 治心善忘小便赤澀多夢亡人或夢水澤中驚恐惕惕目視䀮䀮不欲聞人聲音食不知味

人參 甘草二兩 半夏 龍骨二兩 麥冬 石羔

懷熟地四兩 遠志用甘草水浸過四兩 水煎五錢入大棗小麥去渣入阿膠末一錢餳糖少許再沸溫服日二

延齡煮散 治心臟氣虛健忘服之安神養氣聰明不忘

茯神 人參 益智仁 懷熟地 藿香葉 桑寄生

沉香 防風 炙甘草一兩 共末空心米飲下二錢日二

白石英湯 治心氣虛健忘精神不足失志善忘陰痿懶

語多驚稍思慮即小便白濁

白石英 人參 川芎 白朮 藿香葉 紫石英

石斛 石菖蒲 續斷一兩 炙甘草 細辛五錢

水煎三錢服

檀香丸 治心虛常怔悸恐懼多忘

白檀香 桂心 白茯苓 甘草三兩 石菖蒲

蘇合油酒化 天竺黃 犀角 懷生地一兩 人參

麥門冬 遠志一兩 共末用蘇合油入蜜杵丸芡實大食後含化一丸飲下

烏犀角丸 治心虛憂愁過度驚悸善忘精神恍惚言語無度心中煩悶服之安魂定魄

烏犀角 麥冬 遠志 羚羊角 郁李仁 鐵粉飛過

丹砂飛一分 人參 茯神 龍齒五錢 氷片另研一錢

共末入蜜杵丸芡實大金箔爲衣酒嚼一丸飲下小兒半丸

善笑

論曰內經謂神有餘則笑不休蓋心藏神在聲音爲笑在志爲喜今心氣實則神有餘神有餘則陽氣發越此所以

有喜笑之症

草龍膽丸　治心經實熱驚悸喜笑

草龍膽　白薇　茯神　山梔仁　大黃微炒二兩

麥門冬三兩　羚羊角　玄參半兩　人參　炙甘草半兩

共末入蜜杵丸梧子大空心大棗湯下二三十丸二

丹砂丸　治心氣有餘精神恍惚自語自笑乘止不常

丹砂飛過　乳香另研　酸棗仁生用一兩

共末酒糊丸如梧桐子大水下十丸

龍齒丸　治心神狂越多喜善笑如邪祟

龍齒　遠志　人參　生地　山藥　防風　地骨皮

五味　白茯　麥冬　天冬　車前子炒一兩

共末入蜜杵丸梧子大用竹葉湯下二三十丸日二

丹砂酒　治心神不定登高臨險言語不避親疎時時自笑高聲叫呼舉止無常大便秘小便赤解衣露體不能安處

丹砂飛過五錢　麝香研二錢　同研勻入白酒二升重湯慢煨隨患人平日酒量令醉候患人睡着急厚衣被蓋之令汗出病愈若病人不能多飲藥只用其半時時飲之良

小腸腑門

小腸虛　小腸實

小腸虛

論曰小腸者受盛之官心之腑也乃手太陽之經其氣虛則爲不足故左手寸口人迎以前脉陽虛者小腸虛也虛則生寒是故有顱際頭角偏痛耳聾不聰驚跳小便頻數之症治宜補之

牡蠣丸　治小腸虛寒小便數小便下次面有膜如乳膏狀

牡蠣煅童便淬　石斛　川芎　益智仁　萆薢　石硫黃另研

龍骨　五味子　牛膝　狗脊　山萸肉

巴戟天　續斷一兩　共末入蜜杵丸梧子大鹽湯下四十丸便止即已

益智仁丸　治小腸虛寒小便後有餘瀝陰痿

益智仁　川芎　木瓜　巴戟天　川萆薢　川續斷

牛膝　狗脊五錢　附子一枚　共末蜜丸梧子大鹽湯下四十丸日二

斷弓弦散　治小腸氣虛寒撮痛并女人血刺心痛

五靈脂 蒲黃一兩新者 先用好米醋一合入藥二錢熬成膏以水一鍾煎七分熱呷 又名失笑散

蘹香子丸 治小腸虛冷少腹氣痛

蘹香子 桂心兩 木香 附子 蓽沉茄 赤石脂三分 川歸酒洗 川椒炒五錢 共末入蜜丸梧子大酒下二十丸

小腸實

論曰小腸者受盛之官心之腑也手太陽之經其脉盛則為有餘故左手寸口人迎以前脉陽實者小腸實也夫實則生熱是故有身熱來去口瘡心煩身重汗不出爭小便不利之症治宜瀉之

麥冬湯 治小腸實熱脉氣盛實小便赤澀下血

麥冬 知母 片芩 木通 升麻 蒲黃一分 大黃炒三分 水煎三錢溫服日二以差為度

瞿麥穗湯 治小腸實熱小便黃赤結澀不通

瞿麥穗 豬苓 川連 防己 烏犀角 車前子炒一兩 炙甘草五錢 木通一兩 水煎三錢溫服日二

脾臟門

脾癉 穀勞

脾癉

論曰有病口甘者此五氣之溢也名曰脾癉夫食入于陰長氣于陽肥甘太過令內熱而中滿則陽氣盛矣故單陽名為癉其症口甘久而弗治轉為消渴以熱氣上溢故也

蘭草湯 治脾癉口甘中滿

蘭草切一兩 水三鍾煎令減半分三服早中晚用以差為度

麥冬湯 治脾癉發口甘煩渴

麥門冬 石羔三兩 白芍藥 片芩半兩 烏犀角一兩 枝子五枚炒 水煎五錢去滓入朴硝五分再一二三沸溫服日二

石羔湯 治心脾實熱口甘煩渴引飲無度

石羔四兩 人參 知母 白芍 柴胡 茯神 赤石脂 白朮 山梔各一兩 竹瀝 生地汁 水煎五錢去滓入竹瀝少許生地汁一合再一二三沸溫服若宜利加芒硝一兩去白芍藥

麥冬生地汁煎 治脾癉內熱口甘煩渴引飲

生麥冬汁 懷生地汁 生白蜜半斤 括樓根二兩

犀角生剉 淡竹葉 知母鹽酒炒 地骨皮 麥冬去心
綿黃芪 升麻一兩 炙甘草五錢 凝水石研淬 石羔研二
兩 除二汁蜜用井華水七升煑十一味取三升濾去
渣入汁蜜同慢煎如稀餳入瓷瓶內重湯頓刻成煎
收貯每用一二匙含化溫湯送下日二夜一

穀勞

論曰胃受水穀其氣虛弱不能傳化則令人怠惰嗜卧肢體傾重腹滿善饑而不能食食已則發穀氣不行使然也故謂之穀勞

沉香湯 治穀勞體重食已便卧使氣消食化
沉香 白朮土炒 紫朴薑汁炒兩 人參 白茯苓
半夏薑汁炒 木香 草豆蔻 甘草三分 陳皮去白炒三分
黑乾薑分 生薑大棗水煎三錢溫服日二

木香湯 治穀勞身重少力多困
木香 陳皮 人參 甘草 陳麯三分 紫朴
蓬莪茂 大麥糵炒一兩 棗肉五十枚
水煎三錢溫服日二

白豆蔻丸 治穀勞身重食已困倦少力食已即眠
白豆蔻兩 枳殼去白炒半斤 桂心 陳皮去白炒
訶黎勒煨取皮 川歸酒浸一兩 共末蒸大棗肉和末杵丸梧子大用淡薑湯空心下二三十丸臨卧再服酒下亦可

胃腑門

食亦 胃反 噦 噫醋 胃寒腸熱
胃熱腸寒

食亦

論曰內經云大腸移熱于胃善食而瘦亦謂之食亦胃移熱于膽亦曰食亦夫胃為水穀之海所以化氣味而為榮衛者也胃氣和則食行節氣血盛而膚革充盛若乃胃受邪熱消爍穀氣不能變精血故善食而瘦也病名食亦言雖能食亦若饑也胃移熱于膽亦曰食亦以膽為陽木熱氣乘之則爍土而消穀也

參苓丸 治胃中結熱消穀善食不生肌肉
人參 赤茯 菖蒲 遠志 牛膝 地骨皮二兩
共末蜜丸梧子大飲下二十丸日二

甘露飲 治胃熱善食不生肌

生地 熟地 天冬 麥冬 片芩 石斛 枇杷葉
甘草 枳殼 茵陳蒿一兩 水煎三錢服

胃反

論曰脾與胃合主腐熟水穀今脾胃氣虛水穀不化與停飲相擊胃中虛脹其氣逆上食久反出故名胃反其候朝食暮吐暮食朝吐寒熱時作心下痞結狀如覆杯

人參湯 治胃反食下便吐
人參 澤瀉 甘草 大黃炒 桂心二兩 赤茯四兩
竹茹二兩 陳皮 乾薑一兩 水煎五錢服日二

鉛丹丸 治胃反嘔吐噦逆
黑鉛四兩化汁入硫黃以柳木槌研成砂羅過一兩 米醋二升熬成膏入蒸餅少許熬丸如赤小豆大薑湯下十丸飲亦可

木香湯 胃反不納飲食開胃和氣
木香一分 糯米一撮 胡椒二十一粒 同炒米熟研末分五服水煎服

田季散 久患翻胃及小兒驚吐諸吐
硫黃五錢 水銀一錢五分 同研黑煤色 生薑四兩取汁 酒一鍾 和藥三錢空心服之以衣被蓋覆自足指汗出遍遲徧身汗徹即差

常有人病反胃經三年不差消瘦殆盡用藥一服汗出如膠腥穢不可近當日更不復吐遂差又小兒諸吐量大小與藥一字至三四字冷水下吐立定此散極浮難調須先滴少水以指緩緩研殺稍增湯調和若傾入湯酒盡浮泛不可服又烏頭散吳茱萸散皆治反胃惟田季散有陰陽理勝于二方今載于後但性差熱更量臟腑寒溫用之

吳茱萸散 胃氣虛冷不能飲食食即吐酸水

吳茱萸湯泡七次炒 乾薑炮製二兩 共末空心熱酒下三錢

吳茱萸丸 治年深膈氣翻胃早食晚吐生存不化膈上常有痰涎時時嘔血胸多酸水吐清水無時夜吐至曉日漸消瘦羸弱腹中痛楚痰逆時復冷滑又即秘結等疾
吳茱萸湯洗炒二分 半夏一兩生薑四兩取汁入木麥麵和研成餅 當歸焙洗
人參 胡椒 甘草五錢半生用半紙裹六七重醋浸煨乾又浸又煨七次
白礬燒枯五錢 共末膏丸梧子大桑柳枝煎湯下七丸日三服忌食諸毒發物惟可食油煎猪胰脚軟飯

茯苓飲　治胃反吐逆發渴飲水

赤茯二兩　白朮　甘草　桂心五錢　澤瀉　乾薑一兩

水煎五錢空心服日二

通膈湯　治胃反不下食

視布取對蹬戶者洗去鹹水浸燒灰　白朮一兩　大黃五錢炒　檳榔

丁香　訶梨勒　木香　半夏三分　薑水煎三錢服

噦

論曰人食于口而聚于胃脾胃散精氣以養四旁臟腑氣和乃能卑助于中若脾胃氣虛不能傳化水穀之精與新

穀相干脾胃氣逆痞滿復遇冷折之故令噦逆也

人參湯　治噦逆不止

白茯　人參　白朮　藿香五錢　甘草一分　水煎三錢溫服

水銀膏　治諸般噦逆

水銀不結沙子　硫黃研細　太陰玄精石各一兩研　共和勻研極細用米醋五升文武火熬成膏磁盒收貯旋丸梧子大艾湯下七丸

枇杷葉湯　治噦逆不止飲食不下

枇杷葉去毛炙四兩　陳皮去白炒五兩　甘草炙三兩

薑棗水煎三錢稍熱服

三聖散　治噦逆不止

丁香四十九枚　胡椒四十粒　半夏大者七枚薑汁炮　共末大人薑湯下一字　小兒筋頭蘸薑汁點藥口中立愈至甚不過二服

神効方　治胃口冷噦逆不止

大棗一枚去核　入胡椒七粒溼紙包煨熟出火毒空心細嚼溫酒送下以粥投之取効爲度

噫醋吞酸

論曰上焦有留飲脾胃挾宿寒致飲食滯于膈脘不能傳化令人腹滿氣逆所以噫醋也

半夏丸　治上焦冷氣噫醋吞酸吐沫嘔逆不思飲食

半夏二兩薑汁製　丁香五錢　乾薑一分炒　共末薑汁糊丸梧子大空心木瓜鹽湯下十五丸

藿香半夏丸　治胸膈有痰脾胃積冷噫醋吞酸不思食

藿香一分　半夏五兩薑汁浸　丁香五錢

共末糊丸梧子大薑湯下十五丸

丁香煮散　治噫醋吞酸不欲飲食

丁香 乾薑五錢 人參 白朮 白芷 赤茯
桔梗炒 半夏 甘草 桂心一兩 檳榔 高良姜
肉豆蔻一分 共末薑棗水煎三錢服

丁香丸 治食飲不化噫氣吞酸
丁香 人參 五味 半夏上錢 甘草 琥珀
乾薑一分 桂心 枳殼 昆布 訶勒皮三分
共末蜜丸梧子大空心薑橘湯下二十丸

胃寒腸熱

論曰病有腹脹而泄者為胃寒腸熱胃受寒則氣收不行而為脹滿腸客熱則水穀不聚而為泄注病本濁寒之氣在上清熱之氣在下故為腹脹而且泄也

訶梨勒湯 治胃寒腸熱腹脹滿悶泄瀉不止
訶勒皮兩半 青皮 大黃炒 陳皮 紫朴薑汁炒
高良姜炮 枳殼炒五錢 防風 甘草一分 乾薑一兩
薑棗水煎三錢服

當歸黃連湯 治胃寒腸熱腹脹泄利
當歸 川連二兩 木香 紫朴薑汁炒 訶梨勒
吳茱萸洗炒 赤茯一兩
共末蜜丸梧子大飲下三十丸日二

紫朴丸 治胃寒腸熱腹脹洩利
紫朴薑汁炒兩半 附子 龍骨 川連 白石脂
訶梨勒 吳茱萸洗炒 乾薑一兩 共末醋浸炊餅丸梧子大空心吳茱萸湯下三十丸米飲亦可

妙應丸 治胃寒腸熱腹脹泄利
烏頭炮去皮臍五錢 枝子 乾薑一分 共末薑取自然汁和丸梧子大空心酒下七丸日二

胃熱腸寒

論曰腸胃相通疾病相連人因飲食不節寒溫失宜致腸胃受邪有冷有熱病症俱見者則善饑小腹痛脹為胃熱腸寒之病胃熱則消穀故善饑腸寒則血凝脉急故小腹痛又寒則氣聚故痛而且脹

地黃湯 治胃熱腸寒食已小腹痛脹
熟地 人參 白茯苓 地骨皮 甘草 枇杷葉去毛
炙 麥冬 石斛 黃芪炙二兩 水煎三錢空心服

調中湯 同
人參 白茯十兩 甘草炙 紫河車炙二兩

水煎三錢空心服
麥冬湯　同
麥冬　炙甘草各二　白术　羗活　白茯苓　旋復花
人參　升麻　桑白皮　白芍藥　玄參　當歸酒洗
柴胡各一　胡黃連一分　木香五錢　熟地兩半　共搗粗末
薑棗水煎三錢入甘草一寸空心服日二

肺臟門

肺消　膈消　肺痿　肺痿咽燥
肺痿小便數　肺癰　肺癰喘急脹滿

肺消

論曰內經謂心移寒于肺故爲肺消肺消者飲一溲二病不治夫病必有傳而傳則有順有逆傳其所生者順順則易治傳其所勝者逆逆則難治緣心經受邪傳之于肺是爲逆症益以寒邪隨心火內爍金精肺臟既已銷鑠氣無所持故症飲少而溲多也當其始病之時治宜去其寒邪使不乘心火而移害于肺至于肺已既消則又當補其肺氣平其心火邪無所容而病自愈

黃芪湯　治肺消飲少溲多
黃芪蜜炙二兩　人參　五味子　麥冬　貝母去心
桑白皮東引蜜炙　枸杞子酒洗　懷熟地兩半
水煎五錢空心溫服日二

兎絲子散　治肺消飲少溲多
兎絲子酒洗淨用白酒浸一宿曬焙乾研一兩　雞膍胵黃皮不見水炙兩半
蒲黃隔紙微炒　五味子炒　川連去蘆兩半　肉蓯蓉酒洗
太甲焙一兩　硝石五錢　共末粥下三錢日二

黃芪湯　同
黃芪蜜炙　土瓜根二兩　茯神　地骨皮　五味子
人參　石羔研　牡蠣童便淬一兩　水煎五錢服日二

膈消

論曰心移熱于肺傳爲膈消夫心肺二臟皆居膈上心火既熾移熾于金二臟俱熱薰蒸膈間而血氣消鑠也心主血肺主氣俱受邪熱宜不息而消故久則引飲爲消渴之疾

麥冬飲　治膈消胸中煩滿津液燥少短氣多渴
麥冬二兩　人參　生地　五味　甘草　葛根　括樓
知母　茯神一兩　水煎五錢入淡竹葉十片溫服日二

除熱地黃煎 治膈消煩渴

生地汁 生括樓汁二升 牛乳三升 白蜜半斤 川連一斤

為末 合煎減半入末收成膏熱湯化下二大匙日三

知母湯 治膈消心胸煩渴咽燥

知母 子芩 白茯 生薑焙 澤瀉二兩 小麥入合

大棗肉十五枚 甘草二兩 水煎五錢入淡竹葉十五片

溫服日二

肺痿

論曰內經謂熱在上焦因欬為肺痿其病之所得或因汗

出或因嘔吐或因消渴或小便利數或因便難數被快藥

下利重亡津液故得之診其寸口脈數而虛其人胸煩多

唾唇燥小便難或數欬不得欬欬則出乾沫胸中隱隱痛

者是也

地黃湯 治虛寒肺痿喘急

懷熟地 川芎五兩 人參 桂心三兩 桑白皮炒二升

大麻仁一升炒研如脂 水煎五錢去滓入麻仁脂少許再數

沸溫服日二

旋復花湯 治肺痿咳嗽吐稠黏虛瘦喘急盜汗

旋復花 甘草 牡蠣醋淬一兩 生地汁 生薑汁二合

紫菀 桔梗炒 麥糵五錢

水煎五錢去滓入二汁少許沸服日二

紫菀湯 治肺痿咳嗽涕吐稠黏小便不利

紫菀 天冬 桔梗五錢 白茯 知母一兩 百合二兩

生地汁 水煎五錢去滓入生地汁半合沸服要利加

朴硝末少許此疾利多為肺與大腸合故秘澀者少

鹿髓煎 治傷中氣脈絕筋急肺痿咳嗽

鹿髓半斤 白蜜 真酥二兩 杏仁三兩去皮尖 桃仁去皮尖三

兩炒研用酒一升濾汁 生地汁五合 先將二仁汁地汁煎減半

下鹿髓酥蜜攪勻慢煎如餳不拘早晚頻服一匙如

無鹿髓以牛髓代之

肺痿咽燥

論曰熱在上焦因咳為肺痿其脈則寸口數其症則咳而

口中有濁唾涎沫甚者咽中乾燥蓋以邪熱熏肺使然或

因快藥下利重亡津液所致

天冬丸 治肺痿咽乾煩燥痰壅咳嗽小便澀赤眠臥不

安咳吐涎沫咽喉腫痛

天冬 人參二兩 杏仁 甘草一兩 貝母 阿膠
桑白皮 五味子五錢 共末蜜丸梧子大臨卧人參湯
下十丸含化亦可
生薑甘草湯 治肺痿咳吐涎沫不止咽燥而渴
生薑五兩 甘草四兩 人參三兩 大棗十五枚
水煎六錢溫服日二
人參煎 治肺痿咳嗽吐涎沫咽燥渴
生天冬汁 醇白酒 飴糖一斤 紫菀四兩為末 將酒汁
重湯煎沸下菀末攪勻入飴糖可丸即丸如杏仁大

津液含化一丸日三
生地煎 治肺痿喘欬涕吐稠粘咽膈不利
懷生地 杏仁去皮尖炒研三兩 生薑二兩與生地同研取汁
玄參一斤生 天冬去心半斤 麥冬去心一斤二味用生者 牛旁子生用四兩與玄參二冬蘇子同用水擂取汁 蘇子炒二兩 同和勻慢火煎
令稠入煉過蜜五兩與酥二兩攪勻入磁罐內放飯
甑蒸少時收貯頻化一匙
肺痿小便數
論曰內經云臟真高于肺又曰真氣奪則虛今肺中冷則
肺中真氣不足而其人上虛矣虛則無以制下故上為肺
痿下為小便數以致吐涎沫而欲咳不能咳者皆其症也
治宜以溫藥和之
白茯苓湯 治肺痿小便數甚者吐涎沫欲咳不能
白茯苓 附子 桂心 白芍炒三兩 川椒炒四十粒
肉蓯蓉一兩半 補骨脂 黃芪一兩 水煎三錢空心溫服
日二
甘草乾薑湯 治肺痿小便數咳吐涎沫
炙甘草四兩 黑乾薑二兩 用水煎三錢空心溫服日二

以差為度
五味子湯 治肺痿小便數
五味子 款冬花 人參 桂心二兩 麥門冬
桑白皮炙二兩 生薑大棗水煎六錢空心溫服日二
龍骨湯 治肺痿小便數漸覺氣弱
白龍骨 肉蓯蓉 黃芪蜜炙一兩 附子 白薇
牡蠣醋淬二分 炙甘草五錢 生薑大棗水煎三錢溫服日二
肺癰
論曰肺癰之病脉數而實蓋以風中于衛呼氣不入熱過

子榮吸而不出風熱凝滯蓄結爲癰其症惡寒口乾胸中隱隱痛咳而胸滿時出腥唾者是也宜速治之久則吐膿如米粥始萌可救膿成難治

葦葉湯　治肺癰

葦葉（細切二升）　桃仁（去皮尖炒五十枚研）　瓜蔞仁　薏苡仁（各半升）

用水一斗將葦葉取汁五升入藥煮二升去滓分三服當吐如膿差

甜葶藶丸　治肺癰

甜葶藶（紙炒研）　杏仁（去皮尖兩炒研膏）　貝母（炒五錢研）　皂莢（肥大不蛀者二兩）

先將皂莢椎碎入無灰酒半升內熬按濾去滓慢煎成膏將三味共末入膏和丸梧子大溫水下二十丸如肺氣喘急濃煎桑白皮湯下

防己丸　治肺癰咳嗽久不差

防己　杏仁（去皮尖炒研）　川貝母　炙甘草（二兩）　甜葶藶（紙炒研四兩）

共末糊丸梧子大水下三十丸日二

地黃湯　治肺癰

生地汁（一斤）　人參　附子　白石英（醋淬三次）　川歸

甘草（炙一兩）　白豆（小者二十粒）　白絲毛雞（一隻男人用雌者女人用雄者）

（如法治食）用水一斗五升先煮雞取汁七升去雞入地汁再沸下諸藥慢火煎三升濾去滓每服一鍾日三夜二

桔梗湯　治肺癰吐膿如粳米粥

桔梗（炒三兩）　炙甘草（一兩）　水煎六錢空心溫服須臾吐膿數合再服

薏苡仁湯　治肺癰咳嗽

薏苡仁（一升）　苦酒（三升）　用酒煮薏仁至一升溫頓服吐出膿血驗

桔梗白朮湯　治肺癰吐膿經時不差

桔梗（炒三升）　白朮　懷生地　薏苡仁　炙甘草　敗醬（二兩）　桑白皮（升）　川歸（一兩）　大豆（四升）　用水一斗五升煮豆取汁七升內滿大酒三升合諸藥煮之去滓取三升每服一鍾日三夜一

肺癰喘急脇滿

論曰內經謂肺之癰喘而兩脇滿蓋肺主氣而合于息其脉別支者從肺系橫出腋下故邪氣蘊積于肺則上爲喘急下連兩脇滿治宜瀉其肺臟之邪毒病斯愈矣

葶藶大棗瀉肺湯　治肺癰喘急不得安卧

葶藶甜者五兩紙炒研取末二錢　大棗十枚去核　用水三大鍾煮棗取汁入葶末五錢一二沸溫服日止一服

平肺湯　治肺癰氣急喘逆咳嗽脹滿

黃芪　陳皮　杏仁一兩　沉香五錢　人參　紫菀

紫蘇二兩　水煎五錢溫服日二

夜合湯　治肺癰咳喘體有微熱煩滿胸前皮甲錯者

夜合白皮一兩炙即合歡皮肺癰之妙藥　水三鍾半分二服日服之以差為度

大腸門

腸垢　虛瘕

腸垢

論曰內經謂大腸有熱便腸垢巢元方云腸垢者腸間津汁垢膩也蓋傳化之腑熱氣積而為痢痢久不已腸間虛滑津垢乃出是邪熱氣實與臟氣虛故有此症

附子丸　治腸垢因久痢腸滑下垢不止羸困

附子去皮臍炮　桂心　赤石脂　黑乾薑二兩　共末入蜜杵丸梧子大空心米飲下二三十丸臨臥再下

虛瘕

論曰內經謂小腸移熱于大腸為虛瘕夫小腸者乃受盛之官化物出焉大腸者乃傳導之官變化出焉二者皆以傳化為事今也小腸受熱移于大腸則陰氣虛而津液耗不能滑利故糟粕內結沉伏而為瘕聚腸間菀結大便秘澀是也

檳榔丸　治大小腸胃受熱氣不宜通瘕聚沉伏腸間菀結腹脹滿大便秘澀

檳榔　大黃　枳殼炒二兩　桃仁去皮尖炒　大麻仁炒

青皮炒　木香一兩　共末溫水下一錢日二以知為度

秦艽湯　治大腸虛瘕秘澀躁悶

秦艽一兩　防風　枳殼　檳榔　桂心　獨活

牽牛一兩生搗　朴硝研

水煎三錢去滓入硝末五分再沸服日二

腎臟門

腎虛　腎實　腎脹　解㑊　瘖俳　腎虛陽痿

腎虛多唾　骨虛實　髓虛實

腎虛

論曰腎主水受五臟六腑之精而藏之若腎氣虛弱則足

少陰之經不利故其症腰背痠疼小便滑利臍腹痛耳鳴
四肢逆冷骨枯髓寒足脛力劣不能久立故曰診左手尺
中神門以後陰脉虛者爲少陰經病令心悶下重足腫不
可按蓋足少陰腎之經也

磁石丸　治腎經虛憊四肢無力體面少色惡風寒手足
冷骨節痛耳內蟬鳴
磁石醋淬七次研　附子　桂心　補骨脂　肉蓯蓉一兩
巴戟天去心　續斷　人參　白茯苓　柴胡　黃芪
山藥　紫朴薑汁炒　木香　牛膝酒浸　遠志甘草水煮
川椒炒一兩　羊腎一對去筋膜鹽水煮　檳榔一枚　桃仁去皮尖炒

共末入蜜杵丸梧子大空心酒下二三十丸日二

鹿茸丸　治男子腎臟虛損腰腳弱氣不足體煩倦面色
黑小便數
鹿茸一對酒炙去毛炙　附子　牛膝　人參　木香
巴戟天　天雄　肉蓯蓉酒浸去甲　五味子　川椒
羌活　桑螵蛸　兎絲子　葫蘆巴　紅豆蔻　山藥
沉香　肉豆蔻　楮實子　懷熟地　白蒺藜　桂心
白茯　沒藥炙一兩　共末入蜜杵丸梧子大酒下二十
丸日二

羊腎丸　治腎虛攻注四肢煩熱多汗肢節痛耳鳴
羊腎一對去筋膜　杏仁去皮尖炒　川椒　川歸　麻黃去根節
黃芪一兩　共末用羊腎酒煮爛研酒煮糊丸梧子大酒
下二十丸日二

羊骨補腎丸　治腎虛寒耳鳴好睡日漸瘦弱
羊脛骨酥炙五兩　白朮　磁石醋淬七次二兩　桂心三兩
黃芪蜜炙　白茯苓乳浸　乾薑一兩　水煎五錢溫服日二

葫蘆巴丸　治腎氣虛損陽氣痿弱補虛損興陽氣
葫蘆巴微炒　附子　肉蓯蓉　巴戟紫者炒　蘹香子炒一兩

半　川牛膝　蛇床子　桂心　楝實去皮醋浸　補骨脂
一兩　蓬莪茂醋浸煨二兩
共末入蜜杵丸梧子大鹽湯下二十丸日二

桑螵蛸丸　治腎元虛耳聾脹滿腰脊強直小便赤黃
桑螵蛸炒　山藥　沉香　山茱肉　肉蓯蓉　磁石
醋淬研三分　五味子　川歸五錢　附子三枚　石菖蒲　續斷
三分　蘹香子炒一分
共末蜜丸梧子大酒下二十丸日二

沉香飲　治腎氣虛小腹急滿骨肉乾枯陰囊浮痒
沉香　木香　羌活　熟地　黃芪　澤瀉　桑螵蛸五錢　白芍　川歸　天雄　續斷　磁石醋淬七次研一分
萆薢　牛膝　大腹皮三分　生薑水煎五錢溫服日二
慶雲散　治陽氣不足腎元虛精乏不能施化
兎絲子五兩　天冬九兩　五味子六兩　覆盆子十兩
紫石英二兩　桑寄生　天雄一兩　白朮　石斛三兩
共末酒下二錢　氣寒者去桑寄生用細辛二兩

腎實腎何能實以腎火實也

論曰足少陰腎經其氣實爲有餘有餘則舌燥咽腫上氣嗌乾咳喘汗出腰背强急體重內熱小便黃赤腰脊引痛足脛腫滿此由足少陰經氣實或爲邪淫所加故有是症治宜瀉之

瀉腎大黃湯　治腎元實熱小腹膜脹腹重不利足下熱痛耳聾腰髀夢伏水中
大黃蜜水浸　懷生地　磁石醋淬七次二兩　玄參　片芩
澤瀉　五加皮　羚羊角　石菖蒲　炙甘草　赤茯苓一兩　水煎三錢入竹葉二七片溫服日二

羚羊角湯　治腎元實熱多怒好忘肢體煩滿腰腹急重
羚角　升麻　檳榔　白芍　杏仁　甘草　澤瀉
子芩　木通　赤茯一兩
水煎三錢入竹葉十四片溫服日二

大澤瀉湯　治腎元實熱多怒善忘舌燥咽腫喘急耳聽不聰四肢滿急腰背強直
澤瀉　子芩　升麻　杏仁去皮尖　芒硝研三兩　磁石醋淬七次四兩　茯神　大青　竹葉二兩　懷生地五兩
羚羊角一兩　柴胡三兩　水煎五錢空心溫服日二

腎脹

論曰腎脹之病腹滿引背央央然腰髀痛者是也蓋腎主腰腳其經屬足少陰與足太陽爲表裏故腎經所過抵少腹通膀胱挾脊內過髀樞循髀外是動則病髀不可以曲今寒氣積于腎經不得宣故氣留滯而爲脹名曰腎脹

溫經湯　治腎虛脹寒氣不宜利上攻腹內及背腰脊髀痛
附子　杜仲鹽炒　牛膝一兩　補骨脂　川續斷
黑乾薑　桂心三分　生薑水煎三錢入鹽一捻服日二

蘹香子散　治腎虚脹氣攻腰腹髀痛
蘹香子　桂心　石斛　懐熟地　桃仁去皮尖炒
黑乾薑　杜仲酒炒　甘草一兩
共末空心酒下二錢日二
八味丸　治腎氣虚冷氣攻腰腹痛
附子去皮臍炮　桂心　澤瀉二兩　懐熟地八兩　山藥
山萸肉四兩　牡丹皮不見火　白茯三兩　共末入蜜杵丸
梧子大空心酒下二三十丸鹽湯下亦可久服溫腎
經消脹滿

解㑊
論曰內經云冬脉太過則令人解㑊其症脊脉痛而少氣不欲言語夫腎爲作强之官精爲養身之本所以運動形體者也一或受邪則腎實而精不運故有脊脉痛少氣不欲言之証其名解㑊者解有解緩之義㑊則疑其寒亦疑其熱疑于壯又疑于弱有不可必之之詞診其尺脉緩而濇者爲解㑊也
利腎湯　治解㑊脊脉痛而少氣不欲言此爲腎氣有餘
懐生地　赤茯苓　澤瀉半兩　柴胡　枳殼去白炒
麥門冬　川牛膝　檳榔　子芩一兩
水煎三錢空心溫服日二
通腎湯　治解㑊少氣不欲言脊脉急痛腰背强直足下熱疼小便癃閉心煩咽乾
懐生地　羚羊角　赤芍　石菖蒲二兩　猪苓
炙甘草　五加皮　澤瀉一兩　水煎三錢溫服日二
瘖俳
論曰內經謂內奪而厥則爲瘖俳此腎虚也瘖俳之狀舌瘖不能言語足廢不能爲運用蓋腎脉挾舌本腎氣內奪

氣厥不至舌本故不能言語而爲瘖腎脉循陰股循䯒骨內踝入足下腎氣不足故足廢而爲俳名曰瘖俳
熟地黄湯　治腎氣虚厥語聲不出足廢不爲運用
懐熟地　附子　石斛　五味　巴戟天　肉蓯蓉
山萸肉　桂心　遠志　麥冬去心　白茯苓　石菖蒲
五錢　生薑大棗水煎三錢溫服日二
補骨脂丸　治瘖俳腎氣內奪舌瘖足廢
補骨脂　肉蓯蓉一兩　遠志　麥冬　石菖蒲
鍾乳粉五錢　共末入蜜杵丸梧子大用木通湯下二三十

丸日二

腎虛陽痿

論曰腎臟虛損陽氣痿弱者蓋由嗜慾不節勞傷腎氣精血耗竭臟腑空虛血氣不能充養故也治宜補虛損興陽道益精氣

五味子丸　治腎虛損精神精神衰竭陽道痿弱腰脚無力

五味子　兎絲子　鹿茸去毛炙　巴戟天　杜仲

肉蓯蓉一兩　共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十丸日

磁石丸　治腎氣虛損骨髓枯竭小便頻數腰背拘急耳鳴面色黑黯陽道痿弱

磁石醋淬七次二兩　附子一兩　人參　白朮　白茯

地骨皮　桂心　五味　熟地　黄芪　牡蠣

澤瀉三分　共粗搗每用羊腎一對煮汁入藥三錢再煮煎服日二

助陽丸　治腎虛損陽氣痿弱無力志意不快小便數

附子　人參　鹿茸去毛炙　兎絲子　肉蓯蓉

鍾乳粉　黄芪　原蠶蛾一兩

共末入蜜杵丸梧子大酒下二十丸日二

腎虛多唾

論曰水飲非升降不能傳導非陽氣不能消鑠腎虛多唾者蓋緣腎臟不足陽氣虛微而又陰寒凝結停滞于胸膈之間不能消鑠水飲上溢于齒牙故喜唾也

地黄湯　治腎虛使人痰唾不休

懷熟地　鹿茸　巴戟天　丹參　五加皮　枸杞子二兩　車前子　桂心　防風一兩　水煎四錢溫服日二

半夏丸　治腎虛寒唾液不休心胸痞悶

半夏湯泡七次爲末用薑汁和作餅曬乾炙　人參　附子　前胡一兩

五味子　枳殼　檳榔　赤茯　陳皮　桔梗

訶黎皮五錢　共末酒煮糊丸梧子大薑湯下二三十丸日二

骨虛實

論曰腎生骨髓骨髓者腎氣之餘腎氣虛則骨髓痠疼倦而無力其氣實則骨熱苦煩津液內燥當隨症施治

補骨脂湯　治骨虛痠疼多倦不能久立

補骨脂　人參　附子　五味子　肉蓯蓉一兩

水煎三錢去滓入酒二分溫服日二

白芍虎骨散　同

白芍藥（一斤，細）　懷熟地（五斤，細）　虎骨（四兩，剉）　用白酒一斗浸三宿晒乾又浸又晒以酒盡爲度共末不拘茶酒下二錢日二

四物湯　治骨髓實苦疼煩熱

葛根汁　生地汁　麥冬汁　白蜜（各半鍾）

共和勻分三服每服入水半鍾同煎溫服

髓虛實

論曰骨髓之病應肝膽若其腑臟有病皆從髓生蓄熱則應臟寒則應腑故髓虛者腦痛不安身常清慄髓實者身體煩躁勇悍驚熱此髓虛實之候當隨症施治

補虛羌活丸　治髓虛寒腦痛不安身常清慄

羌活　川歸　人參　川芎（二兩）　桂心（一兩）　大棗（去皮核，三十枚）　羊髓　牛髓　真酥　大麻仁（各一合，研）

共末入髓酥和勻入器內重湯煅稠丸梧子大空心酒下三四十丸日二

溫髓湯　治髓虛骨寒

附子　人參　桂心　黃芪（蜜炙）　細辛（一兩）

水煎三錢溫服　髓實者於腎實并骨實中求之

膀胱腑門

胞痺　胞轉

胞痺

論曰內經謂胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀于小便上爲清涕夫膀胱爲州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒邪溼氣客于胞中則氣閉不能化出故胞滿而水道不通其症小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀于小

便以足太陽經氣閉故熱而痛也上爲清涕者以足太陽經直行者從巔頂入絡腦腦氣下灌出于鼻竅則爲清涕矣

溫腎湯　治胞閉小便不利腰脊疼痛腹背拘急絞痛

澤瀉　白朮　赤茯苓　黑乾薑（二兩）

水煎四錢溫服日二

人參湯　治胞痺小便不利

人參　白芍　川芎　生地　川歸　赤茯　遠志　子芩　五味　甘草　麥冬　乾薑（一兩）　桂心（二兩）

水煎羊腎取汁入大棗煎五錢溫服日二

脊瀝湯　治胞痹小腹急痛小便赤澀

麥門冬　犀角　五加皮　杜仲鹽酒炒　桑螵蛸十枚切破炙黃　赤芍藥　木通　桔梗炒一兩　水煮羊腎一對取汁煎五錢去滓入竹瀝半合舊汁少許再沸溫服日二

胞轉

論曰胞受水液氣未轉行則小腸滿脹或飽食用力或因合陰陽令胞屈辟小便不下遂致胞轉其候水道不通小腹急痛煩悶汗出氣逆奔迫甚至于死名曰胞轉宜速治之

虎珀湯　治胞轉臍下急滿或因霍亂而得者

虎珀研一兩　阿膠炒五錢　車前草三兩　葱白二七莖

用水五鍾煎葱白車前取汁三鍾下膠末炙下珀末微煎分三服

石菖蒲散　治胞轉不得小便少腹急痛

石菖蒲　滑石飛過一兩　共末用雞子白和二錢下頃再下

秦芃湯　治胞轉不得小便小腸滿脹

秦芃　水煎五錢空心溫服少頃又服以差為度

琥珀湯　治胞轉小便不通小腹痛煩悶

琥珀研細　生大黃　滑石飛過　車前子　車前葉一兩

水煎五錢入葱白三寸空心溫服日二

車前草飲　治胞轉臍下急滿小便不利

車前草一握　用水三鍾煎溫服日二以差為度

聖濟總錄纂要卷十六終

聖濟總錄纂要卷之十七

程　林雲來　纂

許　綱芳蕤

新安　戴自修肇紀　較

方鴻逵于雲

面體門

面䵟䵳　面皯皰　面皶皰　面皶

面體疣目　狐臭　滅瘢痕

面䵟䵳

論曰䵟䵳之狀䵟如烏麻斑如雀卵稀則棊布密則不可容鍼皆由風邪客于皮膚痰飲漬其形外著或飽食安坐無所作爲養生方所謂積聚不消之病使人面目黧皯是也散之固有常劑若乃塗澤滋除朝夕從事者又安可已耶

治面䵟䵳方

雞子一枚去黃　朱砂末一兩　二味先研朱砂爲末入雞子中封固口與雞卵同令雞哺候雞雛出即取塗面效

治面䵟䵳方

沉香三分　牛黃三分　薰陸香三分　雌黃各半兩　丁香一分

玉屑二分　鷹屎半兩　水銀一分　共八味先將三味香擣羅爲末次將玉屑雌黃入乳鉢中研令細方入水銀及諸藥同研令極細入白蜜調和令稀稠得所入瓷盒中盛每至臨卧時塗面䵟䵳處

杏仁膏　治面䵟䵳塗之令白潤澤

杏仁一兩去皮尖雙仁　雌黃一兩　瓜子一兩　白芷一兩

零陵香半兩　白蠟二兩　右六味除白蠟外並入乳鉢中研令細入油半斤并藥內鍋中以文火煎之候稠凝即入白蠟又煎攪勻內瓷盒中每日先塗藥後傅粉

大去䵟䵳

羊髓膏方　治面䵟䵳塗之令先白潤澤

羖羊脛骨髓二兩　丹砂半兩　雞子白　三味先將髓并丹砂入乳鉢中研令極細以雞子白調和令勻入盒中盛每用時先以漿水洗面後塗之

益母草塗方　治面䵟䵳令先白潤澤

益母草灰一升　一味以醋和爲團以炭火煅七度後入乳鉢中研細用蜜和勻入盒中每至臨卧時先漿水

洗面後塗之大妙

面皯皰

論曰面皯皰者面生皶皰細起如粟穀狀由風熱相搏而生蓋諸陽在於頭面風熱乘之結而不散故成皯皰養生方說醉不可露臥及飲酒熱未解冷水洗面令人面發瘡輕爲皰正謂此也

白芷膏方　治面皯皰塗面光白

白芷　白斂各三兩　白朮三兩半　白芨　細辛三兩

白茯苓一兩半　白附子一兩半　右七味擣羅爲末用鷄

子白和匀丸如彈子大瓷盒中盛每臥臨時先洗面後取一丸以漿水研化塗面上明旦井華水洗之不過七日大效

礬石散方　治面皯皰令白塗面

礬石燒令汁盡　白石脂各一分　白斂三分　杏仁去皮尖研半兩

四味並爲散以雞子白調令匀入瓷盒中盛臨臥時先用漿水洗面後塗藥明旦以井華水洗之

浮水膏方　治面皯皰令光白

水萍暴乾五兩　一味擣羅爲末以白蜜調和稀稠得所入瓷盒中盛每臨臥時塗面

面皶皰

論曰諸陽皆會於面風邪熱氣客於膚腠不能流通因發爲皶皰形似米粟色有赤白亦有緣醉酒露卧及飲酒未解以冷水洗濯而得之有率由風熱在皮膚間外感冷氣摯搏而成

杏仁膏方　治面皶皰

杏仁湯浸去皮尖研半兩　硫黃研一分　密陀僧研半兩　硇砂研一錢

白鷄脂鍊成八兩　右五味除鷄脂外再同研如粉入

鷄脂油更研令匀傾入瓷盒子坐煻灰火中養之攪令稀稠得所成膏每臥臨時以紙拭皰令乾塗之

防風散　治肺臟風毒及遁飲成皶皰

防風一兩　石膏細研水飛　小荊子一兩　梔子仁一兩

蒺藜一兩　枸杞子一兩　白蒺藜一兩　甘草炙半兩

共八味擣羅爲末每服二錢溫水調下食後服

面皶

論曰面皶者是粉刺也面上有皶如米粒此由膚腠受於風邪搏於津脉之氣因虛而作亦去傅胡粉散入虛脈使

之然也

白歛膏塗方　治面粉皶

白歛　白石脂　杏仁去皮尖雙仁研各半兩　三味擣羅為末更研極細以雞子白調和稀稠得所甆盒盛每臨臥塗面上明旦以井華水洗之

兔絲汁塗方　治面粉皶

兔絲苗一握　一味擣絞取自然汁塗面上不三五次效

石粟膏塗方　治面粉瘡皺如麻子

石灰二兩　粟米一合　二味將石灰研細同粟米內瓶中以水浸二宿取出研如膏暴乾重研如粉以面脂調勻入甆盒中盛每洗面訖拭面塗之

面體疣目

論曰風邪入於經絡氣血凝滯肌肉弗澤發為疣目或在頭面或在手足或布於四體其狀如豆如結筋綴連數十與鼠乳相類故謂之疣目

去疣目方

石灰二兩　一味以苦酒漬七日滴汁點疣上即落

又方

牛口中涎　用以塗疣上自落

又方

艾　一味作炷於疣目上灸之三壯即除

狐臭

論曰陰陽之在人血與氣兩者調適則行流散徙莫或凝滯達於形色暢於腠理無不得其和苟失其宜血氣從而凝滯此所以有狐臭之病其候不一有曰狐臭有曰體臭有曰漏腋狐臭者指其腋間體臭者舉其大槩漏腋則又言其液而生瘡者不可不辨也

治丈夫婦人腋氣不可近者方

右方以開通錢四十九文用鋼筋穿入炭火內燒赤醋浸四十九次碾羅為細末入麝香一分研和勻先用熱酒洗腋下後以藥末揩腋下數次永除狐氣

治腋氣人不可近者方

石灰二兩　桑柴灰一兩　炭灰一兩　雌黃一兩　四味同研末水調塗於腋下可一食久即以柳木篦子刮藥其腋下毛並落然後用四灰散

治腋氣四灰散方

粉霜　艾葉灰　礬石灰　鉛灰無即用胡粉蜜陀僧代之

四味唯艾葉灰稍多餘並等分研令極細先以醋漿水洗拭乾即傅之不過三五上永除臭氣如要試但傅藥蒜上良久自無臭氣兼治脚汗

治腋下汗不止及足心手掌陰下股裏常如汗溼臭方

乾薔薇根　乾枸杞根　甘草炙各半兩　商陸　胡粉

滑石炙各一兩　右六味先將四味擣羅極細即入研者二味拌勻以苦酒許和塗當微汗出夜復更塗之不過三傅愈

丁沈丸方　治七竅臭氣

沈香一兩　丁香半兩　甘草炙半兩　白瓜子仁一兩

藁本三分　當歸　芎藭　麝香　共八味研七味為細末後入麝香拌勻鍊蜜丸如小豆大每服溫酒下二十丸日三含化令遍體俱香

滅瘢痕

論曰風熱諸毒留於腑臟發於肌肉而為瘡瘍病後瘡愈餘毒未殄故瘡痂雖落而瘢痕不滅治法既有塗澤膏潤之劑亦須頓榮衛平均肌溫氣應外宜慎風冷也

辛夷膏方　治面上瘢痕塗之

辛夷一兩　麝香半分　杜若　細辛各半兩　白附子三分

共五味除麝香外並剉碎以酒兩盞浸一宿別入羊髓五兩銀石鍋中以文火煎得所去滓將麝香研如粉內膏中攪勻再以微火煖入盒中每日三塗瘡瘢上避風

當歸膏方　治面上瘢痕塗之

當歸　白芷　烏雞糞以猪脂三斤飼雞三日後取乾雞糞各一兩

鷹屎白半兩與糞同研　右四味先將當歸白芷剉碎酒浸

一宿別鍊猪脂一斤消後入浸藥并酒文火煎之候白芷黃色去滓將雞屎鷹屎內膏中攪勻傾入瓷盒中每日三塗瘢上避風

臘脂膏方　治面上瘢痕塗之

臘月猪脂四斤　大鼠一枚　二味入鐺中以文火煎之待鼠銷盡以新綿濾去滓入瓷盒盛每用先以布拭令瘢痕色赤次以膏塗之三五度差慎風

雞子膏方　治瘡瘢痕無問新舊塗之

雞子五枚　一味熟煮取黃於鐺中炒如黑脂膏以物先

揩瘢痕然後塗膏日三次即自滅

麥麩散　治面瘢痕凸塗之

右方秋冬以小麥春夏以大麥麩細擣爲散酥和傅封瘢痕上

眞玉磨方　治面上瘢痕

眞玉　取平處一面磨瘢痕久則無痕

髭髮門

烏髭　榮養髭髮　鬚髮黃白　白秃

赤秃

眉鬚髭髮統論

論曰足太陽血氣盛則眉美足少陽血氣盛則鬚美足少陰血氣盛則髮美手陽明血盛則髭美夫經絡所至不同血氣各有所屬眉鬚髮髭率本於經絡之血氣或黑或紺或黃或白可以知盛衰蓋血氣在人猶水之津也髭髮猶津之有彡也津之槁澤而彡隨之則髭髮本氣血可知矣

烏髭髮

論曰髮本於足少陰髭本於手陽明二經血氣盛則悅澤血氣衰則枯槁容貌之間資是以爲飾則遇枯槁爲悅澤法務可廢乎

地黃丸方　烏髭髮

生乾地黃一斤　生薑汁五合　巨勝子　旋復花　熟乾地黃　乾椹子各二兩　共六味除二味汁外擣羅爲末先將前二味汁用銀器煎熟看稀稠將藥末和丸如彈子大每服夜飲酒半酣後含化一丸

揩牙烏髭方

皂莢肥者十條　以地黃自然汁生薑自然汁各半盞和勻旋刷皂莢於火上炙以二藥汁盡爲度研細爲末入青鹽拌勻逐日擦齒藥用經旬效

鬚髮黃白

論曰足少陰血氣盛則髮潤澤而黑足太陽血氣盛則鬚潤澤而黑二經血氣虛乏則鬚髮變爲黃白然則還其潤澤復其紺黑雖有傳染之法曾不如益血補氣爲常服劑益血調適則滋澤外彰其視用傳染之功遠矣

乾漆丸方　治髭髮白可以變黑

乾漆炒令煙盡　栢子仁炒　生乾地黃　熟乾地黃各一兩

共四味擣羅爲末研糯米飯和擣三五百杵塗酥丸

如梧桐子大每服二十丸空心温酒下

治鬚髮黃白變令黑色倒行油方

右方取銀子三兩作小盒子盛汞一兩以乾水蛭七枚為末同入盒內用蚯蚓泥固濟約半指厚深埋在馬糞中十九日取出已化為黑油矣用魚胞裹指頭點藥撚之

白秃

論曰蟯之為害因血氣虛乘風而上則能生瘡痏癬為疥無不為也瘙痂不去而痒鬢髮秃落無復生榮是為白秃

五味子膏方　治白秃髮落

五味子　肉蓯蓉　松脂一　蛇牀子　遠志各三兩

雄黃研　雞糞白　雌黃研　白蜜　兔絲子五兩以酒浸一宿各一兩　猪脂二升　共十一味先將草藥擣羅為末次將石藥及雞糞白再研令如粉下猪脂松脂入鍋中同熬化復下諸藥文火煎稀稠得所以綿濾去滓瓷盒盛每用先以桑柴灰汁洗頭令淨後塗藥不過三次髮落生

赤秃

論曰諸陽脉皆在於頭風熱乘之則陽邪熾盛發於頭皮腠絡之間細瘡瘑瘡赤色有汁痒痛侵淫乃至髮落故名赤秃

旱蓮汁方　治赤秃髮落塗之

旱蓮草三兩　鐵粉一分　二味先將旱蓮草擣絞取汁次入鐵粉研令極細入盒中每用先以泔漿洗頭次塗之

牛羊角灰方　治赤秃髮落塗之

牛羊角燒灰等分　二味研如粉以猪脂調傅之

馬蹄灰方　治赤秃髮落塗之

馬蹄燒灰　一味研如粉用臘月猪脂調塗之

椹汁方　治赤秃髮落塗之

黑椹二升　一味內瓶中密封於北簷下埋之百日即變為水每用淨洗頭次塗髮即生

眼目門

肝虛眼　肝實眼　目胎赤

眼目統論

論曰內經曰肝主目又曰在臟為肝在竅為目難經曰肝氣通於目目和則知五色矣內經又曰心者五臟專精目

者其竅也夫目既爲肝之竅矣又爲心之竅何也曰目者五臟之精華固不專於肝也所謂骨之精爲瞳人筋之精爲黑血之精爲絡脉氣之精爲白睛肉之精爲約束是也析而言之則通乎五臟合而言之則主於肝夫惟通乎五臟故曰精明五色者氣之華於此乎覘五臟有餘不足六腑强弱彤之盛衰以此參伍决生死之分矣惟主於肝故肝虚寒則目䀮䀮視物生花肝實熱則目痛如刺肝中寒則目昏而瞳子痛肝熱冲䐲則目眥赤痛生瘜肉不特如此神志俱悲而泣下則以水火相感故也一水不勝五火

而目盲則以陰陽各併故也夫五臟陰陽其變動俱感於目又况攝養失宜動過生疾者耶或多餐食或嗜五辛或喜怒不時或房室不節以至凌寒冐暑處湮當風哭泣不寐凡過用目力皆至疾病其候不一養生者不可不知也

肝虚眼

論曰肝虚眼其證不一巢氏析之有忽然發腫者有淚出不止者有精生翳膜暈者有視物漠漠不能遠視者有精彩昏濁黑白不明而暈者蓋肝開竅於目腑臟精華之所聚也氣血既衰不足以榮養故證狀之異如此龍木論有肝臟虚熱外障謂其證忽發昏澁淚出痒痛瘁隱瞳人黒睛㬝漸生翳障視物不明者宜審治之

栢子仁丸方　治肝虚視物漠漠不能遠見睛輪昏暗瘡痛眼散暈時聚補肝丸

栢子仁 研　蔓荆實 去　烏麻仁　車前子　枸杞子　覆盆子　兔絲子 酒浸別搗末各一兩　杜蘅子　青葙子　五味子　蛇床子　桂心　菊花　甘菊 各半兩　熟乾地黃　肉蓯蓉 酒浸切焙　白茯苓 各一兩

右十七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心温酒下

石决明丸方　治肝虚血弱目久昏暗

石决明　兔絲子 酒浸一宿別研爲末　五味子 各一兩　熟乾地黃　細辛　知母　山茱萸 各一兩

右七味爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

地黃丸方　治肝虚淚出不止翳暈侵睛視物不遠或睛昏濁黒白不明

熟乾地黃　五味子　兔絲子 酒浸一宿別搗　桃仁 去皮　車前子 各一兩　白茯苓　栢子仁 研　細辛　甘草

防風各半兩 共十味為末煉蜜和丸如梧子大每服二十丸空心溫酒下

肝實眼

論曰肝氣通於目其氣平則諸疾不生過實則生患乃有肝實眼之證令人目痛如刺久不已則目赤而生淫膚息肉治宜瀉之又當視其老壯凡人五十以前可服瀉肝湯過五十則不可或有是疾當不得已而用之

菊花散方 治一切眼疾肝熱上攻羞明畏日淚出

菊花一兩 密蒙花 甘草生 梔子仁 芎藭 大黃各半兩 蒺藜子炒去角 防風 當歸焙切各一兩

九味為散每服二錢食後臨臥麥門冬熟水調下

生地黃湯方 治肝實熱眼熱痛不止

生地黃汁 蜜 車前子汁各二兩三味和勻 玄參 升麻 梔子仁各一兩 芍藥一兩半 細辛半兩 共八味羅五味為末每服五錢水煎入前三汁再煎溫服

點眼煎方 治肝實熱目昏熱痛

梔子仁 蕤仁 决明子微炒各一兩 石膏二兩 車前葉二合 竹葉二握 秦皮三分 白蜜三兩後入

共八味剉碎先將七味以井華水五斤煎取汁一升再入蜜調勻瓷器中重湯煮如稀餳每點如大豆許

羚羊角散方 治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚

羚羊角[illegible] 羌活 玄參 車前子 黃芩 栝樓仁 山梔子各半兩 胡黃連 菊花各三分 細辛一分

為散每服二錢食後竹葉熟水調下

目胎赤

論曰目胎赤者緣在胎時其母[illegible]熱及[illegible]熱物傳於胎藏[illegible]上赤爛[illegible]名胎赤又大人

初生洗目不淨穢汁漬壞者亦有之內外之治小異也

羚羊角湯方 治胎赤眼久不差昏暗羞澀瞻人眼痛

羚羊角屑三兩 防風 芍藥 蕤仁 麥冬 地骨皮 决明子 甘草炙各二兩 茯神去木三兩 每服五錢水煎食後臨臥服

治胎赤眼點眼梨汁煎方

梨汁一盞 古字銅錢二七文 胡黃連末二錢 青鹽半兩 龍腦一錢 共五味先將古錢二七枚重重鋪青鹽隔每一重錢著一重鹽疊之填滿錢孔中入火燒令通赤

去灰塵投入前梨汁中浸一復時去錢將汁煎三五
沸以新綿濾入瓷器瓶內入胡黃連末浸七日去黃
連龍腦末令勻要用以銅筯點少許在目眥頭

治虛赤眼翳瞙龍腦膏方

龍腦一錢研　蕤仁一分去皮研　杏仁七枚湯浸去皮尖雙仁研

三味研如膏用人乳汁調和令勻瓷盒中盛每用以
銅筯點少許在目眥頭日兩度

目赤痛　目熱磣痛赤腫

目赤痛

論曰內經謂心主血又曰肝受血而能視蓋肝開竅於目
若肝氣壅盛心經熱實熱氣既燥血乃妄溢而上衝於目
故令目赤痛也難經所謂痛者為實宜散壅滯決邪實則
病可已

羚羊角湯方　治肝心氣熱目赤痛

羚羊角鎊　蔓荊實去白皮　菊花　防風　芍藥各一兩半
黃芩一兩　玄參半兩　每服三錢煎再入馬牙硝半錢食
後溫服臨臥再服

旋復花湯方　治目赤痛

旋復花　升麻　秦艽　防風　羚羊角　萎蕤各一兩
黃連　柴胡去苗　黃檗去粗皮　甘草炙各半兩
每服五錢水煎食後溫服臨臥再服

乳汁煎點眼方　治肝熱目赤痛

人乳汁半兩　古字錢十文　二味以乳汁於銅器中磨錢
令變色稀稠成煎即止內瓷瓶盛每以銅筯點少許
目眥頭日三五次

犀角湯方　治赤眼腫痛

犀角末　秦艽二兩　黃連　馬牙硝　滑石　杏仁去皮尖雙仁半兩出油

右六味為末和勻以沙糖一處入藥熬成
膏每用皂子大沸湯化洗之

通頂散方　治赤眼腫痛

苦葫蘆子四十九粒　穀精子一錢研　瓜蒂十四枚燒灰　乳香研半錢
薄荷葉一錢　五味為末入龍腦少許鼻內搐一
字立效

石膏散方　治上焦壅熱目赤口乾

石膏　甘菊花　羌活　白附子　白殭蠶　玄參
黃連　共七味等分為散每服二錢生薑茶酒調下

目熱砂痛赤腫

論曰五臟六腑之精華皆上注於目若風熱搏於腑臟毒氣乘肝衝發於目則熱氣外泄淚下眵多日夜暴燥故熱砂痛赤腫也

地骨皮湯方　治風毒衝眼赤痛翻乾砂

地骨皮　甘菊花揀　升麻　黃連　防風　决明子微炒　細辛各一兩　竹葉　共八味除竹葉外擣篩每服五錢入竹葉七片同煎服食後臨臥再服

龍膽湯方　治眼砂澁如針刺血痛昏暗

生麥門冬半兩　木通一兩　熟乾地黃三兩　旋復花　大青　茯神各一兩　黃連各一兩　每服三錢水煎入芒硝半錢攪勻食前溫服

地骨皮散方　治風毒氣上攻兩眼砂澁疼痛及暴赤眼

地骨皮　羌活　防風　土蒺藜去刺微炒　甘草炙一兩

爲散每服二錢荊芥茶清調下如患暴赤眼淚煎甘草湯調下食後臨臥服

洗眼甤仁湯方　治目熱赤痛砂澁

甤仁去皮　秦皮　防風各一兩　甘菊花半分　竹葉二握

山梔子仁　萎甤各半兩　共七味剉如麻豆以水五盞煎取二盞半熱淋冷頓煖淋洗痛止則止卽住煎藥不得犯鐵器

點眼黃連煎方　治眼目暴赤砂澁疼痛

甘蔗汁十二兩　黃連半兩研　二味於銅器中以慢火養令汁涸去半以綿濾去每日兩度點

目赤爛　目血灌瞳人　赤脉衝貫黑睛

目赤爛

論曰目赤爛者瞼眥俱赤且爛見風益甚又謂之風赤眼此由衝冒風日風熱之氣傷於瞼眥與津液相搏故令赤爛也迎風則痒淚出遇熱則傷爛眵多治宜鎮平肝氣滌洗瞼膚則淸淨之竅自然明矣

菊花湯方　治風毒氣攻眼生瘡爛

菊花　升麻　黃連去鬚　木通　防風去叉　白茯苓　地骨皮　萎甤各一兩　右八味擣篩每服五錢入竹葉十片同煎去滓空心日午臨臥溫服

柴胡洗眼湯方　治眼赤痛微腫眥赤爛多時

柴胡去苗　甤仁去皮研　黃連去鬚　升麻各一兩

右四味擣篩以水三升煮取一升半濾去滓微熱淋
洗如冷再煖洗三徧

黃連散方　治赤白眥爛生瘡衝風淚出

黃連去鬚　雄黃研各一兩半　細辛去苗葉　黃蘗去粗皮各二分
乾薑一分　右五味擣羅為散研令極細以瓷器盛每用
二黍米許點兩目眥日三度

目血灌瞳人

論曰目屬肝肝受血而能視則目睛視必資血苟因物損
傷致血脉散亂則敗血侵睛灌注瞳人害於瞻視不早治

或致喪明故謂之血灌瞳人

人參湯方　治血灌瞳人澁痛

人參　赤茯苓　細辛　桔梗　車前子各一兩　防風去叉
五味子各半兩　共七味擣篩每服五錢水煎溫服
食後臨臥再服

決明湯方　治血灌瞳人

石決明　人參　川芎　細辛　五味子各一兩
赤茯苓二兩　右六味擣篩每服五錢水煎溫服食後臨
臥服

沒藥散方　治血灌瞳人

沒藥一兩半　騏驎竭　大黃炒　芒硝各一兩　右四味
擣研為細末每服三錢熱水調下空心食後日三

赤脉衝貫黑睛

論曰眼者五臟之精華若風邪熱毒內干於臟腑則隨其
經絡上衝於目故令赤脉衝貫黑睛也上下左右各有部
分不可不察其從大眥侵睛而痒者肺胃熱也其從小眥
起者手少陽脉動虛熱也其自上而下者足太陽脉動邪
熱也其自下衝上者足陽明脉動邪熱也其源不同當察

其部分依經以治之

通明湯方　治三焦熱治小眥偏赤赤脉射黑睛

木通　萎蕤　甘草炙各一兩半　枳殼去瓤麩炒　黃芩去黑心
右五味擣篩每服五錢水煎入芒硝地黃汁各少許
再煎沸溫服

黃耆湯方　治眼上下赤脉貫黑睛

黃耆　芍藥　知母　升麻　犀角鎊各一兩半
苦竹葉五十片　右六味擣篩每服五錢水煎入芒硝少
許再煎溫服

摩頂明目膏方 治風熱衝目赤脉努肉
生麻油二升 真酥五兩 車前葉 淡竹葉洗各半兩
吳藍 大青 黃連去鬚 山梔子仁 麥門冬
槐白皮 甘草炙 梛白皮 黃芩 馬牙莧實
生犀角鎊 馬牙硝別研 朴硝別研各一兩 鹽花研半兩
右十八味除硝鹽油酥外細剉通油瓷瓶中綿羃口重
湯煑三復時換去滓更新綿濾過置生鐵器中每日
飯後及臥時開髮滴頂心以生鐵熨斗子摩頂一二
千下兼去目中熱毒昏障痛澁

墜睛 蟹目 目珠子突出

墜睛
論曰墜睛者眼因賊風所吹血脉受寒貫衝瞳人風寒氣
隨眼帶牽拽睛瞳向下名曰墜睛也日久不治瞳人損陷
遂致失明
犀角散方 治墜睛眼昨發疼痛視物散亂
犀角 羚羊角各半兩 青牛膽一枚 五味子 槐實
茺蔚子 青葙子 惡實炒 胡黃連 蘆會研
地骨皮各一錢 兎肝一具炙乾 右十二味除膽外擣研爲
末以膽汁拌勻每服二錢煎槐子湯調下卧再服忌
發熱毒物
槐實丸方 治墜睛失明眼睛牽陷
槐實 羚羊角 獨活 地膚子 天麻 沙參
人參各一兩 防風去叉 甘菊花 枳殼炒各一兩 決明子
二兩 右十一味擣羅爲末鍊蜜和擣百杵丸如梧桐子
大每服二十丸空心臨臥漿水下

蟹目
論曰臟腑壅滯肝經積熱上衝於目令人目痛睛疼者毒
氣結聚甚則黑睛上生黑珠子如蟹目狀故以名之或有
如豆者名曰損翳或曰離睛又曰蟹睛病極難治不可鈎
割及傅諸毒藥惟宜服宣泄之劑使邪熱退病差矣
瀉肝補膽防風湯方 治蟹目疼痛
防風一兩半 遠志 黃芩 人參 桔梗炒 細辛
芍藥各一兩 右七味擣篩每服五錢水煎食後臨臥溫服
萎蕤犀角散方 治眼生蟹目黑睛疼痛
萎蕤 犀角 蕤仁湯浸去赤皮 黃連去鬚 黃芩
梔子仁 甘草 升麻各等分 共八味擣羅爲散每服

三錢水煎食後臨臥溫服

瀉肝黃芩羚羊角湯方　治蟹睛疼痛

黃芩　羚羊角　赤芍藥　細辛　桔梗炒　人參

遠志　甘草炙各半兩　防風去叉一兩半　右九味擣篩每服

五錢水煎食後臨臥溫服日再

目珠子突出

論曰人因風熱痰飲攻漬府臟陰陽不和肝氣蘊積熱毒之氣上衝于目使目睛痛疼甚者突出治宜先服寒藥以瀉肝氣然後調治勿求速效惟漸治之仍須微鍼引出惡汁也

麥門冬羌蔚飲方　治風熱攻目赤痛目睛欲凸出者

麥門冬　羌蔚子各二兩　桔梗炒　防風　玄參

知母各一兩　黃芩去黑心　天門冬去心各一兩半

右八味擣篩每服五錢水煎食後臨臥溫服

黃連湯方　治風毒衝眼赤腫睛欲突出洗眼

黃連去鬚　秦皮　黃檗去粗皮各一兩　乾棗去核十枚　蕤仁三分

右五味㕮咀如麻豆大拌勻每用一兩半以水四盞煎至二盞稍熱去滓抄洗眼冷即重煖日三度

治睛眼忽然突出一二寸者冷水灌

右方急取冷水灌眼中數次換水須臾睛當自收

目見黑花飛蠅　息肉淫膚　目生胬肉

目見黑花飛蠅

論曰腎水也肝木也木得水而盛其理明矣腎水既虛肝無以滋養故見於目者始則睆睆不能遠久則昏暗見黑花飛蠅其證如此腎虛可知也治宜以益腎水去肝風之劑則標本兩得矣

治肝腎風虛眼生黑花宜服此方

磁石二兩燒醋淬七徧細研水飛　神麯炒四兩　硃砂一兩細研水飛

右三味擣羅爲末鍊蜜和擣一二百杵丸如梧桐子大食後酒下二十丸

治肝腎虛風上攻眼生黑花頭目不利能通神延年

川椒一斤　一味揀淨去目并閉口者於銚內炒令透於地上鋪淨紙二重新盆合定周迴用黃土培之半日去毒出汗然後取之乾爲度只取椒於瓷盒子內收

每日空心新汲水下十粒

五倍子丸方　治眼見黑花去翳明目

巴戟天兩 枸杞子揀二合 甘菊花三兩 旋復花四兩

蜀椒去目并閉口者五兩 右五味將椒入銀器內入青鹽四兩醋二升慢火煮乾如器物小旋添醋煮候醋盡又將椒與前四味焙乾杵爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸空心午夜臨卧溫酒或鹽湯下

枸杞丸方 治肝腎風氣上攻眼生黑花

枸杞子久暴二兩 巴戟天穿心紫色者去心 蜀椒去目并閉口者炒出汗各一兩 旋復花淨擇 右四味擣爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸臘茶下不拘時

兎肝丸方 治肝腎毒風攻衝眼生黑花昏暗視物不明

兎肝去筋膜切焙 羌活 黄連 菊花各三分 地骨皮

龍齒 防風 茈胡 車前子 青葙子 白附子

蔓荆各半兩 右十二味擣羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後竹葉湯下

息肉淫膚

論曰脾肺有熱蘊積不散傳播肝經流注血脈上衝于目發于瞼背息肉脹起攀系白睛隱澁妨悶故謂之息肉淫膚

桔梗湯方 治目生鷄冠蜆肉

桔梗 大黄炒 細辛 黄芩 玄參 芒硝鍊過各一兩

防風 車前子各一兩半 右八味擣篩每服三錢水煎食後溫服

點眼蝸牛漿方 治息肉淫膚赤白膜侵見人說治小兒痘後生翳以蝸牛汁丹砂滴目中效

生蝸牛一枚 一味去其掩內丹砂末於口中火上炙沸以綿注取汁傅于眥中立效

點眼雀糞膏方 治息肉淫膚赤白膜

雄雀糞 一味取細直者以乳汁和研細點傅翳上

又方

杏仁湯浸去皮尖雙仁用七枚 一味嚼細吐于手掌內以綿纏筯頭點于胬肉上不過三五度差

點眼食鹽膏方 治眼中息肉

食鹽一分研 驢脂一兩 二味先熬驢脂後下食鹽調成膏以銅筯點如黍米許於目眥頭日三夜一

通神膏方 治眼生翳膜赤脈息肉澁磣痒痛有淚

白沙蜜四兩 青鹽研 麝香研各一字 硇砂飛過半字

白礬飛過半字 當歸為末半錢 黃連去鬚為末一錢 右八味同研

令研勻入青竹筒內慢火煮半日候冷綿濾去滓瓷瓶收貯每點眼了瞑目少時以溫湯洗翳與息肉等俱下

目生胬肉

論曰目生胬肉者由脾肺不利風熱乘之其候或痒或痛赤疼而爛瘥熱既久息肉增長近則侵睛輪大則覆瞳人治不可緩鈎割熨烙各自有法至於袪風滌熱之劑豈可偏廢哉

玄參散方 治目赤痛胬肉滿疼

玄參 甘菊花 決明子 大黃炒 苦參 車前子 枳殼去瓤炒 山梔子仁 防風 黃連去鬚 升麻各二兩

右十一味擣羅為細散每服三錢食後以米飲調服臨卧再服

決明散方 治眼生胬肉侵睛及贅肉生瘡暈眼赤

決明子 車前子 青葙子各半兩 黃連去鬚 蕤核 甘草炙 羚羊角 枳殼去瓤炒 芎藭各一兩 右九味擣羅為細散每服三錢食後溫漿水下臨卧再服

升麻丸方 治熱痛胬肉生瘡

升麻 車前子 黃芩 茺蔚子 玄參 決明子炒 龍膽 山梔子仁 防風 甘草炙 生地黃 地膚子各一兩 右十二味擣羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸食後溫漿水下臨卧再服加至三十丸

點眼艾熏散方 治目生胬肉

蕤仁一兩研細 膩粉一錢 牛酥一兩 熟艾如雞子大許

右四味擣三味入乳鉢中令極細攤開次取艾火燒將乳鉢覆令煙熏之候燒盡艾煙以槐木搥碎研令

煙氣勻然後少少點眼眥頭日三五度

鯽魚貼方 治目生胬肉滿痛

鯽魚鮮者一 一味去皮骨淨取肉一片中央開一竅正貼眼上日三五度易

目內生瘡 目膿漏 目生珠管 雀目

目瞼垂緩 目瞼垂腫 倒睫拳攣

目內生瘡

論曰目內生瘡者以脾臟壅熱熏蒸于上鬱而不散遂令

臉內生瘡其初患時或痒或痛發歇無常或多眵淚背門如丹砂色於是漸有翳膜龍木論謂不宜點藥鍼灸惟宜服瀉脾清腸之劑滌蕩本源當如是也

決明子丸方　治肝肺熱毒氣攻兩眼生瘡赤痛

決明子炒　菊花　桑皮　黃連去鬚各一兩　車前子
地骨皮各一兩半　黃芩　羚羊角　生乾地黃焙
山梔子　萎蕤　秦艽各一兩　青葙子　白茯苓各一兩半
升麻一兩　右十五味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸食後溫水下再服

梔子湯方　治肝心熱毒目生瘡及澀痛

梔子仁半兩　犀角屑一兩　木通　黃芩各半兩　大黃炒
瞿麥穗各一兩　黃連去鬚　車前子一兩　右八味擣篩每服五錢入竹葉七片同煎入芒硝末半錢放溫服二日

清涼包子方　治眼赤熱生瘡退翳

黃連一分為末　一味用水一碗面東擦取倒流水些小將黃連末勻摻在碗內用熟艾一塊如雞子大安在古錢七文上四面更用青銅錢四十文足作四塊疊子覆黃連碗在上點火燒艾候煙盡更掃下黃連末用夾絹袋子盛了取孩兒乳汁浸時時點在眼中覺口中苦透為度即染赤眼用之立效

目膿漏

論曰目膿漏者緣血脈壅熱傳入於足太陽膀胱之經膀胱之脈起于目內眥則令人瞼眥腫痒久即成瘡膿汁時下綿綿不絕如器津漏故謂之膿漏不治則膿毒淹漬穿鑿白睛黑點相連即難治療

防風湯方　治眼漏睛膿出

防風二兩　地骨皮　遠志　白茯苓　人參　黃耆各一兩　大黃炒　知母各二兩　右八味擣篩每服一錢水

煎食後臨臥溫服

龍腦散點方　治睛漏瘡自大眥出膿汁有蟲

龍腦研　馬牙硝研各半錢　菉豆粉一錢
三味同研極細用燈心蘸藥點之再點

目生珠管

論曰目生珠管者風熱痰飲漬于肝血氣蘊積津液結聚所由生也肝藏血故肝受血而能視氣調血和則精華見於目今邪乘於肝肝氣受病為風熱痰飲漸漬使血

氣壅閼上衝於目津液結聚狀如珠管故以名焉

銅青丸方　治眼生膚翳垂珠管

銅青一兩　細墨半兩　二味合研爲末醋和丸如白豆大

每用一丸以乳汁新汲水各少許浸化以銅筯點之

鉛丹膏方　治眼卒生珠管

鉛丹半兩　鯉魚膽汁量鉛丹多少用

二味合調如膏點目眥中日三五次

治卒生珠管方

白蜜　一味以少許點目中仰臥令淚出半日許洗之

雀目

論曰晝而明視暮不覩物名曰雀目言其鳥鵲不能見於夜也夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰血受邪肝氣不能上榮於目肝受血而能視今邪在於肝陰血澁滯至暮則甚故遇夜目睛昏不能覩物世謂之雀目

防風煮肝散方　治雀目

防風去叉　黃連去鬚　穀精草　黃芩　甘草炙

天南星各一兩　蛤粉半分　右七味擣羅爲細散每服一錢用羊子肝一片銅竹刀批開摻藥在內以麻繩纏定研粟米飯一大盞銀石鍋內煮熟放溫臨臥嚼服

切不得犯鐵器病甚者不過再服必效

鬱金散方　治雀目

鬱金三兩　新牛膽一枚　猪膽二枚　蛤粉二兩　大黃炙半兩

黃連去鬚半兩　雄黃一分　共七味將五味爲細散并猪膽拌和入牛膽中塡滿陰乾爲細散每服大人一錢小兒半錢食後新汲水調下赤眼氣眼瘡眼亦能治之

煮肝散方　治雀目咫尺不見物

紫芥菜子具香炒令黑色碾爲細散用羊肝一具分作

八服每用散二錢捻在肝上以笋籜葉裹煮令熟放冷服以煮肝湯下不過一具肝永除根本臨臥時服

還睛丸方　治雀目

人參　細辛　白茯苓　木香　知母　芎藭各一兩

石決明　菟絲子各二兩　共八味擣羅爲細末鍊蜜丸

如梧桐子大每服空心茶下二十丸

目瞼垂緩

論曰眼瞼垂緩者以血氣不足膚腠開疎風邪客于瞼膚其皮垂緩下覆睛輪故俗呼爲雎目又曰侵風久之則垂

瞼愈下眼閉難開

芜蔚散方　治風毒攻眼瞼垂下

芜蔚子　防風　羌活　蔓荊實　玄參　細辛

甘菊花　黃芩　車前子　甘草各一兩炙　大黃半兩炒

右十一味擣羅爲散每服四錢水煎温服食後臨臥

各一

竹葉湯方　治眼熱毒瞼垂腫遮睛

苦竹葉　黃連去鬚　黃蘗　梔子仁各一兩　蕤仁湯浸去皮半兩

右五味細剉以水五大盞煎至二盞半去滓温服

澄清洗眼日五七次

黃耆丸方　治氣血不足腐瞼下覆睛輪垂緩難開又名

雎目

黃耆　蒺藜子炒去角　生乾地黃焙　柴胡　甘草炙

梔子仁　苦參　白朮　白花蛇酒浸去皮骨各一兩　防風去叉

菊花　茯苓　山藥　秦艽各三分　天門冬　枳殼去瓤麩炒

白檳榔各一兩半　右十八味擣羅爲末鍊蜜丸如梧桐子

大每服三十丸空心温酒下

升麻散方　治風邪客於瞼膚其皮垂下緩覆睛輪眼閉

難開

升麻　山茱萸各三分　甘菊花　細辛各半兩　蔓荊實

山藥　防風各一兩　右九味擣羅爲散每服三錢温酒

調下

目瞼腫鞕

論曰目瞼腫鞕者內因肺肝積熱上衝于目外爲風邪所

搏風熱畜結在於瞼皆血氣不得宣通故令腫鞕久不差

者多成風粟細瘡眼汁淹漬浸壞眼目先宜鎌洗出毒然

後以藥攻治則病可差

黃耆湯方　治目瞼鞕赤腫痛

黃耆　羌蔚子　麥門冬各一兩半　地骨皮　玄參

黃芩　知母各一兩　右七味擣篩每服五錢水煎食後

臨臥温服日三

大黃桔梗散方　治目瞼腫鞕刺痛

大黃炒一兩半　桔梗炒　黃芩　玄參　羚羊角

白茯苓　人參各一兩　七味擣羅爲散每服一錢至二

錢食後臨臥米飲調下日三

洗眼防風湯方　治風熱客搏目瞼腫鞕

防風 秦艽 甘菊花各二兩 蕤仁湯浸去皮 竹葉一握

梔子仁 蒺藜各半兩 右七味細剉令勻每服一兩以

水二盞煎取一盞半綿濾去滓每煖洗之

倒睫拳攣

論曰臟腑久積風熱內熏肝經衝發于目始則腫赤隱痛多淚日久津液澁少瞼眥皮急致睫拳倒刺隱瞳人治法當起去毛睫又刺太陽經令出血及鈹鎌除其惡血仍服除風退熱之劑

防風湯方 治風熱衝肝目多倒睫

防風 甘菊花 旋復花 決明子炒 蒺藜

麥門冬 梔子仁 黃連 甘草炙 升麻 秦皮各等分 右十一味搗篩每服五錢水煎食後臨臥溫服

車前子散方 治倒睫赤眼疼痛不開

車前子二兩 馬蹄決明微炒 蕤仁各一兩半 地膚子

龍膽 甘草炙 菊花各半兩 青葙子 山梔子仁各一兩 前胡三分 右十味搗羅為散每服二錢至三錢空心粟米飲調下食後臨臥再服

洗眼湯方 治風熱攻目瞼澁疼痛漸致倒睫

蕤仁 秦皮 防風各一兩 山梔子仁 菊花

蒺藜各半兩 竹葉

右七味細剉以水三升煎取一升半乘熱淋洗冷即再煖作三度使

聖濟總錄纂要卷十七終

程必大末能
新安 程朝宣將侯
程朝徵叔獻 較
程 蓮質華

眼目門

目生膚瞖　目生花瞖

目生膚瞖

論曰目生膚瞖者以腑臟氣血虛實不調加以風邪痰飲鬱於膈上熏蒸既久衝發於目乃生膚瞖其瞖上及瞳人有物如蠅翅狀是為膚瞖也

決明子丸方　治久患膚瞖遮覆瞳子

決明子炒　甤仁去皮　地膚子　白茯苓　防風
麥門冬　澤瀉　茺蔚子　枸杞子　五味子
青葙子各一兩　細辛　車前子　兔絲子酒浸別搗末三分
生乾地黃二兩　桂心去粗皮半兩　黃芩　杏仁

右十八味搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後以米飲下臨臥再服久服此藥加兔肝一兩至二月停甚妙

盧會丸方　治眼熱赤痛及生膚瞖

盧會研半兩　鯉魚膽取汁一枚　牛膽乾者半兩濕者用汁一合
熊膽研一分　石決明刮洗一兩　麝香研半分　車前子一兩

右七味除膽外搗研為細末後入汁同和勻煉蜜丸如梧桐子大食後米飲下二十丸加至三十丸

貝齒散方　治目風熱赤生膚瞖點眼

貝齒七枚燒為末　珍珠一分為末　龍腦研半錢　三味合研如粉每點服時用黍米大於瞖膜上日三度

菊花散方　治眼目膚瞖侵及瞳人如蠅翅狀

菊花　防風　木通　木賊　僵蠶　荊芥去梗
甘草炙各一兩　右七味搗羅為散每服二錢食後茶半錢同點溫服

目生花瞖

論曰目生花瞖者點點色白狀如棗花魚鱗之類是也此由肝肺實熱衝發眼目其始則目痛淚出變生白瞖宜急治之不爾則致障瞖也

桑白皮湯方　治目生花瞖白點狀如棗花

桑根白皮 木通各一兩半 羚羊角 澤瀉 黃芩
旋復花 川大黃炒 玄參 茯神以上各一兩 甘草一分
甘菊花半兩 右十一味搗羅為細散每服二錢水煎溫服

羚羊角湯方 治眼生白翳如棗花
羚羊角 大黃炒 桑根白皮 黃連 决明子
黃芩去黑心 甘菊花各一兩 甘草炙各半兩
右八味搗篩每服三錢水煎煮食後溫服

退翳偏木散方 治眼生花翳
蒼术二兩米泔浸一宿焙 木賊 甘草炙各一兩 穀精草

蟬蛻各一分 蛇蛻一錢湯洗焙 黃芩半兩
共七味為散每服一錢空心臨臥冷水調下

目青盲 將變內障眼

目青盲

論曰龍木論稱內障有變青盲者初患之時昏暗不痒不痛亦無翳膜至於失明與不患者相似是知青盲之狀外無異證瞳子分明而不見物由肝腎氣虛精血衰弱不能上榮故目盲而無所見者經曰肝氣通於目目和則知白黑矣生方乃以寒故井水滴令人目盲豈其本哉

羊肝丸 治內外障青盲雀目眼生黑花白翳十年以上者可治
羖羊肝一具切片文武火炙 薏仁一兩 錦文斑鳩一隻去頭足腸胃取肉炙為末 細辛 防風 黃連去鬚 瞿麥子 蕤蕤子
桂 甘菊花 牡蠣燒為末各五兩 羌活二兩 白茯苓四兩
葶藶子一升炒五七錢 决明子炒二兩 右十五味搗羅十二味為末入羊肝斑鳩牡蠣末乳鉢內同研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後臨臥茶清下

澤瀉湯方 治肝臟熱衝目赤瞻視漠漠積年青盲不見物

澤瀉 杏仁湯浸去皮尖研 决明子炒 大黃炒 黃芩
甘草炙 枳實麩炒 芍藥各一兩 梔子仁 人參
赤茯苓 黃蘗 細辛 白朮各半兩 柴胡四兩
青葙子一兩 桑根白皮炙三兩 升麻一兩 右十八味搗羅每服五錢水煎入生薑半分同煮再入芒硝半錢放溫食後臨臥服日再

真珠散方 治眼青盲
真珠末三分 胡黃連三分 石決明一兩搗碎細研水飛 琥珀一分

地膚子一兩 天靈蓋三分燒灰 母猪肝半兩切炙乾

右七味擣羅為散每服二錢食後溫水調下臨臥再服日三

治青盲烏雞丸方

右方用黃荊嫩頭春初取之九蒸九曬取半斤用烏雞一隻純黑者以米飼五日安淨版上飼以大麻子又二三日旋收糞暴乾取入淨瓷餅子內熬糞令香黃然後和荊頭擣成末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸陳米飲下加至二十丸日二服

將變內障眼

論曰眼疾始於淨淺久而弗圖變為內障者非一端也龍木論內障皆有其漸蓋從一眼先患後乃相牽其損是肝腎氣虛風邪熱毒上攻眼目氣血衰微久則為害但不痛不疼亦無眵淚目視如輕煙或如薄霧或見垂絲或見蠅翅或見飛蚊其初若無足慮至其成內障則慢慢不卹矣今以將變內障者敘之蓋圖難於易之意也

瀉肝飲方 治雷頭風恐成內障先服瀉肝飲後服磁石丸

防風二兩 五味子炒 細辛 車前子 黃芩 羌活 桔梗炒 大黃炒 芒硝研各一兩 右九味擣篩為粗末每服三錢水煎去滓放溫食後臨臥服

磁石丸方

磁石二兩燒赤醋淬七遍 五味子炒 牡丹皮 附子去皮臍 玄參各一兩 右五味擣羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯下

黃耆丸方 治肝虛勞兼膀胱久積虛冷目眩見花不明漸成內障

黃耆 白茯苓 石斛去根各二兩 鹿茸去毛酥炙一兩半 五味子炒二兩 防風去叉 生乾地黃 覆盆子 酸棗仁 牡丹皮各三兩 右十味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下加至三十丸

蕤仁丸方 治內外障眼

生乾地黃焙一兩半 菊花焙一兩一分 蕤仁三兩 黃連去鬚 車前子各二兩 人參 麥門冬去心各二兩 防風 黃芩 青葙子湯浸焙 秦艽 羚羊角各一兩半 甘草炙 丹參炒 決明子炒 天門冬 地膚子 升麻炒 苦參炒

地骨皮　羌活　玄參（炒各一兩一分）　右二十二味擣羅拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大食後煮百合湯下二十丸加至三十丸但有瞳人不拘內外障翳並治

目眵𥇖　眯目　鍼目

目眵𥇖（眵音眵目汁凝目傷皆𥇖目赤也眵也　眵音蚩　𥇖音蔑）

論曰目者五臟之精華肝之外候津液之道也若臟腑挾熱內熏於肝衝發於目使液道熱澁結滯於皆瞼則成眵𥇖

羚羊角散方　治風熱衝肝上熏於目結成眵𥇖

羚羊角（一兩）　犀角（一兩）　桑根白皮　生乾地黃（焙）　防風　五味子　白蒺藜（炒）　牛膝　羌活　芍藥（各三分）　爲散每服二錢水煎溫服

淋洗秦皮湯方　治目生眵𥇖

秦皮　柴胡　黃連（去鬚）　黃檗　蛇銜（各二兩）　苦竹葉（三握）　細辛（一兩）　每一服用藥二兩河水細細煎濃去滓須熱淋洗眼冷卽再煖洗

黃檗膏點方　治風熱衝目多生眵𥇖

黃檗（去粗皮一兩）　蕤仁（半兩）　大棗（三枚青州者劈）　三味以水三升同內瓷器中慢火煮至一升去滓取清再以淨瓷瓶子收每用銅筯點眼日五度

眯目

論曰眯目者緣塵飛埃等物入於目中也治宜亟出之久不出着於瞼皆因而傷動則爲澁痛淚出古方初眯時令緇衆筋撥去之或以墨汁或以雞血浮出者皆良

治雜物眯米不出方

桑根白皮　一味取新者一片如筯大削一頭薄椎令軟滑漸漸入目中撥之須臾自出

又方

猪脂（一分）　一味取塞鼻隨左右用之

又方

生粟米（七粒）　一味爛嚼并唾洗之卽出

治雲母等入眼方

好墨　研爲細末用新筆蘸點眼大小皆頭卽時隨墨出

又方

雞肝中血少許　取滴目中卽出

又方
衣中白魚 暴乾研爲末點眥頭即出
又方
酥 以少許內鼻中隨眯目左右垂頭臥少時令流入
目中淚與眯物同出
鍼眼（即偷鍼）
論曰鍼眼者以邪熱搏於血脉上攻眼目發瞼眥結聚腫
痛赤根白頭包裹膿汁痛如鍼刺治法當詳其外證隨宜
砭刺决泄邪毒後以消毒敗熱之劑斷其根本

半夏湯方 治目熱客目眥結成腫皰俗呼偷鍼者
半夏（湯浸七遍去滑） 細辛（各一兩） 前胡 枳殼（麩炒各二兩）
烏梅肉（半兩） 每服五錢水煎入生薑三片同煎食後臨
臥溫服
芍藥湯方 治熱毒攻目眥目腫起有膿汁者
赤芍藥（一兩半） 羚羊角 玄參 防風 黃芩（各一兩）
蔓荊實 甘菊花（各三錢） 每一次服五錢用白水煎濾
入馬牙硝一錢俟食後臨臥時溫服
點眼蕤仁煮方 治熱毒攻注目眥腫結赤痛

蕤仁（去皮研） 黃蘗（去皮） 青竹茹（洗切） 秦皮（各一兩）
梔子仁（半兩） 剉碎拌勻以水三升入銅器中煮取一升
以綿濾取清汁點眼日三五度
耳病門
耳聾 風聾 勞聾 五聾 耳聾有膿
耳虛鳴
耳統論
論曰腎氣通於耳心寄竅於耳氣竅相通若窗牖然音聲
之來雖遠必聞若心腎氣虛精神失守氣不相宜內外窒
塞斯有聾聵之疾經所謂五臟不和則九竅不通是也

耳聾
論曰耳聾之證有二有腎虛精脫而聾者腎氣通於耳也
有經脉氣厥而聾者經脉絡於耳也腎虛而聾者其候面
色黑氣厥搏於耳而聾者其候耳中煇煇焞焞或耳中氣
滿是也煇煇焞焞過在手少陽耳中氣過在手太陽以至
[illegible]絡皆會於耳中各有證候審而治之
肉蓯蓉丸方 治腎虛耳聾
肉蓯蓉（酒浸切焙） 菟絲子（酒浸搗研） 白茯苓（去黑皮） 山藥

人參　熟乾地黃　桂（去麁皮）　防風（去叉）　芍藥
黃耆（半兩）　附子（去皮臍）　羌活（去蘆頭）　澤瀉（剉各一分）　羊腎（一對批去筋膜炙乾）　共爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十
丸空心溫酒下

山藥丸方　治耳聾、
山藥　熟乾地黃　磁石（煅醋淬七徧）　菊花（炒）　黃耆
茯神（去木）　木通（各一兩）　升麻　獨活（各三分）　共爲末鍊
蜜和丸如梧桐子大每服二十丸米飲下加至三十丸

磁石酒方　治耳聾及耳鳴常如風水聲
磁石（搗研綿裹半兩）　木通　菖蒲（米泔浸一二日切焙各半斤）
共㕮咀以絹囊盛以好酒一斗浸寒七日暑三日每
飲三合日再

鐵酒方　治耳聾
鐵（五兩）　酒（一升）　燒鐵令赤投酒中去鐵飲之仍以磁石
塞耳中

菖蒲丸方　治耳聾塞耳
菖蒲　木通　磁石（煅醋淬研）　乳香　杏仁（去皮尖炒）　松脂
蠟（各一分）　共研極細入鵝膏同搗一二百杵撚如棗核
大以鐵穿中心作一孔子先挑耳令淨然後內藥耳
中入再初著時痒及作聲勿怪

治久耳聾方
烏驢乳（一合）　皂莢（半兩爲末）　蠟（一兩）　相和於銚子內鎔成
膏　即丸如棗丸核大用針穿透安耳中一宿至來
日看之有物下來在耳門中即便取却再用一兩度
即差

又方　治耳聾塞耳
雄黃（一分）　硫黃（一分）　共研爲末綿包裹一字於耳中（即差）

治耳聾灌耳方
鵝毛翎根筒（七莖）　燈心（七莖）　木通（一兩）　地龍（三條）
共相和燒灰研每用半錢以生油調傾入耳中便用
綿絮塞耳且側臥良久如此三度

鯽魚膽膏方　治耳聾滴耳
鯽魚膽（一枚）　烏驢脂（少許）　生油（半兩）
和勻內樓葱管中七日滴放耳內

鵝膏方　治耳聾滴耳
鵝膏（一合）　以少許滴耳中

蟹汁方　治耳聾滴耳

生蟹（二枚）　搗絞取汁以少許滴入耳中

龜尿方　治耳聾滴耳

龜一味物合於中荷葉上養之專看葉上有尿收取滴耳中

鼠膽方　治耳聾灌耳

鼠膽（雄者）　取汁滴入耳內令透初益聾半日後便能聽雖久亦差

蠟紙角方　治耳聾

蠟紙（一張）　一物裁為四片每一片於筋上緊捲抽却筋以蠟紙捲子安耳中燃之待火欲至耳急除去當有惡物出在殘紙上日一角之角了以蠟塞定

又方　治耳聾

以綿裹鐵內耳中隨耳左右口含磁石一塊即通

風聾

論曰風聾者本於足少陰經虛風乘之令氣脉不通風邪內鼓則耳中引痛牽及頭腦甚者聾閉不通故謂之風聾

黃蓍湯方　治風聾颼颼如風雨鐘磬聲或時出清水或有膿汁

黃蓍（一兩半）　附子（炮裂去皮臍）　菖蒲（米泔浸一宿各一兩）　木通（二兩）　五味子　防風（各一兩半）　磁石（醋淬七次三兩）　杜仲（炒去粗皮）　玄參　白茯苓　熟乾地黃　人參（各一兩半）　每服三錢生薑三片大棗一枚同煎空心溫服日二

魚腦膏方　治風聾年久

生鯉魚腦（二兩）　當歸（切焙）　細辛　白芷　附子（去皮臍）　菖蒲（各半兩）　共為末以魚腦置銀器中入藥在內微火煮候香去滓入瓷盒中候凝如棗核大綿裹塞耳中

勞聾

論曰勞聾者腎氣虛勞所致也足少陰腎經宗脉所聚其氣通於耳腎氣虛弱宗脉耗損則氣安得聽徹而不聵聾故謂因勞則甚要當節嗜欲慎起居無損腎藏為要

內補丸　治腎虛勞聾

熟乾地黃　附子（炮裂去皮臍）　桂心（去粗皮）　肉蓯蓉（酒浸一宿）　鹿茸（去毛酒炙酥）　人參（各一兩）　山藥（一兩半）　茈胡（二分）　遠志（半兩）　胡黃連（一分）　白茯苓（一分）　細辛　鍾乳（二錢研者一兩以甘草水煮三日研）　共為末再研勻鍊蜜丸如梧桐子大每

服空心溫酒下二十丸

肉蓯蓉丸方　治勞聾積久耳鳴

肉蓯蓉酒浸一宿切焙　附子去皮臍　山茱萸炒　乾薑

桂心去粗皮　巴戟天去心　熟乾地黃焙　石斛去根

澤瀉　兎絲子酒浸一宿别研　人參　白茯苓　蛇牀子炒

牡丹皮　當歸酒浸令潤　細辛　甘草炙　菖蒲米泔浸一宿

黃耆　遠志　芍藥各一兩　羊腎一對批去筋膜炙　防風三兩

除兎絲子外爲末入兎絲子重羅錬蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後溫酒下漸加至三十丸日三

五聾

論曰五聾不同曰風聾曰乾聾曰勞聾曰虛聾曰聤聾是也腎通氣於耳足少陰其經也經虛受風邪及勞傷血氣停滯津液皆能致聾惟所受不同故其證各異葛氏所謂風聾者痛掣乾聾者生耵聹勞聾者出黃汁虛聾者蕭蕭作聲聤聾者膿汁出可不辨哉

黃耆湯　治五聾

黃耆一兩半　附子一兩去皮臍　菖蒲米泔浸一宿一兩　木通一兩一分　磁石醋淬七次二兩　白茯苓　五味子　防風

熟乾地黃　玄參　人參各一兩一分　杜仲一兩去麁皮

每服五錢生薑半分大棗二枚同煮溫服續喫羊腎粥助之日四五服

耳聾有膿

論曰耳聾有膿者蓋腎藏虛勞傷血氣與津液相搏熱氣乘之則結聚於耳中腐化膿汁氣不開竅則致耳聾

禹餘糧散方　治耳聾有膿

禹餘糧煅醋淬一分　烏賊魚骨去甲　伏龍肝　龍骨各半兩

附子一兩去皮臍　共爲散每以一錢綿裹塞耳中日一易

取差爲度如有蟲加麝香一黑豆大　一方加鐘乳半兩

治耳聾有膿水不絶甚穢方

肉蓯蓉一兩　龍膽一兩　白茅根一兩　共燒爲灰以少蜜和令匀後入鯉魚膽汁三枚攪令稀卽以綿裹取汁瀝入耳中其換乾滓捻作挺子以薄綿裹塞耳不過三日上愈

治腎熱耳聾有膿血溜日夜不止方

鯉魚腦一枚　鯉魚腸一具　烏麻子一升　先擣烏麻令碎

入二味相和微火熬以煖布裹薄卟兩食頃開之當
有白蟲出復更作藥若兩耳並膿分藥於兩耳中用
若只一耳即於一面薄之不過三度差

二聖散方　治耳內出膿水

白附子　羌活各一兩　爲散用豬羊腎各一隻切開每
隻入藥末半錢不得著鹽溼裹煨熟五更初溫酒嚼
下續喫粥壓

速效散方　治耳聾膿出久不差

地龍一條入白礬着當門挂陰乾　入麝香少許研爲細散摻入耳內

魚醋膏方　治耳聾出膿或有蟲

鯉魚腸一具　醋三合　搗如膏取少許綿裹塞耳中二食
頃當痛或白蟲出即易之蟲盡乃止

耳虚鳴

論曰耳者心之寄竅腎氣所通也腑臟和平則其竅通而
無礙腎氣既虚風邪干之復以思慮勞心氣脉內結不得
疏通則耳內煇焞與氣相擊而鳴或爲鐘磬雷鼓或如蟬
噪皆腎虚所致也

磁石散方　治腎氣虚弱氣奔兩耳作聲甚則成聾

磁石七次醋淬　熟乾地黃　菖蒲米泔浸一宿　牡丹皮
白朮各一兩　白茯苓　人參　芎藭　附子　牡荊子
炒　桂心去皮　大黃炒　桑螵蛸炙切焙　當歸各半兩
羊腎一對切去筋膜炙乾　共爲散每服一錢溫酒調下日三加
至二錢不拘時

桑螵蛸散方　治腎氣虚弱氣奔兩耳鳴甚則成聾

桑螵蛸炙　附子　人參　白茯苓　當歸　桂心各半
兩　牡丹皮　白朮炒　熟乾地黃各一兩　羊腎切去筋膜
炙乾　每服一錢空心食前溫酒調下日三加至二錢

鹿茸丸方　治腎勞虚後耳常聞鐘磬風雨之聲補腎

鹿茸一兩去毛酒浸酥炙　磁石醋淬飛　枳實麩炒各二兩　附子去皮
臍　山藥　肉蓯蓉酒浸切焙　牡蠣煅各一兩半　五味子
巴戟天各一兩　楮實炒別搗末三兩　共爲末入楮實末同羅
鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸空心
牛膝酒下

塞耳方　治耳內晝夜虛鳴

菖蒲　烏頭去皮臍生用一兩　爲末綿裹半錢塞耳中再易之

牛膝煮丸方　治腎虚弱風邪干之上攻於耳常作蟬鳴

以至重聽

牛膝 海桐皮二味各半斤擣末用好酒五斤于銀石器內熬成膏 蘹香子炒

當歸 五加皮 赤箭 赤芍藥 桂心去粗皮 麻黄去根節

地龍炒 木香 獨活 乳香研 防風

骨碎補 麒麟竭 乾蠍炒去土 沉香 天南星生用各一兩

附子炮去皮 烏頭炮去皮 楝實 川芎各二兩

虎脳骨酥炙四兩 沒藥一兩 麝香研半兩 共研和入前膏內和擣三千杵丸如桐子大每服十丸至十五丸空心溫酒或鹽湯下

耳耵聹 聤耳 百蟲入耳

耳耵聹

論曰耳者腎之候心之寄竅風熱搏於經絡則耳中津液結聚如麩片之狀久則丸結不側或似蟄蛹致氣竅不通耵聹爲聾

猪脂膏方 治耵聹塞耳聾強堅不可挑塞耳

生猪脂合 釜下墨研半兩 調和成膏捏如棗核大綿裹塞耳中

地龍汁方 治耵聹塞耳聾強堅不可挑摧耳

地龍七條蛭者五 取汁數滴入耳中挑即自出

聤耳

論曰腎氣通耳耳者腎之候若其經爲風邪所乘毒氣蘊結於耳中以至膿汁俱出妨悶疼痛謂之聤耳

白斂散方 治聤耳出膿血塞耳

白斂 黄連 龍骨 赤石脂 烏賊魚骨去甲各一兩

爲散先以綿拭乾用藥一錢綿裹塞耳中

鯉魚腸方 治聤耳出膿久不差者

鯉魚腸一具細切 醋三合 合擣布裹棗核大塞耳半食頃

痛即有蟲出著布即拔之更易新者蟲盡爲度

附子散方 治聤耳耳中痛

附子去皮臍一分 黄連半兩 爲散以少許摻耳中

又方 治聤耳塞耳

母鼠肝一具 旋取活鼠乘肝熱時以棗核大塞耳中

治聤耳方

石首魚腦中枕子一 爲末摻耳中即差

百蟲入耳

論曰百蟲入耳其類不一古方或灌以藥或導以物皆以

意出之也獨驢乳牛酪二物最爲良法諸蟲之入耳灌之卽化爲水其入腹者則連服數劑取差

灌耳牛乳方　治蚰蜒入耳

牛乳一盞　少少灌入耳內卽差若入腹者飲一二升當化爲黃水出未出再服

塗耳百部方　治蚰蜒入耳

百部切焙　爲末以一字生油調塗於耳門上其蟲自出

胡麻枕耳令出方　治蚰蜒入耳

胡麻半升炒令香　碎研以葛袋盛側卧枕耳

豬肉掩耳方　治蜈蚣入耳

豬肉一兩片　炙令香掩耳上立出

鯪鯉甲方　治蟻入耳

鯪鯉甲燒爲灰　以水調濾過滴入耳中卽出

豬脂枕耳方　治蟻入耳

豬脂一片　豬肉片　將豬脂煮炙豬肉令香安耳孔邊枕睡卽出

蜀椒醋灌耳方　治百蟲入耳

蜀椒半兩爲末　醋半盞　以椒末入醋中少灌入耳內行一廿步卽出

葱油枕睡方　治百蟲入耳

油麻一升炒研令烟出　葱白一莖切炒令香　將葱與油麻拌勻以餅子盛當耳門安側睡令餅口向耳無令傾蟲從耳中出至餅子內卽去之

又方

以火照之卽向明出

擊刀法　治百蟲入耳

以刀口於耳上相擊作聲蟲卽出也

治百蟲入耳方

雄雞冠血不拘多少　滴耳內立出

治蜈蚣入耳閉氣令出方

閉氣氣滿卽吐復閉取令出或死耳中徐徐以物鉤出之若稍久不出者取新熱豬肉安耳竅上卽出

治飛蛾入耳法

先大吸氣仍閉口掩鼻呼出氣蟲卽隨氣出

又方

以雞肉塞耳中立出

鼻病門

鼻塞氣息不通　鼻塞不聞香臭　齆鼻
鼻中生息肉　鼻淵　鼻流清涕　鼻中生瘡　㽲蟲食鼻生瘡

鼻病統論

論曰肺爲五臟華蓋開竅於鼻肺氣和則鼻亦和肺氣感風冷則爲清涕爲齆爲息肉爲不聞香臭肺實熱則爲瘡爲痛膽移熱於腦則濁涕不已謂之鼻淵惟證候不同故治療亦異

鼻塞氣息不通

論曰鼻塞氣息不通者以肺感風寒其氣搏結不得宣快窒塞既甚而息不能出入也巢氏謂息肉生長致氣塞不通蓋有未嘗生息肉而氣息不通者宜析而治之

人參湯方　治肺風上攻鼻塞不通

人參　白茯苓　陳橘皮去白　蜀椒去目并合口者炒　麻黄去根節　黄芩　羌活各半兩　每服三錢水煎食後溫服

杏仁煎方　治肺傷寒氣欬嗽唾痰聲重鼻塞補肺

杏仁去皮尖雙仁二兩研　棗肉一升煮去皮核　白蜜　生薑汁　酥各半升　餳一升　同合和於銀器中微火煎候熟服一匙頭溫酒調下食後

人參丸方　治肺風上攻鼻塞不通

人參　防風　細辛　黄耆　沙參　甘菊花炒　木通各半兩　共爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸溫水下日再

木通膏方　治鼻窒塞不通利

木香　細辛　當歸　川芎　木通　蕤仁研　白芷各半兩　共細剉內銀石器中入羊髓微火煎候白芷色黄膏成去滓澄清凝每用小豆大內鼻中日再以差爲度

鼻塞不聞香臭

論曰鼻有息肉不知香臭者亦有無息肉而不知香臭生息肉不知香臭已列方濟此姑論鼻塞不聞香臭蓋鼻之窒塞或冷風乘或肺壅熱冷熱故異其塞則一皆肺臟不和氣不宣通也治塞者當審其冷熱

天門冬丸方　治鼻塞不聞香臭

天門冬　白茯苓各五兩　人參　枳實炒　甘草炙各三兩

檳榔二兩　共爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸
食後漿水下日再暑月以牛乳下
通氣膏方　治鼻中不利窒塞不通不聞香臭
木通　當歸　川芎　蕤仁　桂心各半兩　細辛
白芷　共細剉與羊髓三兩同於銀石器中微火煎至
白芷黃色去滓澄凝每取小豆大塞鼻中日再
芎藭散方　治鼻塞不聞香臭
芎藭　辛夷各一兩　細辛三分　木通半兩　每用少許綿
裹塞鼻中濕卽易

瓜蔕散方　治鼻塞不聞香臭
瓜蔕　藜蘆各一分　每用一錢綿裹塞鼻中日三易
齆鼻
論曰鼻和則知香臭夫鼻爲肺之竅非能自和也必肺氣
流通然後鼻爲用而香臭可知若心經移熱于肺致肺臟
不和則其竅亦無以宣達故爲齆鼻此乃內經所謂心肺
有病則鼻爲之不利也
黃耆散方　治齆鼻順肺氣四時服食
黃耆　人參　防風　防已　生乾地黃　桔梗炒
芍藥　黃芩　澤瀉　石南葉　白术米泔浸一宿炒　桂心去粗皮　甘草炙　牛膝酒浸一宿　赤茯苓　紫菀各三兩
共爲散每服一錢溫酒調下如要丸鍊蜜丸如梧桐
子大每服三十丸溫酒下
雄黃丸方　治齆鼻
雄黃一錢　甘草炙　附子去皮臍　細辛各一分
爲末用羊髓汁和丸如棗核大以綿裹內鼻中移時
出惡物卽差
細辛散方　治齆鼻不聞香臭宜塞鼻

細辛　甘草炙　附子去皮臍　木通各一分
爲散以羊髓汁和如棗核大塞鼻中
治齆鼻法
伏面臨牀以新汲水淋玉枕上卽差
治齆鼻吹鼻
皂莢一挺炙去皮子　爲散以一字吹入鼻中卽差
鼻中生息肉
論曰鼻者肺之竅鼻和而知香臭風寒客於肺經則鼻氣
不利使津液壅遏血氣搏結附著鼻間生若贅疣有害於

息故名息肉

羊肺散方 治鼻中息肉

羊肺一具切去筋膜炙乾 木通半兩 白朮米泔浸一宿炒黃四兩

乾薑半兩 肉蓯蓉酒浸一宿半兩 川芎半兩

為散每服一錢食後米飲調下日二

礬石丸 治鼻生息肉

礬石熬令汁枯四兩 木通 細辛各半兩 丹砂研一分

共為末麪糊和丸如小豆大每用一丸綿裹內鼻中

一日一易取下息肉止

胡粉膏方 治鼻中息肉不通傅鼻

胡粉炒 白礬燒令汁盡各等分

為末用青羊脂和成膏以少許傅息肉上

鼻淵

論曰內經謂膽移熱於腦則辛頞鼻淵鼻淵者濁涕下不止也夫腦為髓海皆藏至陰故藏而不瀉今膽移邪熱上入於腦則陰氣不固而藏者瀉矣故腦液下滲於鼻其證濁涕出不已若水之有淵源也治或失時傳為衄衊瞑目之患

防風散方 治腦熱鼻淵下濁涕不止

防風一兩 黃芩 人參 甘草炙 川芎 天門冬各一兩

為散每服二錢食後沸湯調下日三

雞蘇丸方 治腦熱肺壅鼻淵多涕

雞蘇葉乾者 麥門冬 桑根白皮 川芎 黃耆炙

甘草炙各一兩 生乾地黃二兩 為末鍊蜜和丸如桐子大

每服二十丸食後臨臥人參湯下

辛夷膏方 治肺熱鼻塞多涕

辛夷一分 白芷三錢 藁本 甘草 當歸 細剉以清

酒二盞羊髓十兩銀器內微火煎五七沸傾入盒中

澄凝每取一豆許內鼻中日夜各一服

鼻流清涕

論曰五臟化液遇熱則乾燥遇寒則流衍鼻流清涕至於不止以肺藏感寒寒氣上達故其液不能收制如此且涕泗洟皆鼻液也以繼泣則曰涕以生於肺則曰泗涕甚曰洟此獨言涕與宣明論五藏化液肺為涕同意

細辛丸內鼻方 治腦冷鼻塞時出清涕

細辛 桂心 甘遂炒 芎藭 附子各一分 辛夷半兩

木通二兩 為末鍊蜜丸如棗大以綿裹內鼻中勿令氣泄覺小痛擣生薑汁和擦即愈 一方用狗膽和丸

芎藭膏方 治鼻塞多清涕

芎藭 吳茱萸湯洗炒 蜀椒去目炒 細辛 乾薑

皂莢去皮子各三分 細剉以醋浸一宿內豬脂於銀器石器中煎五七沸去滓傾入盒中澄凝以綿裹少許內鼻中

黃連汁方 治鼻塞多年清水出不止灌鼻

黃連去鬚一兩 蒺藜苗擣二 細剉水二升煎至一升取一合灌鼻中不過再灌大嚏即差

蒺藜汁方 治鼻塞清水不止灌鼻

蒺藜苗擣一 細剉以水三盞煮至一盞去滓仰面先滿口含飯取汁一合灌鼻中不過再灌嚏出息肉差

鼻中生瘡

論曰心肺有病鼻為之不利蓋心肺在膈上肺開竅於鼻心肺壅熱氣熏於鼻間蘊積不散其證乾燥而痛甚則成瘡也惟能平調心火以利肺經則瘡可已

升麻湯方 治鼻乾痒生瘡乾嘔不下飲食

升麻 桔梗 黃芩 犀角 貝母去心 龍膽各半兩

甘草炙一分 每服三錢水煎食後溫服不拘時

硫黃膏 治面瘡鼻頭赤爛

硫黃研細一錢 以葱白三寸入童便二合浸一宿研絞取涎和末如膏塗上不見風日二

梔子煎方 治肺氣風熱鼻內生瘡

山梔子去皮枚 苦參 木通各三兩 細剉以四兩酥同煎令香去滓傾入盒中每以少許滴入鼻中

礬石煎方 治鼻中熱氣生瘡有膿臭兼有蟲

礬石枯一兩 苦參 生地黃洗令淨絞取汁三合 二味為末以地黃汁并水二盞煎至三合綿裹去滓少吹滴鼻中

黃蘗飲方 治鼻中熱氣生瘡有膿臭兼有蟲

黃蘗二兩 以冷水浸二宿絞取汁一盞服之三五度差

疳蟲蝕鼻生瘡

論曰五臟皆有蟲蟲得風則化肺開竅於鼻肺經既虛風熱乘之鼻氣壅塞不得宣通則疳蟲因得侵蝕瘡生鼻間

治鼻中疳瘡方

牛鼻津 取塗瘡上

樁根湯方　治疳蟲蝕人口鼻

樁根切一升去皮　鹽半合　葱白切半升　豉半升　椒一合去目

合和以醋及清泔各三升同煎數十沸去滓約及一升分作三服有惡物出小兒量加減

如聖散方　治疳蟲蝕鼻生瘡及鼻下赤爛

胡粉半兩　麝香研一字　甜瓜蒂七枚為末分兩研　合研勻用

蟾酥少許水浸一宿次日取酥水先和粉次同和丸如菉豆大每用二丸水化傅瘡上鼻下赤爛者亦塗之小兒每用一丸、

青金散方　治疳蟲蝕鼻生瘡及鼻涕淹潰

銅青　白礬各七錢等分

同為散每用少許傅瘡上小兒亦可用

聖濟總錄纂要卷十八終

聖濟總錄纂要卷之十九

方一焜公燿
新安　程增雅高
程滙左鑫　較
程均又庠

口齒門

口瘡　口糜　口吻瘡

口齒統論

論曰足太陰脾之經其氣通於口足陽明胃之經手陽明大腸之經其脉並夾於口故其腑臟風邪湿熱發於經則於是有口吻之疾牙齒者骨之所終髓之所養也又手陽

明之支脉入於齒故骨髓之氣不足與夫陽明之脉虛不能有所滋養於是有牙齒之疾牙齒之疾其候甚多治療之法固不得畧也養生方云鷄鳴時叩齒三十六下食畢令啄齒皆宜長行之令齒不齲去蟲又早朝未起漱口中玉泉令滿口嚥之啄齒二七過去蟲牢齒千金又曰每日以鹽一捻內口中以煖水揩漱及叩齒百徧爲之不絕不過五日即牢密若此之類皆簡易可行行之有效不可忽

也

口瘡

論曰口瘡者由心脾有熱氣衝上焦熏發口舌故作瘡也又有胃氣弱穀氣少虛陽上發而爲口瘡者不可執一而論當求所受之本也

當歸膏方 治口爛生瘡水漿不下

當歸一兩 射干 升麻 附子各半兩 白蜜四合 猪脂五兩

除蜜外并剉先煎脂化去滓入諸藥慢火煎候附子色黃又去滓入蜜更煎如膏以瓷器盛每服如杏

核大含之日三五度嚥津不妨

黃連膏方 治口瘡并咽喉塞

黃連三兩 猪脂一斤 白蜜四兩 羊髓研二兩

以慢火煎猪脂取油去滓入黃連又煎令黑色下羊髓髓化以綿濾去滓入蜜更煎成膏瓷盒盛每含一棗大日三五度嚥津不妨

燒肝散方 治口瘡久不差

茵陳蒿 犀角屑 石斛 白朮 芷胡各半兩 芍藥

吳茱萸湯浸三遍 紫參 桔梗 防風 桂心

白蕪荑各一分

每服五錢以白羊肝五兩切去筋膜入葱白一莖細切相和濕紙三五重裹慢火煨熟空腹頓服米湯下

巴戟散方 治元藏虛冷上攻口瘡

巴戟天一兩 白芷半兩 高良薑一錢 爲末

爲細散用猪腰子一隻去筋膜每一隻入藥散一錢用紙濕裹煨熟乘熱去紙以口吸熱氣有涎即吐候冷細嚼服之

生薑煎方 治口瘡疼痛

生薑取汁一盞 白沙蜜三兩 用煎十沸用瓷器盛時時取熟水調一匙含嚥之

柳花散方 治口瘡

黃蘗一兩 柳花半兩 爲散臨臥乾摻誤嚥亦不妨

升麻含汁方 治口瘡

升麻不拘多少 一味含一里嚥津

升麻飲方 治口內生瘡齒斷肉爛

升麻 黃連 羚羊角 玄參 麥門冬 黃芩

葛根 甘菊花 防風 羌活 大黃各半兩 人參三分

甘草炙 知母各一分 每服三錢水煎食後溫服

玄參湯方 治心肺壅熱口內生瘡胸膈痰逆

玄參 茅根 羌活 竹茹 木通 羚羊角 升麻 黃連 苦竹葉 人參 半夏洗去滑各三分 甘草各半兩 炙一分

每服三錢入生薑三片同煎溫服食後再服

玄參丸方 治口瘡

玄參 天門冬 麥門冬各一兩

爲末鍊蜜和丸如彈子大每用一錢丸綿裹含化嚥津

口糜

論曰膀胱移熱於小腸膈腸不便上爲口糜夫小腸之脉絡心循咽下膈抵胃陰陽和平水穀入胃小腸受之通調水道下輸膀胱今熱氣厥逆膀胱移熱於小腸胃之水穀不得傳輸於下則令腸膈塞而不便上則令口生瘡而糜爛也大抵心胃壅熱則必熏蒸於上不可槩以傳藥當求其本以治之

大青丸方 治口糜生瘡久不差及心胸中熱乍發乍退

大青去根 甘草炙 枳殼去瓤麩炒 苦參各三分 生乾地黃焙 升麻各一兩 黃連一兩

共爲末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後熱水下日二服

升麻丸方 治口糜生瘡

升麻 黃連 黃檗炙 杏仁去皮尖各一兩

將上三味爲末次研杏仁如膏鍊蜜三兩以藥末并杏仁和爲丸如彈子大每服一丸含化嚥津

口吻瘡

論曰口吻瘡者其瘡發于脣吻之間疼痛微腫浸爛有汁世名燕口又名肥瘡此由脾胃有熱随氣熏發上攻於口脣與津液相搏所致

芎藭丸方 治口吻瘡

芎藭二兩 白芷 陳橘皮去白 黃連各半兩

爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸甘草湯下不拘時候

麝香散方 治口吻生瘡久不差

人中白研 麝香研各一錢 再研勻塗瘡上

葵根散方 治口吻瘡

取秋葵根一握燒作灰研爲散傅之

口生瘡 口臭 脣瘡 脣生核

口舌生瘡

論曰口舌生瘡者心脾經蘊熱所致也蓋口屬脾舌屬心心者火脾者土心火積熱傳之脾土二臟俱蓄熱毒不得發散攻衝上焦故令口舌之間生瘡腫痛

烏犀湯方　治口舌生瘡

犀角屑一分　羚羊角屑一分　丹砂三分　黃芪半兩　大黃一分　升麻半兩　生乾地黃一兩　射干一分　天門冬去心生者一兩　玄參二分　甘草炙一兩　每服三錢水煎食後溫服

防風散方　治口舌生瘡

防風一兩　龍腦一兩　生地黃二兩　沉香半兩　升麻半兩

每用二錢入鹽少許沸湯調勻揩齒含嚥便瘥

茯神丸方　治積年口舌瘡諸方不瘥

茯神一兩　白朮一兩　旋復花半兩　縮沙蜜去皮三分　大黃煨半兩　芍藥半兩　桂心二分　郁李仁一兩　大麻仁二兩別研　人參一兩　枳殼炒二分　訶梨勒一兩　厚朴塗生薑汁炙一兩　白檳榔二分　白鮮皮半兩　陳橘皮去白一兩　地骨白皮半兩

爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心粥飲下加至三十丸

口臭

論曰口臭者脾之候心脾或熱蘊積於胃變爲腐臊之氣停聚不散隨氣上出熏發于口故令臭也

升麻散方　治口臭生肌長斷

升麻二兩　防風一兩　當歸　白芷各半兩　川芎　藁本各三分　麝香一分　甘草炙半兩　木香　細辛各一分

每用一錢傅齒根下甚者綿裹含化嚥津

七香丸方　治口及身臭

白豆蔻仁　丁香　藿香　零陵香　青木香　白芷

桂心各一兩　香附子二兩　甘松香　當歸各半兩　檳榔二枚　沉香一兩　爲末鍊蜜和丸常含一丸大豆大嚥汁日三夜一亦可常含嚥汁五日口香十日體香二七日衣被香三七日下風人聞香四七日洗手水落地香五七日把他人手亦香慎五辛下氣去臭

芎藭散方　治心虛寒口臭蟲蝕齒痛

芎藭　白芷各一兩　甘草炙二分　桂心去粗皮　杜衡各半兩　當歸切三分

爲散食前煖酒調下一錢日二服三十日體皆香即差

草豆蔻丸方　治心脾蘊熱隨氣上熏發爲臭

草豆蔻仁　丁香各一兩　麝香一分　藿香葉　零陵香

桂心　莎草根去毛　木香　白芷　當歸　檳榔各半兩

爲末鍊蜜和丸如鷄頭大每含化一丸嚥津液日三丸

脣瘡

論曰脣瘡者以脾胃有熱熱氣循經而外發於脣故生瘡也蓋足陽明之脉下循鼻外入上齒縫中還出挾口環脣內經謂脾之合肉也其榮脣也是故脾胃之經與脣相應熱氣乘經而衝發所以脣爲之生瘡

硫黃膏方　治脣瘡及緊瘡久不差

硫黃研　白礬枯研　丹砂研　水銀　麝香研　黃蘗

爲末各一分　同研候水銀星盡用臘月豬脂和如泥先拭令淨後以膏塗之日三五上即差

五倍子散方　治口脣生瘡

五倍子去心中蟲　槐花擇

等分爲細散每用蜜傅脣上如瘡口乾以蔥汁調上

治瀋脣瘡方

鯉魚血　一味取血磨墨相和塗之差

脣生核

論曰脣生核之候大槩與脣瘡緊脣相類然其脣至於生核者蓋足陽明與太陰爲表裏臟腑俱有風熱風熱之氣衝發二經與血氣相搏而爲脣腫外復爲風冷所乘血氣凝結聚而不散故生核也

防風湯方　治脾胃蘊積熱氣復爲風冷所搏脣邊生核結鞕疼痛

防風去叉半兩　菊花一兩　升麻半兩　獨活半兩　黃芩半兩

知母半兩　玄參半兩　生乾地黃半兩　藁本半兩　大黃半兩炒

梔子半兩　前胡半兩　桔梗炒　甘草炙　麥門冬

各半兩　每服用三錢水煎食後溫服日三

黃連散方　治脾胃積熱風冷乘之脣結核

黃連去鬚　升麻　龍腦各一兩

爲散綿裹如彈子大臨臥新汲水浸過含化嚥津

治脣生核腫痛如彈方

牛膝燒灰存性研　先以鍼刺出惡血次用藥少許以新汲水調塗核上

治脣黑腫生核痛痒不可忍方

古銅錢青者洞文　放石上以臘月豬脂磨取汁塗之

重舌　舌腫強　牙齒歷蠹　牙齒疼痛

齒蠹

重舌

論曰重舌者以心脾二經蘊伏熱氣循緣經絡上衝舌本遂令舌下血脈脹起如小舌狀故謂之重舌蓋心開竅於舌足太陰之脉屬脾絡胃上膈俠咽連舌本散舌下故也

紫雪服之甚妙

牛黃散方　治重舌

牛黃研　人參各半兩　白茯苓二分　大黃炒半兩　當歸一分　甘草炙半兩　丹砂研半兩

爲散每服半錢溫水調下甚者加至一錢食後服

舌腫強

論曰心氣通於舌脾脉挾咽連舌本散舌下心脾二經受風邪則舌本强不能卷舒久或熱氣加之則腫腫則脉筋脹急勢連咽喉礙於呼吸法宜刺之洩去惡血及餌以藥

白茯苓湯方　治舌腫強

白茯苓　牛黃研各二分　犀角鎊一分　甘草炙　人參

羚羊角屑　熟乾地黃　白朮　桂各半兩

每服三錢水煎溫服日三

百草霜方　治舌忽紫硬逡巡能塞殺人者

百草霜　好鹽各半兩　同研勻表裏塗之立效

䗪蟲散方　治舌腫滿口言語不得

䗪蟲五十枚　鹽半兩

細研爲散每服以水煎熱含冷吐以差爲度

螵蛸散方　治木舌腫強

桑螵蛸十二月者炙黃　每服半錢棗蘸汁調下

蚯蚓塗方　治舌腫滿塞喉欲死

蚯蚓一條　以少許鹽花化爲水以塗咽喉舌上良久漸消

牙齒歷蠹

論曰牙齒歷蠹者腎虛弱也骨髓不固氣血衰耗不能榮潤於牙齒故令人牙齒黯黑謂之歷蠹

麝香散方　治齒歷蠹

麝香一塊　定粉一錢　黃蠟半兩　細研前二味鎔蠟調之攤在紙上每臨臥時剪作片子貼所患齒上

升麻散方　治牙齒歷蠹齒根黯黑

升麻 槐枝灰各半兩 白附子 蜜陀僧煆 露蜂房各一分 為散入地黃汁一合和勻陰乾每用揩齒

牙齒疼痛

論曰牙齒疼痛有二手陽明脉虛風冷乘之而痛者謂之風痛蟲居齒根蝕侵不已傳受餘齒而痛者謂之蟲痛二者不同古方有塗傅漱渫之藥治去風蟲用之各有法也

細辛散方 治牙齒疼痛頭面浮腫喫冷熱物不得

細辛 芎藭 藁本 獨活各一兩 地骨皮半兩 蒺藜子三分 為散綿裹如江豆大含化嚥津每日三五度易

之去腦間風熱若患頭風鼻塞先以油塗頂心以手摩一二百遍次用散一錢又摩頂心依前法

地骨皮湯方 治牙齒疼痛吃物不得

地骨皮一兩 細辛半兩 生乾地黃一兩 戎鹽一分

每用五錢以水煎二三五沸熱漱冷吐以差為度

地黃湯方 治牙齒痛

生乾地黃三兩 獨活二兩 㕮咀每用五錢以酒一盞浸一宿煎十餘沸熱漱冷吐以差為度

柳枝湯方 治齒痛連牙頷疼

柳枝 槐枝 黑豆各一合 蜀椒炒去目半兩 青鹽 細辛 羌活各一分 除椒鹽外剉先以水六盞煎取二盞入椒鹽再煎一盞通口漱之不拘時候以差為度

齒䘌

論曰齒䘌如疳䘌蟲之證齒根先露壞爛膿血俱出口內氣息蓋緣臟腑壅滯熏發上焦攻衝齒牙又有嗜肥甘過多或宿食在齒根不能漱去致腐殠之氣淹漬而成者

雄黃膏方 治齒䘌蟲蝕牙齒

雄黃別研半兩 牛酥五兩 黃蠟 白蜜各一兩 藁本三分

丹砂別研一分 蒺藜一分 升麻 川芎 白芷 杏仁去皮尖雙仁各半兩

除別研藥并蜜蠟外餘細剉先於鐺中以酥煎所剉藥候杏仁赤黑色去渣下蜜蠟煎二十沸候膏成續下別研藥攪勿住手候凝成膏於瓷器盛每以少許塗齒病處或蟲孔中點之大驗

薔薇根膏方 治齒䘌

薔薇根二兩 地骨皮一兩 葱根一兩 胡粉一兩 白蠟一分

前三味俱剉以水二大盞煎至半盞以重抄紙半張浸之暴乾更濕浸汁盡為度乾了以粉蠟塗之於上

剪作條子夜臥貼之神效

細辛散方　治齒䘌齒根腐爛

細辛二兩　川升麻二兩　地骨皮二兩　角蒿二兩　牛膝二兩

生地黃五兩　都燒為灰細研每夜臨臥傳齒根或以蠑

紙上貼之至旦即去

黃礬散方　治疳䘌齒根宣露

黃礬一分燒灰　麝香一錢研　乾蝦蟆一分燒灰研　防風去叉

獨活各一兩　除別研外為散以煖漿水漱口後用藥貼

齒根上有涎即吐出日再貼即差

藜蘆散方　治齒疳風䘌疼痛不止

藜蘆　蜀椒去目炒　附子各一分　麝香一錢研

先以三味為散次下麝香和勻每用一錢綿裹置所

患處有涎吐之

䘌蝕牙齒　腎虛齒風痛　齒風腫痛

齒斷腫骨槽風　風疳　齒間出血　齒齲

牙齒動搖

䘌蝕牙齒

論曰字書謂齓動皆風蟲以風化蠧手陽明脉入於齒其

疏虛抵骨髓不榮風邪乘之攻入於齒毒氣與經相搏而

生蟲故云蟲蝕牙齒也其狀齒根有竅或作疼痛甚則搖

動宣露浮腫作裂世俗亦呼為蚛牙

玉池散方　治蟲蝕牙齒蚛蚛風痒搖動疼痛及牙宣出

血氣息浮腫等疾

地骨皮　白芷　升麻　防風　細辛　芎藭　槐花

當歸　藁本　甘草

共十味等分搗羅為末散常用揩牙良久以溫水漱

次用藥散二錢生薑三片黑豆三十粒同煎含冷吐

附子丸方　治久患牙疼及齒蚛

附子一兩去皮臍生用　蜀椒　蓽撥　黃蠟各一分

四味搗羅三味為末鎔蠟和丸如梧桐子大每用綿

裹一丸以患牙咬之如蚛安在蚛竅內

比金散方　治牙疼不止去風蚛神仙功效

雄黃不拘多少

一味研細隨左右疼處以剜耳子送入耳中立止

治牙齒風蚛疼痛方

烏頭去皮臍　芎藭　甘草　地骨皮　細辛　高良薑

白芷半兩 共七味搗羅爲散以指點藥揩於痛處出涎
以溫水漱三五度即差

腎虛齒風痛

論曰腎主骨齒者骨之餘而髓之所養也足少陰經虛
氣血不能榮養骨髓故因呼吸風冷或漱寒水冷則令齒
痛而不已

地黃丸方 治腎臟虛食冷熱齒皆痛

生地黃一兩 白茯苓 防風 獨活 枸杞子 山藥各半兩
右六味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每空心

煎棗湯下十丸至十五丸

雞腸草散方 治腎虛齒痛揩牙烏髭鬚駐顏

雞腸草 白礬 訶梨勒皮 蘹香子 旱蓮子
晚蠶沙 青鹽 茜根 皂莢各一兩 麻籸半兩
共十味除礬并青鹽蘹香蠶沙外各剉半寸用甆瓶
一枚開口入諸藥在內紙筋鹽泥固濟以炭火半秤
煅盡火放冷取出研如粉早晨食後夜臥揩三兩上
頃之漱口

齒風腫痛

論曰齒風腫痛者齒根虛浮牙齒疼痛或遇呼吸風冷其
痛愈甚則斷腫赤乃至動搖此客於陽明經虛風客其
脈流注齒間故爲齒風腫痛之患也

芎藭湯方 治風齒疼腫及口臭

芎藭 當歸 獨活 細辛 白芷各一兩
共五味搗爲末每用五錢水煎熱含冷吐如此三五
次易取差爲度

蓽撥散方 治諸陽氣虛風攻牙齒疼痛不任寒熱嚼物
隱痛

蓽撥 苦參 防風 升麻各二兩 藁本一分
共五味搗羅爲散每三錢水煎熱漱冷吐

皂莢湯方 治諸風齒疼痛

皂莢一挺去皮子炙令黃色 露蜂房一枚劈碎 鹽一分
三味劈剉分爲三貼每貼以漿水煎熱漱冷吐

齒斷腫 附齦風

論曰足陽明之脈起於鼻交頞中旁約太陽之脈下循鼻
外入上齒中手陽明之脈其支者從缺盆直入上頸貫頰
下入齒縫中若其經虛風熱所襲傳流齒牙攻注斷肉則

致腫痒甚者與斷間津液相搏化爲膿汁或血宣而不已

黄芩湯方　治齒斷腫痛及𧏾蝕

黄芩　甘草　當歸　細辛各一兩　蛇床子　桂心各一兩

右六味共搗篩爲粗末每用五錢㶊漿水一盞煎十沸熱含冷吐

地骨皮散方　治骨髆風牙齒宣露腫痒浮動疼痛作時或斷爛生瘡兼治大人小兒口瘡

地骨皮　麥糵各一兩　猪牙皂莢半兩　青鹽一分

右四味同搗碎入鍋炒搗羅爲散每用先以鹽漿水

嗽口摻擦

風痏

論曰風痏之病其候腭斷虛腫牙齒動搖侵蝕齒根腐殘脫落下攻斷頰損爛膿血俱出者是也蓋緣手足陽明之經氣虛風邪熱毒在胃蘊積日久上熏胸膈攻發口齒故成斯疾

升麻細辛散方　治風痏痒痛侵蝕斷爛

升麻　細辛　藁本　防風　芎藭　凝水石研各一兩

甘草炙半兩　右七味搗研爲散取少許貼齒痒處又取一錢綿裹含化嚥津常令藥味相接爲佳

治風痏出血及牙齒浮動牢牙散方

皂莢五挺燒存性小者用十挺　附子生一枚　乳香研半兩　麝香研少許

四味搗研爲末如常揩齒良久漱之頻用爲効

齒間出血

論曰邪熱在上流傳於手陽明之脉注於齒間則令齒斷虛腫甚者齒間出血蓋血性得溫則宣流故也

龍腦散方　治牙齒疼痛斷間血出去口氣辟風冷

龍腦研一分　荆芥穗半兩　細辛　升麻各一兩

右四味搗羅三味爲散入龍腦拌勻每用半錢揩齒良久以溫湯漱口

胡粉散方　治牙宣血出不止

胡粉半兩　麝香研半錢

二味同研爲散臨臥淨揩牙漱口　兼能牢牙

齒齲

論曰齒齲之病由風熱邪氣客於手足陽明二經其狀斷腫或腫膿出而臭久則侵蝕齒斷宣露一名風齲

蜀椒湯方　治牙齒風齲疼痛

蜀椒（去目并合口者） 芎藭 細辛 升麻 莽草 防風

黃芩（各一分）

右九味擣篩每用五錢水煎熱漱冷吐

白礬散方　治齲齒斷腫出膿汁

白礬（一分燒灰） 蟾酥（半分） 乾蝦蟇 麝香（半分） 雄黃（半分）

熊膽（一分）

右六味擣羅爲散每用半錢傅牙根

牛膝散方　治牙齒風齲疼痛觧骨髓風毒氣

牛膝（一兩燒爲灰）　爲末以少許著齒間含之

又方　取郁李根一握切水一盞煎至六分熱含之吐出

蟲長六分黑頭蟲

動搖

論曰手陽明支脉入於齒足太陽之脉又徧於齒爲骨之所終髓之所養若經脉虛風邪乘之血氣損少不能榮潤故令動搖也

治齒風動搖揩齒牢牙方

丹砂（別研一兩） 青礬（別研半兩） 白礬（別研半兩） 馬牙硝（別研半兩）

防風（半兩） 細辛（半兩） 黃蠟（一兩） 麻油（三兩） 松節（二兩）

當歸（半兩） 松脂（二兩） 黃蔑（一兩） 臘月豬脂（半斤）

右十三味除脂蠟油外並細剉先於鐺中煎脂濾去滓次下油煎三兩沸稍下剉藥煎十餘沸以綿濾去滓再下蠟並別研藥慢火養成膏於瓷器盒盛每用少許塗傅患處即差

防風湯方　治齒根出露動搖疼痛

防風（一兩） 蔓荊子（一兩） 細辛（半兩） 川升麻（半兩） 地骨皮（半兩）

赤茯苓（半兩） 芎藭（一兩）

共七味都剉碎和勻每用半兩以酒水同煎熱含就於患處良久冷即吐含盡爲度日二此一劑永差矣

地黃丸方　治齒動搖

生地黃（五斤粗者取汁） 山藥（四兩） 枸杞根（三兩大者） 人參（一兩）

白茯苓（四兩）　右五味先煎生地黃汁擣諸藥末用好酒一斗別煎至三升入煎下地黃汁同再煎入白蜜一斤酥少許煎候可丸即成丸如小豆大每服酒下二十丸日三服加至五服

咽喉門

咽喉閉塞不通　喉痺　馬喉痺

咽喉生瘡　尸咽喉

咽喉統論

論曰咽門者胃氣之道路喉嚨者肺氣之往來一身之中
氣之升降出入莫急乎是評致經絡流注即咽喉所繫非
特肺胃為然故孫思邈曰應五臟六腑往還神氣陰陽通
塞之道也又人之氣血與天地相為流通咽喉尤為出納
之要故內經曰喉主天氣咽主地氣若藏熱則咽門閉而
氣塞甚則咽門破而聲嘶以至腫痛喉痺生瘡懸癰之屬
與夫哽塞如有物妨悶痛痒多涎唾其證不一不可槩以
實熱為治大率熱則通之寒則補之不熱不寒依經調之
湯劑蕩滌之外復有鍼刺等法要皆急治時不可緩非若

臟腑積久之病磨化調養之可比也一切咽喉病常宜為要藥

升麻湯方　治喉中痛閉塞不通

升麻　木通各一分　射干　絡石　芍藥　羚羊角二錢
淡竹葉　杏仁去皮尖雙仁炒各半兩

共八味除竹葉外搗篩每服三錢水煎入竹葉七片
煎至六分溫服日三

喉痺

論曰喉痺謂喉裏腫塞痺痛水漿不得入也治稍緩殺人
由脾肺不利蘊積熱毒外犯寒邪二經壅熱結於喉閉痺
而不通其狀身熱惡寒治法有先鍼而後藥者可謂之急
先務矣

射干丸方　治喉痺腫塞

射干一兩　香豉一合　杏仁去皮尖雙仁炒　芎藭　犀角各二兩
升麻一兩　甘草炙半兩　右七味搗羅為末鍊蜜丸
如小彈丸大每服一丸含化嚥津日可三五服

治咽喉閉塞不通方

大黃末一分　蝸牛二七枚　白礬末　馬勃一分
四味於五月五日午時用白梅肉蝸牛同研和丸如

榛實大如患者開口不得即以木磨用竹管子吹下
喉中立差如輕者以綿裹含化一丸

透關散方　治男子婦人喉痺口噤牙關緊

雄黃研　豬牙皂莢去皮炙　藜蘆各一分
三味研為散每用一匙分彈入兩鼻中關透處即差

逡巡不救方　治急喉痺

皂莢生去皮子半兩　一味擣為末每服少許筋頭點腫處更
以醋調藥末厚塗項下須臾便破血出即愈

馬喉痺

曰馬喉痺之狀勢如奔馬喉間痺痛腫連頰骨壯熱煩
悶數數吐氣者是也此蓋脾肺不利熱毒攻衝發於咽喉
所致

生犀丸方　治熱衝喉間連頰腫數出氣煩滿

犀角　枳實　射干　海藻洗去鹹　升麻各一兩　杏仁去皮尖雙仁研　白附子　百合一兩半　胡黃連　蒺藜子各三分

右十味搗羅爲末鍊蜜丸如彈子大每服一丸綿裹嚥津不計時

天門冬丸方　治馬喉痺咽喉腫痛脣焦舌乾頭頰連腫

天門冬　玄參　惡實炒各一兩　百藥煎半兩　人參一分
紫蘇葉半兩　甘草炙一兩半　蓬砂研一分　龍腦一分

右九味擣研爲細末鍊蜜和丸如皂子大每服一丸
食後臨臥熟水下

治馬喉痺腫連頰吐氣方

馬銜鐵一具　以水三升煎至一升細細含嚥

龍腦散方　治馬喉痺頰咽痛

白龍腦細研　牛黃細研　犀角屑　羚羊角屑　玄參
馬牙硝細研　沉香　甘草炙剉　硃砂以上各一分　蓬砂研一錢　升麻半兩

右十一味除龍腦牙硝擣篩爲散每服三錢水一盞竹葉七片同煎去滓溫入龍腦馬牙硝一錢攪令勻細細含嚥

咽喉生癰

論曰肺氣上通於喉嚨胃經外連於咽嗌其氣和平則呼吸歔納無所妨礙若脾肺壅熱熏發上焦攻於咽喉結聚腫痛不得消散熱氣熾盛致結成癰妨害吐納古方論一寸爲癤二寸至五寸爲癰其候使人寒戰欬吐稠濁善用鍼者辨其可刺宜速破之仍施以點餌之劑

天門冬煎方　治喉癰咽嗌不利

生天門冬汁二升　人參一兩　生麥門冬汁一升　生薑汁一升
桂一兩　半夏湯洗七遍焙乾一兩　赤茯苓二兩　生地黃汁一升
牛黃研半兩　甘草三分

右十味除四味汁外餘六味爲末先以天門冬麥門冬汁煎減半次入生薑汁又煎減半次又入地黃汁并餘六味末同煎汁欲盡卽入白蜜一斤酥四兩同煎成煎以瓷盒盛不拘時以溫水調下一匙以差爲度

射干湯方　治喉痺咽噎腫塞及心肺熱極吐納不利
射干半兩　升麻　大黃生　惡實生用各一兩　木通
馬藺子炒半兩　右六味搗篩每服三錢竹葉七片水煎
去滓下馬牙硝半錢攪令匀不拘時候細細溫服

尸咽喉

論曰道家服藥務先去三蟲者以其爲人害也尸咽之病亦本如此巢氏謂腹中尸蟲上蝕咽喉能令生瘡或痒或痛如醫候者是也善攝生者儻未能除去亦當服藥治之勿使妄動則善矣

黃蘗湯方　治尸咽喉閉塞出瘡及乾嘔頭痛食不下
黃蘗炙半兩　升麻　木通各一兩　竹茹三分　麥門冬一兩半　玄參一兩　前胡　大青各三分
共八味搗篩每服三錢水煎去滓入朴硝末一錢攪匀溫服如鼻中有瘡以生地黃汁少許滴入鼻中日三五服不計時候若通利加朴硝不欲利去之

一捻金方　治尸咽及走馬喉痺或腭内生癰
雄黃研　藜蘆　猪牙皂角去皮子各一分
三味搗研爲散先含水一口用藥一米許搐鼻内仰吐去水少時立效

咽喉中有物妨悶　骨鯁　誤吞諸物

咽喉中如有物妨悶

論曰喉者胃之系故咽主嚥物天氣通於肺故主通氣咽喉如有物妨悶者乃肺胃壅滯風熱客搏結於咽喉使然故聖惠謂憂愁思慮氣逆痰結皆生是疾也

射干湯方　治咽喉中如有物噎塞不下
射干　升麻　紫菀　百合各半兩　木通一兩　赤茯苓　桔梗各三分　右七味每服三錢水煎食後溫服如要通

利每服加朴硝末一錢同煎服

半夏木通湯方　治咽喉如有物噎塞飲食妨悶
半夏湯洗七遍　木通　乾薑各半兩　芍藥　桑根白皮
共五味每服三錢入鹽少許煎溫服又一方搗羅爲末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸食後生薑湯下加至二十丸

四物湯方　治咽喉中如有物噎吐不利
半夏一兩薑汁浸洗　厚朴薑汁炙　陳橘皮浸去白各一兩　赤茯苓一兩　共四味每服三錢入生薑三片同煎食後溫服

厚朴湯方　治咽喉中如有物

厚朴薑汁炙炒　赤茯苓各一兩　半夏湯洗七遍切焙一兩半　紫蘇葉一兩

共四味每服三錢入生薑三片同煎食後溫服

石蓮湯方　治咽喉如有物噎塞飲食不下

石蓮　人參　杵頭糠各一分

共三味每服三錢水煎溫服日二

杵糠丸方　治咽喉中如有炙臠食即噎塞

碓杵頭細糠一合　一味為末煉蜜和丸如彈子丸每含

腹含化一丸微微嚥津下

杏仁煎方　治肺胃壅滯咽喉中如有物妨悶

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒　桑根白皮　貝母各一兩半　生薑汁二合　地黃汁二合半　酥半兩　大棗六十枚去核　紫菀二分　甘草炙　桔梗炒　五味子　赤茯苓去黑皮　地骨皮各一兩　人參二分

共十四味研杏仁以水五升濾取汁將草藥細剉同煎至二升以綿濾去滓續下酥及地黃汁漫火煎成膏每食後含一匙細細嚥津

骨鯁

論曰用藥之法有不取於氣味特以意為用者若魚網虎骨之治骨鯁是也然網能制魚乃魚之所畏虎能伏獸乃獸之所畏其所制伏既不同則用之不異矣

治咽喉諸鯁頓骨散方

赤茯苓　陳橘皮湯浸去白各半兩　甘草炙　縮沙仁各一分

共四味為散每用二錢先摻口中次用新水一盞嚥下

馬勃散方　治骨鯁在喉中不出

馬勃　白礬灰　惡實　陳橘皮湯浸去白各半兩

共四味研為末粟水和丸如櫻桃大含化嚥津

橘皮丸方　治骨鯁在喉中不出

陳橘皮去白半兩　烏賊魚骨去甲　沙糖各一分

右三味搗羅為末煉蜜和丸如皂子大綿裹含嚥

粟皮丸方　治諸骨鯁在喉中不出

粟子內上皮半兩為末　乳香　鮎魚各一分

三味同研為丸如梧桐子大看骨遠近綿裹一丸水潤外留綿線吞之即釣出

飴糖丸方　治諸魚骨鯁在喉中

飴糖不拘多少　一味為丸如雞子大吞之又漸作大丸子再吞即效

魚網散方　治諸魚骨鯁在喉中
捕魚網一片　一味燒灰研細每服一錢新水調下又以
魚網覆鯁人頭上即下
鸕鷀散方　治諸魚骨鯁在喉中
鸕鷀毛翅十片　一味燒灰細研每服一錢濃汁橘皮湯
調下或以綿裹含嚥即下
薤白嚼方　治諸魚骨鯁在喉中
薤白　一味嚼令柔取麄線繫之持線一端吞薤到鯁
處引之即出

採筋引方　治諸魚骨鯁在喉中
鹿筋不拘多少　一味漬之令軟索如彈丸持一端吞之至
鯁處徐徐引出
虎骨散方　治諸獸骨鯁
虎骨　一味研細每服一錢水調下但骨亦得
血餘散方　治食中髮鯁不下逆喉
亂髮一團燒灰　一味研為細散每服一錢粥飲調下
豬膏吞方　治諸鯁
豬膏　一味吞如杏核大未差再吞

螻蛄散方　治諸鯁并刺不出
螻蛄頭一枚　一味為散以綿裹嚥津勿令鯁人如若刺
不出者塗刺瘡上即出
治諸鯁方
右方用木炭皮為末研令極細如無炭皮但堅炭亦
可粥飲調下二錢四五服以鯁下為度
誤吞諸物
論曰誤吞諸物若金銀錢鈎之類雖非病之自內然無術
以出之久則害人若舊概治髮磁石出針皆意為之治不

特取其性味治藥之工可謂用心精微者矣
治誤吞針簇箭鏃等方
肥豬肪肉不拘多少　一味煮令熟頓恣意飽食即下
治誤吞針方
磁石一彈丸大　一味口含之即出
癭瘤門
五癭　諸瘤
五癭
論曰石癭泥癭勞癭憂癭氣癭是為五癭石與泥則因山

水飲食而得之憂勞氣則本於七情之所感氣則隨之或
上而不下或結而不散是也
治癭瘤海藻散方
海藻一兩 昆布一兩半 海蛤 木通 白茯苓三兩
桂心 羊靨十枚去脂炙黄
右七味搗研爲散非時溫酒下三錢夜再服
茯苓丸方 治氣結喉中蓄聚不散成癭
白茯苓三兩 半夏湯洗去滑 生薑二兩 昆布
海藻各五兩 桂心 陳橘皮各一兩

右七味爲末鍊蜜丸如杏仁大常含化一粒細細嚥
津令藥氣不絶
諸瘤
論曰瘤之爲義留滯而不去也氣血流行不失其常則形
體和平無或餘贅及鬱結壅塞則乘虛投隙瘤所以生初
爲小核寖以長大若杯盂不痒不痛亦不結强方剤所治
以治癭法同但癭有可鍼割而瘤慎不破爾
消腫散方 治骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤大如盃盂升斗
者一二三十年不差致有膿潰令人骨消肉盡或堅或
輭或潰令人驚惕寤寐不安體中掣縮
烏賊魚骨去甲 硫黄各一分 白石英 紫石英
鍾乳各半兩 乾薑 大黄炒 附子去皮臍
胡燕屎 琥珀各一兩 丹參三分
共十一味爲散貯以韋囊勿令氣洩若瘡濕即傳之
若瘡乾無汁者以猪膏和傳日三四易之以乾爲度
若汁不盡者至五剤十剤止著藥令人不疼痛若不
消加芒硝二兩
神效散方 治項氣瘤結附贅日漸增長
猪靨各三十枚焙入猪脂内燻通令乾 陳橘皮去白一兩

三味爲散每服二錢空心米飲調下初結不過數服
覺消不用久服
瘰癧門
瘰癧結核 瘰癧寒熱 瘰癧久不差
瘰癧結核
論曰瘰癧結核者由風熱毒氣蘊積肝經攻注筋脉毒氣
鬱而不散故項腋之間瘰癧結聚成核或如梅棗核狀累
累相連其證令人乍寒乍熱頭項强痛心神煩躁蓋毒氣

與氣相搏則榮衛不和使之然也

沉香湯方　治瘰癧毒腫

沉香　丁香　木香　麝香各一分研　連翹

黃芩各半兩　犀角半兩　升麻一兩

每服五錢水煎溫服空心日午夜卧各一服

發水散方　治風熱毒氣項下結核及欲作癰疽瘰癧發背等疾

菉豆粉　乳香各一兩研　二味合研爲散實人分作四服虛人分作八服食後米飲調下就有核處一邊卧盡

劑必差大消腫痛

內消方　治瘰癧腫結

蝸牛殼不拘多少　一味搗爲細散每服二錢空心米飲調下日再至四十九日自消

消毒塗方　治風熱結頸腫赤疼痛及腮頷下忽結成核

大黃二兩　景天御頃火草　二味同研爛塗於患處日再傅

平肌散方

黃狗骨頭燒灰　鯪鯉甲燒灰各一錢　亂髮燒灰一團徽

三味研勻如瘡口已乾用白沙蜜調塗傅之日三四

次瘡即平愈

治瘰癧在項上結成顆塊及觸處但有結凝似作瘰癧急灸法

獨頭蒜一斤　一味截兩頭去心作艾炷大與蒜稱貼瘰子灸之勿令破肉但取氣而已覺熱勿畏每七壯易蒜可至七易取消

治五種瘰癧牡蠣散方

牡蠣煅研　連翹各一兩炒上　二味爲細散每服一錢臨卧無灰酒調下差後更服一兩永不發

瘰癧寒熱

論曰甲乙經論瘰癧寒熱皆鼠瘻寒熱之毒氣留於脈而不去上攻於項腋之間風熱毒氣與血相搏則榮衛不和故瘰癧而發寒熱也

連翹丸方　治瘰癧寒熱結核在項腋之下堅痛

連翹　玄參　木香　升麻各一兩半　大黃蒸一兩

大麻子別研微炒　昆布各二兩　枳殼麩炒一兩半

共八味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸食前米飲下加至二十丸

木香消毒湯方　治瘰癧連連大小寒熱煩悶

木香　大黃生用各半兩　竹葉乾者一分　連翹一兩

獨活半兩　梔子仁一分

共六味每服三錢水酒童子小便共一盞同煎溫服

瘰癧久不差

論曰風熱毒氣蘊積腑臟攻於筋脈則結爲瘰癧其毒氣所感深者則衝發肌肉令久不差此疾尤忌憂思恚怒氣血勞傷飲食寒冷

漏蘆湯方　治瘰癧久不差將欲破者

漏蘆去蘆頭半兩　海藻半兩　連翹一兩　沉香半兩

山梔子仁一分　玄參　丹砂各三分

右七味擣篩每服三錢水煎溫服

烏雞丸方　治瘰癧久不差

烏雞卵一枚　錫貝子

二味將錫貝子入在雞卵內用濕紙裹頭七重再用泥固濟火煅過後入地坑內出火毒一宿取出研細入大黃末半兩麝香一錢同研細鍊蜜丸如菉豆大空心茶水下五十丸不過五服效

連翹湯方　治瘰癧不差敗肉生肌

連翹　犀角各一兩　玄參　木通　黃耆

漏蘆　杏仁去皮尖雙仁炒黃各一兩半

共七味擣篩每服五錢水煎食後溫服日二

聖濟總錄纂要卷之十九終

聖濟總錄纂要卷之二十

程　林雲來　纂

新安　查元佐明茲

張　式嘉敍　較

程　寧彥藩

癰疽門

附骨癰　附骨疽在後　乳癰　腸癰

胃脘癰

癰疽統論

[illegible]治凡有瘍者受其藥焉蓋非專門之學不足以深究博識故也人之氣血與天地同流經絡常數與晝夜同度一或壅而不通泣而不利則血老不作汁肉陳不脫垢蒸氣不達癰疽內熱甚於焚溺治之不可緩是以喜怒憂樂之不時飲食居處之不節芳草藥石之發動內使陰陽不平而蘊結外致榮衛凝澁而腐化輕者起于六腑浮淺而爲癰外消膚肉經所謂榮衛稽留於經脉之中血澁不行衛氣壅遏不通熱甚則肉腐爲膿然不陷肌膚骨髓不爲焦枯五臟不爲傷損其皮薄以澤是也　重者發于五臟蘊結而爲疽內消骨髓經所謂熱毒熾盛下陷肌膚骨髓焦枯五臟涸竭當其病下良肉無餘其皮夭以堅上如牛領之皮是也夫瘡腫之患莫大於癰疽明乎二者則凡腫毒丹瘮可以類推矣故證有淺深治有輕重若瘡發之初湯液疏其內鍼石疏其外內外之治不同也五臟內虛則平補內實則駃利補瀉之法不同也瘡發於虛處則難差發於實處則易愈則其生有虛實之辨富貴體逸危殆者多貧賤形苦困篤者少則其形有苦樂之辨淺瘡欲在厚處攻之易平淺瘡欲在薄處達之易及則肌肉皮膚有厚薄之辨脉見洪滑麤散其病難治脉見微澁遲緩其病易治則脉之與病有應否之辨凡癰之類其氣浮達宜灸焫而不宜鍼烙凡疽之類其氣深沉宜針烙而不宜灸焫此灸焫針烙之異也淋射搨貼以清腫毒膏潤溫養以生肌肉此先後終始之序也昔人論癰疽病者慼於人神所在不可妄行鍼鍼刺見血不知神之與形固爲休戚體既不平神焉能定內經癰疽不得頃時回恐內爛筋骨穿通臟腑豈有人神之忌耶

癰疽所生忌穴

背面九處不可患瘡

第一入髮際爲玉枕亦爲舌本　第二項頸節　第三爲崇骨　第四大椎爲五臟　第五脊骨兩邊肺俞穴　第六夾脊骨兩邊脾俞穴及肝俞穴　第七脊骨兩邊腎俞二穴　第八後心鳩尾穴　第九鳩尾骨穴

正面五處不可患瘡

第一喉骨爲重關　第二當胸前爲神舍　第三爲心鳩尾　第四當乳穴　第五臍下二寸爲腸屈之間

側面三處不可患瘡

耳下近耳後牙車尖央陷中爲喉脉一穴

當脇下下穴爲肩骨　承山上三寸一穴爲腨腸

辯癰疽證候美惡法

夫癰疽外發其理易明至於內癰內疽隱而不見目既不接治之至難然五臟六腑有俞募壅結固於中而自形於外外察其部內審其源定藥按方若拔芒刺然則癰疽之發有五善七惡之證不可不察也　煩躁時嗽腹痛渴甚或瀉利無度或小便如淋一惡也　膿血大洩腫焮尤盛膿色敗臭痛不可近二惡也　喘麤短氣恍惚嗜睡三惡也　目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上視者四惡也　肩項不便四肢沉重五惡也　不能下食服藥而嘔食不知味六惡也　聲嘶色脫脣鼻青赤面目四肢浮腫七惡也　動息自寧食飲知味一善也　便利調勻二善也　膿潰腫消色鮮不臭三善也　神彩精明語聲清亮四善也　體氣和平五善也

癰疽發背治有專門寒熱虛實善惡淺深陰陽臟腑不深諳者恐多錯誤東垣曰少有差謬變症甚於傷寒未

可按方療治故一方不錄其餘一切癰瘍瘡毒則精選不遺也　辛酉麥秋程林識於淮陰師古堂

附骨癰

論曰凡身體盛熱不可當風冷之氣入於肌肉則熱搏伏不得出故附着於骨而成癰也其狀無頭但腫而潤皮膚薄澤者以毒氣伏留于內故也法宜外散其寒內達蘊結之熱

治附骨癰方

新鼠皮一張　一味看瘡大小裁貼日二次若出膿已潰

者用豬脊脂貼吮膿出盡即差

治附骨癰方

萞麻子去殼不拘多少　一味研令細取塗癰上日三兩度即差

治附骨癰方

生地黃一盞取汁　一味用銀石器中煎如膏候冷塗傅癰上日三五度即差

乳癰

論曰足陽明之脉自缺盆下於乳又衝脉者起於氣衝並足陽明之經夾臍上行至胸中而散蓋婦人以衝任為本

若失於將理衝任不和陽明經熱或為風邪所客則氣壅不散結聚乳間或硬或腫疼痛有核皮膚焮腫寒熱往來謂之乳癰然風多則腫硬色白熱多則腫焮色赤若不即治血不流通氣為留滯與乳內津液相搏腐化為膿然此疾產後多有者以衝任之經脉上為乳汁下為月水新產之人乳脉正行若不自乳兒乳汁蓄結氣血蘊積即為乳癰又有因乳子汗出露風邪氣外客入於乳因氣留不行傳而為熱則乳脉壅滯氣不疏通蓄結成膿疼痛不可忍世謂吹乳速宜下其乳汁導其壅塞散其風熱則病可愈

黃芩飲方　治乳癰初覺赤腫有異於常

黃芩　甘草炙令黃　桑上寄生炙　麥門冬　赤芍藥　防風　黃耆炒各一兩　木通半一兩　右八味擣篩每服三錢入棗三枚同煎再入乳糖一分更煎令消溫服日三早晨日午夜臥各一服

鯪鯉甲散方　治乳癰疼痛結硬不可忍

鯪鯉甲一兩燒灰　栝樓一枚燒灰　二味研和為散每服二錢空心用葱調酒下

牡蠣散方　治乳癰初發腫痛結硬欲成膿令一服差

牡蠣取腦頭厚處生用　一味細研為散每服三錢研澱花冷酒調下如癰成潰者以藥末傅之仍更服藥一日三服

樺皮散方　治乳癰初發腫痛結硬欲成膿一服差

以北來真樺皮燒灰酒服方寸匕就病乳處臥及覺已差

甘草飲方　治乳腫痛慮作癰毒

甘草半炙令赤兩半生用　栝樓一枚去皮取瓤　二味先以酒二盞煎甘草至一盞入栝樓瓤同絞和勻濾去滓溫頓服未差更作服之

丹參膏方　治乳癰疼痛

丹參　白芷　芍藥炒各二兩　三味以苦酒浸經一宿又取猪脂半斤微火上同煎之令白芷黃其膏成去滓以膏塗癰腫處差

乳香塗方　治乳癰

乳香一兩研末　丹砂半兩研末　葱白三兩切　三味先研葱令細入二物末再研令勻塗傅乳上乾即易之

治乳癰結硬疼痛方

泥和芥菜半斤　一味剉碎以水四升煮取二升傾於瓷

瓶內熏乳腫處日三五度即差

治乳癰結硬疼痛方

和泥葱半斤　一味細剉以水四升煮十數沸于瓷瓶子內盛熏乳腫處令卽再煖以差爲度

連翹湯方　治吹乳乳癰

連翹　瞿麥穗各一兩　升麻　生乾地黃　芍藥各三分　甘草炙一分　射干半兩　玄參三分

右八味細剉如麻豆大每五錢水煎溫服食後

腸癰

論曰腸癰爲病其身甲錯皮膚急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱或惡寒自汗其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪數者膿已成不可下也

牡丹皮湯　治腸癰

牡丹皮一兩　芍藥　生乾地黃　丹參各二兩　桔梗炒　麥門冬去心　薏苡仁各一兩半　赤茯苓　甘草炙　敗醬各一兩

右十味擣篩爲粗末每服用藥五錢入生薑五片同煎空心日晚溫服

附子湯方　治腸癰

附子去皮臍　敗醬各三分　薏苡仁一兩半　右三味㕮咀如麻豆大每服三錢水煎空心日晚溫服下膿血卽差

大黃牡丹湯方　治腸癰

大黃炒　牡丹皮各二兩　桃仁湯浸去皮尖雙仁半兩　芒硝研　冬瓜仁各二　右五味擣篩粗末每服用五錢白水煎空心溫服以利下膿血爲度

薏苡仁湯方　治腸癰

薏苡仁一兩　牡丹皮　桃仁湯浸去皮尖雙仁各一兩　瓜子仁半兩

右四味擣篩每服五錢水煎空心日晚溫服

胃脘癰

論曰內經謂人病胃脘癰者當候胃脉其脉沉細者氣逆氣逆者人迎甚盛甚盛則熱人迎者胃脉也逆而盛則聚於胃口而不行故胃脘爲癰也夫陰陽升降則榮衞流通氣逆而隔則留結爲癰胃脘癰者由寒氣隔陽熱聚胃口寒熱不調故血肉腐壞以氣逆於胃故胃脉沉細以陽氣不得下通故人迎甚盛令人寒熱如瘧身皮甲錯或咳或嘔或吐膿血觀伏梁之病亦有俠胃脘內癰者以其裹大膿血居腸胃之外故也

射干湯方　治榮衞不流熱聚胃口血肉腐壞胃脘成癰

射干去毛　梔子仁　赤茯苓　升麻各一兩　赤芍藥　白朮各一兩半　右六味㕮咀如麻豆大每五錢水煎入生地黃汁一合再煎三沸溫服不拘時候日二服

麥門冬湯方　治熱氣留聚胃脘內結成癰

麥門冬　犀角　萎蕤　薺苨　赤芍藥　石膏各一兩半　甘草炙　紫雪各一兩　右八味擣篩每服五錢水煎入竹瀝一合再煎二三沸溫服

芍藥湯方　治胃脘蓄熱結聚成癰

赤芍藥　犀角　木通　石膏　升麻各二兩　甘草生　朴硝　玄參　麥門冬去心各一兩

右九味擣篩每服五錢水煎溫服不計時候

附骨疽

論曰附骨疽者由風入骨解與熱相搏復冷濕所折風熱伏結不得發散蘊積成毒故附骨而爲疽喜發於大節解間按之應骨皮肉微急隱在肌而不外見是也治之宜急稍緩則膿不得潰而肢體變青黯者不可治也

漏蘆湯方　治附骨疽

漏蘆去蘆頭　升麻　連翹　麻黃去根節各一兩　防己三分　大黃炒一兩　木香　白歛　沉香各三分

右九味擣篩每服五錢入竹葉七片同煎更入芒硝一錢攪勻空心溫服取利三兩行爲度未利再服

敗醬湯方　治附骨疽

敗醬二兩　大黃炒一兩　桃仁二兩　三味擣篩每服五錢先取皂莢刺一兩剉碎以水二盞煎至一盞半濾出下藥及朴硝一錢同煎空心溫服

內消小豆散方　治附骨疽

赤小豆一合　糯米五合炒黑　二味爲散水調如糊塗攤故帛上貼乾即易之

瘡腫門

諸瘡　諸惡瘡　反花瘡

諸瘡

論曰諸瘡皆緣風溼熱毒之氣種類甚多載之方書備矣然有俗名瘡本論未見採錄考之皆不離于邪氣逆肉理害肌膚者今隨症以治法附之雖田野下俚取而用之判然可曉不必泥于誦襲也

露蜂房散　治頭面上無名瘡黃水不止

露蜂房　蛇蛻　各燒灰等分入膩粉少許拌勻麻油和傅

黃香餅　治鬈毛瘡在頭上初生如葡萄痛不止

川鬱金五錢　川栢一兩　乳香炙一分

共末桃花水和作餅貼之

龍骨散　治髮際瘡初生如粟米大或痒或痛

白龍骨　胡粉　烏賊魚骨去甲五錢　鈆丹炒紫五錢

共研用鹽湯洗過貼之日二三次

海帶散　治緊唇上瘡

海帶　焙乾爲末臨臥貼上二三宿即差

白龍散　治眼瞼瘡目大眥出膿汁有孔子

龍腦　馬牙硝五錢　菉豆粉一錢

研極細用燈心蘸藥點之日四五

井中苔散　治徹耳瘡

井中苔　土馬騣等分　焙乾共末麻油和傅患上日二

馬齒莧塗　治唇緊面腫

馬齒莧　去根洗淨搗取汁塗之冬月用末水和塗日二

麝香散　治鼻瘡侵蝕鼻柱

麝香研　草烏一錢燒灰　共研勻乾摻日二三

百合散　治頤頦瘡一名獨骨瘡

百合　川栢　白芨一兩　蓖麻子五十粒

共研用朴硝水和作餅貼瘡上日二三次

紅粉散　治粉鈆瘡繞頸項赤爛多汁

密陀僧煅　白龍骨煅五錢　胡粉一錢　鈆丹炒紫一錢

共研油和塗日三

芙蓉傅　治腮腫痛或破或捻
芙蓉葉　取生者爛擣如泥傅之帛繫一日換
敗蹄散　治天柱瘡生脊大椎上如錢大赤色出黃汁不止
驢蹄片燒炒 刀削二十　胡粉熬一分　麝香少許
共研末後用米醋麪糊和成膏塗上已破乾摻日二

諸惡瘡

論曰內經云諸瘡瘍皆屬心諸痙腫皆屬脾蓋心主血脾主肉也由體虛受風溼邪毒與氣血相搏故發瘡也甚者

焮腫滿痛潰而多汁或形體爲之壯熱稍緩不治則毒氣內攻難以療也
麝香散　治一切惡瘡久不差
麝香當門子二枚　丁香　木香　紫檀香一分　乳香
沒藥炙五錢　共末用雞子清和勻入殼內飯上蒸熟曬乾研分六服茶飲下日二
膩粉乳香散　治一切惡瘡久不差者
膩粉二錢　乳香一錢　葱白一根煨熟
共擣爛攤帛上貼之三日一易差

二黃散　治一切不測惡瘡年深不愈
大黃　川連　山梔　白芨　青黛　連翹五錢
共末水和塗
白香散　治一切惡瘡久不差
楓香脂　膩粉　防風一分
共研末用甘草水洗過傅上痛立止
蛇床子散　治一切惡瘡久不差
蛇牀子　膩粉　硫黃一分　共末用麻油和傅日二

反花瘡

論曰瘡生惡肉久則反出瘡外故名曰反花瘡其初如飯粟破之血出餘毒尚熾惡肉隨生根深而膿潰皆風熱毒氣所作
甘草塗　治反花瘡
甘草半生半炒　白礬枯　人中白煅　密陀僧各五錢
共研爲細末用童便慢熬成膏煎葱椒水洗過傅上日三五次差
胭脂塗　同上
胭脂一兩　胡粉半兩　共研勻以鹽湯洗過乾塗日三次差

藜蘆傅　同上

藜蘆（研爲細末）　雄猪脂（一兩）　化猪脂入末和成膏塗患上日三五次

柳槐煎　同上

柳枝葉　槐枝葉　細剉各二升用水五升煎減半去滓煎如稠餳塗患上日三五

浸淫瘡　下注瘡　冷瘡　月蝕瘡

浸淫瘡

論曰心惡熱若風熱蘊于心經則神志躁鬱氣血鼓作發

于肌膚而爲浸淫瘡也其狀初生甚微痒痛汁出漸以周體若水之浸漬淫泆不止故名曰浸淫其瘡自內而出流散四肢者輕以毒氣外出故也從四肢反入于內則重以毒氣內入故也

升麻湯　治心有風熱淫瘡偏體

升麻　大黃　片芩　白芍　枳實（一兩）　甘草　川歸（五錢）　水煎五錢入燈心一把空心溫服日二

鯽魚塗　治瘡癬浸淫

生鯽魚（三四寸長者一尾）　香豉（一合）　搗極爛塗瘡上日二易

雄雞冠血塗　忽得浸淫瘡不早治遶身周匝則能殺人

雄雞冠血（性烈雄大者）　用針刺取血塗傅瘡日二五次（即差）

燕窠傅　治浸淫瘡久不差

胡燕窠　取向東方者爲細末用葱椒水洗過傅瘡上日二三效

苦楝根傅　同上

苦楝根及皮　燒灰研細用猪脂和傅瘡上日二三

下注瘡

論曰足三陰之脉脾腎肝之經也并起于足大小指之內

循足跗內踝而上膝脛中若風溼毒氣乘之則榮衛枯濇稽留不行氣脉下注于脚膝脛間故令皮膚腫軟結核成瘡膿水不絕綿歷年歲愈而復發以毒氣自上而下如水之注故名曰下注瘡

枳殼丸　治毒氣下注脚膝脛背瘡

枳殼（去白炒二兩）　懷生地　五加皮　防風（一兩）　羌活（一兩）　黃芪（三兩）　共末入蜜杵丸如梧桐子大空心酒下二三十丸日二

蚯蚓泥散　治下注瘡久不差

蚯蚓泥非菜地上燒赤研一兩　膩粉一分　麝香五分

共末用葱湯洗過乾傅

白黃散　同上

白枯礬一分　川連五錢　膩粉一錢

共研勻以雞子白和塗患上日二

鯽魚散　同上

鯽魚去鱗腸一尾三四寸大　川連五錢　鉛丹　胡粉　蜜陀僧煅赤研一錢

共末入魚肚內縫扎用泥固濟燒赤出火毒研末入猪膽汁和傅日二　此方亦治惡毒瘡

蒜灰散　治一切惡毒風溼瘡下注血氣冷新肉不生者

蒜大者十頭　去衣根苗切片暴乾入小鐵鍋內淨盆蓋之用鹽泥封固不令透氣以火鍊成灰出火毒研細乾傅瘡上日二此治冷惡瘡最妙若熱毒惡瘡不可傅傅之肉反爛開故也

冷瘡

論曰形不足者溫之以氣氣能養形故也周官瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍有五氣養之法蓋以氣不足則血不行血不行則經久不差所謂冷瘡是也蓋諸瘡既資風冷之氣客于榮衛傷於肌肉故令瘡冷而不痛痒俗謂之冷瘻治宜溫肌養心滌瘀除膿則愈

二黃散　治冷瘡不愈

雄黃　雌黃　定粉　膩粉　蜜陀僧一兩　乳香炙一兩

共研末入生蜜和傅日二

葱白湯蒸法　治一切瘡風冷腫痛皆因瘡腫坐于水中及風所致若腫脹入腹則能殺人

葱白　薤白半斤　川椒　香豆二合　川芎一兩　防風二兩

共粗搗用長瓮瓶內藥入水三升以故帛紙數層封

口緊縛重湯煮熟取孔通氣以瘡當氣口上射之令瘡出黃水盡即止日二次

月蝕瘡

論曰月蝕瘡小兒多有之蓋由豎人甘榮衛不清風溼毒熱之氣蘊積腑臟其瘡多生于兩耳及鼻面間并下部諸孔竅側侵蝕之甚則潰爛黃赤汁流達于筋骨月初則瘡盛月晦則瘡衰以其隨月盈虛故名之月蝕瘡或謂小兒以手指月而生未必盡然

水銀膏　治月蝕瘡多在耳上及竅傷隨月盈虛者

水銀一分 胡粉與銀研不見星 松脂 川連末五錢 猪脂四兩
熬脂化香去滓再熬入銀粉攪匀以鹽湯洗過傅瘡
上日二三
酥粉塗 治月蝕瘡
蠐酥五錢 胡粉一兩 共研塗瘡上日二三次
又方 治卒得月蝕瘡
地龍屎 猪脂 和塗患上日三次差
凍爛腫瘡 瘑瘡 漆瘡 湯火
凍爛腫瘡
論曰經絡氣血得熱則淖澤得寒則凝濇冬月嚴寒氣血

凝聚不流則皮肉不溫瘃音竹凍皴赤痛腫而成瘡輕則潰
爛重則損壞肢節也
白斂散 治大人小兒凍手皴裂成瘡
白斂末三分 白芨末五錢 油麻生搗二合 萊菔子二合
同爛研酒和塗日二
猪懸蹄膏 治手足凍瘡血出痛苦者
猪後懸蹄 夜半時燒灰存性研末以猪脂和膏成傅
上日二

雉腦膏 治凍面耳并手足凍瘡年年發者先痒後痛腫
破黃水及血出不止
雉腦雄者一枚搗 黃蠟同上 麻油半兩
慢火熬去滓收成膏塗傅日二三
羊肉湯洗 治凍瘡腫痒
羊肉 葱白半斤 用水煮取汁頻洗日二三差
川椒湯 治寒凍面目手足肉裂
川椒炒 白芷 防風 食鹽一分 川芎三分
水煎頻洗湯冷煖之

尸脚方 治人足在冬月常裂名曰尸脚
雞屎炒一升 用水三升煮五沸去滓漬洗足裂處冷即
易之以差爲度
牛膠散 治寒凍足跟破裂出血疼痛
牛皮膠 燒灰研末津唾和塗
瘑瘡 今之臁瘡
論曰瘑瘡者疥瘡之類由風熱濕邪客搏于皮膚之間變
化生蟲其狀生于皮肉之處手足尤甚赤根白頭相對並
生狀如小豆或若茱萸子淺深痒痛抓之汁出折裂成瘡

此蓋脾肺壅滯風溼乘之與熱相搏結聚而成治宜疏滌
于內傅藥于外并淋洗之頻灸第以治

藜蘆膏　治瘑瘡經久蟲出
藜蘆　枯礬　松脂　雄黃二兩　苦參半兩　猪脂半斤
共研末用脂熬末攪勻塗瘡上日二

胡粉膏　治瘑瘡經久不差
胡粉三兩　水銀二兩　皂莢十挺水浸挼取汁一斤
慢火熬汁五合入銀粉攪勻塗瘡上日二

雄黃膏　同上

明雄黃　川連一兩　片芩　胡松脂二兩　亂髮灰一分
雄猪脂六兩　用脂熬令髮盡去渣入末攪勻塗患上

蝦蟆灰塗　治溼瘑瘡
乾蝦蟆一隻燒灰研　髮灰各等分　猪脂和塗日二

漆瘡

論曰漆雖有毒性有所畏毒即中之亦有叔適然相近者
凡中毒輕痒始于面而胸臂髀腨應之頭面腫起赤延丁
目搔之隨手生瘖瘰已而細瘡如粟重則徧身作瘡小如
麻豆大若桃李紅赤腫焮異常痛楚旋差旋發如火燒之
狀是也

鐵漿飲　治漆瘡
鐵漿　用密絹濾過隨量飲之即差

又方　同上
柳葉三斤生者　用水一斗煮汁頻洗差

芒硝湯淋洗　同上
芒硝五兩研　用滾湯入硝浸洗日三次差

又方　同上
猪脂　熬化頻塗瘡上

蟹黃塗　治漆瘡焮腫痛楚
生蟹黃　用之頻塗瘡上乾即易之

雞子黃塗　同上
雞子　取黃頻塗乾易差

四和膏　治漆瘡徧身焮赤腫痛
麻油　松脂二兩　桂心末　黃蠟一兩　用油化脂蠟入
桂末和塗

川椒湯　治漆瘡
川椒　水煎湯頻洗之差

湯火瘡

論曰水火之氣當因其勢而利導之夫湯火所傷痛熱方熾通導而洩其氣可也苟救目前痛楚遽以冷物淋搨則熱毒冷氣內搏致有爛骨傷筋之患非熱氣本然也湯火之傷本非氣血所生病故治不及于湯液特在乎塗傅膏汁專治其外而已

清涼膏　治湯火傷

生山藥　洗淨去皮爛研如膏傅瘡上痛立刻即止且無瘢痕

雞黃塗　同上

雞子黃　將雞子煮熟用黃慢炒取油入膩粉攪勻傅上無瘢痕

戊巳散　治湯火瘡大熱腫痛

乾牛糞　燒灰存性為末用生麻油和塗日二次差

又方　同上

好米醋　用醋傾淨土上取醋泥傅之日二次立刻止痛無瘢痕

又方　同上

側栢葉　將葉燒灰存性羅過用生蜜和塗日二三差

聖濟總錄纂要卷之二十終

聖濟總錄纂要卷之二十一

新安　程林雲來　纂
　　　張潮山來
　　　戴曾亦魯　較
錢塘　胡爾槐植三

瘡腫門

丁腫　諸瘡　諸癬　代指（即天蛇頭）
丹毒　痱瘡　肉刺（即雞眼瘡）

丁腫

論曰丁腫者由風邪毒氣入于肌肉所生也凡有十種一者瘡頭烏而強凹二者瘡頭白而腫實三者瘡如豆䜴色四者瘡似葩紅色五者瘡頭內有黑六者瘡頭赤紅而浮虛七者瘡頭葩而黃入者瘡頭如金箔色九者瘡頭如茱十者瘡頭如石榴子亦有初如風疹搔破青黃汁赤褁有赤黑脉而小腫亦有全不令人知忽衣觸手撥着則痛若故取便不知處亦有肉突起如魚眼之狀赤黑碜痛徹骨久結皆變至爛疳瘡下深孔如火針穿之狀初作時突起如丁蓋故名丁瘡令人惡寒四肢強痛三日瘡變焦黑腫大光起根硬不可近犯之則痛徹骨其發于手足頭面骨節間為氣血所會尤宜速治不然毒氣入腹煩悶恍惚如醉人治無所施矣

丁腫方

河東柳宗元偶病丁瘡凡四十日他藥治之莫效長樂賈宜伯教用蜣螂心貼之一夕而穴百苦皆已次年春因食羖羊肉丁又大作再用之亦如神效按蜣螂在（心腹）下度取之其肉稍白者是也以此貼瘡半日許可穴再易之血盡根出而愈矣

巴豆塗　治丁瘡乃日本國傳來者

巴豆（去殼十粒）　半夏（一枚）　附子（半枚）　蜣螂（一枚）　各為末以人糞相和看大小瘡作紙圈子圍瘡口以藥傳上用絹貼之一日三易

地骨皮散　同上

地骨皮（五錢）　小麥　大麻子（各十粒燒灰）　緋帛（五寸燒灰）
亂髮（卵大燒灰）　半夏（七枚炒黃）　曲頭棘刺（二十枚燒灰即皂莢刺倒下多年者）
用骨皮半夏為末與各灰同研勻酒下二錢日二

乾薑胡椒傅　治一切丁腫惡毒

乾薑　胡椒炒　龍骨　皂莢去皮子炙　斑猫去翅足一兩

共末用酒和如膏貼上日二

諸疥

論曰字書以疥有介守之義言雖微小介然守形體而難治是以疥有五名皆因風熱邪氣客于皮膚之間久則化為蟲蔣作痛痒故作為瘡腫焮赤痛痒者謂之大疥皮內引起結根搔之不痛謂之馬疥瘙痒皮起謂之乾疥三者為重以風溼熱氣深在肌肉故也若水疥瘖瘰如瘵漿溼疥瘡小而汁出特風熱溼於皮膚之間故淺而輕俱風熱之客故皆有蟲或謂蟯蟲內出理或然也治宜疏風滌熱而以薰浴傳塗湯液並施則善

苦參散　治徧身瘙疥風身癢痒

苦參　白花蛇酒浸去皮骨炙、川連　川歸三兩　人參

玄參　丹參　白芍　防風五錢　白蒺藜炒去刺一兩

共末酒下二錢

快肌丸　治偏身瘡疥癢痒

威靈僊三兩為末　雄猪膽三枚　用膽汁和末丸梧子大荊芥湯下二十丸

防風丸　治一切風疥瘡癬皮膚瘙痒癮疹

防風　蟬蛻　猪牙皂二兩炙去皮　天麻三兩　共末用精羊肉煮極爛以酒熬成膏丸梧子大用荊芥酒下三十丸日二

苦參丸　治一切疥瘡

苦參　玄參　山梔　獨活二兩　甘菊　防風

大黃炒香熟　片芩　枳殼一兩　川連半兩

共末蜜丸梧子大酒下二十丸日二

五參散　治諸疥風虛惡瘡

人參　玄參　丹參　沙參　苦參　秦艽　白蒺藜炒　山藥　子芩　防風　麻黃去根節　獨活　茯神

細辛五錢　山梔　枳殼三分　烏蛇肉酒炙一兩

共末水下三錢日二

雞子油塗　治一切惡疥瘡

雞子七枚煮熟用黃慢炒取油　膩粉　髮灰　枯礬一分　石硫黃五錢

共研入油和勻塗上日三五次差

諸癬

論曰癬之字從鮮言始發于微鮮縱而弗治則浸淫滋蔓

其病得之風溼客于腠理搏于肌肉否澁久則因風溼而
變化生蟲故風多于溼則為乾癬但有周郭皮枯瘙痒搔
之皮起白屑者是也溼多于風則為溼癬周郭中如蟲行
浸淫赤溼搔痒汁出是也風搏于氣血則為風癬癬痺不
痛痒是也如錢形則為圓癬如雀目則為雀目癬亦皆赤
痛而瘙痒又或牛犬所飲之水刀刃磨滓之濺取以盥濯
毒氣傳人亦能生癬故得于牛毒者狀似牛皮于諸癬中
最為瘑厚乃邪毒之甚者俗呼為牛皮癬狗癬白點而連
綴刀癬縱斜無定形凡此八者皆風溼毒氣搏于肌中故

痛痒不已久而不差又謂之大癬

苦參丸　治一切風癬皮膚瘙痒

苦參　烏蛇肉炙四兩　石菖蒲二兩

共末入蜜丸梧子大酒下二三十丸

丁香散傳

丁香　蝦蟆灰一兩　麝香一分　枯礬　五倍子

膩粉五錢研　各末研匀傳上

一抹散　治乾癬

天南星　草烏頭各一枚生為末　用羊蹄根擣取自然汁調

塗三日差

狼牙丹砂膏　治一切乾溼諸癬

狼牙　丹砂　枯礬　雷丸　雄黃　藜蘆　硫黃一兩

共末入豬脂和成膏日塗三五次

代指　即天蛇頭

論曰瘡發指端爪甲脫落名曰代指蓋爪者筋之餘筋骨
熱盛注于指端故其指先腫赤熱焮痛結聚成膿甚則爪
甲脫落世俗謂之遭指又名盜指又名代甲其實此病類
于指疽然無蘊毒故色不黯黑即病雖久亦不殺人也

漏蘆湯　治代指筋骨臟腑中熱焮赤腫痛

漏蘆　升麻　子芩　大黃炒一兩　玄參三分

水煎五錢入淡竹葉二七片煎減半去滓入芒硝一
錢再二三沸溫服日二巳利去芒硝

地龍散　[illegible]

地龍　去泥瓦上炙為末用豬脂和塗患上日二

升麻湯浸　治代指雖內無蘊毒然筋骨中熱氣壅盛

升麻　生甘草一兩　用水煎去滓入芒硝末一兩攪勻
浸指數十次

蚯頭疔瘡痛不可忍臭不可聞　蜈蚣一條焙乾爲末豬
膽汁調　又用黑豆生研末入繭內籠之

醬蜜塗　治代指不結膿
醬汁　白蜜　二味和煎令沸稍熱塗上日三五次

熱湯蘸　治代指爲五臟氣流注十二經毒熱冲于手指
熱湯　急蘸五七次令水凌之又復如此三度便塗羊
膽汁差未成膿者用此方甚效或以豬膽盛代指用
線扎之亦妙

諸丹毒

論曰熱毒之氣暴發于皮膚間不得外洩則蓄熱爲丹毒以其色如塗丹之赤又復陽氣伏于皮膚中故謂之丹因熱氣慓悍其發無常處大則如掌甚則周流四肢若不急治或壞爛出膿血若發于骨節之間則以藥斷截毒氣入腹則能殺人治法用鈹割明不可緩故也

漏蘆湯　治丹毒遊走
漏蘆　升麻　白芍　子芩　白歛　白薇
麻黃去根節　甘草　大黃各一兩　水煎五錢溫服日二

赤小豆塗　治丹毒如掌大身赤腫痛痒、
赤小豆　爲細末以雞子白和如膏塗丹上日二

吳藍湯搨　治丹毒
吳藍　升麻　石羔　片芩　白歛　犀角各一兩
生地三分　山梔　大黃五錢　水煎一兩入竹瀝浸搨

羚羊角塗　治赤黑丹毒
羚羊角燒灰　研細以雞子白和如膏塗患上日二次差

鹿角散塗　治赤黑丹
鹿角　燒灰存性研末入熟豬脂和塗日二

疿瘡

論曰內經謂汗出見溼乃生痤疿蓋熱盛汗出陽氣發泄而腠理疎反以寒水洗浴則熱氣內鬱於皮膚之間輕則爲疿重則爲痤也世俗通謂之疿子其狀皮肉如毫針所刺痛癢細瘡如麸片愈而復發是也

葛粉傅　治疿子
葛粉三兩　生甘草一兩　風化石灰五錢微炒　共研撲之

活石豆粉傅、治疿子
滑石飛過　菉豆粉　棗木葉　共研末傅之日三

乾壁土傅　治暑月肌膚瘡爛或因搔成瘡者

陳乾壁上（取向東方者） 研細傅之日三四次隨手即愈

肉刺

論曰肉刺者生于足指間形如鞕瓜與肉相附隱痛成刺由靴履急窄相摩而成名爲肉刺俗呼爲雞眼睛是也

膠脂膏貼 治肉刺

栢木上白膠 明松脂（兩） 黄蠟（五錢）

將膠脂熬化入蠟成膏貼之

酥粉傅 治肉刺

蟬酥（自取者） 膩粉（一錢） 將酥浸溼入粉研勻用鍼撥破塗上密裹日二

硇砂傅 同上

硇砂 用醋化熬成霜以少許和栢膠傅之其根即出

金瘡門

金瘡血不止 金刃傷中筋骨

金瘡中風水痓 金刃腸出

金瘡血不止

論曰血行脉中周行灌溉而無窮已金刃所傷探則其流湍激若海溲河決禦之至難要在杜其沖溢之勢外觀其形內訂其脉之何如若血出不斷其脉大而止者爲難治若血出不止前赤後黒或黄或白肌肉腐臭寒冷鞕急者爲難治不可不察也

麻黄散 治金瘡止血悶疼痛

麻黄（兩半） 白芷 附子 白芍 川歸 續斷

乾薑 炙甘草 藁本 川芎 桂心（五錢）

共末酒下二錢日二

天南星散 治刀刃所傷血出不止

天南星（三枚） 鉛丹（炒紫一錢） 共末研勻乾貼患上日二

刀箭方 治血出不止

石灰（遠年者一兩） 鉛丹（炒二分） 龍骨 狗腦骨（燒五錢）

共末傅上日二

風化散 治金瘡止血定痛

風化石灰（一升） 乾薑（三分） 韭菜子 白薬（五兩）

午日共末以備後用

石榴花散 同上

石榴花（乾者五錢） 石灰（炒半升） 共末用少許傅上少刻斷血止痛

蒲黃散　治金瘡血出腹脹欲死
蒲黃　生地黃（半兩）　川芎　白芷　川歸　黃芪
續斷（一兩）　甘草（三分）　共末空心酒下三錢令腹中死血
化為水日三若口噤用物斡開灌之加大黃兩半

金刃傷中筋骨

論曰金刃所中至于筋骨其所傷深矣然接骨絕筋亦可接續要在乘血氣未寒急施治法若不乘熱則風冷易入瘡纔暫愈後必不仁亦致痛煩而終身不完至于小碎之骨卽當出之不爾則膿血不絕肌肉亦不能收斂矣

骨碎補丸　治一切金刃傷中筋骨風冷所入疼痛
骨碎補（三兩）　山藥　附子　虎骨（炙）　桂心　白檳榔
自然銅（醋淬七次）　熟地　敗龜板（醋炙）　白薇　山萸肉
澤蘭葉（一兩）　五味子　川歸　乾薑（五錢）　肉蔻（二枚）
肉蓯蓉（二分）　共末入蜜杵丸如梧子大酒下二三十丸
日二

金瘡中風水及痙

論曰金瘡中風水者以封固不密所致也夫中風之候其倉卒無汁中水之候則出青黃汁而又疼痛發熱內腫硬肘為痙狀可急治之凡痙狀口急背直搖頭馬鳴腰為反折須臾十發氣息如絕汗出如雨治不可緩緩則不能救療

熟地丸　治遠年傷折忽因風氣于舊處痛不可忍
懷熟地（四兩）　杏仁（去皮尖炒）　牛膝（兩半）　黃芪　苦參
兔絲子（酒煮）　肉蓯蓉　萆薢（一兩炒）　升麻　桂心（一分）
青木香（一分）　訶勒皮（五錢）
共末入蜜丸梧子大酒下二三十丸日二

雞屎白豆酒　治金瘡中風反張者
雞屎白（一合）　大豆（二合）　先以豆炒焦黑入屎白同炒熱

又以瓶貯酒三升乘熱豆傾酒中蓋良久去滓服五合少頃又服取汗出飲酒後以薑粥助之

羌活飲　治金瘡并傷折骨諸瘡腫慎不可當風臥溼地取涼若風溼所傷則發痊口噤殺人若覺頭項強身拘急便服
羌活（一兩）　竹瀝（三鍾）　用水煎羌活減半去滓入瀝再沸
分三服

川椒散　治金瘡中風
川椒（生用三兩）　看瘡大小用麪作餛飩包火中炮熟乘熱

開一孔當瘡上懸之勿引風出多做候換數次差
川芎湯　治金瘡中風痛不可忍
川芎　防風　羌活　川歸一兩　炙甘草三分
水煎六錢熱服取汗如汗不出加麻黄一兩桂心三
分湯成入竹瀝沸服日二
鹽韭傳　治金瘡中風水腫
韭白　食鹽等分　共擣爛放瘡上以火炙藥上熱徹愈
又方
鹿角　燒灰存性研末用豬脂和塗日二差

金瘡腸出
論曰金刃所傷有腸出者有腸出已斷者視其輕重以決
死生腸有一頭見者不可續也若腹痛不可忍短氣不能
食近則一日遠則三日治無及矣腸有兩頭見者速以桑
白皮接作線或以麻線縫之仍用雞冠血塗際勿令氣洩推
內之斷縫瘡口用雞血塗之腸有出而不斷者以大麥
汁洗而內之亦如前法須研米粥飲二十餘日強糜百日
方可食飯又不可令飽恐其腸斷仍常以湯散助之
磁石散　治金瘡腸出宜入之
磁石七次醋淬　滑石飛過等分　同研酒下一錢日三及以針
砂塗腸上其腸自收入而無害
小麥飲噴腸方　治金瘡腸出不能入
小麥三升　用水九升煮汁五升以綿濾過候冷含噴瘡
上漸入以冷水噴其背不令病人知亦不可使傷人
語卒然忽噴其腸自入不可食飽勿使病人驚恐恐
驚則殺人難治
毒箭所傷　箭鏃金刃入肉　狐尿刺
惡刺　竹木刺傷肌肉不出

毒箭所傷
論曰箭鏃毒藥入皮膚肌肉間令人短氣悶絕口噤脣乾
血雖止而腹滿不能言其人如醉者爲難治若瘀血應時
出其瘡濕而熱開口能言則可治巢氏論毒箭有三種曰
嶺南夷俚人用焦銅作箭鏃其嶺北諸處以蛇毒螫物汁
着管中漬箭鏃及有以菌藥爲之者丞種傷人皆不易治
唯急飲糞汁可以解其毒少緩則毒氣淺入不可救也慎
之慎之
半夏飲　治毒箭所傷箭鏃毒藥在內不出

半夏三兩用生薑二斤取汁浸三日 白歛三兩 同炒爲末酒下一錢
日五瘡淺十日出瘡深二十日方出

雄黃塗 治毒箭所傷

明雄黃 研極細傅瘡上日四五汁出愈 此方治毒蛇蜈蚣咬亦妙

生薑飲 治中毒箭

生薑 取自然汁飲五分未退再飲 一方用甘草煎汁頻飲

旋復根散 治中毒箭

旋復根 爲末酒下二錢日三仍傅瘡上 無根用花

箭鏃金刃入肉

今日凡箭鏃金刃入肉治宜速出內有碎骨亦須去盡然後傅藥不然其瘡必不合縱然少愈亦常作疼痛若神驚血亂氣奪則死無救

丹皮散 治金瘡箭頭在骨多年不出

丹皮 白歛各一兩 丁香 麝香 藿香 桑白皮各一分

共末溫酒下二錢淺者十日深者二十日箭頭自出

又方 同上

磁石極細研 明雄黃各三分 同研勻用菉豆煮汁下二錢
十日後輕撥便出手足上用此末點之亦自出

紅散子 治中箭頭用之摩瘡口上

曼陀羅子 草烏 茄子花 蓖麻子 麒麟竭各五錢

共末以好酒和調塗摩瘡上箭頭自出

解骨丸 治箭鏃不出能令自出

明雄黃 象牙末 蜣螂各一兩 共末入蜜杵丸黍米大用一丸內瘡中以細膩羊腎脂貼之箭頭自出

鼠肝傅 治箭頭不出

鼠肝五枚 研如泥傅之兼以鼠腦髓塗之良亦治針折

肉中塗之自出

象牙散 治箭頭不出

象牙屑 研末用蜜和塗瘡上并折針竹木刺皆出

狐尿刺

論曰狐尿刺者乃狐狸尿草棘上人有悞犯則發腫痛焮熱多在手足指節然亦有端居不出而被此毒者蓋毒氣有相類之症亦不因狐狸尿乃爾也

白歛膏 治犯狐尿久不差

白歛 羊屎 括蔞根各五錢

共擣如膏褁瘡上一伏時其刺自出

大豉傅 治狐尿刺在手足指節間腫痛

大豉一兩 細嚼熟傅之少頃取下看豉中有毛效如不見毛又嚼傅之以毛出為度

桂心黃蠟丸 治一切惡刺入肉者

桂心 研末用黃蠟化丸看瘡口大小置丸瘡內以溼紙三五重搭蓋以火焇候丸化入肉其刺自出如無刺其傷處亦平也

獨栗塗 治惡刺不出

獨顆栗 去衣嚼如泥塗瘡上帛褁半日有刺自出

惡刺

論曰惡刺初得以蛇虺毒氣經由草木水澤間有人涂着忽似刺劄俄致腫痛其肉潰爛若手足上着之即指節墮落土人謂歷既多初覺中刺時以艾灸數十壯十愈八九灸弗愈者速以下藥塗傅

葱白蒲公草膏 治中一切惡刺

葱白一把 蒲公草五兩 大豉一分

共爛擣塗瘡上外用醋麪紙封自出

木蟲塗 治惡刺

木中蟲五枚 用米醋和研如泥封之差

黑豆汁漬 同上

黑豆一升 用水煮取濃汁頻頻漬之差

竹木刺傷肌肉不出

論曰竹木刺所傷爲患甚淺然入人肌肉久不得出則損動榮衛而作瘡或中風水則腫痛若成膿淹留歲月未易治也但刺傷之初宜速治之加以塗傅無致風水之患

羊屎傅 治竹木刺

羊屎 炙乾爲末用豬脂和傅日三五上經宿自出

象牙散傅 治竹木刺并鍼折不出

象牙屑 爲末以雄鼠腦髓和傅上立出

糯米膏 治金瘡水毒瘡疽熱毒竹木等刺

糯米三升 於端午日前四十九日以冷水浸之日二換水輕淘至午日午時曬乾挂風處凡遇患用少許炒焦爲末水和成膏塗瘡口帛纏候瘡愈解去若金瘡快把生水作膿腫甚者急用此膏塗之良久其腫處

即消若癰疽毒瘡初發紅焮腫痛併痄腮等症用
此末貼項下及腫處若竹木簽刺入肉者臨臥時貼
之明日揭看其刺自出在藥內若貼腫毒藥乾即換
之須常令溼為妙唯金瘡及水毒切不可換恐傷動
瘡口

痔瘻門

諸痔　牡痔　牝痔　脉痔　血痔
腸痔　氣痔　痔瘻　腸風下血

諸痔

論曰痔有五名一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四曰腸痔
五曰血痔症雖小異大率皆飲食飽甚情慾過度之所致
也夫飲食飽則腸胃傷情慾過則氣血耗毒氣乘虛流入
下部所以澼積而為痔也

如神丸　治腸風五痔
烏蛇肉酒炙　防風　大黃煨二兩　枳殼炒　黃芪
刺猬皮炙黑　陳皮　白蒺藜炒去刺　秦艽半兩
共末入蜜杵丸梧子大空心酒下三十丸臨臥再服
當日血止定痛

神妙湯　薰洗五痔
萆薢　甘草　五倍子　括蔞根　大戟
葱白等分　每日用一二兩煎水薰洗日二

神白散　治痔瘡下部發腫如梅李大痛硬不能行者即
時取效
半夏齊州者　每用一枚研極細入冰片一小皂子大同
研勻用津唾和攤紋紙上貼之即冷如冰良久清水
水漸消未全愈再貼去根尤妙

牡痔

論曰內經謂飲食自倍腸胃乃傷因而飽食筋脉橫解故
澼而為痔其狀肛邊生鼠乳或痒或痛膿血時下謂之牡痔

猬皮丸　治牡痔肛邊生鼠乳疼痛寒熱
猬皮炙焦　附子　槐木耳　枯白礬　川歸　桑白皮
赤芍一兩　楮根白皮炙
共末入蜜杵丸梧子大飲下三十丸

荊芥槐花散　治鼠乳牡痔便血痛不可忍
荊芥穗　槐花炒　枳殼炒　黃芪蜜炙二兩
共末空心飲下二錢

牝痔

論曰牝痔者由邪熱壅在肺經傳注大腸又大腸久虛風熱留滯故令肛邊生瘡而出血也名曰牝痔此皆酒食房勞過度令毒氣攻注所爲故又謂之酒痔

地榆湯　治牝痔肛門生瘡下血不止

地榆　子芩　赤芍　枳殼　檳榔　川歸　黃芪各一兩

水煎四錢空心溫服日二

淋洗白礬湯　治牝痔

枯白礬　研末每用五七分入沸湯內和勻淋洗日二差

脈痔

論曰脈痔者臟腑蘊積風熱不得宣通也風熱之氣乘虛流入下部故肛邊生瘡痒痛血出也蓋實爲痛虛爲痒今實熱乘虛下攻肛腸故痒且痛又脈者血之腑得熱則妄行故血乃出也

槐莢煎丸　治脈痔生瘡下血痒痛

槐莢一斤洗入水二升研取汁　白蜜二兩與莢汁同煎成膏　防風

黃芪炙五錢　杏仁去皮尖炒　皂莢子炒三分　枳殼炒一兩

共末與杏末拌勻入膏杵丸梧子大飲下二三十丸

日二

阿膠湯　治脈痔有蟲時作痒痛血出不止

阿膠炒　艾葉　川歸　青葙子一兩　水煎五錢溫服日二

熏洗槐白皮湯　治脈痔有蟲或下膿血

槐白皮二斤　用水一斗五升煎一斗傾盆中坐熏湯冷再煖蟲當隨便利自出仍用槐白皮爲末綿包錢許內下部中日二差

出蟲方　治脈痔下部如蟲咬

桃葉十斤　搗研蒸熟乘熱入小口器中坐熏其蟲自出

塗痔散　同上

白礬研一兩　取小便三升溫熱入礬末五錢乘熱洗之差

血痔

論曰血痔者乃肺熱流毒也肺與大腸爲表裏今肺蘊積熱毒氣流滲入于大腸血性得熱則流散故因便而肛腸重痛滿血隨出名曰血痔

蝟皮散　治血痔

蝟皮燒灰存性　白芷　黃芪　懷熟地　側柏葉

川續斷　地榆　川連一兩　共末空心飲下二錢日二

地榆湯　治血痔

地榆　熟艾　防風　枳殼炒　龍骨　黃芪

桑木耳一兩　水煎五錢入生地一分溫服日二

蒲黃湯　治諸痔下血

蒲黃　川芎　生地　白芷　川連　川歸　白石脂

甘草兩　水煎五錢空心溫服日二

黃芪散　治血痔下血不止

黃芪蜜炙　枳殼炒三兩　防風半兩　共末空心飲下三錢

日二

枳實槐角子散　治血痔下血久不差

枳實麩炒　槐角子　木賊五錢　共末用皂莢湯下二錢

日二

腸痔

論曰腸痔者以腸胃有風挾熱二者乘虛入于腸間冲發下部故令肛邊生核腫痛不消病始作令人寒熱時有血出也

枳殼湯　治腸痔腫痛生核或發寒熱

枳殼炒　子芩　白芍　黃芪一兩　川芎　川歸

檳榔煨　丹參一兩半　水煎五錢空心溫服日二

括蔞散　治腸痔下血

括蔞大者一枚　烏梅肉十枚　將蔞切蓋去空以梅肉實其中仍蓋封用黃泥包裹將乾火煅存性研末溫酒下二錢日二

地榆散　治腸痔下部生核腫痛時發寒熱出血

地榆　槐花半生半炒　甘草一兩　共末用枳殼桑白皮湯下二錢日二

又方　治一切痔淋洗

荊芥穗　生甘草二兩　同末水煎一兩淋洗日二

白朮紫朴丸　治久積虛冷腸風痔瘦面色萎黃虛劣

白朮　紫朴三兩　人參　甘草　川歸一兩　黃芪

黑乾薑　陳皮半兩　共末入蜜杵丸梧子大飲下二三十丸

二根散　治腸痔有血

枸杞根白皮　白薔薇根白皮二兩　共末水下二錢日二

氣痔

論曰氣痔者因便下血或肛頭腫凸良久乃收是也此由

毒氣蘊積腸間及恚怒不節酒食過傷令下部氣滋痿結而成

烏蛇黃芪丸　治氣痔大便下血脫肛腫痛

　烏蛇肉五兩　人參　獨活　枳殼　地骨皮一兩

　郁李仁去皮炒　羚羊角三兩　黃芪　檳榔一兩半　大黃炒

　大麻仁炒二兩　訶勒皮一分　共末入蜜杵丸梧子大酒

　下二十丸以利爲度未利加丸數

必效丸　治氣痔脫肛不收或生鼠乳時出膿血久不差

　枳殼麩炒　黃芪蜜炙　共末陳米糊丸梧子大空心飲下

　三十丸日二

痔瘻

論曰五痔之疾或生鼠乳或發寒熱或生瘡痒痛或下膿血其症不一治之不早反勞傷過度則毒氣浸漬肌肉穿穴瘡口不合時有膿血故成痔瘻經曰痔久不差變爲痔瘻是也又或蔓穿數處或形似螺蜆膿血與肌肉綿綿而下故謂之痔瘻昔人謂蟯蟲居胴腸間多生瘻痔方中用薰法及化蟲之藥不可不察

乳香丸　治一切痔瘻反花瘡

　乳香五錢　麝香　冰片　丹砂　沒藥二錢　雄黃

　黃蠟　生地一兩　共末研勻化蠟丸梧子大用麥冬湯

　下十丸少留末塗瘡上

蝟皮丸　治五痔多年不差漸成痔瘻

　蝟皮炙焦　龍骨煅二兩　附子　川歸　枳殼炒

　黑乾薑一兩半　黃芪蜜炙　艾葉三分　共末入蜜杵丸梧子

　大用黃芪湯下三十丸

腸風下血附結陰下血

論曰腸風下血者由腸胃有風氣虛挾熱血得熱即妄行因而滲入腸間故令下血故以爲名昔人謂先血後便爲近血先便後血爲遠血遠近之別不可不察

玉壺丸　治腸風下血

　皂莢鍼青嫩者半斤用水五升浸七日搗碎煮取汁一升又熬成半入蜜一兩熬成膏　胡桃

　仁十枚　枳殼火燒酒淬一兩　乳香　沒藥炙二錢　椿根白皮

　陰地者炙一兩　共末入膏杵丸梧子大每服二十丸

　腸風下血煎木賊湯下　五痔疾荆芥湯下

　時常瀉血米飲日下二

玉屑丸　治腸風下血及痔瘻癥毒久不差

　槐根白皮　椿根白皮　苦楝根白皮三兩三味採時春宜早夏宜遲

天南星生 生半夏五錢 威靈仙一兩 寒食麪二兩
共末拌勻滴水丸梧子大每服三十丸先用水二鍾
煎滚入丸令浮再服日二
琥珀散 治腸風及一切血痢脾臟下血不止
琥珀屑研 赤小豆 白芷 枳殼 槐花 鹿角霜
一兩 上五味同炒焦黑爲末入珀末拌勻空心米飲下
二錢日二
槐角子散 治腸風
槐角子炒 防風 枳殼炒五錢 黄芪炙一兩

共末空心茶下一二錢
防風散 治腸風下血
防風炒 黄芪炙一兩 炙甘草 人參五錢
共末空心飲下二錢
白朮丸 治腸風痔瘻脫肛下血面色萎黃久不差
白朮一斤用糯米三升同浸三日漉乾細切慢炒香爲末 懷生地半斤酒浸蒸熟爛搗
二味和勻用大力者搗二三千杵如硬入好酒添
如泥 少許丸梧子大陰乾空心米飲下二三十丸日二
牡蠣散 治腸風下血不止及脫肛

牡蠣火煅醋淬七次 細研如麪空心飲下二三錢日二
傷折門
從高墜下傷損腫痛 傷折惡血不散
筋骨傷折疼痛 傷折風腫
傷折統論
論曰諸脉從肉諸筋從骨骨三百六十有五聯續纏固手
所以能攝足所以能步凡厥運動罔不順從若乃倉卒之
際墜墮倒仆傷折蹉跌患生不測豈可不圖療治小則消
腫而伸縫大則續筋而接骨各有方劑存焉當按症施治

從高墜下傷損腫痛
論曰凡墜墮傷損腫痛輕者在外塗傳可已重者在內當
導瘀血養肌肉宜察淺深以治之
阿膠湯 治墜墮傷折手足痛
阿膠 白芍半兩 生地 川芎 川歸 熟艾一兩
黑乾薑 甘草五錢 水煎三錢溫服日二
地黄糟罨方 治墜墮撲損筋骨疼痛瘀血凝滯腫熱不消
懷生地搗 酒糟等分 看輕重下藥拌勻蒸熱塗傳患
上用帛裹縛日一易

接骨膏　治一切打撲傷損疼痛

續斷一兩　白芨　附子　川歸　獨活　桂心

雄黑狗脊骨燒灰　白歛　桑白皮五錢　黃米炒二合

共末用酒半鍾和藥末三錢白麪二錢生薑自然汁少許慢熬成膏攤貼三日一換冬月用杉木皮綁縛夾縛夏月以柳枝子五條夾縛雖緊不妨

續骨丸

黃蠟半斤煉過　鉛丹飛炒過　自然銅醋淬七次　蜜陀僧煅四兩　白礬十二兩　麒麟竭　丹砂飛過　乳香炙去油另焙　沒藥炙去油一兩　猪脂十兩　先熬脂化蠟于冷處入鉛丹銅末再熬攪滴水不散又出鼎離火下諸末不住手攪至凝丸彈子大且用笋皮襯之桶冷收貯凡傷折用一丸入少油化塗傷痛處以油紙帛護之甚者以燈心裂木夾之又以一丸分作小丸熱酒下痛即止如藥力盡痛未除再一服骨上便安

玄胡索湯　治傷折疼痛筋骨未合肌肉未生

玄胡索　川歸　白歛　懷熟地　鹿角膠　綿黃芪

桑寄生　桂心一兩　水煎五錢空心溫服日二盞煖

傷折惡血不散

論曰脉者血之府血行脉中貫于肉理環周一身因其肌體外固經脉內通乃能流注不失其常若因傷折內動經絡血行之道不得宣通瘀積不散則爲腫爲痛治宜除惡瘀使氣血流通則可復完

黃芪湯　治傷折惡血凝滯腫痛

黃芪　白芍　附子　生地　桂心　川歸　續斷一兩

大黃生　川椒　乾薑二兩　白水煎三錢溫服日二

糯米塗　治傷折赤腫惡血不散疼痛

酒糟二斤　糯米半升　用酒煮米熟入糟煮稀稠得所乘溫熱塗上用帛封裹煖一日一換以差爲度

蒲黃散　治傷損惡血不散不欲聞人聲胸中氣塞便利出血

蒲黃一合　生地二兩　桂心　白芷　川歸　續斷一兩

炙甘草五錢　共末酒下一二錢日二

葱白塗　治一切墜落打撲腫毒疼痛

葱白根三十　用灰火煨透乘熱搗爛塗患上用棉紙包縛令煖

筋骨傷折疼痛

論曰人之一身血榮氣衛循環無窮或筋肉骨節悞致傷折則血氣瘀滯疼痛倉卒之間失於調理所傷不得完所折不得續輕者肌膚焮腫重者髀肉剉脫治宜先整其骨續其所折後施貼熁封裹之劑

麒麟竭散　治筋骨損傷疼痛

麒麟竭　白芷　赤芍　沒藥（炙去油）　蒲黃　自然銅（醋淬七次）　生大黃　川歸（五錢）　桂心（各）　荷葉　骨碎補（去毛）（三分）　共末空心酒下二錢日三

川芎散　治傷折腫痛血不散

川芎　桂心　附子　川椒（炒）　甘草　荷葉（各一兩）　大黃（醋炒）　川歸（五錢）　共末酒下二錢日二

接骨桂芸膏　治撲打筋骨傷折腫痛不可忍

桂心　芸苔子　白芥子　敗龜版　大黃　虎頭骨（酥炙）　赤狗頭骨（燒灰存性）　木別子（一兩）　共末研勻用小黃米粥攤帛上摻末一匙裹損上以竹片夾定繩縛（七日）

沒藥丸　治傷折筋骨疼痛

沒藥（炙研）　丹砂　牛膝（一兩）　爲末研勻用酒麪糊丸梧子大丹砂爲衣用木瓜湯下二十丸日一

入骨散　治筋傷骨損疼痛

虎骨（醋炙）　龍骨（煅研）　牛骨（醋炙）　雞骨（醋炙）　狗骨　兎骨（酥炙）　羊骨（醋炙）　猪骨（醋炙）　楓香脂　自然銅（醋淬七次）　共末每有傷折以黃米粥熱攤布上摻末貼患處用布包裹以繩縛之

神授散　治傷折內外痛不可忍

川歸　鉛粉（五錢）　蓬砂（一錢）　共研勻共蘇木煎湯下二錢仍用粟米粥攤布上摻末貼腫處如骨碎用木皮竹帛夾定繩縛

五骨散　治傷折筋骨痛不止

鮫鯉甲項骨　虎頭項骨　猴猻項骨　黃犬項骨　野猫項骨（一兩）　上五骨細剉以米醋好酒各半斤浸一宿炙黃爲末入後藥用

天雄（五錢去皮臍炮裂）　肉蓯蓉（五錢酒浸炙）　二味共末與上末拌勻每服酒下二錢日二又用粟米爲末醋煮成糊入末拌稠攤傘帛上貼痛處用帛包綿裹熨痛立止

傷折風腫

論曰肌肉傷折皮肉破裂久而未合爲外風所觸則令肌肉受寒既不得收斂又與氣血相搏不得消散故爲風腫風腫不散即變膿血敗壞之疾

荊芥湯　治傷折風腫

荊芥穗　川歸　川芎　川續斷一兩　共末酒下二錢日二

地黃川歸散　治傷折爲風冷所侵肌肉不合腫痛

懷熟地　川歸　羗活　獨活一兩　共末空心酒下二錢日二

沒藥散　治傷折風腫

沒藥　川芎　附子　白芷　川椒　川歸　檳榔

甘草　桂心五錢　共末酒下二錢日二

川歸湯　治傷折皮肉破裂爲風毒內攻腫痛不消

川歸　大黃炒　白芷　防風　烏頭一兩

水煎五錢溫服日二

黃蠟膏　治傷折風腫痛

黃蠟五兩　桂心　吳茱萸一兩　食鹽二錢燒　共用爲末

以麻油化蠟入末熬攪匀成膏攤日一易

聖濟總錄纂要卷之二十三

新安　程　林雲來　纂
錢塘　陸鴻勳奐菴
關中　田　弘海若　較
山陽　王道明朗士

傷折門

打撲損傷　被傷絕筋　諸骨蹉跌

傷損止痛生肌　傷折貼熁幷膏藥

打撲損傷

論曰打損撲傷或瘀腫疼痛或血出不止外須以貼熁塗傳內須服去瘀血養肌肉和血氣之劑久則生肌斂口傳之以俟平復此治損傷之大法也

骨碎補散　治打撲損傷筋骨皮肉發熱疼痛

骨碎補　白芷　乳香去油　生地　當歸一兩　澤蘭葉

川芎　桂心　桃仁五錢　甘草　附子一分

共爲細末溫酒調下三錢頃又服

地黃湯　治墜墮傷折手足痛

生地　川歸一兩　阿膠　白芍一兩半　川芎　熟艾一兩

骨碎補一兩　桂心　甘草五錢　右㕮咀每服五錢水煎溫服日二

二奇湯　治打撲損傷

威靈仙　骨碎補各五錢

右作一服酒煎盡量飲盞暖出汗即愈

回生散　治打撲損傷疼痛

大茴　官桂　烏藥　紫荊皮　甘草各一錢

右為末每服五分好生酒送下盡量飲取汗避風瘦人三分大便出血即愈

被傷絕筋

論曰被傷絕筋者須觀其輕重治之接續之法要在氣血未冷之際外用續筋止痛藥傅裹內兼服藥調治庶幾可救緩則風冷入于裏則難治矣

聖功散　治筋骨傷折疼痛不止接骨續筋

硃砂　明礬　乳香　沒藥各一錢　麝香少許

土鱉十枚燒酒浸炙焙乾

右為細末磁罐封貯勿令洩氣用時强盛人服一字瘦弱人服半字燒酒調下未愈再服

沒藥散　治跌打損傷骨折筋絕

乳香去油　沒藥去油　琥珀二錢　土鱉三個燒酒浸炙焙　明礬一錢

硼砂一錢　麝香三分　半兩錢一個醋淬七次　蟹爪肉三錢熬

活牛角刮取炒黃色二錢

右為細末每服五分好酒送下在下部食前服在上部食後服

諸骨蹉跌

論曰諸骨蹉跌者從墜倒仆傷折致諸骨蹉跌治之須扶骨對正用止痛生肌接骨之劑封裹內服藥調治倘骨碎者便當出之否則瘀血不絕肌肉亦不能收斂則難愈也

接骨紫金丹

乳香去油　紫荊皮　骨碎補　大黃　血竭

歸尾　硼砂　土鱉焙乾　自然銅醋淬七次各一兩

右為細末每服七分半熱酒調服其骨自接此方治打撲骨折瘀血攻心發熱昏暈其瘀血自下吐血等症皆可服之如骨接而諸症未去者去土鱉自然銅更服五分即愈

傷損止痛生肌

論曰傷折之候皆因刑杖跌撲損傷或撷腫疼痛或血出不止大抵最忌服冷物恐血凝入心之故內服之劑要在溫補和血止痛為上至於斂口生肌之外用者可徧撰焉

虎骨散　治打撲損傷疼痛不止并治筋骨疼痛血風走注疼痛皆治

虎骨炙　自然銅醋淬七次　地龍水浸焙乾　牛膝　[illegible]　延胡索　威靈仙　龜板炙　桂心　當歸各一兩

共爲細末每服一錢煖酒調下

生肌散　治打撲墜墮損傷骨折筋斷血出疼痛不止傅之即愈并治一切瘡瘍時毒膿水將盡時用之去腐生肌金瘡刀斧傷血出疼痛不止者傅之神妙

白蘞　合歡皮　乳香去油　赤石脂煅　没藥去油　血竭　海螵蛸去殼　雄黃　龍骨煅　兒茶　狗脊各二錢　土鱉三枚焙乾　蟹爪肉焙熟　白芷　枯礬各一錢　硃砂一錢　麝香一分　金箔少許

右爲細末磁罐收貯每用少許傅傷處立能止痛止血合時須五月五日或天醫日合爲妙

傷折貼烙并膏藥

治日傷折之症輕則肌膚腫痛重則肉脫血出既整其骨內服去瘀生肌之劑外必以貼烙膏藥并用可也

接骨方　治打撲墜墮損傷手足骨折

用雄雞一隻約一斤重者生去毛生去爪嘴開腹底乘生氣即搗爛用五加皮研末和入搗之以勻爲度勿太爛勿過乾用時先以五加皮煮無灰老酒飲至極醉將骨折處用手按平將雞藥傅上棉帛縛之如今日此時縛至明日此時解開其骨即生滿矣如過一時其骨即長一寸　如骨接後而尚痛者以黑豆炒焦色用老酒沃之搗爛傅上半日一换

糯米塗　治跌打損傷疼痛

糯米一升　酒麯三丸　將糯米煮熟如飯入酒麯和勻乘熱塗上用帛封裹三日一换酒香即愈

龜板膏　治打撲損傷疼痛

敗龜板一枚燒灰　虎骨燒灰　白芥子　生大黃　川歸五錢　滴乳香炙　没藥炙各一分

右爲末研勻用小黃米粥攤於□上摻末一匙裹損上以竹片夾定繩縛七日

雜療門

中藥毒　食毒　食諸菜蕈菌中毒

飲酒中毒及大醉不解

中藥毒

論曰炎帝嘗百草而著本經分上中下三品聖功極矣漢唐以來漸增至于百種之繁益無毒之中而有有毒者從代庸民去聖巳遠不審良惡偶誤餌之經云有病病當無病胃傷不急救之漸致危斃古方用甘草菉豆能解諸毒亦用諸藥而各相制伏者

冬青汁飲　解砒霜毒

先用白蠟爲末和新汲水服之護其腸胃仍以冬青葉擣汁灌之以大便去毒爲度如冬月無葉以根擣汁和

水代之

解中砒霜方

羊血　雞血各一鍾　和勻服之

又方

稻稈　燒灰新汲冷水淋汁濾清冷服一碗毒即下

黄連湯　解中巴豆毒

黄連　黄栢各五錢　水二升煎一升候極冷服之忌服熱物仍以冷水浸兩手

又方

寒水石　一味爲末煮汁飲之

解烏頭附子天雄毒

遠志一兩　防風五錢　水煎汁飲之

服諸石藥中毒解方

白鴨屎汁　水和服之

解中大戟毒方

石菖蒲　一味煎汁服二升差或生擣汁更妙

解芫花毒方

防風　甘草　防巳等分　三味水四升煎二升服之

解射罔毒方

藍汁　大豆　菉豆各二合　藕汁一鍾　二豆煎汁和勻服之

解甘遂毒方

大豆五合　水三升煎升半服之

食毒

論曰飲食雖以養生亦有時而傷生何也凡食物諸品莫不有陰陽五行具焉漫不察其寒温燥濕之性順逆宜忌之因人性南北異稟食物南北異種一或犯之棘喉潰腹可不愼與倘誤中其毒宜服藥解之

解一切飲食毒方

大豆五合 大粉草五兩微炒 二味搗細用水四升煎二升

溫服須臾或吐或瀉毒即隨去雖甚渴不可飲水

又方 治誤飲饌中毒者未審中何毒卒急無藥可解

薺苨 甘草一兩 水二升煎一升服之入口便活

食諸菜蕈菌中毒

論曰諸菜雖地產陰物而能養生然氣有寒溫性有善惡倘不審辨之其不爲禍也幾希如諸蕈菌夜有光者煑不熟者煮訖其湯照人無影及欲爛無蟲者皆不可食倘誤中其毒以地漿諸藥解之

解食諸菜毒方 治食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死

葛根 生搗汁一升服之良或無生者即搗乾葛末水和服之煮服之亦可

治食諸菜毒方

苦參二兩 甘草一兩 苦酒二升同煎數沸去滓服吐出即愈

治諸菌毒方

地漿水 掘地作坎以水沃其中攪之令濁俄頃取之

飲三四鍾即解 又兼治楓樹菌誤食之令人笑不止飲之即解

又方

橄欖七枚上核 搗爲泥服之

又方

防風一兩 甘草一兩 用水四升煎至二升須冷飲即解

解食諸蕈毒方

木香 青皮 等分爲末煎湯飲之

飲酒中毒及大醉不解

論曰本草謂酒通血脉厚腸胃禦霧露瘴氣敵風雪寒威惟糯米麯麴爲良隨處出者名多不一或用諸燥藥爲麯皆大熱有毒惟菉豆能解之若恣飲過多助火亂性腐腸損身倘中其毒及大醉不解者急宜服藥解之

黃連解毒湯 治縱飲熱酒中酒毒煩亂躁渴引飲面赤眼紅小便澁少

黃連 黃栢 黃芩 山梔仁等分 水煎五錢溫服

解酲丸方

葛花一兩 桂花 菊花 五味子 烏梅肉五錢

共末蜜丸彈子大每用一二丸預先化下能解酒毒

若已醉者服之能解

飲燒酒醉死急救方

先用冷豆腐厚傅胸膈以護其心仍急用清水煮滾用鍋數箇取氣汗水三鍾徐徐灌下即解

治酒醉不醒方

甘草五錢 菉豆去殼一合 水二升煎一升溫服

又方

甘菊花 九月九日採取陰乾為末清飲調下二錢

酒醉不醒方

葛根 生擣汁飲一二升即差

又方

菘菜子二合 細研井華水一鍾調為二服

食牛馬猪犬魚蟹中毒 解金銀銅鐵石毒

中蠱毒 狗咬

食牛馬猪犬魚蟹中毒

論曰天產屬陽地產屬陰禽獸皆陰陽生物氣味各有冷熱之殊性有好惡之異大抵諸肉補陽能助起陰中之火素問云膏粱之變足生大丁故諸肉如熱血不斷落水不沉及病牛壞馬魚目有睫目能開合腦有連珠鰓煮不消蠏腹有毛及諸肉形色異常皆有毒不可食孔子色惡不食臭惡不食者此也倘中其毒宜服藥解之

解一切牛馬肉毒方

大粉草 細切微炒擂細量病人喫得多少酒取無灰酒一處研去滓溫服須臾大吐瀉毒亦隨去雖十分渴不可飲水飲水難救

解中雞子毒方

醇醋 飲三四口即解

治食狗肉不消心下堅硬或腹脹口乾忽發熱妄語方

韭根 杏仁一兩 藍根三兩 水四升煮取二升飲之

治食魚肉毒方

苦參三兩 以苦酒一升煎三五沸去滓服吐出即愈

解諸魚毒方

陳橘皮二兩 水三升煮取升半去滓服即愈

又方

蘆根三兩 剉碎水三升煮一升飲之即解

治河豘毒解方

扁豆五兩 水四升煮汁二升服之即解

又方

橄欖十枚 水二升煎汁一升服

治解蟹毒方

黄芪 吳藍等分 水煎一兩服之即解

治蟹毒方

冬瓜 生取汁飲一二升即解

又方

紫蘇擣 擣汁一升飲之差如無生者乾者煎汁飲之

又方

乾蒜七枚 煮汁飲之即愈

解金銀銅鐵石毒 治誤食金銀銅鐵方

蠶豆炒 研爲細末砂糖調服即從大便出

解金毒方

斑鳩肉 治如食法煮食之解或鷓鴣肉食之

又方 治吞金欲死

鴨一隻 殺取血飲之即解

解金銀銅鐵毒

雞屎 水淋取汁服之或鴨屎汁亦可

解鐵毒方

磁石 爲末水服三錢

蠱毒

論曰蠱毒者嶺南人多作之凡病人中蠱其狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕人五臟盡即死欲知是此當令病人吐水沉者是浮者非亦有以蠱蛇合作蠱藥著飲食中使人病瘕此一種一年死治之之法當服

藥使呼蠱姓名即去亦有服諸藥而制伏者

蠱毒方 治卒中蠱毒下血如鷄肝晝夜不絕臟腑壞敗待死

敗鼓皮 燒灰酒服三錢須臾自當呼主姓名即差

試中蠱毒方

雞子一枚 煮熟去殼以小銀簪一枝插在蛋內含口中一頓飯時視簪蛋俱黑即是中蠱 倘若人與飲食以犀角攪之有白沫泛起即有毒也用後方

石榴皮飲 治中蠱毒

石榴根皮東引者 剉一兩煎濃汁飲之即吐出活物

又方 治中蠱毒吐下血如爛肝

苦瓠一枚 水二升煮取一升服立吐即愈 又方煮苦瓠令消服神驗

治蠱毒神驗方

胡荽根 擣爛絞汁半升和酒服之立下

治蠱毒神驗方

玳瑁 以水磨濃汁飲服一盞即解

治中蠱毒或吐下血如爛肝方

蚯蚓十四枚 以苦酒二升漬之蚓死但服其汁已死者皆可活

治蝦蟆及蝌蚪蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣絕方

車轄脂半升 和溫酒一升漸漸服之其蠱自出

又方

刺蝟皮 燒過爲末水服三錢當吐出毒

治蠱毒方

牡丹根 擣羅爲末每服一錢日三服

治中蠱毒方

胡荽子五合 酒二升煮汁一升服之

狗咬 治狗咬方

甘草 杏仁一兩 紫蘇五錢 水四升煎去滓溫服更以三味末傅咬處

又方

生鐵 不拘多少煮令有味洗之

又方

乾薑 爲末內瘡中立差

猘犬齧 蛇齧 諸蟲齧

猘犬齧

論曰猘犬齧者犬發狂疾跑躁齧人若中之令人疼痛不止發狂如犬聲不急治之亦能殺人男子過三日不治婦人過五日不治

治猘犬齧方

地榆一兩 水二升煮汁一升飲之幷爲末傅瘡上每服末三錢白湯下日三服忌酒若瘡已差者擣生韭汁飲三升

又方　治猘犬齧瘡

礬石　爲細末摻內瘡中裹之立止痛其瘡即愈

又方

生地黄　擣汁飲四五合幷塗瘡口

治猘犬齧方

小兒胎髮炒　新香附　野菊花

研細末酒調服盡醉

又方

鼠屎二升　燒存性爲末傅瘡上

蛇螫

論曰諸蛇螫人如青竹赤楝虺蛇地匾之類皆有大毒倘中人不急治之則能殺人也

雄黄散　治諸蛇毒螫人欲死佩之兼辟蛇毒

雄黄　乾薑各等分　共爲細末傅螫處如辟蛇毒用小絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥氣遠避

香白芷散　治諸蛇螫辟蛇毒

香白芷　雄黄　蓼根各等分　麝香少許

共爲末醋調傅螫處立愈欲辟蛇焚之即遠遁去

一方用菊花根汁調傅亦妙

治一切蛇螫方

金線重樓　水磨少許傅螫處又爲細末酒調飲之

治毒蛇螫人方

地榆根　擣爛絞汁飲之兼漬之

治蛇入口幷入七孔中方

母猪尾尖割斷瀝血滴口中即出

治蛇螫方

鼠偎花　擣爛傅之即愈

辟蛇方

若蛇到燒羖羊角令有烟出蛇即去矣

治蛇齧方

人糞　先以灰酒洗過次以糞傅齧處差

治蠍螫人方

活蜘蛛一枚　爛研取汁傅之即差

蜂螫　蜘蛛蜈蚣傷　溺水死　自縊欲死

治九里蜂螫方

處士劉湯隱居王屋山曾見一大蜂誤落蛛網爲蜂所

螫墜地俄頃蛛腹脹欲裂徐徐行入草中咬開芋梗以傷䖏咬處磨之良久腹漸消輕走如故自後有被蜂螫者將芋梗傅之即愈

治蜂螫人方

芋酥　傅之即愈

蜘蛛蟲等咬傷方

銹鐵　即鐵上鏽末取和獨蒜磨傅咬處

治蜈蚣咬傷方

取活蜘蛛一枚放咬處則能吸其毒如蜘蛛死痛未知

更著生者以愈為度

又方

蝸牛　擣取汁滴入咬處

又方

苦參末　百齒霜（即頭垢屑）　二味酒調傅之

治蜈蚣咬方

桑白皮　生者取汁和白鹽傅之

溺水死

論曰凡溺水死心氣尚溫而脉未絕者宜換去溼衣以厚衣裹之灌以熱湯可活切忌火烘恐寒熱相搏之故若或犯之則不能救也

治水溺死灸法

艾炷如黃豆灸臍五七壯如不應移上一二分再灸數壯可活

溺水死方

皂角　為末綿裹內穀道中須臾出水即活

自縊欲死　治縊死灸法

凡自縊死用麩塊塞糞門勿急剪繩用二人扶定將繩

解鬆用艾炷灸臍七壯如不應移上一二分再灸只在上下臍孔間不住灸至數十壯猶有活者不可因臍傷釋手至囑至囑令數人搓手心腳心熱更好

五絕散　治自縊死併溺死

半夏（一兩）　擣篩為末丸如豆大內鼻中即愈心溫者一日可治

治自縊死方

梁上塵　如大豆各內一筒中四人各一筒同時極力吹兩耳鼻中即活

治自縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷抱定心下猶溫者

雞冠血　刺取之滴口中即活男雌女雄

又方

雞屎白　如棗大酒半盞和灌之及鼻中佳

聖濟總錄纂要卷之二十二

新安　程林雲來　纂
山陽　湯起綏克徵
錢塘　朱長春永年　校
新安　方埏淮中

婦人門

婦人月水不通　婦人月水不斷
婦人月水不來腹痛　室女月水不通
帶下　漏下　經血暴下 即血崩
經血暴下兼帶下　血分　水分　無子

氣血統論

論曰血為榮氣為衛行陰行陽晝夜共行五十度周終身內之五臟六腑外之百骸九竅莫不假此而致養矧婦人所稟純陰以血為本以氣為用在上為乳飲在下為月事養之得道則榮衛流行而不乖調之失宜則氣血愆期而不應衛生之經不可不察

婦人月水不通

論曰婦人月水不通者所致不一有氣不化血微不通有

先期太過後期不通有大病後熱燥不通有疑寒結滯不通有積聚氣結不通有心氣抑滯不通凡此所受不同治之亦異蓋女人假血為本以氣為用血氣稍虧則澁而不行其為病或寒或熱或臍腹堅痛或肌肉消瘦久而不治則為勞瘵之症

地黃煎丸　治月水不行心忪悸身體熱面頰紅赤食味不美臍下刺痛腰胯重

生地汁　青蒿汁　生薑汁一盞共熬膏　麒麟竭　没藥去油

玄胡索　凌霄花　紅藍花五錢

共末用膏丸彈子大酒下一丸

當歸湯　治血澁不行心忪肌熱腰重腹痛不可忍

川歸　丹皮　川芎　白芍　牛膝　麥蘗

玄胡索　桂心五錢　琥珀　没藥一分炙去油

水煎三錢溫服日二

婦人月水不斷

論曰女人以衝任二經為經脉之海手太陽小腸之經與手少陰心之經者此二經相為表裏主下為月水若勞傷經脉則衝任氣虛衝任既虛則不能制其氣血故令月事來而不斷也

白茯苓散　治女人血海不調因虛冷成疾致月水不絕及赤白帶下面色萎黃

白茯苓　木香　懷熟地　石菖蒲　秦艽　栢子仁

青皮　兎絲子　赤石脂　烏賊魚骨　訶勒皮

川歸　五加皮　牛角䚡燒灰　杜仲　艾葉一兩燒存性

共為末不拘茶飲酒任下二錢日二

川歸丸　治月水不斷或多或少四肢倦身痩痒

川歸三兩　地榆　人參　白朮　白茯　鹿茸

白龍骨　阿膠　白芍　卷栢　石斛　蒲黃

紫朴一兩　桂心　枳殻二兩　懷熟地三兩

共末蜜丸梧子大酒下二十丸日二

地黃湯　治衝任氣虛經血虛損月水不斷綿綿不止

懷生地二兩　子芩　川歸　側栢葉半兩　熟艾五錢

水煎三錢入蒲黃一錢食前溫服日二

一方加地榆伏龍肝

白芍藥湯　治月水經久不斷

白芍藥炒　側栢葉二兩炙令

用水酒同煎三錢溫服未差再服

婦人月水來腹痛

論曰月水乃經血之餘和調則所下應期無過與不及之患若衝任氣虛爲風冷所乘致氣脉不順所下不調或先或後或多或少風冷之氣與月事相擊故因所下而腰背拘强臍腹刺痛也

川歸飲　治月水不調及欲來臍下痛肌體熱

川歸　白茯　人參　白芍　枳殼　紫朴　肉豆蔻

甘草五錢　水煎三錢溫服日二

丹皮湯　治月水來而不利攻臍腹痛不可忍

丹皮　人參　川芎　子芩　甘草　乾薑　吳茱萸

桂心半兩　白芍　白茯　川歸一兩　桃仁八十枚炒

水煎三錢服

白芍湯　治月水來腹痛煩悶體熱

白芍藥　紫朴　人參一兩　甘草　川歸　枳殼三兩

肉豆蔻五錢　水煎三錢溫服日二

川芎丸　治月水來腰腹刺痛不可忍或多或少或來如清水豆汁虛乏黄瘦

川芎　白芷　生地　桃仁去皮尖炒一兩　黑乾薑

蒲黃　甘草五錢　人參　白芍　丹皮　牛膝

桂心　川歸三分

共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十丸日二

室女月水不通

論曰女子二七而天癸至任脉通月事以時下若稟受不足或任脉爲風寒所搏致令風氣凝結不能應時而下經久不治則致勞疾

人參湯　治室女思慮太過心氣不足氣結不得宣利月

水不依時或久不通或血隔成勞漸有寒熱肌肉不生不思各味凡此病症不可復行破血急性之藥宜通心氣行榮衛滑經絡

人參　白芍　麥冬　丹皮　檳榔　草蔻　大腹皮

白朮　川芎　生地　桔梗　防巳　枳殼　丁香皮

甘草　茯神　川歸一兩　桂心　大黃　遠志

生薑大棗水煎三錢入酒少許溫服日二

赤芍藥散　治室女月水不通

赤芍　牛膝　人參　木香　甘草　丹皮　玄胡索

川芎五錢 桂心 川歸三分 桃仁去皮尖炒一兩
共末酒下二錢
沉香湯 治室女榮衛凝澁月水不利目昏悶肢體拘急
五心虛煩多困少力
沉香 檳榔 甘草二兩 人參 木香 桂心
川歸 生地 白茯苓 陳皮 青皮 柴胡
鼈甲醋炙兩半 生薑水煎三錢溫服日二
羚羊角湯 治室女元氣不足虛勞內燥月水不利四肢
少力煩赤口乾五心煩熱

羚羊角 防風 地骨皮 川芎 黃芪蜜炙 赤茯苓
桂心 麥門冬 防風 炙甘草一兩 懷生地三兩
羌活 酸棗仁炒 川歸 紅花子 白芍藥兩半
生薑三片薄荷七片水煎三錢入酒少許溫服日二
二地散 治室女月水不通臍腹下剌痛
懷生地四兩 懷熟地 桂心 川歸二兩
共末酒下二錢日二

帶下

論曰帶下有三十六種名雖不同其所致則一蓋婦人衝
任爲經脉之海上爲乳汁下爲月事血氣和平則生育之
道得矣苟乖于保養風寒乘虛襲于經絡衝任不能循流
血氣蘊積冷熱相搏故成帶下冷則色白熱則色赤冷與
熱并則赤白雜下間有五色者各隨五臟虛損而應焉
川芎湯 治帶下漏血不止
川芎 吳茱萸 白芍藥 黃芪 炙甘草 黑乾薑
川歸一兩 懷熟地二兩 水煎三錢溫服日二
桑寄生湯 治三十六種帶下
桑寄生 熟艾 川芎 鹿角膠一兩 川歸二兩

用酒水合煎三錢溫服日二若口乾渴者加白茅根
懷生地麥門冬一兩
龍骨散 治三十六種帶下不止
白龍骨 黑乾薑一兩 黃牛角䚡燒灰三兩 禹餘糧醋淬七次
續斷 阿膠炒 川歸五錢
共末酒下一二錢日二以差爲度
側栢葉散 治帶下腹痛
側栢葉炙二兩 白芍藥 川芎 牡丹皮 白芷
黑乾薑一兩 川歸五錢 共末酒下二錢日二

禹餘糧散　治帶下五色久不止

禹餘糧淬醋七次研　鹿茸　赤石脂二兩　烏賊魚骨去甲燒灰

兩　半　兩　阿膠炒　川歸　白芍藥　蒲黃一兩　牡蠣童便淬二

共末酒下二錢日二

川歸散　治帶下白黃不止體瘦繞臍腹痛

川歸　附子　白术　白龍骨　桂心　鹿角膠粉炒一兩

共末酒下一二錢日二飲下亦可

漏下

論曰漏下之病經血淋瀝不斷是也夫衝任之脉所至有

時若非時而下猶器之津洩故名之漏下葢由血虛氣衰

不能約制又有瘀血在內因冷熱不調致使血敗其色或

亦如豆汁黃如爛瓜黑如衃青如藍白如膿五色隨五臟

虛損而漏應焉

沉香丹皮丸　治內挾瘀血月水淋瀝不止或多或少四

肢煩倦

沉香　人參　丹皮　赤芍　川歸　木香　巴戟天

川芎　山藥　白茯　白芷　陳皮　黃芪　吳茱萸

桂心　枳殼　紫朴　肉蔻　牛膝　龍骨　黑乾薑

一兩　共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十丸日二

白馬蹄湯　治赤白帶下淋瀝不止色敗如五色者

白馬蹄剉炒焦二兩　白龍骨　禹餘糧半兩　白殭蠶

赤石脂　附子　懷熟地　牡蠣醋淬　炙甘草一兩

川歸　烏賊魚骨燒灰兩半

水煎三錢入酒少許溫服日二

鹿茸散　治漏下久不止

鹿茸去毛炙　阿膠粉炒　烏賊魚骨去甲燒灰兩半　川歸

蒲黃微炒一兩　共末酒下二錢日二

鼈甲散　治漏下赤白經久不止

鼈甲醋炙　牡蠣童便淬二兩

共末空心酒下一二錢日二以差爲度

白术散　治赤白漏下不止

白术土炒　川栢炙半兩　白薇炒五錢

共末溫酒下二錢日二

大黃散　治漏下青色

大黃炒三分　牡蠣童便淬　子芩　桂心一分　白薇五錢

共末酒下二錢

蒲黃散　治血漏不止日久虛損

蒲黃(二兩 微炒)　鹿茸(去毛 炙)　川歸(一兩 酒炒)

共末酒下二錢日二

黃芪湯　治漏下赤白淋瀝不斷

黃芪(半兩 炙)　阿膠(二兩 粉炒)　炙甘草(一分)　大棗肉(五十枚)

水煎三錢服

經血暴下(即血崩)

論曰女人經血謂之月事有常以三旬而一見也若血氣和平則所下應期若衝氣虛則經血不能制約故令暴下不止乃至數升也

生地散　治血傷暴下不止腰脚疼重倦怠無力心煩渴燥面目虛浮

懷生地　黃牛角䚡(燒灰)　酸石榴皮(炙)　人參

白芷　炙甘草　陳皮　地榆(炙)　川續斷

共末飲下二錢日二

劉寄奴湯　治血下不止臍下虛痛

劉寄奴　赤芍藥(二兩)　艾葉(一兩 炒用)　白茯苓(一兩)　川芎

川歸(半兩)　水煎三錢溫服日二

如聖散　治經水暴下不止

酸榴皮(一兩 燒灰)　烏梅肉　黑乾薑(三味並燒存性 五分一兩)

共末用烏梅湯下一錢日二久患不過三服

續斷丸　治經水漏下日久不止或五色相兼而下面萎黃肌體瘦腰重無力

續斷　赤石脂　炙甘草　阿膠(粉炒)　川芎　丹參

地榆根　小薊根　側柏葉　鹿茸　川歸(一兩)

鱉甲(醋炙)　生地　黃牛角䚡

共末入蜜杵丸梧子大酒下三十丸

白芍藥散　治經水不止兼五色雜下不定日夜不止

白芍藥　黃芪　白朮　白龍骨(一兩)　烏賊魚骨(醋炙)

桂心　附子　乾薑　牡蠣(醋淬 五錢)　懷生地(三分)

共末酒下二錢日二

地黃湯　治經血不止顏色不定

懷生地(一兩 去)　子芩　熟艾葉　川歸(二兩)　側柏葉

伏龍肝　蒲黃(微炒)　生薑(三兩)　地榆(炙 四兩)

水煎三錢溫服日二

二灰散　治經水暴下不止

韮絲燒灰　箬葉用茶籠內者燒灰各一兩　同研勻酒下一二錢日二

禹餘糧丸　治經血不止氣弱黃瘦

禹餘糧火醋淬七次研　附子炮去皮臍　川芎　川歸各三分

白芷　黃芪蜜炙一兩　白龍骨　桂心　白石脂

共末入蜜杵丸梧子大丹砂爲衣酒下二三十丸日二

經血暴下兼帶下

論曰女人臟腑久冷素有赤白帶下復因衝任氣虛不能制約經血以至暴下則二病兼作故謂經血暴下兼帶下也

黃牛角䚡丸　治經水暴下兼帶下經久不止面黃困劣

黃牛角䚡燒灰　赤石脂一兩半　鹿茸去毛炙　桑白皮炒

阿膠炒一兩　艾葉炙三分　白龍骨煅二兩　黑乾薑一分

共末入蜜杵丸梧子大酒下

白芍藥酒　治經血暴下兼帶下經久不差

白芍藥炒　懷生地　黃芪炙二兩　艾葉炙一兩

酒一斗浸七日服

牛角䚡散　治傷血並帶下

黃牛角䚡酒炙焦　側栢葉炙　川續斷炒　熟艾

伏龍肝　川歸　赤石脂一兩　地榆

共末酒下二三錢日二

人參散　治血傷兼赤白帶下日久不止

人參　五味子　艾葉燒灰　白茯苓　牡蠣醋淬

地榆　白龍骨　懷熟地　炙甘草　川芎

續斷一兩　共末空心用酒下一二錢日二

白茯苓丸　治血傷兼帶下積久不止漸成虛勞面黃羸

脚沉重

白茯苓　栢子仁　訶勒皮　兎絲子　木香

杜仲炒　赤石脂　五加皮　懷熟地　秦艽

川歸　石菖蒲　青皮　黃牛角䚡切燒灰

烏賊魚骨去甲燒灰　艾葉燒灰一兩

共末酒下二錢日二醋糊丸亦可

生地湯　治血傷帶下

懷生地炒　川歸　阿膠　黃芪炙一兩　艾葉炒三分

生薑水煎三錢溫服日二

烏賊魚骨丸　治血海虛敗赤白帶久下不止肢體虛熱

煩躁頭目旋運口舌乾澁

烏賊魚骨（去甲燒灰）　白芍藥　川歸　山茰肉
川芎　訶勒皮　酸棗仁　白茯苓　覆盆子
玄參　華澄茄　懷熟地　地榆　黃連（炙一兩）
共末蜜丸梧子大酒下三十丸
黃芩湯　治經水暴下帶兼赤白不止
懷生地（二兩）　子芩　蒲黃（錢炒）　熟艾　側柏葉
川歸（五錢）　水煎三錢溫服日二
車前子湯　治經血暴下兼赤白帶下經久不止
車前子　子芩　懷生地　淡竹葉　阿膠（炒一兩）

水煎三錢服
白龍骨散　治經血暴下兼赤白帶下不止
白龍骨　續斷　鹿茸　赤石脂　肉蓯蓉
白芍藥　懷生地（炒）　烏賊魚骨（去甲燒灰二兩）
共末用米飲下二錢日二
婦人血分
論曰血分者經水通之際因寒濕傷其衝任爲之中止氣壅不行播在皮膚邪氣相搏經血分而爲水發爲胕腫故曰血分脈經曰經水前斷後病水者名爲血分久之不治積成水腫即難治也

枳實散　治血分身體浮腫心腹煩滿不能食
枳實（麩炒）　牛膝　青皮（去白炒）　豬苓（去黑皮）
桑白皮　川歸（炒一兩）　木香　牡丹皮
防已　大黃（炒）　檳榔（煨）　甘遂（炒五錢）
人參（一兩）　共末湯下二錢日二
檳榔湯　治血分上攻頭面身體浮腫心煩熱滿悶
檳榔（微炒）　赤芍藥　郁李仁　牽牛子（炒）
人參　牡丹皮　百合　木香（五錢）　赤茯苓

牛膝　枳殼（炒三分）　知母（童便炒一分）
水煎三錢溫服日二
婦人水分
論曰水分者以水氣上溢于皮膚分散于四肢發爲胕腫蓋腎者胃之關關門不利故聚水而從其類也此病與血分相似而治療有先後耳
赤茯丸　治水氣在皮膚浮腫經水不通
赤茯苓　赤芍藥　澤漆（微炒）　木通　防已（一兩）
豬苓（去黑皮）　小海蛤　澤瀉（半兩炒）　桂心　陳皮（炒三分）

共末入蜜杵丸梧子大桑白皮湯下三四十丸日二三

防已飲　治水病浮腫身經水斷絕名曰水分

防已　澤漆　子芩　玄參　陳皮各一兩　赤茯

葶藶紙炒　杏仁　白朮　猪苓　大豆半升炒各兩

桑白皮炙一兩　水煎三錢服

甘遂丸　治水分四肢浮腫經水斷絕

甘遂微煨兩　天門冬去心　川連半兩　葶藶紙炒二兩

苦胡蘆一枚取瓤　共末蜜杵丸小豆大酒下十丸至十五

丸水利止服

木通散　治水分先病水腫日久不消致經水斷絕

木通　赤茯苓　石韋去毛　桑白皮　防已

澤瀉二分　大腹皮四枚　水煎五錢溫服日二

如水通利少服

婦人無子

論曰婦人所以無子者由衝任不足腎氣虛寒故也內經謂女子二七而天癸至任脈通太衝脈盛陰陽和故能有子若衝任不足腎氣虛寒不能繫胞故令無子亦有本于夫病婦疾者當原其所因而調之

白薇丸　治婦人久無子

白薇　川歸　人參　附子　川芎　藁本

禹餘糧一兩　石斛　熟地　柏子仁　紫參

蒲黃　川椒　桑寄生　牛膝　五味子

桂心　吳茱萸　防風　甘草五錢

共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十丸日二

澤蘭葉丸　治久無子

澤蘭葉　川歸　白龍骨　陳皮去白炒　遠志

菴䕡子　川芎　桃仁去皮尖炒　禹餘糧醋淬七次研

紫石英　藁本　蒲黃微炒　覆盆子　白芷

卷柏一兩　人參　麥門冬　黑乾薑　車前子

懷熟地　細辛　白茯苓　赤石脂　川椒炒

石膏　白薇　蛇牀子五錢

共末蜜丸梧子大酒下

妊娠門

妊娠惡阻　妊娠漏胎　妊娠胎動下血

妊娠胎萎燥　妊娠胎不長養

妊娠惡阻

論曰婦人所食穀味化爲血氣下爲月水凡妊娠之初月水乍聚一月爲胚二月爲胚三月爲胎胎成則男女分方食于母而口如鳥在胚胚之時血氣未用五味不化中氣壅實所以脾胃不思穀味聞見于物即惡心有所阻也其病心中憒悶頭重目眩四肢怠惰惡聞食氣是矣

茯苓湯　治妊娠惡阻嘔逆胺疼頭痛惡聞食氣心忪煩悶多損墮宜安胎調血脉

白茯　旋復　生地二兩　人參　白芍　陳皮

桔梗炒　細辛　芎藭　甘草炙兩半　水煎三錢

橘皮湯　治妊娠惡阻嘔吐不下食

陳皮　竹茹　人參　白术三兩　厚朴二兩

每水煎三錢

柴胡飲　治惡阻頭疼瘦弱不思食嗜臥

柴胡　赤芍　人參　麥冬　黃芪　甘草炙五錢

生地兩半取汁　水煎三錢入地汁一分日二

人參飲　治惡阻煩悶嘔欬吐逆惡聞食氣頭眩肢節痠嗜臥出汗黃瘦

人參　麥冬　白茯　生薑三分　陳皮

甘草炙五錢　大棗五枚

共分二劑每劑水五鍾煎二鍾分三服頃再服

茯苓飲　治惡阻煩悶頭眩憎聞食氣聞便嘔逆四肢不能自持

白茯　人參　白术　防風　枳殼炒　生薑五錢

甘草炙一分　分爲二劑每用水四鍾煎半分二服頃再服

妊娠漏胎

論曰妊娠將理失宜經血時下謂之漏胎由衝任虛弱不能固養胞胎故令經血時下如器之漏也久漏不已則胎氣無所稟養必致萎燥矣

續斷飲　治妊娠漏胎下血不止腹內痛

續斷一兩　艾葉　熟地　當歸一兩　竹茹

阿膠　雞蘇五錢　爲粗末水煎三錢日二

艾葉飲　治漏胎淋瀝不止

艾葉五錢　乾薑　當歸三分　芎藭一兩

每水煎三錢日二

膠艾湯　治漏胎下血過多

阿膠五錢　艾葉一兩　水煎三錢日二

黄芪湯　治五六月下血

黄芪半兩　熟地　桑寄生　地榆一兩　艾葉

龍骨三分　薑棗水煎五錢日二

竹茹桑寄生湯　治漏胎心腹痛時下血

竹茹　桑寄生　艾葉　白芍　阿膠

白朮各等分　水煎三錢

當歸阿膠散　治胞漏下血不止

當歸　阿膠　熟艾五錢　龍骨二分半　蒲黄炒

地榆三分　牛角鰓炙焦　熟地兩

共末酒飲任下二錢日二

姙娠胎動下血

論曰姙娠之人將護爲難若觸冒風寒飲食生冷及喜怒勞動之過致患胎動胎動則氣血失度故下血也古方云母有宿疾子臟爲風冷所乘者亦令胎動下血皆失將護所致

阿膠湯　治胎動腹痛下血運悶

阿膠一兩　生薑炒　側栢葉　桑寄生　當歸

艾葉三分　竹茹一大團　芎藭　續斷五錢

棗水煎三錢

鹿角膠湯　治胎動漏血不止

鹿角膠一兩　人參　白茯苓五錢　水煎三錢

阿膠散　治損動胎氣腹内結痛血下不止運悶

阿膠　桑寄生二兩　人參　懷熟地　白芷

芎藭一兩　續斷半兩　共末竹茹糯米湯下三錢

秦艽湯　治胎動下血身體煩熱倦怠

秦艽　人參　炙甘草　芎藭　地榆　白芷

鹿角膠五錢　糯米一撮水煎五錢

芍藥散　治胎動下血不止臍腹痛運悶昏塞

白芍　木賊炒一兩　牡蠣　熟地　乾薑

烏賊魚骨去甲五錢　共末酒下三錢

人參飲　治胎動腰腹痛血下不止

人參　芎藭　當歸　阿膠　杜仲二兩　熟地

炙甘草一兩　艾葉一把　棗水煎五錢

姙娠胎萎燥

論曰人由受氣于有生十二經脉迭相滋養尤生物也得寒温之正土地之宜無物不長凡胎處胞中或有萎燥者

蓋由孕婦所稟怯弱不足自因陰陽血氣偏倚并冷熱
胞胎失于滋利所以萎燥而不長也日月雖過不能生育
亦有後時致失者惟宜資母血氣俾陰陽調通本末相應
則胎從而有養矣

艾葉湯　治胞中冷致胎萎燥

艾葉炒　芎藭　當歸炒　白朮　乾薑一兩

水煎三錢日二

白朮湯　治萎燥瘦劣面黃黑腹藏虛冷

白朮炒二兩　人參　當歸　白芍　芎藭

訶勒皮　厚朴　炙甘草五錢

薑水煎三錢日三

白朮當歸湯　治胎萎燥漏下腹痛不可忍

白朮　當歸　人參　芎藭　阿膠二兩

艾葉一兩　酒水煎五錢入大棗分三服

桑寄生湯　治胎萎燥不能轉動心中急痛

桑寄生　人參　白茯苓　蒺藜一兩　白朮二兩

薑水煎三錢入粳米半合溫服日二

地黃湯　治胎萎燥過時未產滋氣血益胞藏

熟地　當歸　熟艾炒　芎藭一兩　阿膠

炙甘草五錢　水煎三錢日二

姙娠胎不長養

論曰姙娠將理無方脾胃不足飲食減退不能行榮衛化
精微養衝任故令胎藏內弱子氣不足生化稍虧巢元方
謂母病療母則胎安是也若使脾胃和而能飲食水穀化
而運氣血則何慮胎氣不長也

白朮散　治胎不長養

白朮一兩　人參　白芍　芎藭　阿膠一兩

炙甘草五錢　共末葱粥飲下三錢日三

地黃湯　治氣血不足胎瘦不長

熟地　阿膠　芎藭　當歸二兩　人參　赤芍

炙甘草五錢　水煎三錢入粳米日三

姙娠嘔逆不下食　姙娠咳嗽　姙娠傷寒

姙娠下痢　姙娠子淋

姙娠嘔逆不下食

論曰姙娠之人脾胃氣弱風冷乘之則中焦否膈胃中虛
滿其氣上溢氣不下降故雖食飲卒不得下甚則嘔逆

茯神湯　治姙娠嘔逆不下食和胃順氣

茯神　黃芪　人參　白术五錢　藿香

甘草炙二錢　薑水煎二錢

人參湯　同

人參　山藥　白茯　粳米陳者一兩　半夏五錢

薑棗水煎二錢

保生湯　治姙娠嘔逆不下食

陳皮二兩　人參　白术　麥冬　厚朴　白茯一兩

薑棗水煎四錢入竹葉

厚朴湯　同

厚朴　人參　白茯苓　白术　陳皮　竹茹

半夏一兩　薑水煎三錢

姙娠咳嗽

論曰姙娠咳嗽者以肺感寒氣也經曰形寒飲冷則傷肺久嗽不已則寒氣相移不惟姙育有傷而肺氣痿弱皮毛枯悴治宜發散寒邪養補胎氣則咳嗽自已

麥冬飲　治咳嗽不止

麥冬一兩　紫菀　杏仁　桔梗炒三分　炙甘草一分

桑白皮五錢　水煎三錢入竹茹白蜜日三

人參散　治姙娠咳嗽

人參　陳皮　炙甘草三兩　生薑五兩切

共末湯下二錢

桑白皮丸　治姙娠咳嗽痰盛嘔逆

桑皮二兩　半夏　人參　阿膠一兩　丹砂分

炙甘草五錢　共末蜜丸芡實大臨臥含化一丸

姙娠傷寒

論曰姙娠感冒寒邪藏于皮膚洒然而寒翕熱而悶頭項痛腰脊強脈浮在表者當汗之在裏者下之汗下之理觸方宜輕但非破血傷胎之劑和其陰陽正其表裏使經不傷邪無深入斯無危殆矣

麻黃湯　治姙娠傷寒發熱惡寒體痛

麻黃　蒼术三兩　陳皮二兩　白术　炙甘草一兩

水煎三錢入葱白豉

興功湯　治姙娠傷寒頭痛體疼安胎和氣

麻黃四兩去根節　白术　蒼术二兩　芎藭

炙甘草半兩　葱白水煎二錢日三

柴胡湯　治姙娠傷寒憎寒壯熱頭痛身疼

柴胡　白朮一兩　芎藭　白芍藥　當歸

防風　赤茯苓一分　黄芪　生地五錢

薑棗水煎三錢

白散子　治姙娠傷寒護胎

白藥子末研　用雞子清調塗紙上約碗大貼在臍下乾

以温水潤之

姙娠下痢

論曰姙娠飲食過傷脾胃不和冷熱之氣入于腸間腸虚

則泄故爲痢也然冷多則白熱盛則赤冷熱相攻赤白相

雜甚則膿血雜下速宜療之恐傷胎也

阿膠丸　治姙娠下痢日夜頻瀉并安胎氣止腹痛

阿膠　醋石榴皮五錢　川連一兩　當歸　肉豆蔻三錢

共末蜜丸小豆大飲下十五丸

黄連湯　治姙娠下痢頻瀉并裏急後重

川連炒　黄栢二兩　白朮四兩　薑水煎五錢口三

健脾湯　治姙娠下痢臍腹撮痛益胃氣思飲食

厚朴　蒼朮四兩　人參二兩　大棗一升煮熟去皮核研棗汁五升與朴朮同

煮乾　陳皮生白炒　白茯三兩　炙甘草二兩

薑水煎三錢進飲食調脾胃

阿膠丸　治姙娠下痢膿血不止腹痛

阿膠三兩　白朮五兩　川連　肉豆蔻一兩

共末蜜丸梧子大飲下三十丸

黄栢散　治姙娠赤白痢腹痛腰疼如欲産

黄栢微炒　當歸　赤芍藥　阿膠　艾葉　芎藭

桑寄生一兩　炙甘草　乾薑三分　共末水煎四錢

阿膠散　治姙娠赤白痢腹痛不止

阿膠　當歸二兩　白朮二分　艾葉炒　石榴皮炒五錢

共末薑水煎四錢

姙娠子淋

論曰婦人懷子而淋者謂之子淋因腎虚膀胱經客邪熱

令溲少而數水道澁痛痛引于臍者是其候也

海蛤湯　治姙娠子淋頻數澁痛

海蛤　木通　猪苓五錢　冬葵子微炒　滑石一分

水煎三錢入燈心三十根

白芷散　治姙娠子淋頻數澁痛

白芷二分 阿膠 鬱金 滑石一兩
共末葱白湯下二錢
當歸湯 治姙娠子淋澁痛
當歸 白芍藥 赤茯苓 炙甘草 山梔子等分
水煎三錢
姙娠浮腫 姙娠小便不通
姙娠大小便不通 姙娠半產
姙娠數墮胎
姙娠浮腫

論曰脾合土候肌肉土氣和平則能制水水自傳化無有停積若姙娠脾胃氣虛經血壅閉則水飲不化濕氣淫溢外攻形體內注胞胎懷姙之始腫滿必傷胎氣如臨月而脚微腫利其小便則病自愈
防已湯 治姙娠通身浮腫喘促小便澁
防已 大腹皮三分 赤茯苓 桑白皮一兩 木香
紫蘇一分 薑水煎四錢
木通湯 治姙娠身體浮腫心腹脹滿小便不通
木通 香薷 桑白皮一兩 木香 訶勒皮

黃芩三分 枳殼炒 檳榔 紫蘇五錢
薑水煎四錢日二
赤茯苓湯 治姙娠身體浮腫心腹急滿小便赤
赤茯苓一兩 白朮 旋復花五錢 木通 杏仁
黃芩三分 薑水煎三錢
赤茯飲 治姙娠胎間水氣子滿體腫
赤茯苓 白朮二兩 杏仁 旋復花一兩 黃芩一兩半
水煎五錢日二
桑寄生飲 治姙娠徧身虛腫

桑寄生 紫蘇一兩 木香五錢 桑白皮炒
大腹皮三分 水煎三錢
姙娠小便不通
論曰姙娠小腸有熱熱積胞內使氣道否澁故小便不通令人腹脇脹滿臍下急痛是其証也
榆白皮散 治姙娠小便不通心神悶亂小腹急痛
榆白皮 王不留行 滑石一兩
共末燈心湯下二錢
冬葵子湯 治姙娠淋小便澁小腹急水道熱痛

冬葵子二合 赤茯苓 白芍藥 車前子一兩
黃芩五錢 水煎五錢
滑石傅 治妊娠子淋小便數熱痛手足煩疼
滑石飛 汲水調五錢塗臍下一寸小便即利未利再塗

妊娠大小便不通

論曰妊娠大小便不通者以臟腑盛實熱氣蘊積不時宣導之所致也若熱結于大腸則大便不通結于小腸則小便不通今大小腸俱有熱則二便俱不通其候令人煩滿小腹脹急惟能均調臟腑使氣疏達則傳化無所留滯矣

梔子湯 治妊娠二便不通臍腹脹痛
梔子 黃芩 柴胡 葵子一兩 石膏四兩
澤瀉 赤芍二兩 車前草五錢 水煎四錢入竹葉十片

柴胡通塞湯 治妊娠二便不通下焦熱結
柴胡 黃芩 陳皮 澤瀉 羚角三分 梔子
大黃炒 石膏一兩
水煎四錢入生地一分或微炒半分

茅根湯 治妊娠二便不通結悶氣急腹滿欲死
茅根 滑石 車前子 大黃炒各等分 水煎四錢

木通湯 治妊娠二便不通下部脹滿
木通 大黃生二兩 滑石三兩 大麻仁一兩 水煎四錢

又方 治妊娠二便不通
猪脂二兩 酒半升煎脂化分三服未通再服

妊娠半產

論曰妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產蓋由妊婦衝任氣虛不能滋養于胎胎氣不固或顛撲閃墜致氣血損傷或因時病瘧痢之類皆致半產

延胡索湯 治半產後氣血不快惡露積斷

延胡索 當歸 白芍藥 炙甘草 芎藭
桂心一兩 水煎三錢

艾葉飲 治半產後惡露不斷心悶氣短
艾葉 生地黃 當歸 人參 地榆
乾薑 阿膠各等分 水煎三錢

妊娠數墮胎

論曰胚胎之始賴血氣以滋育若妊娠血氣盛強陰陽之氣和相與流傳于一體唯能順時數謹人事勿動內傷則生育之道得矣衝任氣虛將攝失宜子臟風冷不能滋養

子胎故每有妊則數數傷墮也

地黃散　治數墮胎子宮虛冷

熟地　黃芪　人參　白朮　芎藭　當歸各一兩

吳茱萸　炙甘草　乾薑五錢　共末酒下二錢

阿膠湯　治數墮胎小腹痛不可忍

阿膠　熟地　艾葉炒　芎藭　白朮　當歸

杜仲炒一兩　棗水煎四錢服

地黃湯　治妊娠氣血衰微胞藏挾冷數墮胎

熟地黃四兩　艾葉　當歸二兩　杜仲　芎藭

阿膠　五加皮二兩　水煎五錢日二

芎藭湯　治數墮胎心腹痛

芎藭　白芍藥　白朮　阿膠　炙甘草一兩

艾葉糯米薑水煎三錢

聖濟總錄纂要卷之二十三終

聖濟總錄纂要卷之二十四

程林雲來　纂

新安　汪士昌禹言　方振先孝起　校

畢天鋐羲馭

產難門

逆產　難產　子死腹中　息胞即胞衣不下

產後門

產後血運　產後譫言妄亂　產後中風

產後中風口噤　產後中風角弓反張

產後蓐勞　產後大便不通

產後乳汁不下　產後妬乳

產後乳結核　產後乳結癰

逆產

論曰逆產者蓋因妊婦初覺腹痛產時未至驚動傷早兒回轉未至竟便用力產之即令逆也

牛酥膏　治逆產數日或生不以理橫逆艱難千方百計不安急宜服之膏至兒身上即產下

貞牛酥 秋葵子一升 大豆黃卷 滑石二兩
瞿麥一兩 白蜜半升 秋冬二葵子功用并同
共末用酥煎沸入蜜再煎下末攪勻收貯酒下一二
匙頻服
半夏飲 治橫產及倒生胎死腹中并衣不下母氣欲絕
者
半夏五枚薑汁炒 白斂一兩 共末溫酒下一錢難產一服
橫產二服倒生三服胎死腹中四服此方加瞿麥
尤佳

竈心黃土塗 治逆產
竈底心黃土五合研 以生薑汁和如糊塗產母臍中以
帛繫換
小麥飲 治逆產
小麥 小豆一兩炒 共末水煎二三錢溫服少項又服
鹽粉塗 治逆產足下
食鹽 胡粉 共研勻用米醋和塗兒足心即順下
葱蒜熏法 治逆產
大蒜七枚 生薑五錢 葱白二十一根 共搗入盆中以沸湯

五大碗投盆內速扶產婦坐盆上薰產戶冷即易之
三易胎正矣
丹砂塗 治逆產
丹砂五分 用蜜和塗兒足心又以丹書兒左足心千字
書右足心里字
又法
以鍼刺先出足底足痛還即順若手先出即刺手
又法
取三家鹽熬令黃以津唾和塗兒足心次取三家飯放

兒母手中佳
艾葉湯 治逆產及子死腹中
生艾葉五兩 用酒一升煎旋服則順下如不飲酒以水
煎服
蛇脫灰酒 治逆產及子死腹中
蛇脫燒灰 研末用白酒和下面向東方服一錢未下再服
兎絲子酒 治逆產及子死腹中
兎絲子炒 為末酒下一二錢即生 一方以車前子
為末酒下二錢

蒲黃塗　治逆產

蒲黃　用水和塗兒手足心即順

難產

今曰臨產或難蓋為正氣擾亂心神不寧所致古人有預備方法臨月用滑胎散并日行二三十步貫使血氣下順產無留難無令喧雜驚怖必須產閣溫暖遇嚴寒之日四圍燒火及多備熱湯焚諸異香常令爐火氣及身暖使人看候產婦纔覺腹痛速與飲食令飽無使困乏飢則難產煮粥湯則白蜜煎湯或空痛經日兒胎未動者宜安心熟

忍以薦蓐鋪牀就上安產免爲地氣所侵又就邊行三五百匝或困于行暫且扶立須臾又行如血水俱下痛陣及腰此欲產之兆諸餘法度宜次序行之

車前子散　治難產經日不下

車前子 炒微　滑石　川歸 五錢　榆白皮　瞿麥穗

共末用酒下二錢如血水未下用大黃二錢煎湯服胞胎即下

如意膏　治難產催生

蓖麻子 二十一粒去殼研　丹砂 五分　共研如膏用油紙攤貼臍下小腹間外用帛緊縛候產與胞衣下速去之

緩即脫人氣血此藥覺腹痛便宜用

牛酥膏　治難產催生 見治逆產

苧麻根飲　治難產及晚嫁難產

乳母論云三十後適人者謂之晚嫁也蓋少嫁則筋骨軟弱故產門易開晚嫁則筋骨堅强所以難產產婦臨月宜常服之

苧麻根　人參　陳皮 炒　熟生地　炙甘草

烏雞肉 一兩　生薑　水煎四五錢溫服少頃又服

燒弓弦散　治難產

弓弦 五寸燒灰研　箭幹 五寸燒灰　共研勻作一服酒下

牛酥飲　治數日不產胎上冲心欲死

牛酥 五錢　冬葵子 炒一合　滑石 研二分

共入袋盛用酒一升煮熱服一鍾

白芍散　治數日不產胎上冲心欲死

白芍　川芎　甘草　川歸　茯神　陳皮 各二兩

苧麻根 一把　髮灰 一分

共末空心食前酒下二錢少頃又服

桂心湯 治難産數日不生子死腹中母氣欲絶者服之效

桂心半兩 木通 牛膝 瞿麥穗 榆白皮各二兩

水煎五錢服

石燕酒 治難産催生 一方兩手握石燕亦産

石燕 以童便磨取三四錢微温呑赤小豆七粒立産

子死腹中

論曰胞衣未下急于胎之未生子死腹中危于胎之未下蓋胞衣未下子與母氣通其呼吸若子死腹中胞藏氣寒胎血凝沍氣不升降所以難下古方多以行血順氣藥及硝石水銀硇砂之類其胎已死雖形已冷血凝氣聚復以至寒之藥下之不惟無益而害母命者多矣古人用藥深于用意但後生不分子死理有二端用藥寒温各從其宜有妊娠胎漏血盡子死者有墜墮顛撲內傷子死者有緣久病胎萎子死者若此之類遂令生人挺擧妊婦使身體中正仍以褥蓐自腰抵定令仰臥開足向地如欲産勢遂進附子湯三服方見後 卽以衣包温瓦數片二三人不住手自臍腹撫摩左右周回熨之使胞藏温煖凝血流動蓋附子湯能破寒氣墮胎服之少頃覺腹內痛陣陣作惡血漸動良久必産此用温藥之意也有因傷寒熱病温瘧之類胎受邪熱毒氣內外交攻因致胎死胎不卽下留于胞藏古人慮胎受毒氣必致脹大所以用硝石水銀硇砂之藥蓋硝石水銀之性不惟使胎不脹大又能使胎化爛副以行血順氣之味死胎卽下臨産更令生人以手體候胎有橫有逆有脹有爛以意消之庶免難産之理胎若則所生子日月已周臍蔕不養所以自下由之果實既熟不俟剪折蔕帶自分若子死腹中則所生在母日月未足臍蔕尚固由之果實未熟枝末雖枯不折不離所以在母行之有法用之有度斯無虞矣凡審死胎當辯有妊之婦病胎隱伏不動難認存亡令生人以煖手就臍下款款按至胎處覺腹中冷應手是胎已死稍温卽非更看妊婦外症面青舌冷舌下脉青黑口穢氣手指甲黑皆子死之候

附子湯 治子死腹中産後氣寒胎血凝沍子死難下破寒墮胎

附子大者一枚生去皮臍切十片 生薑五片

水煎稍熱服經時不下服桂心湯
桂心湯　治子死腹中産後氣寒胎血凝冱子死難下破
寒墮胎
桂心不見火　烏頭一大者一兩　水煎稍熱進用三服
地黃酒　治子死腹中未下
懷生地酒洗搗取自然汁　用酒煎沸和地黃汁連三服胎不
下服牛膝湯
牛膝湯　治子死腹中氣血凝結致子難下
牛膝　朴硝三兩　川芎　大黃炒　桂心

蒲黃五錢　懷生地二兩　水煎五錢去滓入朴硝一錢再
沸服連進三服未下服後瞿麥湯
瞿麥穗湯　治子死腹中二三日不出母氣欲絕
瞿麥穗半兩　牛膝　榆根白皮一兩　木通　桂心三分
水煎五錢去滓服連進三服胎未下服後牛膝湯
牛膝湯　治子死腹中滑氣血破胞胎或子死壞爛母氣
悶絕者
牛膝一兩　川歸　桂心三分　川芎　蒲黃五錢
硝石　瞿麥穗二兩　懷生地汁一鍾

水煎五錢入汁再沸連進三服惡血下子即出也或
胎已損令生人仔細探之勿令腐肉瘀在腹內出畢
再一二服逐惡免生他病
薑汁酒　治子死腹中氣血凝滯不下
生薑汁六分　雞子黃二枚　白酒二分　米醋一分
共酒醋同煎入薑汁二分再沸傾碗中入雞黃一枚
乘熱打轉稍熱服須臾依上法連進三服
牛尿塗　治子死腹中二三日不下
牛尿　用之塗兒母臍腹上并左右少頃立出

水銀飲　治子死腹中悶絕者
水銀一兩　飲下若母不知人事斡開口灌下口斡不開
當于鼻中灌下令頭稍仰銀入母腹中立出
又方
竈中黃土　研末用酒和服二三錢立下
息胞即胞衣不出
論曰凡產子母已分而胞衣未下名曰息胞蓋由欲產之
時用力太過產罷又被風寒冷氣所侵血氣凝澁乏力運
用以致持久不惟有妨兒臍兼亦致害母命急須提掣產

母使形體平正氣息少待可以運動及以壯氣益血湯散助之俾氣血滑利其胞可下矣若初生產婦未經諳練見胞衣未下恐妨兒體輒便剪臍或誤牽斷或執握不固其胞直上掩心使不盡天年者多矣古人剪臍之法必用慣熟生人先備金銀銅鐵稱錘之類用軟熟衣帶一條絨一頭縮定仍留一頭纔下臍即將臍帶與衣帶相連結定以緊牽爲度所貴胞不上掩心也

壯氣益母湯　治胞衣未下被風寒所侵血氣凝澁或氣少力乏不能運用胞衣停息

懷生地　人參　川歸一兩　代赭石醋淬五錢研

木香一分　生薑大棗水煎五錢稍熱服少頃又服以衣下爲度

牛膝湯　治胞衣半出半不出或子死腹中著脊不下及二三日不產血氣上冲

牛膝　秋葵子　榆白皮三兩　懷生地取汁三分

水煎五錢入汁服

滑石湯　治胞衣不出服之爛胞

滑石　川歸　炙甘草一兩　牛膝　瞿麥穗半兩

秋葵子二合　水煎五錢稍熱服少頃再服以下爲度

惡血不下盛于衣中

鹿角　剉爲細末用酒下一二錢以下爲度

草麻子塗　治胞衣不下

草麻子一二十枚　去殼研如泥塗腳心衣下速去

又方　治胞衣不下

水銀　用棗肉研不見星丸皂子大酒服一丸立下

冬葵子酒　治衣不下令爛胞

葵子　阿膠　牛膝　川歸各一兩　共末酒下三錢

產後血運

論曰產後血下或多或少者皆致血運蓋血隨氣行血多者氣虛血少者氣逆故也其候頭目旋轉精神昏憒沉默不知人事治法虛弱者宜調氣而益血氣逆者宜調氣而下血則運思過半矣

玄胡索湯　治產後血運

玄胡索　川芎一兩　人參　川歸　牛膝半兩

懷生地一兩　水煎五錢去滓入童少許稍熱服

益母草飲　治產後血運心煩悶亂恍惚如見鬼神

益母草汁如無以土瓜根汁代之 生地汁 藕汁半鍾
雞子白三枚 童子便一鍾
將四汁煎沸入雞子白攪勻分三服連進
紅藍花湯 治產後血少運悶嘔逆
紅藍花 蘇枋木一兩 水煎四五錢稍熱服日二
蒲黃飲 治產後惡血上掩心如見鬼神欲死
生蒲汁 生地汁一鍾
用白酒一鍾同二汁煎十數沸稍熱服
醋雞子 治產後血運迷悶不省人事脣口冷面青

米醋一鍾 雞子生一枚
將醋煎沸以雞子打破攪勻頓服
白芍湯 治產後血運心中迷悶不知人錯亂少氣
白芍藥 懷生地 炙甘草一兩 丹參五錢
生薑水煎五錢去滓入蜜少許連進三服

產後語言妄亂

論曰憂愁思慮則傷心心虛故邪從之新產之人內亡津液而血虛志弱使人精神昏亂語言差謬恍惚不寧甚者變狂顛之症治宜補血益心安心定志其病自愈

白茯苓湯 治產後血氣虛弱精神不安言語錯謬
白茯苓 人參 桂心 澤瀉 蒲黃半兩
懷熟地 川歸 麥門冬 遠志一兩
共末入蜜杵丸梧子大人參湯下三四十丸
白茯苓湯 治產後心氣不足血虛狂言
白茯苓 熟地二兩 人參 甘草 防風
白薇 龍齒 獨活 遠志一兩
水煎四五錢稍熱服
茯神湯 治產後血虛狂言妄語心志不寧

茯神二兩 人參 白芍藥半兩 桂心 川歸
炙甘草一兩 生薑大棗水煎四五錢稍熱服日二
遠志湯 治產後血虛心氣弱為風邪所搏語言妄亂
遠志 人參 赤芍 白茯 子芩 獨活
炙甘草 防風一兩 懷熟地二兩
水煎四五錢熱服日二

產後中風

論曰產後血氣未完風邪乘之入于經絡則發為痓其候口噤不開筋脉攣急而目喎僻至于五臟六腑則隨所中

而症候出焉甚者瘈瘲直視角弓反張神志昏塞便溺遺
失瘖不能言爲中風之證

小續命湯　治產後失血中風口眼喎斜身麻不知痛處
拘急不得轉側遺溺失音
麻黃二兩去根節　人參　附子　川芎　白术
防己　白芍　子芩一兩　桂心　甘草二兩　防風一兩半
生薑水煎五錢服

大豆酒　治產後中風背强口噤或煩熱頭身皆重身痒
及嘔逆直視皆風濕所致

大豆三升　炒令聲斷用酒五升沃熱豆中取豆汁服一
盞日飲五七次取微汗身潤即愈一則去風二則
消血

麻黃湯　治產後中風口眼喎斜身背拘攣
麻黃去根節　桂心一兩　川芎　白芍藥　防風二分半
竹瀝一合　白术五錢炒
生薑水煎五錢去滓入竹瀝半合二三服取汗

地黃酒　治產後中風口噤筋脈攣急角弓反張
生地汁一升　白酒三升　生薑汁二合　用二汁煎數沸入
酒再煎十數沸任性細飲數杯若冷多加桂心末二
兩若熱多加藕汁二合

產後中風口喎

論曰足陽明胃經入上齒中環出挾口環唇下交承漿手
太陽經循頸上頰至目銳眥此二經皆爲風寒所中使筋
脈縮急牽引于頰故爲口喎僻不正語言蹇澁目不能平
視也

人參湯　治產後中風口面喎斜
人參　白芍藥　防己　白术　甘草

防風　麻黃去根節　附子　川芎　子芩
桂心一兩　生薑大棗水煎三錢溫服

天麻散　治產後中風口眼喎斜筋脈不利
明天麻　懷生地　白殭蠶炒　玄胡索
獨活　防風　川歸　荆芥穗　桂心五錢
共末用酒下二三錢日二服

獨活湯　治產後中風口面喎斜
獨活　防風　川歸半兩　川芎　枳殼　桂心一兩
細辛五錢　蔓荆子半兩　竹瀝

水煎三錢去滓入竹瀝半合再沸服日二

竹瀝湯 治產後中風口面喎斜手足不隨語言謇澀昏

昧

竹瀝 防風 麻黃去根節兩半 升麻 羌活

羚羊角 川芎 桂心一兩 杏仁八十枚去皮尖炒研

水煎三錢去滓入竹瀝半合再沸二三沸少頃再服

取微汗差

地汁竹瀝飲 治產後中風口眼喎斜筋脉拘急

生地汁 竹瀝各半升 獨活半兩 用水二鍾煎獨活三

錢去滓入地汁竹瀝各半合再二三沸溫服日二

產後中風角弓反張

論曰背為陽腹為陰陰陽之脉交相維持產後血脉不足風邪中於陽經使陽脉拘急反引腰背如角弓反張故以為名

麻黃湯 治產後中風角弓反張筋脉急痛

防風 人參 白朮 川芎 甘草 川歸

麻黃去根節 桂心一兩 附子 乾薑五錢

杏仁四十枚去皮尖炒 水煎三錢服日二

白茯苓湯 治產後角弓反張

白茯苓 山梔仁 川芎 川歸 炙甘草五錢

黑乾薑 吳茱萸 懷熟地 桂心 細辛一兩

水煎三錢溫服日二

黑豆酒 治產後中風腰背反折筋急口噤

黑豆二升小者 白酒四升 將豆炒香熱傾入酒中去豆用酒不拘時頻服一鍾服完再服後地黃酒

地黃酒 治產後中風腰背反折筋急口噤

生地汁二升 白酒二升 生薑汁二合 先煎二汁數沸入

酒再沸十數沸任意飲二鍾若冷多加桂心末二兩

熱多加藕汁二合

產後蓐勞

論曰產蓐之後食飲起居失于常度使氣血不得其養若血虛則發熱氣虛則發寒氣血俱虛則寒熱更作日漸羸瘦故為蓐勞又產後惡露未盡亦令致此則時寒時熱腰腹刺痛甚者不能食食亦不作肌膚

懷熟地湯 治產後蓐勞寒熱肢體痛力乏

熟地黃 人參 白朮 白茯苓 牛膝

鼈甲　淡竹葉　桂心　麥門冬　川歸
甘草一兩　水煎三錢溫服日二
赤芍湯　治產後蓐勞疼痛寒熱頭目旋運多驚盜汗腹
痛大便不利瘦劣
赤芍　川芎　人參　丹皮　玄參　五味子
白薇　白茯　麥冬　甘草　川歸一兩　熟地二兩
水煎三錢服
猪腎湯　治產後蓐勞似瘧寒熱不能食
猪腎一對　粳米　白芍藥　知母一分　川歸分半

葱白五寸　水煮腎取汁入米煎三錢溫服日二
黃芪煮散　治產後蓐勞肌瘦面無顏色或寒或熱肢痛
頭疼心煩
黃芪　鼈甲一兩　人參　白芍藥　川歸
白茯苓　桑寄生　麥門冬　熟地　桂心
牛膝　甘草五錢　共末每用猪腎一對煮取汁入芪
棗煎三錢溫服日二
白薇丸　治產後蓐勞寒熱體虛瘦弱不思食
白薇　附子　熟地　栢子仁　鼈甲　川歸

肉蓯蓉　黃芪　人參　白芍　丹皮　桂心
石斛　羌活三分　川芎　甘草五錢
共末蜜丸梧子大飲下三四十丸
產後大便不通
論曰大腸者傳道之官變化出焉產後津液減耗胃中枯
燥潤養不足糟粕壅滯故令大便難而或致不通蓋新產
之人喜病此者由去血過多內亡津液故也
訶梨勒丸　治產後大便不通
訶勒皮　人參　懷熟地　大黃酒炒　川歸

大麻子一兩　共末入蜜杵丸梧子大米飲下三四十丸
日二
人參丸　治產後大便不通
人參　檳榔半兩　紫朴三分薑炒　川歸一兩
郁李仁去皮尖研五錢　共末入蜜杵丸梧子大酒下三四十
丸日二
大黃丸　治產後大便秘澁不通
大黃酒炒　赤芍藥　川歸　紫朴薑炒兩　枳實麩炒
懷生地　大麻仁三分　共末入蜜杵丸梧子大陳米飲

下三四十九

升麻湯　治產後大便秘澁

升麻　大黃一兩　生地　前胡二兩　山梔

川歸八兩　水煎服

大腹皮湯　治產後下血過多熱毒氣結燥大便不通壅滯氣悶腰痛脇脹

大腹皮五枚　枳殼　懷生地　赤芍藥一兩

甘草三分　天門冬　羌活　郁李仁

秦艽五錢　水煎三錢溫服日二

蜜煎導法　同上

白蜜中斤　慢煎令稠如硬餳撚指大長二寸內下部中仰臥效

烏梅導法　同上

烏梅肉　爛搗如泥入蜜少許撚內下部中即仰臥效

溫中丸　治產後大便不通七八日以上者

硫黃生用研細　檳榔末研細　以水浸炊餅糊丸梧子大用木香湯下一二十丸

中和散　治產後大便不通及老少皆可服

附子去皮臍　大黃一兩同上俱半生半炒

共末臨臥飲下二錢日二

產後乳汁不下

論曰新產水血俱下暴傷津液氣脈未順所以乳汁不下若能調其衝任治手太陽少陰之經不足則乳脈自然流行若其稟虛弱氣脈閉而不通雖治之亦無益也

豬蹄湯　治產後乳汁少或不下

豬蹄兩隻以水五升煮取汁二升　木通　漏蘆　瞿麥穗一兩

用汁煎三錢溫服日二以效為度

木通湯　治產後乳汁不通

木通半兩　子芩　白芍藥　桑皮　漏蘆一兩

甘草　枳殼炒五錢　竹葉一把

水煎三錢溫服日二

萵苣子散　治產後乳汁不下

萵苣子　糯米　粳米半合　水煎甘草五錢取汁煎三味分三服

括蔞酒　同上

括蔞　取大者一枚搗爛入白酒煎溫服以效為度

魚灰散 治產後乳汁不下

鯉魚骨 燒灰為末酒下一二錢

產後妬乳

論曰氣血流行上為乳汁下為月水上下通達不失常度是謂平人若不通而塞則為痛熱氣復來乘之則為腫向之流行者今壅遏矣倘失調治則結硬成核身體壯熱癢則憎風遂為乳癰世傳治結乳閉乳亦即為妬乳者此也

升麻湯 治產後妬乳乳汁不洩結成癰腫熱痛

升麻 玄參 白芍藥 生地黃 甘草 連翹

瞿麥穗一兩 射干五錢 水煎三錢溫服日二

二灰散 治乳汁不下結滯不消熱腫

蔓荊子 皂莢刺各燒灰存性一兩

共研勻用酒下一二錢日二

升麻傅 治妬乳結成癰腫

升麻 木香 檀香五錢

各用成塊砂盆酒磨相等用鵝翎傅乳上

天麻草洗 治妬乳成癰腫或已破膿血未散

天麻草不拘多少 用水煎濃汁頻洗患上日三四次差

產後乳結核

論曰產後乳結核者以血氣虛弱風邪搏之乳脈凝滯故結而為核日久不差蘊積生熱熱勝則腫腫甚則成癰也

枳殼湯 治產後乳結核或成癰腫發熱疼痛

枳殼 木通 人參 白蒺藜炒去刺 桂心

烏雞骨醋炙 白芍藥 川歸 黃芪 大黃炒一兩

水煎三錢溫服日二

麥門冬湯 治產後乳結核及欲作癰腫痛

麥門冬去心 子芩 木通 白芍藥 人參

赤茯苓 甘草 綿黃芪 桑寄生 防風一兩

大棗水煎五錢去滓入沙糖二錢攪服

川歸散 治乳結核堅硬

川歸 人參 白芍藥 枳實麩炒三分 木通

白蒺藜炒 烏雞骨醋炙 黃芪一兩 桂心五錢

共末酒下一二錢日二

產後乳結癰 乳癰外科結核詳前乳癰門

論曰產後衝任不足氣血俱虛其熱滯行入于足陽明之脈其直行者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中衝脈者

起于氣衝並足陽明之經夾臍上行至胸中而散其經爲邪熱攻衝則血爲之擊搏氣爲之留滯擊搏則痛作留滯則腫生內經所謂榮氣不從逆于肉理乃生癰腫產後多有此疾者以乳汁壅積與氣相擊搏故也

黃芪湯　治乳結核腫痛煩熱漸成癰

黃芪　生地黃　升麻　麥冬半兩　人參

赤茯苓一兩　遠志　川歸　白芍藥　甘草五錢

水煎三錢溫服日二

白芍湯　治乳結癰腫毒敗壞不散發熱疼痛

白芍藥　人參　赤茯苓　生地黃　川歸

黃芪　麥門冬　甘草　桂心一兩

生薑大棗水煎三錢去滓入朴硝五分沸服日二

甘草飲　治乳癰熱痛未結膿者

甘草五錢半生半炙　括蔞一枚去皮

用酒甘草取汁入蔞瓤再煎服

括蔞散　治乳癰膿潰未潰熱痛不已

括蔞二兩　防風　人參　細辛　紫朴　黑乾薑

敗醬　桔梗一兩　共末用酒下二錢日二

黃芪膏　治乳癰欲結未結膿攻痛

黃芪　白芍藥　川芎　子芩　防風　川連

白斂　川歸一兩　共末用雞子白和塗患上日二易

聖濟總錄纂要卷之二十四終

程　林雲來　纂
項　睿視菴　補
新安　許志義逸師　較
江　湘郢上　閱

小兒門

小兒初受氣法　小兒相法　小兒浴法
小兒口噤　小兒撮口　小兒鵝口
小兒重腭　小兒臍風　小兒解顱
小兒顖陷　小兒急驚　小兒慢驚
小兒天瘹
小兒門
小兒諸疳　小兒無辜疳　小兒哺露丁奚
小兒嘔吐　小兒嗽吐哯　小兒泄瀉
小兒洞泄注下　小兒燕口瘡　小兒語遲
小兒齒不生　小兒涎液不收

小兒初受氣法

小兒受氣在娠一月胚二月胎三月血脉生四月形體成五月動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃十月百神備而生生後六十日目瞳子成能欬笑應人百日任脉生能反覆百八十日尻骨成能獨坐二百十日掌骨成能匍匐三百日髕骨成能倚立三百六十日爲一期膝骨成乃能行立此是定法若有不依期者必少壽也

小兒相法

兒生枕骨未成者能言而死膝骨不能成者能踞而死掌骨不成者匍匐而死踵骨不成能行而死臏骨不成者能立而死又初生頭四破者不成啼聲散者不成汗不流小便凝如脂者不成此其大略也

浴兒法

初生浴兒用猪膽汁一枚投湯中令終身無瘡疥湯中勿加生水浴訖斷臍

生三日浴法

桃李梅根各二兩　水煎浴之去不祥令無瘡疥或入麝香少許

虎頭骨湯浴法　鎮心安神永無驚風顛癇瘡疥癃癖之

患

虎頭骨五兩　赤金十兩　白芷二兩　苦參四兩

水煮入猪膽汁浴兒

口噤

論曰凡兒初生便口噤不能飲乳者此由在胎時母臟腑有熱熏蒸胞胎熱氣入兒心脾致初生後熱結于口點生口中如黍米大令兒不能吮乳名曰口噤

竹瀝飲　治口噤體熱

竹瀝　一合水頓令溫分三服徐徐灌下差

又方　治小兒口噤病在咽中如麻豆許令兒吐沫不能哺乳

雄鼠屎　一枚研塗舌上與兒飲差

撮口

論曰小兒初生未滿七日面赤喘促啼聲不出乳哺艱難名曰撮口蓋因胎中受風挾熱始生之時氣血未定洗浴當風拥抱失宜致成斯疾撮為急切宜速治之

麝香散　治初生胎熱撮口

麝香　丹砂一分　蛇脫一尺許炙赤研

共研津液和塗兒唇口上五七次

牛黃竹瀝散　治胎風熱撮口發噤

牛黃一分　竹瀝半合　用瀝和黃一字服之三四歲兒服二字良

鵝口

論曰小兒初生口中有白屑如粟米狀舌外有瘡至舌上又生瘡謂之鵝口此由胎中稟受穀氣偏多既生之後心脾氣熱上熏于口致成斯疾蓋心主舌脾之絡脈散于舌下故也

爪斷法　治小兒初生連舌下有膜如石榴子者中膈連）舌下致令兒語不發舌不轉也

以爪甲摘斷令微有血出無害若血不止可燒亂髮灰塗傅即差

鵝口

栗房　用井華水濃煎汁以綿纏筋頭拭之如無栗房以木代用

白礬散　治鵝口不能吮乳

白枯礬　丹砂一分　同研細傅舌上日二夜一

又方

白鵝屎　用水絞取汁瀝塗口中舌上下良

重腭

論曰小兒初生上腭有物脹起若懸癰或如蘆籜盛之狀者名曰重腭此乃脾胃挾熱血氣不能收斂令口中舌下或在腭頰如吹脬速宜以綿纏長針微露鋒芒刺腫上决去惡血則其病可消若再生再刺不爾則脹滿口中妨害乳食呼吸不可少緩也

二乳飲　治小兒重腭

驢乳　猪乳合　以二乳和煎頻服一二匙良

又方　治小兒重腭

蛇脫　露蜂房各燒灰　研勻塗口中差日二

臍風

論曰初生斷臍後臍瘡未愈不可令犯風邪及浴水入瘡浮冷搦抱皆致臍風其候臍腫多啼甚則風行百脉口噤不乳身體反強乃致不救

錦白散　治初生七日臍風發腫欲落者

錦帛燒存性一錢研　雄鼠屎七枚炒研　麝香少許　大棗肉三分

共末臍欲落不落用末傅之忌見水火

川栢散　治臍風汁出不止

川栢一兩半　亂髮灰一分　釜黑煤三分　共研末傅上良

解顱

論曰腎爲一身之骨髓腦爲髓海若腎氣和平則骨髓充足骨髓充足則顱顖閤滿若腎氣不足則骨髓不充年雖長大其頭縫尚開故名曰解顱又名顖解

細辛散　治解顱

細辛　桂心　乾薑炒五錢

共末用乳汁和傅顱上日二三

封顖散　治顖門開解

栢子仁　細辛　白芨　防風一兩　草烏五錢

共末乳和傅開處

蟹足散　治顖門開解

蟹足炙　白斂五錢　共研末用乳汁和傅開處日二

甘菊湯　治小兒鼻中多涕是顖門爲風所吹

甘菊花　炙甘草一兩　防風五錢　山萸肉四錢

水煎二錢服日二

合顖散　治顖門不合

防風　白芨　栢子仁一兩

共末用乳汁和塗以合為度日二三

雞血塗　治腦長顖不合

丹雄雞　就兒顖上刺冠令血滴顖上以赤芍藥末粉之日二次差

蛇脫膏塗　治腦長髮大顖開不合臂脛不能勝頭

蛇脫燒灰　研末以猪頰骨髓少許和塗上日二次差

顖陷

論曰人之冲氣內圖于胃上通于項顖小兒胃氣冲和則腦髓充足顖項自合若胃熱薰蒸臟腑渴而引飲或致泄痢則臟腑血氣虛弱不能充髓腦所以顖陷也

生地散　治小兒臟腑壅熱氣血不榮致顖陷者

懷生地焙乾二兩　烏雞骨酥炙一兩　共為末用米飲下一錢日二兒小者服二五分以差為度

狗頭骨塗　治小兒胃虛血氣不充顖陷

雄狗頭骨酥炙黃　研末以雞子白和塗顖上日二三以差為度

地黃丸　治小兒胃虛血氣弱不充足顖陷

懷熟地　白朮　白芍藥　川歸五錢　桂心一錢

共末入蜜杵丸如黍米大飲下一二十丸日二

急驚風

論曰小兒急驚之狀身體壯熱痰涎壅滯四肢拘急筋脉牽掣項背強直目睛上視牙關緊急謂其發動擊急故名急驚此因心絡受邪所致蓋心藏神而主血小兒血氣不和宿有實熱若為風邪所乘則熱盛血亂血氣相并則神舍不安故卒然而驚古人所謂驚癇是也

龍齒散　治小兒急驚風四時傷寒壯熱口焦乾目翻露搐搦昏迷

龍齒一錢　丹砂　麝香五錢　鉛霜二錢

共末研勻用水煎金銀葱白湯下二五分汗出立愈

黑神丸　治小兒急慢驚風

牛黃　麝香　冰片　青黛五分　膩粉二錢

蘆薈　京墨　使君子　白麪一錢

共研陳米糊丸芡實大薄荷湯下一丸

蝎稍散　治小兒急慢驚風

蝎梢　烏頭尖七枚　丹砂五分　附子生一分
半夏一枚　共末柳枝湯下

慢驚風

論曰小兒慢驚者癇病發于陰也由在胎時稟受不足心氣虛弱外中風邪入于臟腑其發則手足瘈瘲頭目搖動牙關緊噤神情如醉休作有時潮搐不定謂之陰癇治則外以灸法內以藥餌臨機應變可謂上工若症見息高魚口泄瀉遺尿者皆所不治

羌活煎　治小兒慢驚風兼內外俱虛

羌活　防風　人參一分　獨活　桂心一分
硫黃　水銀二錢　白附子五錢　全蠍　白殭蠶一分
共末棗肉丸小豆大防風湯下一二丸

全蠍散　治小兒慢驚風兼內外俱虛

全蠍五枚　乳香　細辛一分　青黛　白附子五錢
共末冬瓜子湯下

珍珠丸　治小兒慢驚風

珍珠　牛黃　丹砂　雄黃　膩粉一分　共末研勻用陳米糊丸小豆大用薄荷湯下五七丸日二

醒脾散　治小兒慢驚風

人參　半夏　膽星　山藥　全蠍　薄荷一分
桑螵蛸四枚　共末入麝香少許拌勻用粟米飲下五分

鈎藤煎　治虛風慢驚

鈎藤　防風　川芎　天麻　麻黃一分　蠍稍
荊芥穗　蟬蛻五錢　冰片　麝香一分　白殭蠶
薄荷心各二十一枚
共末入蜜杵丸皂子大用荊芥薄荷湯下一丸

天竺黃散　治小兒慢驚風經久不差

天竺黃　人參　使君子　炙甘草　蠍稍
胡黃連一分　冰片　麝香五分　半夏二枚薑炒
藿香五分　共末蜜湯下三五分

天癇

論曰小兒卒然驚悸眼目翻騰壯熱不止四肢抽掣上即如釣縛之狀名曰天癇乍作乍止此風熱痰涎之所發也良由乳母恣噉五辛熱酒之類毒熱氣流入乳中因即乳兒兒飲熱乳臟腑風熱脾胃生涎痰涎既生必壅滯不得宣通致令心神不寧為天癇之病

赤靈丸方　治小兒天瘹癎病急慢諸風

丹砂研水飛過　人參各一兩　酸棗仁研二兩

乳香研半兩　白麪二錢　生蜜和膏入新竹筒內以油紙封扎定坐飯甑上炊候飯熟爲度分作三十丸每一丸分四服薄荷湯化下更量兒大小服之

白殭蠶散方　治小兒天瘹

白殭蠶炒　馬牙硝　鬱金　乾蠍去土炒各半兩

爲散每服一字匕乳汁調服長者半錢不拘時候

天南星散方　治小兒天瘹

天南星大者一枚掘地作坑安磚子一片先用火燒赤後放南星于磚上用酒半升傾天南星上卽用盞子蓋之候冷　爲散每服一字溫酒調下二歲以下用乳汁調

備急塗頂膏方　治小兒天瘹

烏頭末　芸薹子末各二錢　每用一錢新水調傅兒頂上

諸疳

論曰疳之爲病多矣錢氏謂二十以下爲疳二十以上爲勞二症同出而異名也總之不外毛髮焦稀口鼻唇白眼昏脊聳肚脹腸鳴或食炭米泥土等物又有五疳之分心疳卽驚疳其症壯熱臉赤唇紅口瘡盜汗煩渴便赤虛驚是也肝疳卽風疳其症搖頭側目白膜遮睛筋青燥渴汗多下痢是也腎疳卽急疳其症腦熱肌削手足如冰寒熱時來滑泄肚痛口乾爪黑是也肺疳卽氣疳其症咳嗽喘逆皮膚粟立口鼻作癢生瘡流涕咽喉不利是也脾疳卽食疳其症身黃困倦肚大腳細水穀不消瀉下酸臭是也此五臟成疳之謂也其外又有脊疳腦疳蟲疳蛔疳之名同疳渴疳瀉疳腫疳勞之各異然詳其始初者不出嗜欲失常大者不過甘肥無度所致總在隨症斟酌治之不可執一端以誤事也蓋疳者乾也因脾胃津液枯涸治宜調補胃氣爲主

褊建剪紅丸　治小兒疳積初起各種疳症皆宜服之

檳榔一觔　大黃一觔　牽牛末一觔　雷丸五錢

三稜醋炒六兩　蓬术醋炒六兩　貫衆炒五錢　商陸炒五錢

沉香五錢　藿香五錢　木香一兩五錢　丁香三錢

青木香三兩　速香五錢　香附米二兩　生漆渣四兩

楝樹根八兩　牙皂八兩煎汁　茵陳八兩煎汁　金毛狗脊二兩煎汁

不煎汁者各爲細末再用史君子肉二兩同大黃好

酒浸一日夜先放栢葉於鍋底次放大黃使君子肉
在上酒煮三炷香取出二味晒乾爲末各色先以一
圈者檳榔牽牛末跌起次用二圈者次用三圈者次
用四圈者將前汁跌爲丸以百草霜爲衣看兒大小
虛實自一錢至三錢止空心溫茶送下

蘆薈肥兒丸　治諸疳並鼻下生瘡愛喫泥炭米土諸物
神效

五穀蟲二兩煅　蘆薈一兩　胡黃連炒一兩　川黃連薑汁炒一兩　銀柴胡炒一兩二錢　扁豆炒二兩　山藥微炒二兩

山查肉飯鍋內蒸透二兩五錢　蝦蟆肥大者四隻煅　肉荳蔻麵裹煨去油七錢
檳榔六錢　史君子肉炒一兩五錢　神麯炒二兩
麥芽炒一兩六錢　鶴虱炒八錢　蕪荑炒去皮取一兩
硃砂二錢　麝香五分　共爲細末醋糊爲丸如黍米
大每服大者二錢小者一錢米飲湯下

蒸雞丸　治腎疳成勞骨蒸潮熱盜汗瘦弱腹急面黃食
不生肌日哭夜啼

黃連　柴胡　蕪荑　鶴虱　秦艽
知母　丹參　史君子肉等分

右爲末用黃雄雞一隻重一斤者籠之用大麻子飼
之五七日去毛令淨於背上開一孔去腸肚拭乾入
前末藥於雞腹內以線縫之先以黑豆鋪三寸於甑
底再安雞於甑中仍以黑豆蓋滿自朝蒸至晚候溫
冷取雞肉研爛同前末藥入酒麪糊丸如赤豆大二
歲者米湯吞服二十丸十五歲溫酒吞五十丸忌豬
雞肉

無辜疳

論曰小兒病面黃髮直時時壯熱飲食不生肌膚頭項生

核狀如瘤贅以無辜而得故名無辜疳由小兒嗜肥甘過
多蟲因甘動內緩脾氣飲食不調所致也治之當如治諸
疳之法凡小兒頭項有核如彈丸按之虛軟法當去之爲
此核初生軟而不痛中有蟲如米得熱氣則能蔓生蝕小
兒腑臟故外證肌瘦悴毛髮聳直下痢膿血體常瘡疥
滿不已也　無辜疳者言天有鳥名曰無辜晝伏夜游浣衣被露之經宿或過此鳥飛從上過將衣被與小兒穿卧便令兒有此疾古人言必有所據

丹砂丸方　治小兒一切無辜黃瘦腹痛疳痢或有蟲[illegible]
熱悉宜治之

丹砂　雄黃　乾蝦蟆一枚去頭足塗酥炙焦為末研

石菖蒲　漏蘆各一兩　麝香研一分

以菖蒲漏蘆為末與餘四味入乳鉢同研勻再羅粟米飯為丸如麻子大每服二丸米飲下空心後午各一服隨兒大小加減

蘆薈散方　治小兒無辜疳氣寒熱積滯不化心腹脹痛

蘆薈研　人中白研　蝦蟆炙黃各半兩　麝香研一分

為散再合研令細每服一字至五分熟水調下不拘時日二服後當下惡物量大小加減

鼈甲丸方　治小兒無辜疳

鼈甲醋炙黃去裙　黃連　桔梗炒　夜明砂各一兩

訶梨勒皮一兩半生一半熟　麝香一分　乾蝦蟆雄者一枚塗酥炙黃

為末以糯米飲為丸如菉豆大粥飲下七丸疳痢亦宜服日三服量大小加減

哺露丁奚

論曰小兒乳哺不調傷於脾胃脾胃衰弱不能飲食血氣減損不榮肌肉而柴辟羸露其臟腑不宜暢則吸吸苦熱謂之哺露也丁奚者黃瘦腹大項小與無辜哺露二候大體相似以輕重立名也

十全丹　治丁奚哺露

陳皮　川芎　青皮　莪朮煨　五靈脂

白豆蔻　檳榔　蘆薈各五錢　木香

使君子　蝦蟆各二錢

右為末豬膽汁浸糕糊丸麻子大每服二十丸米飲下有熱薄荷湯下

赤芍藥丸　治小兒丁奚雖食不生肌肉腹大食不消化

赤芍　大黃微炒　鼈甲醋塗炙令黃去裙襴各三分

桂心　柴胡　赤茯苓各等分

右件藥搗為末煉蜜和丸如麻子大每服五丸日三

服

人參丸　治小兒羸瘦腹大青筋及丁奚等病

人參　麥冬去心　半夏湯洗　黃芪　大黃微炒

茯苓　柴胡　黃芩各三分　甘草炙

芎藭半兩　訶梨勒皮煨用　鼈甲醋炙黃去裙襴各一兩

右件藥搗羅為末煉蜜丸如麻子大一二歲以粥飲下三丸四五歲五丸日三服量意加減用

嘔吐

有物有聲名曰嘔有聲無物則曰乾嘔有物無聲曰吐皆
因胃氣不和陽明之氣下行則順今逆上行則嘔吐有因
胃寒胃熱痰水宿食氣攻之症有乳吐熱吐寒吐冷吐傷
食吐傷寒吐各受症不一治法不同但兒啼未定氣息未
調遽以乳飲之其氣尚逆乳不得下停滯胃中則令嘔吐
又乳母貪涼冷氣入乳兒若飲之亦生嘔吐或因宿食未
消或解脫衣服因受風冷之氣入于腠理則腹脹痛嘔吐
熱吐者先去風痰冷吐者宜固胃氣痰吐宜下其痰次與
固正氣之藥食吐者當與塌氣諸症詳可一槩治之吐瀉

不止脾虛生風眼開風驚眼合慢驚慢脾當要固養正氣
若仍以驚藥治之則死不旋踵若不槩詳治療豈不悞哉

加味二陳湯　治胃有熱膈上有痰以成嘔吐

半夏製　橘紅　茯苓　甘草炙

黃連薑汁炒　山梔子炒黑　生薑各等分

水一鍾煎至六分緩緩熱服

加味理中湯　治寒痛嘔吐

人參　白朮　乾薑　甘草　丁香

右藥各等分用水一盞半煎六分熱服

藿香正氣散　治小兒風寒嘔吐

藿香　紫蘇　陳皮　桔梗　大腹皮　甘草

茯苓　厚朴　白芷　半夏麯

右剉爲末每服二錢加薑一片棗一枚水一盞煎至
六分去滓溫服

竹茹湯　治小兒積熱嘔吐

葛根三錢　半夏製　竹茹各二錢　甘草一錢

共爲末用水一盞半煎八分去滓臨服加生薑汁一
茶匙

朱沉丹　治小兒嘔吐不止

硃砂二錢半　沉香三錢　藿香三錢　滑石半兩

丁香十四粒　右爲細末每服半錢用新汲水一盞芝麻
油滴成花子抄藥在上須臾墜滿去水却用別水空
心送下

紫金核　治小兒一切嘔吐

半夏湯泡薑製　人參　白朮　木香　丁香各二錢半

藿香三錢　右爲細末稀麪糊爲丸如李核大後用沉香
一錢爲末硃砂一錢水飛二味同研勻爲衣陰乾每

服一丸用小棗一枚去核納藥在內濕紙裹火煨熟與小兒服後以米飲壓之

聖惠散　治心神煩熱嘔吐

麥冬去心半兩　淡竹茹半兩　甘草　人參　茅根

陳皮去白各五分　右為末每服二錢水一盞薑三片煎至五分溫服日二三服

綠豆飲　治嘔吐誤服熱藥

綠豆粉一兩　黃連　乾葛　甘草各五錢

右除豆粉外餘藥三味共為細末入乳鉢同菉豆粉拌勻每服半錢至一錢溫豉湯調服

噦吐哯

論曰小兒初見乳自流出謂之哯哯之不已謂之吐吐之不已則作嘔吐嘔吐不已則傳噦噦之不已即作噦自嘔噦噦皆有出聲動氣嘔者口開而作噦者心胸上下氣逆鬱結噦者無物可出即脾虛胃寒引氣噦噦作聲皆由哺乳冷冷乳入胃與胃氣相逆冷傷胃氣不得宣通故作噦也此候若不調和胃氣養正祛邪須臾症變而慢驚慢脾風者立至也

又曰小兒哯嘔吐噦四症皆胃有傷而發哯則如溢水射出嘔則開口而作吐者吐出有物噦者無物可出失於調治則慢驚由此而成四者之候雖同而每症之寒熱虛實異必須察其脉症以治之

六君子湯　治小兒胃寒作噦

人參　白朮土炒　茯苓　甘草炙　陳皮

半夏製各等分　右剉咀加薑三片水二鍾煎八分溫服

泄瀉

論曰小兒肌膚脾胃脆弱若解脫不時風邪易傳客于肌肉搏于胃經則為胃風其狀腹善滿食寒則泄診形瘦而腹大益足陽明胃之經其支者起胃下口循腹裏下至氣衝故風冷入中則腹善脹大又胃為水穀之海得寒則食物不化氣血虧損故泄瀉而形瘦也

胃風湯方　治小兒胃風泄痢腹脹腸鳴

人參　白茯苓　川芎　桂心　白芍藥

當歸　白朮　每服一錢入粟米半匙同煎溫服空心食前日二以意加減

訶梨勒湯方　治小兒胃風腹脹得冷則瀉痢

一訶梨勒皮煨用 當歸炒 黃連炒各一兩 甘草炙

厚朴散方 治小兒腸胃風冷泄痢水穀腹脇脹滿不欲食

木香 乾薑各等分 每服一錢水煎放溫不計時候服

厚朴薑汁炙香 黃連各半兩 丁香 肉豆蔻

當歸 木香 龍骨 白朮各一分

為散每服半錢以粥飲下食前服日三量意加減

洞泄注下

論曰小兒下痢不止食已即泄名為洞泄注下此由風邪

客於腸胃方春之時為風冷所傷藏在肌肉至長夏陰氣方盛或因飲食居處不慎復被風冷入於腸胃其病下痢冷盛則重故為洞泄注下俗謂之水穀痢是也病本於風若甚則變胃風證

草豆蔻湯方 治小兒洞泄不止

草豆蔻去皮一枚 高良薑 人參 甘草各一分

乾木瓜一分 白茯苓 桔梗炒各半兩

每服一錢生薑七片水煎分三服乳食前各一量加減

粱米湯方 治小兒洞泄注下水穀不分

粱米 稻米 黍米各二分 蠟如半彈大

以東流水二升煮粱米三沸去滓再汁煮稻米三沸去滓復以汁煮黍米三沸去滓置蠟於汁中和之候蠟消放溫每以半合分為二服空心午後各一更量兒大小加減

厚朴湯方 治小兒泄瀉不止

厚朴薑汁炙 黃連去鬚各一兩 一二歲兒每用一錢薑二片水煎分溫二服空心日午各一量大小加減

黃連丸方 治小兒腸胃虛寒洞泄下痢腹痛

黃連炒半兩 乾薑 吳茱萸炒各三錢 肉豆蔻三枚

草豆蔻一枚 為末燒粟米飯和丸如菉豆大每服七丸乳食前米飲下量兒大小加減

燕口瘡

論曰小兒燕口瘡者口吻兩際瘡生如燕口世亦謂之肥瘡此由脾胃客熱上衝口唇熏發為瘡或者以燕泥和臙少許傅之甚良蓋治之以其意也

胡粉散方 治小兒燕口瘡

胡粉一分炒研　黃連末半兩

二味同研勻以少許傅瘡上

治小兒燕口及口內生瘡方

羖羊髭燒灰　一味研細以臘月豬脂和日三四上塗之

又方

雞膍胵黃皮不拘多少燒灰

一味研爲末以乳汁調半錢日三

黃檗皮散方　治小兒燕口瘡

用黃檗皮爲末飯汁調塗傅瘡上差

語遲

論曰心爲言肝爲語其經屬于手少陰足厥陰其氣上通於舌舌者聲之機若稟受之初母懷驚怖則子之心火不足而肝木弱令機關不利氣不宣揚而語遲期者有經數歲月而不能言者

雞頭丸方　治小兒諸病後六七歲不能語

雄雞頭一枚燒炙　鳴蟬去翅足炒三枚　甘草炙半兩

麥門冬一兩半　大黃一兩半炒　當歸三分　黃耆三分

川芎三分　遠志去心半兩　木通半兩　人參一兩

爲末鍊蜜丸如菉豆大每服以粥飲送下五七丸量兒大小加減不計時候

菖蒲丸方　治小兒五六歲不語

菖蒲　人參　黃連各半兩　丹參　赤石脂各三分

天冬去心　麥門冬去心各一兩

右爲末鍊蜜丸如菉豆大每服五七丸溫水下不拘時候日三量兒大小以意加減

齒不生

論曰牙齒是骨之所終髓之所養手陽明足陽明之脈並

入於齒若血氣充實則骨髓强盛雖其齒損落猶能更生也若虛弱者血氣衰耗風冷乘之致令齒久不生假令生者或齲或蟲落不能復生也

治小兒牙齒不生方

雄鼠糞二七枚　一味每日用糞一枚齒根上拭至二十一日其齒即生

又方

道傍遺稻粒　一味於齒根落處點三七下其齒自生

治小兒齒不生無問遠近皆得便生神效方

雄雞糞二七枚頭尖者　雌雞糞二七枚頭圓者

右二味用火燒灰存性先用鍼挑開齒斷上後以雞糞灰點之

涎液不收

論曰小兒因氣不升降膈脘否滯致令乳飲不化流入胃中隨氣上溢故令多涎其候胸滿短氣飲食難化內經謂脾爲涎當調脾胃升降其氣則病可愈

半夏丸方　治小兒脾胃氣不升降氣溢於上涎液不收

半夏炒一兩　白礬研半兩　先以半夏爲末再入白礬和勻麵糊和丸如粟米大每服五七丸量輕重加減食後臨臥薑湯下

桑白汁方　治小兒脾熱乳食不下胸膈痞悶涎溢不收

新桑根白皮不計多少細剉　自然汁塗於兒口內立效如無新桑根白皮取乾者一兩細剉用水一盞煎一半放溫塗兒口亦可

是書三副奏合仍缺小兒方五卷一百七十三卷至一百七十七卷止余於秘閣內府江浙齊梁諸藩古家遍訪無有藏本欲補全而未能同學項視菴搜求小兒今古方論補全五卷識論簡要方法詳明可稱全璧矣諸瘖以下卽其所補也

黃海程林識

聖濟總錄纂要卷之二十五終

古婺　倪明素白中　仝纂
新安　程　林雲來
子共武與繩
孫康發蕘卿　仝鈔

神仙服餌門

神仙服草木藥石

論曰神仙服草木必取其柯葉堅固形質不變若松柏茯苓之類其意益以延年益壽爲本至於其他弁具五行之秀則必備四氣之和其意深矣千金謂服餌大法必先去三蟲三蟲既去次服草藥草藥得力次服木藥木藥得力次服石藥精麁相代由麁以至精其序不可紊也

黃精丸方　延年補益療萬病

黃精十斤洗令淨蒸令爛熟　白蜜三斤　天門冬三斤去心蒸令爛熟

右杵和令勻置於石臼內搗一萬杵再分爲四劑每一劑再搗一萬杵取出丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下日三不拘時

兔絲子丸方　明目進飲食益精壯下元

兔絲子一斤酒浸三日搗焙爲末　甘菊花去土搗末

右杵和令勻鍊白蜜爲丸如梧桐子大每日清晨空腹後食前以溫酒送下二十丸至三十丸進食倍常頻頻泄氣是藥之應若諸般眼疾黑花昏暗者並宜服之

黃精酒方　延年益壽返老還童除萬病

黃精五斤　天門冬三斤去心　松葉　枸杞根各五斤

右搗爲麁末以水三石入前藥在內煮一石用糯米一石細麯麴半秤蒸米麴入在前藥水中封閉二七日

熟任性飲之

地髓散方　長年保命

生乾地黃四兩　香附根　茜根　地骨皮洗焙

菴蕳子　茅草根各一分

右六味擇日修合春用甲子夏用丙子秋用庚子冬用壬子搗羅爲細散每日早晨溫酒調下一錢七午後再服五十日後諸疾不生身體輕强養血去風治吐血衂血失血諸疾

靈仙散方　輕身延年却老還童

白茯苓一兩 巨勝子酒浸九蒸晒一斤 天門冬去心

白术 杏仁去皮尖 乾黃精各一兩

右六味搗羅爲細散每於食前水飲下三方寸匕日

二服或以蜜丸如赤小豆大每服三十丸溫水下

松實丸方 延年復命

松實 栢實淨揀各三兩 松脂鍊成十斤 甘菊花五升

爲細末鍊蜜和搗五六百下丸如梧桐子大每日食

後午前溫米飲下二十丸漸加至三十丸至百日不

飢顔色光潤

胡麻散方 益壽延年去客熱

胡麻子 白茯苓 生乾地黃 天門冬去心各八兩

爲細散每服方寸匕食後溫水調下

芡實散方 河上公益壽延年

乾雞頭實五兩 忍冬莖葉揀無蟲污新肥者 乾藕各一斤

三味於甑內炊熟暴乾搗羅爲細散每日食後新汲

水調下一錢

益壽地仙丸方

甘菊花三兩 枸杞二兩 巴戟天二兩 肉蓯蓉酒浸一宿洗淨切焙

焙乾四兩 爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心鹽湯或

酒下三十丸久服淸頭目補益丹田駐顔潤髮春秋

枸杞菊花加一倍冬夏蓯蓉巴戟加一倍服餌勿令

斷絶

辟穀木耳丸方

木耳搗末 大豆炒熟搗末各八兩 大棗煮熟去皮核研一斤

三味鍊蜜和丸如雞子大有食日服一丸無食日服

二丸逢食卽食無食亦不飢矣

服松脂辟穀不老方

松脂五斤 桑灰汁一石 二味以灰汁一斗於釜內煮松

脂三五沸取接置冷水中候凝復煮之如此十度乃

止逐度易灰汁并換冷水其脂白矣取鍊成白脂研

羅爲末每服一匙頭以酒或米飲調下空腹日午近

晩服若至十兩以上不飢一年以後夜視明目久服

不老

絶穀升仙不食方

松實去皮 菊花等分 二味爲末鍊過松脂和丸如梧桐

子大或鍊蜜爲丸每服十丸酒下日三服可至二十

丸亦可作散服二錢空心日午近晚各一服

天門冬丸方　辟穀延年

天門冬　白茯苓　白蠟　白蜜　白羊脂去膜各一斤

先搗羅天門冬茯苓二味爲末次以清酒五升入大鐺中煎三沸內羊脂煎三五沸又內蜜并蠟煎五沸掠去沫次入天門冬茯苓末用柳木篦不住手攪令勻火勿令猛候煎成膏可丸乃丸如櫻桃大又取大杏仁一升浸去皮尖雙仁研如膏傾入淨通油瓷缾內坐慢灰火中內前藥丸子于杏仁膏中養令色白即取離火每服三丸空腹溫酒下

廣福延齡丹方　去三尸潔臟腑鎮七魄明耳目

丹砂研　雄黃研如粉　人參　白茯苓各二兩

白术　乳香研四兩

右六味各擣研爲末和勻入銀器中用白蜜和如稀膏以油單封口又以水和白麪裹器物外厚兩指許每日於飯上炊候飯熟取下如此半月如藥乾更入蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二十丸忌羊血其功甚大

神仙巨勝丸方　輕身壯陽却老還童去三尸下九蟲除萬病

巨勝即黑芝麻一斤淘淨九蒸九曝　牛膝酒浸切焙一兩　巴戟天

天門冬　山藥　柳桂　熟乾地黃

酸棗仁　覆盆子　兔絲子酒浸別搗焙乾　遠志去心

菊花　人參　白茯苓各一兩

揀擇淨爲末錬蜜丸如梧桐子大每日空心溫酒下二十丸服一月身輕體健萬病不侵

青元子返童散方　輕身延年除百病去三尸

天門冬　人參　白茯苓　麥門冬　白菊花各六兩

爲散每日溫酒或飲調下三錢不拘時候服三年身輕

補益門

平補　峻補　補虛益氣　補虛益精髓

補虛固精　補虛壯元陽　補虛理腰膝

平補

論曰一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾不明乎道未有能已人之疾者世之貪藥石惟務酷烈非徒無益反傷和

氣故方論平補之法欲陰陽適乎其中也

平補五臟延年治百病方

兔絲子酒浸七日炒黃三兩　覆盆子　車前子

巴戟天　遠志　生地黃　白朮　細辛去苗葉

何首烏　菖蒲　地骨皮　牛膝一兩

續斷　菊花去梗萼各一兩半

除菊花外以溫水和酒少許洗過焙乾杵羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每日空心常服三十丸男子鹽湯下婦女醋湯下午食前更一服至十服其人病有發

時是藥動病本功應也

枸杞丸方　平補心腎延年駐顏

枸杞子　肉蓯蓉酒浸一宿　菊花　黃蓍塗酥炙

桂心　牛膝浸一宿　生乾地黃酒浸一宿　遠志

山藥各一兩　人參　白茯苓　柏子仁炒酒浸各一兩半

右爲末以浸藥酒煮麪糊丸如梧桐子大每服空心酒下三十丸鹽湯下亦可

無比山藥丸方　平補諸虛百損五勞七傷頭痛目眩手足厥冷或煩熱有時或冷痺骨疼腰髖不隨飲食雖多不生肌肉或少食而脹體無光澤陽氣衰絶陰氣不行此藥能補經脈起陰陽安魂魄開三焦破積聚厚腸胃强筋練骨輕身明目除風去冷無所不治

乾山藥二兩五錢　肉蓯蓉四兩去皴皮酒浸焙　五味子二兩五錢

兔絲子酒浸三兩研爛焙乾　杜仲三兩炒　牛膝二兩酒浸

山茱萸二兩　熟乾地黃二兩　澤瀉一兩　茯神去皮二兩

巴戟二兩　赤石脂一兩　一方有遠志二兩

右爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸食前溫酒下溫米飲亦得服之七日後令人身輕

健四體潤澤脣口赤手足暖面有光悅消磨飲食身體安和音聲清響是其驗也十日後長肌肉此藥通中入腦鼻必酸疼勿怪

六神丸方　平補諸虛大益氣血

石菖蒲　地骨皮　牛膝酒浸　兔絲子酒浸炒

生乾地黃　遠志各等分

右爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心食前溫酒或鹽湯下加至三十丸

山藥四倍丸方　平補除風痰益年壽

山藥（半兩）　枸杞子（一兩）　甘菊花（二兩）　熟乾地黃（一兩）
為末鍊蜜丸如梧桐子大空心食前鹽湯下三十丸
溫酒亦可

補骨脂丸方　平補諸虛益精壯陽
補骨脂　松脂　白茯苓　山藥（各八兩）
杏仁（去皮尖雙仁炒三升）　胡桃肉　大棗（各一斤）　桂心
牛膝（酒浸）　澤瀉　菖蒲　薏苡仁　萆薢
檳榔（各一兩）　鹿角膠（炙燥十兩）　獨活　蛇牀子
菟絲子（[illegible]去[illegible]各一兩）　生地黃（十斤取汁）

右除地黃汁外為末以水煎至地黃汁成膏入藥點
蜜和丸如梧桐子大每服空腹溫酒下三十丸

峻補

論曰陰陽之氣本自和平過則生患峻補之藥施於倉卒
緣陽氣暴衰真氣暴脫或傷寒陰證諸疾急於救療者不
可緩也蓋人稟受有限嗜慾太過病疾橫生固當取陽氣
以扶衰弱則峻補諸方經所謂補下治下制以急急則氣
味厚者此之謂也

青硫丸方　治久冷峻補元臟
硫黃（一斤酒水浸研三日）　甘草　附子（炮去皮）　山茱萸（各[illegible]）
牛膝（酒浸一兩）　白豆蔻（去殼二兩）　木香（二兩）　肉豆蔻（去殼二兩）
艾葉（乾一兩）　為末拌勻蒸木瓜肉和擣為丸如梧桐子
大每服十丸至十五丸空心鹽湯下如腳腰疼痛用
木瓜湯下

益神丸方　補元臟久冷
硫黃（酒研甘草水研一日）　木香　肉豆蔻　檳榔
桂心　青橘皮（去白各一兩）　附子（炮去皮）　乾薑（各一兩）
為末和勻用糯米粥丸如梧桐子大每服十丸至十
五丸空心酒下

補虛益氣

論曰形不足者溫之以氣精不足者補之以味形精相感
氣血生化則榮衛循流不失其度食飲不節起居靡常嗜
慾過度神懲精搖則真氣將耗虛損之疾由是而生治法
當補虛益氣

兔絲子丸方　補元臟益脾胃止腹臍疼痛思進飲食固
真氣美顏色
兔絲子（水淘去浮酒浸七日別擣）　萆薢（各二兩）　肉蓯蓉（酒浸一宿四兩）

黑狗脊骨并髓炙焦一兩半黃耆亦佳 枳實炒一兩
熟乾地黃二兩 山藥一兩 爲末酒煮麪糊丸如梧桐子
大每服二十丸米飲下空心食前各一服
地黃沉香丸方 治上熱下冷五勞七傷補益虛損
沉香 鹿茸酒浸酥炙 肉蓯蓉酒浸 牛膝酒浸
附子去皮臍各二兩 兎絲子酒浸一宿別搗末三兩 黃耆
熟乾地黃四兩 蒺藜子炒二兩 巴戟天 川芎
石斛 山茱萸 木香 羌活 補骨脂
蛇牀子 楝實取肉 人參 桂心 蘹香子炒

檳榔 骨碎補 安息香胡桃瓤二枚研各一兩
右爲末別取地黃自然汁七升棗膏四兩酒三升谿
半斤酥五兩於銀石器中熬如膏放冷入羯羊脊骨
內髓半斤鍊油去滓和前末杵千百下丸如梧桐子
大每空心溫酒或鹽湯下二十丸加至四十丸
四補丸方 益氣血補元藏悅顏色
栢子仁生搗袋盛 何首烏切片 肉蓯蓉切片
牛膝生絹袋盛各二兩 用酒三升春夏浸七日秋冬浸二七
日取牛膝栢子仁先搗如泥次將何首烏蓯蓉杵得

所爲丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸空心溫
酒下
補虛益精髓
論曰內經謂腎者主水受五臟六腑之精而藏之又曰腎
之合骨也骨者髓之府故嗜慾過傷精髓耗憊則必用補
腎之劑以益之凡病虛則補之不必專用熱藥若腎虛之
證尤當以益精髓爲先聖濟經謂陽劑剛勝則曰天癸竭
而榮涸蓋謂此也
覆盆子丸方 治五勞七傷骨髓虛憊

覆盆子 鹿茸去毛酥炙 巴戟天 五味子
桂心 山藥各半兩 黃耆 牛膝酒浸
熟乾地黃一兩 遠志一分 肉蓯蓉酒浸 石斛各三分
右爲末鍊蜜丸如梧桐子大空心溫酒下三十丸
仙丸方 補不足塡精髓除風變白
生地黃廿斤取汁 生牛膝十斤取汁 生薑三斤取汁
兎絲子酒浸別取末 桃仁去皮尖雙仁炒 杏仁酒浸去皮尖雙仁
巨勝子甑內炊熟暴乾九過湯浸去皮炒研 蒺藜子各一升 白蜜
先將地黃汁量二升入銀石器內浸到處刻記定次

入餘地黃汁慢火煎至刻處次下牛膝汁又煎至刻處其火常令如魚眼沸次下杏仁桃仁末次下巨勝末次下蒺藜末次下兎絲末又下白蜜攪勿住手候可丸即擣三千杵丸如梧桐子大每服空心溫酒下三十丸加至四十丸晩再服百日後白髮變黃二百日後從黃變黑諸風悉除尤補腰腎益氣明目

金鎖丸方　壯元氣益精髓補虛損

龍骨（一兩半香炒各一處研如粉）　蓮花蕋（七八月採二兩）

雞頭粉（二分）　山茱萸（酒浸取肉）　沉香　肉蓯蓉（酒浸去皮）

附子（去皮臍）　桂心　爲末以金櫻煎膏丸如無即錬蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二十丸至三十丸

地黃煎方　治精極塡骨髓

生地黃（一斤取汁）　牛酥（一斤）　白蜜（一斤）　以慢火煎地黃汁減半內牛酥更煎良久次下蜜攪勻候稀稠得所瓷器盛每日空心食前溫酒調下數錢

靈芝丸方　治脾腎氣虛補骨髓通利耳目

蒼朮（一斤米泔浸時換水）　以竹刀刮去皮并土夏浸三日冬浸七日晒乾爲末棗肉丸如梧桐子大空心棗湯下三十丸至五十丸（蒼朮一味甚妙人以至賤而忽之勝他藥多矣故存之）

補虛固精

論曰腎主水受五藏六腑之精而藏之所謂天一在藏本立始也若腎衰精氣不固或因洩而出或因聞見而流或因虛勞漏泄精氣或因邪氣乘虛客於陰爲夢遺皆腎虛也宜補益固之澁以去脫之劑

九物金鎖丹方　治虛損去風閉精固元陽

龍齒　敗龜板（酥炙）　雄蠶蛾　白蓮花（各半兩）

山藥（二兩）　巴戟天（去心一兩）　蓮子心　肉蓯蓉（各一兩）

雄雞肝（一具）

爲末麪糊丸如梧桐子大每服十丸空心溫酒下

補骨脂丸方　治夢泄

補骨脂（炒四兩）　龍骨　山茱萸　巴戟天（各一兩）

爲末錬蜜和丸如梧桐子大空心鹽湯下三十丸

神效散方　治夢洩

白茯苓（一兩）　豬苓（二錢）　先用水煮合宜去豬苓再將茯苓焙乾爲散每服一錢溫酒下空心夜臥各一

半夏丸方　治夢泄除痰利胸膈

半夏二兩湯洗七遍入猪苓同兩炒令猪苓紫色去猪苓用半夏　為末酒麪糊丸
如梧桐子大每服十五丸空心粥飲下

韭子丸方　治腎臟虛冷腰膝痠疼冷痺夜多小便夢寐
遺泄日漸羸瘦面無顏色兼治女人惡露赤白帶下

韭子七升淨揀　以醋湯煮千百沸取出焙乾旋炒令作油
麻香為末鍊蜜丸如梧子大每日空心溫酒下二十
丸加至三十丸

補虛壯元陽

論曰陰陽氣血之在人初無餘欠及勞動妄作嗜慾過度

戕其太甚則有陰陽偏傷之病氣血虛損之證法宜補之

蓯蓉丸方　補元臟益精氣利腰腳

肉蓯蓉酒浸二兩　天雄去皮臍一兩　白馬莖酥炙二兩
雀卵丙丸枚　兔絲子酒浸三宿一兩
右將四味為末以雀卵并鍊蜜丸如梧桐子大每服
十丸空心溫酒或米飲下

兔絲子丸方　補虛益氣壯元陽

兔絲子淘去浮者以酒浸七日爛研焙乾三十兩　蘹香子炒八兩
青鹽三兩　為末用浸藥酒煮麪糊丸如梧桐子大每服
空心溫酒下二十丸至三十丸

補虛理腰膝

論曰內經謂腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝者筋之
府屈伸不能行則僂附筋將憊矣蓋腎主腰肝主筋筋聚
於膝若腎臟虛損肝元傷憊則筋骨受病故腰膝為之不
利

酸棗仁散方　治骨極腎虛腳膝骨髓痠疼

酸棗仁微炒八兩　虎脛骨酥炙黃二兩半　熟乾地黃八兩
杜仲炒黃二兩　桂心三兩　牛膝三兩

右為散每服二錢胡桃酒下葱茶亦可空心日午夜
臥各一服

杜仲丸方　補下元烏髭髮壯腰膝進飲食悅顏色治腰
疼

杜仲炙為末　補骨脂炒香熟為末　胡桃仁湯浸去皮研洛一兩
研勻鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下

地仙煎方　治腰膝痠疼頑痹內一切冷病令人悅澤顏
色骨髓堅固行及奔馬

山藥末一斤　杏仁去皮尖一升　生牛乳一升

先將杏仁細研入生牛乳絞取汁次取山藥末相拌
入新瓷器密封安放釜中重湯煮一日煎成每服一
錢空心溫酒下

兎絲子丸方　治腰膝積冷痠疼或痹麻無力壯真元

兎絲子　牛膝各一兩　於銀石器內好酒漬之令酒過
藥一寸經五日控乾焙燥搗羅爲末將元浸藥酒煮
麪糊丸如梧桐子大每服三十丸空心食前酒下

神仙服餌三卷非烹砂煉石則嚼栢咀松或吐納導引
或斬除尸蟲皆藏經所備載亦難行難用也一概删去
今選其可服餌延年駐顏者方十餘道又補益門方二
十餘道爲養生家備用博雅君子求全書繙閱則余纂
要一書濟世婆心庶閒閱見當有賞識者矣

康熙辛酉中秋月　靜觀居士程林題於邗上三一齋

聖濟總錄纂要卷之二十六終

儒門事親十五卷

（金）張從正撰

明萬曆二十九年新安吳勉學刻古今醫統正脈全書本

儒門事親十五卷 大學士英廉家藏本

金張從正撰。從正字子和，號戴人，睢州考城人。興定中召補太醫，尋辭去。事蹟具金史方技傳。從正與麻知幾、常仲明輩講求醫理，輯為此書。劉祁歸潛志稱麻知幾九疇與之善，使子和論說其術，因為文之。則此書實知幾所記也。其例有說、有辯、有記、有解、有誡、有箴、有詮、有式、有斷、有論、有疏、有述、有衍、有訣、有十形三療、有六門三法，名目頗煩碎，而大旨主於用攻。其曰儒門事親者，以為惟儒者能明其理，而事親者當知醫也。從正宗河間劉守眞，用藥多寒涼，其汗吐下三法，當時已多異議，故書中辨謗之處為多。丹溪朱震亨亦譏其偏，後人遂并其書置之。然病情萬狀，各有所宜，當攻不攻與當補不補，厥弊維均。偏執其法固非，竟斥其法亦非也。惟中間負氣求勝，不免過激。欲矯庸醫恃補之失，或至於過直。又傳其學者不知察脈虛實，論病久暫，概以峻利施治，遂致為世所藉口。要之，未明從正本意耳。

張子和先生著

儒門事親

映旭齋藏板

步月樓梓行

重刊儒門事親序

是書也戴人張子和專爲事親者著論議淵微詞攄有法其術與東垣丹溪並傳名書之義蓋以醫家最上非儒不能明藥品酒食非孝不能備也故曰爲人子者不可不知醫子幼失怙慈親在堂踰七望八滯頤既具未嘗不防以藥物每慮當有所饋委之時醫恐爲盡道之累將欲遍閱方書諸家著述繁雜竊恐是望皇皇者數載矣近得是書如獲寶璐執是以證何虛聽說之能惑惜其板久失傳本多亥豕之訛因付儒醫開忠較訂鋟梓與世之事親者共云

嘉靖辛丑三月戊子復元道人邵輔序

儒門事親論方目録

卷之一

七方十劑繩墨訂一
指風痺痿厥近世差玄說二
立諸時氣解利禁忌三
瘧非脾寒及鬼神辯四
小兒瘡疱丹熛瘾疹舊蔽記五
婦人赤白帶下錯分寒熱解六
霍亂吐瀉死生如反掌說七
目疾頭風出血最急說八
過愛小兒反害小兒說九
服藥一差轉成他病說十

卷之二

偶有所遇厥疾獲瘳記十一
攻裏發表寒熱殊塗箋十二
汗下吐三法該盡治病詮十三
凡在上者皆可吐式十四
凡在表者皆可汗式十五
凡在下者皆可下式十六
推原補法利害非輕說十七
口眼喎斜是經非竅說十八
疝本肝經宜通勿塞狀十九
五虛五實攻補懸絕法二十

卷之三

喉舌緩急砭藥不同解二十一
五積六聚治同鬱斷二十二
凡十膈五噎浪分支派疏二十三
飲當去水溫補轉劇論二十四
嗽分六氣毋拘以寒述二十五
九氣感疾更相為治衍二十六

三消之說當從火斷二十七
蟲𧏾之生濕熱為主訣二十八
補論二十九
水解論三十

卷之四

風一 暑二
濕三 火四
燥五 寒六
解利傷寒七 中風八
痺九 痿十

厥十一　癇十二
瘧十三　泄痢十四
疳痢十五　臟毒下血十六
下痢膿血十七　水泄十八
痔漏腫痛十九　霍亂吐瀉二十
大便澀滯二十一　小便淋瀝二十二
酒食不消二十三　酒食所傷二十四
沉積水氣二十五　諸積不化二十六
骨蒸熱勞二十七　虛損二十八
上喘中滿二十九　一切涎嗽三十

咳嗽三十一　咳逆三十二
風痰三十三　咯血欬血三十四
消渴三十五　雷頭風三十六
頭痛不止三十七　兩目暴赤三十八
目腫三十九　病目經年四十
風衝泣下四十一　風蛀牙疼四十二
口瘡四十三　喉閉四十四
癭四十五　背疽四十六
瘰癧四十七　便癰四十八
惡瘡四十九　下疳五十

卷之下
癰癤瘤腫五十一　瘡腫丹毒五十二
凍瘡五十三　金瘡五十四
誤吞銅鐵五十五　魚刺菱芡五十六
蛇蟲所傷五十七　杖瘡五十八
禁蝎五十九　落馬墜井六十
腰膝疼痛六十三　頭風眩運六十四
經血暴下六十五　赤白帶下六十六
月事不來六十七　婦人無子六十八
小產六十九　大產七十

產後心風七十一　乳汁不來七十二
產後潮熱七十三　乳癰七十四
姙娠大小便不利七十五
姙娠病虛七十六　雙身傷寒七十七
身重瘖瘂七十八　懷身入難七十九
眉煉八十　牙疳八十一
夜啼八十二　丹瘤八十三
疳眼八十四　身瘦肌熱八十五
大小便不利八十六
久瀉不止八十七　通身浮腫八十八

發驚潮搐八十九　拗哭不止九十
身熱吐下九十一　風熱涎嗽九十二
水瀉不止九十三　瘡疥風癬九十四
甜瘡九十九　白禿瘡九十六
癘疾不愈九十七　腫痛氣刺九十八
赤瘤丹腫九十九　瘡疱癮疹一百

卷之六

十形三療目録

風形

因驚風搐一　風搐反張二
飧泄三　因風鼻塞四
風痰五　癩六
手足風裂七　胃脘痛八
搐搦九　面腫風十
驚風十一　風溫十二
風水十三　小兒風水十四
腎風十五　勞風十六
中風十七

暑形

中暑十八　瘧病十九

火形

馬刀二十　項瘡二十一
代指痛二十二　瘰癧二十三
咽喉腫痛二十四　舌痛二十五
腰胯痛二十六　[illegible]二十七
痰厥二十八　滑泄乾嘔二十九
笑不止三十　膈食中滿三十一
目盲三十二　小兒悲哭不止三十三
小兒手足搐三十四　目赤三十五

熱形

沙石淋三十六　膏淋三十七
二陽病三十八　小兒面部赤腫三十九
頭熱痛四十　勞嗽四十一
勞嗽咯血四十二　吐血四十三
嘔血四十四　因藥燥熱四十五
肺癰四十六　痿四十七
口瘡四十八　虛勞四十九
心痛五十　傷寒極熱五十一
失笑五十二　赤目五十三
目瞖五十四　瘡後嘔吐五十五

熱厥頭痛五十六　産後喘五十七
血崩五十八　婦人二陽病五十九
月閉寒熱六十　悪寒實熱六十一
遇寒手熱六十二　嘔逆不食六十三
痤癤六十四　平疹六十五
淋六十六　口臭六十七
濕形
疝六十八　水疝六十九
留飲七十　黄疸七十一
黄病七十二　病發黄七十三

水腫七十四　涌水七十五
停飲腫滿七十六　濕痺七十七
屈膝有聲七十八　白帶七十九
温嗽八十　瀉兒八十一　濕癖八十二
濕痺痿八十三　泄瀉八十四
洞泄八十五　大便少而頻八十六
暑泄八十七　腹滿面腫八十八

卷之七

燥形
臂麻不便八十九　大便燥結九十

孕婦便結九十一　偏頭痛九十二
腰胯痛九十三
寒形
因寒腰強九十四　寒疝九十五
感風寒九十六　凍瘡九十七
寒痰九十八　瀉痢悪寒九十九
内傷形
因憂結塊一百　病怒不食一百一
不寐一百二　驚一百三
兒寐不寤一百四　孕婦下血一百五
收産傷胎一百六　懐恐脇痛一百七
背疽一百八　肺癰一百九

咽中刺寒一百十
誤呑物咽中一百十一
腸刺下血一百十二
水腫睾丸一百十三
伏驚一百十四
外傷形
孕作病治一百十五
杖瘡一百十六

落馬發狂一百十七
太陽脛腫一百十八
足閃肭痛一百十九
膝肭跛行一百二十
杖瘡入水一百二十一

卷之八

內積形

傷冷酒一百二十二
心下沉積一百二十三
茶癖一百二十四

腹脹水氣一百二十五
痃氣一百二十六
胸膈不利一百二十七
冷積一百二十八
積塊一百二十九
肥氣積一百三十
伏瘕一百三十一
停飲一百三十二
積氣一百三十三
沉積疑胎一百三十四
是胎非積一百三十五

外積形

瘤一百三十六　膠瘤一百三十七
瘻一百三十八　痔一百三十九

卷之九

雜記九門

誤中涌法
嗽　疥　赤目　感風寒
誤中寒涼
經閉　下血　痢

儒門事親

臨變不惑
涌法　涌嗽
常禁不禁
病愈犯禁而死
不忌反忌
不忌口得愈　不可忌口
高技常孤
群言難正
謗吐　謗三法　謗峻藥
病人負德愈後吝財

同類妬才　㗂口誣戴人

卷之十

撮要圖　四因氣動

五鬱風暑濕燥寒主病

六氣主治

五氣風暑濕燥寒主治

大寒初氣至終氣小雪爲病

十二經是動爲病

風暑濕火燥寒六淫爲病并治

六門病治諸方

內經濕變五泄　金櫃十全之法

金櫃十全五泄後論已上之圖改校爲

篇法

卷之十一

治法雜論

風論　論火熱二門　濕熱門

風門　濕門　寒門

內傷　外傷治法　婦人風門

火類門　濕門　寒門

半產　小兒風門　二火類

卷之十二

三法六門

吐劑

三聖散　瓜蒂散　獨聖散

稀涎散　蔚金散　茶調散

獨仙散　碧雲散　常山散

汗劑

通聖散　雙解散　浮萍散

麻黃散　升麻湯　桂枝湯

下劑

導水丸　禹功散　通經散

神祐丸　琥珀丸　益腎散

大承氣湯　小承氣湯　調胃承氣湯

桃仁承氣湯　玉井散　水煮桃紅丸

無憂散　泄水散　牛黃通膈丸

四生丸　內托散　藏用丸

神芎丸　進食丸　牛黃白朮散

玉燭散　三和湯　丁香化癖散

抵當湯　十棗湯　除濕丹

利膈丸　三一承氣湯　握宣丸

人參補肺散　白术湯
薏苡仁湯　益黄湯
香連丸
火門
涼膈散　黄連解毒湯
瀉心湯　八正散
調胃散　三黄丸
芍藥蘗皮丸　大金花丸
清涼飲子　黄連清心湯
犀角散　黄連木通丸

燥門
神功丸　脾約丸
麻仁丸　潤體丸
寒門
薑附湯　四逆湯
二薑湯　术附湯
大已寒丸　理中丸
平胃散　養脾丸
兼治於内者
大柴胡湯　小柴胡湯

柴胡飲子　防風當歸飲子
白术湯
兼治於外者
桂苓湯　麻黄湯
升麻湯　五積散
青金散
獨治於内者
陷胸湯　大黄丸
備急丸　枳殼丸
蓮殼散　木香檳榔丸

導飲丸　五香連翹散
四物湯　當歸散
又方　葛根散
定志丸　檳榔丸
小檳榔丸　瞿麥散治氣積方
獨治於外者
青金散　敗毒散
水澄膏　魚膽丸
金絲膏　生肌散
赴筵散　麝香玉線子

人參化癭丹　通氣丸
又方　消毒散
煮肝散　枯瘤散
小黃膏　刀箭藥
木香檳榔散　陽起石散
鉛白霜散　雄黃散
化斑湯
調治
無比山藥丸　當歸丸
香薷湯　石葦散
妙功丸　人參散
茴香丸　七宣丸
人參調中湯　烏金散
沉香降氣丹
卷之十三
劉河間先生三消論
猪肚丸　葛根丸
胡粉散　人參散
卷之十四
扁鵲華佗察聲色定死生訣要

病機
卷之十五
世傳神効諸方目録
瘡瘍癰腫第一　口齒咽喉第二
眼目疾證第三　頭面諸疾第四
解利傷寒第五　腰脚疼痛第六
婦人雜病第七　咳嗽痰喘第八
心氣刺痛第九　小腸疝氣第十
腸風下血第十一　小兒病證第十二
破傷風邪第十三墜毒傷寒附
諸風疾證第十四　小便第十五
下痢第十六　雜證方藥第十七
開穀諸藥第十八
太醫先生辭世詩仍附于後

儒門事親後序　跋

醫道之大尚矣其上醫國其下醫人而身之所繫抑豈小哉觀抱樸子之金櫃肘後其用心以亦精矣功亦溥矣夕〻矣邵君柏崖以玉牒之親存以于天下後世乃以是書命愚機之壽諸梓以廣其傳功豈在抱樸子下哉愚不學恐成後人之誚幸柏崖之去然日夜是懼不敢語盡以力至於根微鄙與剛謬辯非尚俟後之君子

嘉靖十九年歲次庚子孟冬朔日錢唐者相閒忠機于南園陋室中

儒門事親卷之一

戴人張子和著
新安吳勉學校

七方十劑繩墨訂一

方有七劑有十舊矣雖有說者辯其名而已敢申昔人已揭之意而爲之訂夫方者猶方術之謂也易曰方以類聚是藥之爲方類聚之義也或曰方謂五方也其用藥也各據其方如東方瀕海鹵斥而爲癰瘍西方陵居華食而多顧腫脅痿南方瘴霧卑濕而多痺疝北方乳食而多藏寒滿病中州食雜而多九疸食痨中滿留飲吐酸腹脹之病蓋中州之地土之象也故脾胃之病最多其食味居處情性壽夭兼四方而有之其用藥也亦雜諸方而療之如東方之藻帶南方之丁木西方之薑附北方之參苓中州之麻黃遠志莫不輻輳而參尚故方不七不足以盡方之變劑不十不足以盡劑之用劑者和也方者合也故方如尾之合劑猶羹之和也方不對病則非方劑不蠲疾則非劑也七方者大小緩急奇偶復也十劑者宣通補瀉輕重滑澁燥濕也

夫大方之說有二有君一臣三佐九之大方有分兩

大而頻服之大方蓋治肝及在下而遠者宜頓服而數少之大方病有兼證而邪不專不可以一二味治者宜君一臣三佐九之大方王太僕以人之身三折之上爲近下爲遠近爲心肺遠爲腎肝中爲脾胃胞脏膽亦有遠近以予觀之身半以上其氣三天之分也身半以下其氣三地之分也中脘人之分也又手之三陰陽亦天也其氣高足之三陰陽亦地也其氣下戊巳之陰陽亦人也其氣猶中州故肝之三服可併心之七服腎之二服可併肺之七服也

小方之說亦有二有君一臣二之小方有分兩微而

頻服之小方蓋治心肺及在上而近者宜分兩微而少服而頻之小方徐徐而呷之是也病無兼證邪氣專可一二味而治者宜君一臣二之小方故腎之二服可分爲肺之九服及肝之三服也

緩方之說有五有甘以緩之之緩方糖蜜棗葵甘草之屬是也蓋病在胸膈取甘能戀也有丸以緩之之緩方蓋丸之比湯散其氣力宜行遲故也有品件群衆之緩方蓋藥味衆則各不得騁其性也如萬病丸七八十味遞相拘制也有無毒治病之緩方蓋性無毒則功自緩矣有氣味薄藥之緩方蓋藥氣味薄則[illegible]上治上比至其下藥力已衰故補上治上制之以緩緩則氣味薄也故王太僕云治上補上方若迅急則上不任而迫走於下制緩方而氣味厚則勢與急同

急方之說有五有急病急攻之急方如心腹暴痛兩陰溲便閉塞不通借備急丹以攻之此藥用不宜恒蓋病不容俟也又如中風牙關緊急漿粥不入用急風散之屬亦是也有湯散蕩滌之急方蓋湯散之比丸下咽易散而施用速也有藥性有毒之急方蓋有毒之藥能上涌下泄可以奪病之大勢也有氣味厚

藥之急方藥之氣味厚者直趣於下而氣力不衰也故王太僕云治下補下方之緩慢則滋道路而力又微制急方而氣味薄則力與緩等

奇方之說有二有古之單方之奇方獨用一物是也病在上而近者宜奇方也有數合陽數之奇方謂一三五七九皆陽之數也以藥味之數皆單也君一臣三君三臣五亦合陽之數也故奇方宜下不宜汗

偶方之說有三有兩味相配之偶方有古之復方之偶方蓋方之相合者是也病在下而遠者宜偶方也有數合陰陽之偶方謂二四六八十也皆陰之數也

君二臣四君四臣六亦合陰之數也故偶方宜汗不宜下

復方之說有一方有二方三方相合之復方如桂枝越婢一湯如調胃承氣湯方芒硝甘草大黃外參以連翹薄荷黃芩梔子以爲涼膈散是本方之外別加餘味者皆是也有分兩均劑之復方如胃風湯各等分是也以内經攷之其奇偶四則反以味數奇者爲奇方味數偶者爲偶方下復云汗者不以奇下者不以偶及觀仲景之制方桂枝湯汗藥也反以三味爲奇大承氣湯下藥也反以四味爲偶何也豈臨事制

宜復有增損者乎攷其大旨王太僕所謂汗藥如不以偶則氣不足以外發下藥如不以奇則藥毋攻而致過必如此言是奇則單行偶則併行之謂也急者下本易行故宜單汗或難出故宜併蓋單行則力孤而微併行則力齊而大此王太僕之意也然太僕又以奇方爲古之單方偶爲復方今此七方之中已有偶又有復者何也豈有偶方者二方相合之謂也復方者二方四方相合之方歟不然何以偶方之外又有復方者歟此復字非重復之復乃反復之復何以言之蓋内經既言奇偶之方不言又有重復之方惟云奇之不去則偶之是爲重方重方者即復方也下又云偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反從其病也由是言之復之爲方反復亦不遠内經之意也

所謂宣劑者俚人皆以宣爲寫劑抑不知十劑之中已有寫劑又有言宣爲通者抑不知十劑之中已有通劑舉世皆曰春宜宣以爲下奪之藥抑不知仲景曰大法春宜吐以春則人病在頭故也況十劑之中獨不見通劑豈非宣劑即所謂通劑者乎内經曰高者因而越之木鬱則達之宣者升而上也以君召臣曰宣義或同此傷寒邪氣在上宜瓜蒂散頭痛葛

根豆豉湯傷寒懊憹宜梔子豆豉湯精神昏憒宜梔子厚朴湯自瓜蒂以下皆涌劑也乃仲景不傳之妙今人皆作平劑用之未有發其秘者予因發之然則爲涌明矣故風癎中風胸中諸實痰飲寒結胸中熱蔚化上而不下久則嗽喘滿脹水腫之病生焉非宣劑莫能愈也

所謂通劑者流通之謂也前後不得溲便宜木通海金沙大黃琥珀八正散之屬裏急後重數至圊而不便宜通因通用雖通與寫相類大率通爲輕而寫爲重也凡痺麻蔚滯經隧不流非通劑莫能愈也

所謂補劑者補其不足也俚人皆知山藥丸鹿茸丸之補劑也然此乃衰老下脫之人方宜用之今往往於少年之人用之其舛甚矣古之甘平甘温苦温辛温皆作補劑豈獨硫黃天雄然後為補哉況五臟各有補瀉肝實瀉心肺虛補腎經曰東方實西方虛瀉南方補北方大率虛有六表虛裏虛上虛下虛陰虛陽虛設陽虛則以乾薑附子陰虛則補以大黃硝石世傳以熱為補以寒為瀉訛非一日豈知酸苦甘辛鹹各補其臟內經曰精不足者補之以味善用藥者使病者而進五穀者真得補之道也若大邪未去方

滿方悶心火方實腎水方耗而驟言鹿茸附子庸鉅知所謂補劑者乎

所謂瀉劑者泄瀉之謂也諸痛為實痛隨利減經曰實則瀉之實則散而瀉之中滿者瀉之於內大黃牽牛甘遂巴豆之屬皆瀉劑也惟巴豆不可不慎焉蓋巴豆其性燥熱毒不去變生他疾縱不得已而用之必以他藥制其毒蓋百千證中或可一二用之非有暴急之疾大黃牽牛甘遂芒硝足矣今人往往以巴豆熱而不畏以大黃寒而反畏庸鉅知所謂瀉劑者哉

所謂輕劑者風寒之邪始客皮膚頭痛身熱宜輕劑消風散升麻葛根之屬也故內經曰因其輕而揚之發揚所謂解表也疥癬痤痱宜解表汗以泄之毒以熏之皆輕劑也故桂枝麻黃防風之流亦然設傷寒冒風頭痛身熱三日內用雙解散及嚏藥解表出汗皆輕劑之云耳所謂重劑者鎮縋之謂也其藥則朱砂水銀沉香水石黃丹之倫以其體重故也久病咳嗽涎潮于上咽喉不利形羸不可峻攻以此縋之故內經曰重者因而減之貴其漸也

所謂滑劑者周禮曰滑以養竅大便燥結小便淋澀

皆宜滑劑燥結者其麻仁郁李之類乎淋澀者其葵子滑石之類乎前後不通者前後兩陰俱閉也此名曰三焦約也約猶束也先以滑劑潤養其燥然後攻之則無失矣

所謂澁劑者寢汗不禁澁以麻黃根防已滑泄不已澁以荳蔻枯白礬木賊烏魚骨罌粟殼凡酸味亦同乎澁者收斂之意也喘嗽上奔以齏汁烏梅煎寧肺者皆酸澁劑也然此數種當先論其本以攻去其邪不可執一以澁便為萬全也

所謂燥劑者積寒久冷食已不飢吐利腥穢屈伸不

便上下所出水液澄徹清冷此爲大寒之故宜用乾薑良薑附子胡椒蓽以燥之非積寒之病不可用也若久服則變血溢血泄大枯大涸溲便癃閉聾瞽痿蒻之疾設有久服而此疾不作者慎勿執以爲是蓋疾不作者或一二誤死者百千也若病濕者則白朮陳皮木香防巳蒼朮等皆能除濕亦燥之平劑也若黃連黃蘗梔子大黃其味皆苦苦屬火皆能燥濕此內經之本旨也而世相違久矣嗚呼豈獨薑附之儔方爲燥劑乎

所謂濕劑者潤濕之謂也雖與滑相類其間少有不

同內經曰辛以潤之蓋辛能走氣能化液故也若夫硝性雖鹹本屬真陰之水誠濡枯之上藥也人有枯涸皴揭之病非獨金化爲然蓋有火以乘之非濕劑莫能愈也

指風痺痿厥近世差玄說二

風痺痿厥四論內經言之詳矣今余又爲之說不亦贅乎曰非贅也爲近世不讀內經者指其差玄也夫風痺痿厥四證本自不同而近世不能辨一槩作風冷治之下虛補之此所以曠日彌年而不愈者也夫四末之疾動而或勁者爲風不仁或痛者爲痺弱而

不用者爲痿逆而寒熱者爲厥此其狀未嘗同也故其本源又復大異風者必風熱相兼痺者必風濕寒相合痿者必火乘金厥者或寒或熱皆從下起今之治者不察其源見其手足亸曳便謂之風然左傳謂風淫末疾豈不知風暑燥濕火寒六氣皆能爲四末之疾也哉敢詳條于左有意於救物者試擇焉可也

夫風之爲狀善行而數變內經曰諸風掉眩皆屬肝木掉搖眩運非風木之象乎紆曲勁直非風木之象乎手足掣顫斜目喎口筋急攣搐瘛瘲驚癇發作無時角弓反張甚則吐沫或泣或歌喜怒失常頓僵暴

仆昏不知人茲又非風木之象乎故善行而數變者皆是厥陰肝之用也夫肝木所以自甚而至此者非獨風爲然蓋肺金爲心火所制不能勝木故也此病之作多發於每年十二月大寒中氣之後及三月四月之交九月十月之交何以言之大寒中氣之後厥陰爲主氣巳亥之月亦屬厥陰用事之月皆風主之時也故三月四月之交多疾風暴雨振拉摧拔其化爲冰雹九月十月之交多落木發屋之變故風木鬱極甚者必待此三時而作凡風病之人其脉狀如弓弦而有力豈敢以熱藥投之更增其勢哉今人論方

者偶得一方間曾獲效執以為能著灸施鍼豈由病
者巧說病人使從已法不問品味剛柔君臣輕重何
藏何經何部何氣凡見風證偏枯口眼喎斜涎潮昏
憒便服靈寶至寶清心續命等藥豈知清心之雜以
龍麝靈寶之亂以起石硫黃小續命湯藏以附子惟
夫至寶其性尚溫經曰風淫於內治以辛凉如之何
以金石大熱之藥以治風耶有以熱治熱者一之為
甚其可再乎故今之劉河間自制防風通聖散搜風
丸之類程參政祛風丸換骨丹用之者獲效者多矣
而謗議百出以誣其實余嘗見內經氣交變論中言

五鬱之法鬱極則為病況風病之作倉卒之變生嘗
治驚風癇病屢用汗下吐三法隨治隨愈內經中明
有此法五鬱中木鬱達之者吐之令其條達也汗者
是風隨汗出也下者是推陳致新也此為汗下吐三
法也愈此風病莫知其數如之何廢而不用也余恐
來者侮此法故表而出之昔項關完顔氏風病搐先
右臂并右足約搐六七十數良久左臂并左足亦搐
六七十數不寤兩目直視昏憒不識人幾月餘求治
于余先逐其寒痰三四升次用導水禹功丸散泄二
十餘行次服通聖散辛凉之劑不數日而瘥故書此
以證之

夫痺之為狀麻木不仁以風濕寒三氣合而成之故
內經曰風氣勝者為行痺風則陽受之故其痺行旦
劇而夜靜世俗莫知反呼為走注疼痛虎咬之疾寒
氣勝者為痛痺寒則陰受之故其痺痛旦靜而夜劇
世俗不知反呼為鬼忤濕氣勝者為著痺濕勝則筋
脉皮肉受之故其痺著而不去肌肉削而著骨世俗
不知反呼為偏枯此疾之作多在四時陰雨之時及
三月九月太陽寒水用事之月故草枯水寒為甚或
瀕水之地勞力之人辛苦失度觸冒風雨寢處津濕

痺從外入況五方七地寒暑殊氣剛柔異稟飲食起
居莫不相戾故所受之邪各有淺深或痛或不痛或
仁或不仁或筋屈而不能伸或引而不縮寒則蟲行
熱則縱緩不相亂也皮痺不已而成肉痺肉痺不已
而成脉痺脉痺不已而成筋痺筋痺不已而成骨痺
久而不已內舍其合若臟腑俱病雖有智者不能善
圖也凡病痺之人其脉沉濇今人論方者見諸痺證
遽作脚氣治之豈知內經中本無脚氣之說或曰諸
方亦有脚氣統論又有脚氣方藥若止取素問則諸
方皆非即曰痺病以濕熱為源風寒為兼三氣合而

爲痺柰何治此者不問經絡不分臟腑不辯表裏便作寒濕脚氣烏之附之乳之没之種種燥熱攻之中脘灸之臍下燒之三里火之蒸之熨之湯之炕之以至便旋澁滯前後俱悶虛燥轉甚肌膚日削食飲不入邪氣外侵雖遇扁華亦難措手若此者何哉胸膈間有寒痰之故也痺病本不死死者醫之誤也雖亦用蒸之法必先涌去其寒痰然後諸法皆効内經曰五臟有俞穴六腑有合穴循脉之本分各有所發之源以砭石補之則痺病瘳此其内經中明白具載如之何不讀也陳下酒監魏德新因赴冬選犯寒而行

真氣元衰加之坐卧冷濕食飲失節以冬遇此遂作骨痺骨屬腎也腰之高骨壞而不用兩胯似折面黑如炭前後廉痛痿厥嗜卧徧問諸醫皆作腎虛治之余先以玲瓏竈熨蒸數日次以苦劑上涌訖寒痰三二升下虛上實明可見矣次以涼劑使白术除脾濕令茯苓養腎水青宮桂伐風木寒氣偏勝則加薑附否則不加又刺腎俞太谿二穴二日一刺前後一月平復如故僕嘗用治傷寒汗下吐三法移爲治風痺痿厥之法愈者多矣

痿之爲狀兩足痿弱不能行用由腎水不能勝心火心火上爍肺金肺金受火制六葉皆焦皮毛虛弱急而薄著則生痿躄躄者足不能伸而行也腎水者乃肺金之子也今腎水衰少隨火上炎腎主兩足故骨髓衰竭由使内太過而致然至真要大論云諸痿喘嘔皆屬於上者上焦也三焦者手少陽相火也痿喘嘔三病皆在膈上屬肺金之部分也故肌痺傳爲脉痿濕痺不仁傳爲肉痿髓竭足躄傳爲骨痿房室大過爲筋痿傳爲白淫大抵痿之爲病皆因客熱而成好以貪色強力過極漸成痿疾故痿躄屬肺脉痿屬心筋痿屬肝肉痿屬脾骨痿屬腎總因肺受火熱葉

焦之故相傳於四臟痿病成矣直斷曰痿病無寒故痿之作也五月六月七月皆其時也午者少陰君火之位未者濕土庚金伏火之地申者少陽相火之分故痿發此三月之内以爲熱也故病痿之人其脉浮而大今之行藥者凡見脚膝痿弱難於行步或一足不伸便作寒濕脚氣治之驟用烏附乳没自然銅威靈仙之類燔針艾火湯煮袋蒸痿弱轉加如此而死豈亦天乎夫治痿與治痺其治頗異風寒濕痺猶可蒸湯灸燔時或一効惟痿用之轉甚者何也蓋以痿肺熱爲本葉焦而成痿以此傳於五臟豈有寒者歟

若痿作寒治是不刃而殺之也夫痿病不死死者用藥之誤也陳下一武弁宋子玉因駐軍息城五六月間暴得痿病腰胯兩足皆不任用躄而不行求治于予察其兩手脉俱滑之而有力予憑內經火淫于內治以鹹寒以鹽水越其膈間寒熱宿痰新者為熱舊者為寒或宿食宿飲在上脘者皆可涌之宿痰既盡因而下之節次數十行覺神志日清飲食日美兩足漸舉腳膝漸伸心降腎升便繼以黃連解毒湯加當歸等藥及瀉心湯凉膈散柴胡飲子大作劑煎時時呷之經曰治心肺之病最近用藥劑不厭頻而少治腎肝之病最遠用藥劑不厭頻而多此法人皆難之

然余治痿尋常治之如拾遺物予若以此誑人其如獲罪於天何此宋子玉之證所以不得不書也且示信於來世故內經謂治痿之法獨取陽明經陽明經者胃脈也五藏六腑之海也主潤養宗筋宗筋主束骨束骨在臍下陰毛際上是也又主大利機關機關者身中大關節也以司曲伸是以陽明虛則宗脈縱宗脈縱則大脈不伸兩足痿弱然取陽明者胃脈也胃為水穀之海人之四季以胃氣為本本固則精精化則髓充髓充則足能履也陰陽應象論曰精

足者溫之以氣精不足者補之以味味者五味也五味調和則可補精益氣也五味五穀五菜五果五肉五味貴和不可偏勝又曰恬淡虛無真氣從之精神內守病安從來若用金石草木補之者必久而增氣物化之常氣增而久夭之由也所以久服黃連苦參者而反化為熱久服熱藥之人可不為寒心哉余嘗用汗下吐三法治風痺痿厥以其得效者衆其敢誣於後人乎

厥之為狀手足及膝下或寒或熱也舉世傳腳氣寒溼之病豈知內經中無腳氣之說王太僕亦云本無

腳氣後世廣飾方論而立此名古之方謂厥者即今所謂腳氣者也然厥當分二種次分五藏所謂二種者有寒厥亦有熱厥陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥熱厥為手足熱也寒厥為手足寒也陽經起于足指之表陰經起于足心之下陽氣勝足下熱陰氣勝足下寒又曰陽主外而厥在內陰主內而厥在外若此者陰陽之氣逆而上行故也夫春夏則陽多陰少秋冬則陰壯陽衰人或恃赳壯勇縱情嗜慾於秋冬之時則陽奪於內精氣下溢邪氣上行陽氣既衰真精又竭陽不榮養陰氣獨行故手足寒

發為寒厥也人或醉飽入房氣聚於脾胃主行津液陰氣虛陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則四肢不榮酒氣與穀氣相薄則內熱而溺赤氣壯而慓悍腎氣既衰陽氣獨勝故手足熱發而為熱厥也厥亦有令人腹暴滿不知人者或一二日稍知人者或卒然悶亂無覺知者皆因邪氣亂陽氣逆是少陰腎脉不至也腎氣微少精血奔逸使氣促迫上入胸膈宗氣反結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相助令身不仁又五絡皆會於耳中五絡俱絕則令人身脉皆動而形體皆無所知其狀如尸故曰尸厥有涎

如拽鋸聲在喉咽中為痰厥手足搐搦者為風厥因醉而得之為酒厥暴怒而得之為氣厥骨痛爪枯為骨厥兩足指攣急屈伸不得爪甲枯結為臂厥身強直如椽者為肝厥喘而啘者狂走攀登為陽明厥皆氣逆之所為也今人見蒞厥者皆謂之毆著掠著此是何等語也非徒其名之謬因其名之謬而乖其實也既言毆著中著掠著必歸之風此清心靈寶至寶又為先驅矣身中噙藥身上燔火豈知厥之為病如前所說者耶項西華季政之病寒厥其妻病熱厥前後十餘年其妻服逍遙十餘劑終無寸效一日命余診之二人脉皆浮大而無力政之曰吾手足之寒時時漬以熱湯漬而不能止吾婦手足之熱終日以冷水沃而不能已者何也余曰寒熱之厥也此皆得之貪飲食縱嗜慾遂出內經厥論證之政之喜曰內經真聖書也十餘年之疑今而釋然縱不服藥愈過半矣僕曰熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也寒在上者以溫劑補肺金熱在上者以涼劑清心火分處二藥令服之不輟不旬日政之詣門謝曰寒熱之厥皆愈矣其妻當不過數月而有娠何哉陰陽皆和故也凡尸厥痿厥風厥氣厥酒厥可一涌而醒次服降心

火益腎水通血和氣之藥使粥食調養無不瘥者若其餘諸厥倣此行之慎勿當疑似之間便作風氣相去遠矣

立諸時氣解利禁忌式三

春之溫病夏之熱病秋之瘧及痢冬之寒氣及咳嗽皆四時不正之氣也總名之曰傷寒人之勞役辛苦者觸冒此四時風寒暑濕不正之氣遂成此疾人之傷於寒也熱鬱於內淺則發早為春溫若春不發而重感于暑則夏為熱病若夏不發而重感于濕則秋變為瘧痢若秋不發而重感于寒則冬為傷寒故傷

寒之氣最深然而傷寒及温熱但發必先發熱惡寒
頭項痛腰脊強者一日在太陽經故也内經中雖言
一日太陽者傳受常也亦有太陽證至了不傳者止
可汗之如升麻湯解肌湯通毒散五積散之類發散
則愈也蓋病人熱甚更以辛温則病必轉加今代劉
河間先生自製辛涼之劑以通聖益元散相合各五
七錢水一中椀入生薑十餘片葱鬚頭二十餘根葺
豉一撮同煎至五七沸去滓分作二服先以多半服
之頃以釵股於喉中探引盡吐前藥因其一涌腠理
開發汗出周身復將餘藥温熱而服之仍以酸醋辛

辣漿粥投之可以立愈解利傷寒温温熱病治法有
二天下少事之時人多静逸樂而不勞諸静屬陰雖
用温劑解表發汗亦可獲愈及天下多故之時熒惑
失常師旅數興饑饉相繼賦役既多火化大擾屬陽
内火又侵醫者不達時變猶用辛温茲不近於人情
也止可用劉河間辛涼之劑三日以裏之證十痊八
九予用此藥四十餘年解利傷寒温熱中暑伏熱莫
知其數非爲衍也將以證後人之誤用藥者也予嘗
見世醫用升麻五積解利傷寒温疫等病往往發狂
譫語衄血泄血喘滿昏瞀懊憹悶亂勞復此數證非

傷寒便有此狀皆由辛温之劑解之不愈而熱增劇
以致然也凡解利傷寒時氣疫疾當先推天地寒暑
之理以人參之南陲之地多熱宜辛涼之劑解之朔
方之地多寒宜辛温之劑解之午未之月多暑宜辛
凉解之子丑之月多凍宜辛温解之少壯氣實之人
宜辛凉解之老者氣衰之人宜辛温解之病人因冒
寒食冷而得者宜辛温解之因役勞冒暑而得者宜
辛凉解之病人禀性怒急者可辛凉解之病人禀性
和緩者可辛温解之病人兩手脉浮大者可辛凉解
之兩手脉遲緩者可辛温解之如是之病不可一槩

而用偏熱寒凉及與辛温皆不知變通者夫地有南
北時有寒暑人有衰旺脉有浮沉劑有温凉服有多
少不可差玄病人禁忌不可不知昔有人春月病瘟
三日之内以驢車載百餘里比及下車昏瞀不知人
數日而殂又有人飲酒過傷内外感邪頭痛身熱狀
如傷寒三四日間以馬馱還家六七十里到家百骨
節皆痛昏憒而死此余親覩若此之類不可更述假
如瘟病傷寒熱病中暑冒風傷酒慎勿車載馬馱摇
撼頓挫大忌夫動者火之化静者水之化也静爲陰
動爲陽陽爲熱陰爲寒病已内擾又復外擾是爲至

擾柰人之神詎能當之故遂行得疾者宜舟泛狀撞
無使外擾故病不致增劇又若傷寒時氣瘟病嘗六
七日之間不大便心下堅硬腹脇緊滿止可大小承
氣湯下之其腸胃積熱愼勿用巴豆杏仁性熱大毒
之藥雖用一二丸下之利五七行必反損陰氣涸枯
津液燥熱轉增發黃譫語狂走斑毒血泄悶亂輕者
爲勞復重者或至死間有愈者幸矣不可以爲法故
傷寒新愈之人愼勿食猪魚雜果釅酒濕麪及沐浴
房室事如犯病必再發愛其身者不可不愼又如正
二三月人氣在上瘟疫大作必先頭痛或骨節疼與

傷寒時氣冒暑風濕及中酒之人其狀皆相類愼勿
便用巴豆大毒之藥治之元光春京師翰林應奉李
屏山得瘟疫證頭痛身熱口乾小便赤澁渠素嗜飲
醫者便與酒癥丸犯巴豆利十餘行次日頭痛諸病
仍存醫者不識復以辛溫之劑解之加之卧於暖炕
強食葱醋湯圖獲一汗豈知種種客熱疊發併作目
黃斑生潮熱血泄大喘大滿後雖有承氣下之者已
無及矣至今議者紛紛然不知熱藥之過往往獨歸
罪於承氣湯用承氣湯者不知其病已危猶復用藥
學經不明故也良可罪也然議者宜不歸罪於酒癥丸

者亦可責也夫瘟證在表不可下況巴豆之丸乎巴
豆不已況復發以辛溫之劑乎必有仲尼方明冶長
之非罪微生高之非直終不肯以數年之功苦讀內
經但隨衆好惡爲之毀譽若此者皆妄議者也不真
知其理遽加毀譽君子之所不取以予論之凡傷寒
之氣有六禁初病之時甚似中酒傷食者禁大下之
一禁也當汗之時宜詳時之寒暑用衾衣之厚薄禁
沐浴之火坑重被熱粥燔針二禁也當汗之時宜詳
解脉之遲數用辛凉之劑禁妄用熱藥三禁也當下
之時宜審詳證下之藥禁巴豆銀粉丸方四禁也遠

來之病人禁車載馬馱五禁也大汗之後禁雜食嗜
慾憂思作勞六禁也故凡有此者宜淸房凉榻使不
受客熱之邪明憁皓室使易見斑出黃生之變病者
喜食凉則從其凉喜食溫則從其溫淸之而勿擾休
之而勿勞可辛溫則辛溫解之可辛凉則辛凉解之
所察甚微無拘彼此欲水之人愼勿禁水但欲之後
頻與按摩其腹則心下自動若按摩其中脘久則必
痛病人獲痛復若有水結則不敢按矣止當禁而不
禁者輕則危重則死不當禁而禁者亦然今之士大
夫多爲俗論先錮其心雖有正論不得而入矣昔陸

緣先嘗云天下本無事庸人擾之爲煩耳余亦曰正氣本亂庸醫擾之爲劇耳

瘧非脾寒及鬼神辯四

夫瘧猶酷瘧之瘧也以夏傷酷暑而成痎瘧也又有瘖瘧連歲不已此肝經肥氣之積也多在左脇之下狀如覆杯是爲痃瘧猶瘖也久而不已令人瘦也內傷既以夏傷於暑而爲瘧何後世之醫者皆以脾寒治之世醫既不知邪熱畜積之深爲寒戰遂爲寒戰所感又不悟邪熱入而後出於表發爲燥渴遂爲交爭所惑相傳以薑附硫黃平胃異攻散交解飲子治

之百千之中幸其一効孰以爲是至使父子弟兄相傳及其瘧之甚者則歸之祟怪豈可不大笑耶內經拘於鬼神者不可與言至德何世俗之愚而難化也又或因夏日飲冷過常傷食生硬瓜果梨棗之屬指爲食瘧此又非也豈知內經之論則不然夏傷於暑遇秋之風因勞而汗玄府受風復遇悽愴之水風閉而不出舍於腸胃之外與榮衛並行晝行於陽夜行於陰邪熱淺則連日而作邪熱深則間日而作併入於裏則熱併入於表則寒若此而論了不干於脾後世論藥如此之差互也以時言之治平之時常瘧病少擾攘之時常瘧病多治平之時雖用砒石辰砂有毒之藥治之亦能取効緣治平之時其民夷靜故雖以熱攻熱亦少後患至於擾攘之時其民勞苦不可遽用大毒大熱之藥若以熱攻熱熱甚則轉爲吐血泄血癰疽瘡瘍嘔吐之疾蓋擾攘之時政令煩亂徭役紛冗朝戈暮戟略無少暇內火與外火俱動在侯伯官吏尤甚豈可與夷靜之人同法而治哉余親見泰和六年丙寅征南師旅大舉至明年軍迴是歲瘴癘殺人莫知其數昏瞀懊憹十死八九皆火之化也次歲瘧病大作侯王官吏上下皆病輕者旬月甚者

彌年夫富貴之人勞心役智不可驟用砒石大毒之藥止宜先以白虎湯加人參小柴胡湯五苓散之類頻服立解或不愈者可服神祐丸減用神芎等甚者可大小承氣湯下之五七行或十餘行峻泄夏月積熱暑毒之氣此藥雖泄而無損於臟腑乃所以安臟腑也次以桂苓甘露散石膏知母湯大小柴胡湯人參柴胡飲子量虛實加減而用之此藥皆能治寒熱往來日晡發作與治傷寒其法頗同更不愈者以常山散吐之無不愈者今代用張長沙汗下吐三法愈瘧極多大忌錯作脾寒用暴熱之藥治之縱有愈者

後必發瘡疽下血之病不死亦危余自先世授以醫方至于今日五十餘年苟不誠於聖人之經何以為人之師也又嘗觀刺瘧論五十九刺一刺則衰再刺則去三刺則已會陳下有病瘧二年不愈者止服溫熱之劑漸至衰羸命予藥之余見其羸亦不敢便投寒涼之劑乃取內經刺瘧論詳之曰諸瘧不已刺十指間出血正當發時余刺其十指出血血止而寒熱立止咸駭其神余非衒術竊見晚學之人不考諸經妄說鬼疾妄求符籙祈禱辟匿法外旁尋以致病人遷延危殆瘧病除嵐瘴一二發必死其餘五臟六腑瘧皆不死如

有死者皆方士誤殺之也或曰汝言瘧因於暑者春發之瘧亦傷暑乎余曰此瘧最深何哉暑伏於秋冬而不發至春始發此瘧之深者內經氣交變大論歲火太過炎暑流行金肺受邪啟玄子云火不以德邪害於肺金也故金肺先病以金氣不及故為病又經曰歲火太過大熱先發故民病瘧少氣欬喘血溢血注下嗌燥耳聾中熱肩背熱上應熒惑星見則山澤燔燎雨乃不降爍石消金涸泉焦草火上大而明見注曰火無德令縱熱害金水復制心故心火自病熒惑見則酷法大故瘧常與酷吏之政並行或酷政行

於先而瘧氣應于後或瘧氣行於先而酷政應于後昔人有詩云大暑去酷吏此言雖不為醫設亦於醫巫之旨有以暗相符者也以前人論瘧者未嘗及于此故予發之及知聖人立瘧之名必有所謂云

小兒瘡皰丹熛癮疹舊蔽記五

兒之在母腹也胞養十月蘊蓄濁惡熱毒之氣非一日及歲年而後發雖至貴與至賤莫不皆然輕者稀少重者稠密皆因胞胎時所感濁惡熱毒之氣有輕重非獨人有此疾凡胎生血氣之屬皆有蘊蓄濁惡熱毒之氣有一二歲而發者有三五歲至七八歲而

作者有年老而發丹熛癮疹者亦有傷寒中溫毒而發斑者亦有陽毒發斑者斑有大小色有輕重大者為陰小者為陽均是熱也但色重赤者熱深色輕紅者熱淺凡治者輕者因而揚之重者因而減之內經曰少陽客勝則丹疹外發及為丹熛手少陽者三焦少陽相火也啟玄子云是五寅五申之歲即少陽相火司天故也他歲亦有之但內經獨明瘡疹者少陽相火之所為也俗呼曰瘢疹傷寒此言却有理為此證時與傷寒相兼而行必先發熱惡寒頭項痛腰脊強從太陽傳至四五日熛疹始發先從兩脇下有之

出於脇肋次及身表漸及四肢故凡小兒瘡疱丹熛癮疹皆少陽相火客氣勝也內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火豈有寒乎故治瘡疱與治傷寒時氣同法初覺頭痛身熱惡寒此小兒初發瘡疱之候也其脉息皆浮大而有力亦與傷寒時氣冒風驚風宿乳一槩難辯宜先解之有二法遇亢陽炎熱之時以辛凉解之遇久寒凝冽之時以辛温解之辛凉之劑者凉膈通聖之類是也辛温之劑者升麻葛根之類是也此二法慎勿互用之既用此二法之後次以白虎湯加人參冷服之勿擁蓋防瘡疹發喘喘者必死人參止

喘故也或云立秋之後不宜服白虎湯者非也假如秋深發瘧瘧者中暑而得之白虎大解暑毒既有白虎湯證豈可問以秋冬乎瘡疱癮疹丹熛皆是火之用也是肺金之不及也故曰白虎湯加人參一日不可闕也瘡疱熛疹或出不均大小如豆黍相親見其不齊也相天之寒温以蟬殼燒灰抄半字或一字以淡酒調少許飲之大人以淡酒温調之不半日則均齊如或用百祥丸紫草飲子皆可服之俗以酒醋薰之者適足增其昏瞀耳至六七日痂疹出全可調胃凉膈下之同調理傷寒法或言瘡疹首尾俱不可下

者此水奉議公之言也適足使人戰戰兢兢而不敢用藥也錢仲陽之用百祥丸其間有大戟豈奉議公獨不見耶自奉議公斯言一出死者塞路矣予家其親屬故舊小兒有患瘡疱黑陷腹內喘者余以白虎湯加人參凉膈散加當歸桔梗連進數服上灌下泄晝夜不止又使睡臥於寒凉之處以新水灌其面目手足膿水盡去蓋四肢者諸陽之本也兒方為瘡疱外燔沃以寒水使陰氣循經而入達於心肺如醉得醒是亦開昏破鬱之端也如此救活者豈啻千數夫瘡疱黑陷喘而滿者十死八九若依此法尚能活其

六七何世醫與病家至今猶未悟也近年予之庄鄰沿蔡河來往之舟常艤於此一日舟師偶見敗蒲一束公流而下漸迫舟次似聞啼聲而微舟師疑其人也探而出之開視之驚見一兒四五歲許瘡疱周匝密而無隙兩目皎然飢而索食因以粥飽其舟師之妻怒曰自家兒女多惹瘡疱傳染奈何私料此兒必蔡河來其流緩必不遠持兒一舫泝流而上徧河之人皆曰無此兒行且二十里至一村落舟師高唱曰有兒年狀如許不知誰是瘡疱病死棄之河中今復活矣鬧酒肆中飲者喧嘩有人出曰我某村某人也

兒四五歲死於瘡疱舟師出其鞋以示之其父泣曰
眞吾兒也奔走來視驚見兒語大痛流涕拜謝舟師
請抱兒歸今二十餘歲矣此兒本死得水而生伏諗
來者瘡疱之疾熱耶寒耶經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心
火啓玄子注云心寂則痛微心燥則痛甚百端之起
皆自心生瘡疱之疾豈有寒歟余承醫學於先人閱
病多矣苟誑後人罪將安逃誠如此法則原上之丘
以瘡疱而死者皆誤殺人也故療小兒惟錢仲陽書
中可採者最多但其方爲問孝忠所亂有學者宜擇
而取之

證婦人帶下赤白錯分寒熱解六

君子非好與昔人辨以曉學也蓋昔人有一誤流爲
千百世之禍者苟不證其非雖口諫諫其如人命何
如精選聖惠方二十三卷論婦人赤白帶下云婦人
帶下者由勞神過度損動經血致令身虛受於風冷
風冷入於脬絡傳其血之所成也又有巢氏內篇四
十四卷論任脈爲經之海其任之爲病女子則爲帶
下手太陽爲小腸之經也手少陰爲心之經也心爲
藏主於裏小腸爲府主於表二經之血在於婦人上
爲乳汁下爲月水衝任之所統也衝任之脈旣起於
胞內陰陽過度則傷脬絡故風邪乘虛而入於胞中
損衝任之經傷太陽少陽之血致令脬絡之間穢與
血相兼帶而下冷則多白熱則多赤二家之說皆非
也夫治病當先識經絡靈樞十二經中有是動之病
有所生之病大經有十二奇經有八脈言十二經之
外復有此八道經脈也十二經與八道經脈通身往
來經絡共二十道上下流走相貫周環晝夜不息與
天同度自手太陰肺經起行陽二十五度行陰亦二
十五度復會於手太陰肺經也然此二十道經絡上
下周流者止一十九道耳惟帶脈起少腹側季脇之

端乃章門穴是也環身一周無上下之源絡脬而過
如束帶之於身難經曰帶之爲病溶溶如坐水中衝
任者是經脈之海也循腹脇夾臍傍傳流於氣衝屬
於帶脈絡於督脈督脈者起於關元穴任脈者女子
在養胎孕之所督脈乃是督領婦人經脈之海也衝
任督三脈同起而異行一源而三岐皆絡帶脈衝任
督三脈皆統於篡戶巡陰器行廷孔溺孔上端衝任
督三脈以帶脈束之因餘經上下往來遺熱於帶脈
之間熱者血也血積多日不流火則從金之化金曰
從革而爲白乘少腹間冤熱白物滑溢隨溲而下綿

綿不絕多不痛也或有痛者則壅礙因壅而成痛也內經曰少腹冤熱溲出白液冤者屈滯也病非本經為他經冤抑而成此疾也冤一作客客猶寄也遺客熱于少腹久不去從金化而為白設若赤白痢赤者新積也從心火白者舊積也從肺金故赤白痢不可兩分寒熱止可分新舊而治之假如癰瘡始赤血次潰白膿又豈為寒者哉而病者未信也此今之劉河間常言之矣皆云寒多則白以乾薑赤石脂桃花丸治痢雖愈後必生血疾如白帶下病徑以白芍藥乾薑白帶雖愈則小溲必不利治瀉痢與治帶下皆不

可驟用峻熱之藥燥之燥之則內水涸內水涸則必煩渴煩渴則小溲不利小溲不利則足腫面浮漸至不治內經曰思想無窮所願不得意淫于外入房太甚發為筋痿淫衍白物如精之狀男子因溲而下女子綿綿而下左傳曰少男惑長女風落山之象是為惑蠱之疾其文三蟲同皿曰蠱乃是思慕色慾內生後蝕甚不可便用燥熱之藥攻之漸至形削羸瘦脈大者必死而不救且赤白痢者是邪熱傳於大腸下廣腸出赤白也帶下者傳於小腸入脬經下赤白也據此二證皆可同治濕法治之先以導水禹功瀉訖次以淡劑降心火益腎水下小溲利水道則自愈矣

項頻丘一婦人病帶下連綿不絕白物或來已三載矣命予脈之診其兩手脈俱滑大而有力得六七至常上熱口乾眩運時嘔酢水余知其實有寒痰在胸中以瓜蒂散吐訖冷痰三二升皆酢水也間如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹功以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其水道不數日而愈余實悟內經中所云上有病下取之下有病上取之又云上者下之下者上之然有此法亦不可偏執更宜詳其虛實而用之故知精選聖惠方帶下風寒之

言與巢氏論中赤熱白寒之說正與難素相違予非敢妄論先賢恐後學又流不明未免從之而行也如其寡學之人不察病人脈息不究病人經脈妄斷寒熱信用群方暴熱之藥一旦有失雖悔何追嗚呼人命一失其復能生乎赤白痢與赤白帶下皆不死人內經惟腸澼便血血溫身熱者死赤白帶下白液白物蠱病腎消皆不能死人有死者藥之誤也

霍亂吐瀉死生如反掌說七

巢氏先賢也固不當非然其說有誤者人命所係不可不辯也今之醫者家置本以為綱紀嗚呼何今之

人信巢氏而不信素問也此予不得不為之說且巢氏論霍亂吐瀉皆由溫涼不調陰陽清濁二氣相干致腸胃之間變而為霍亂寒氣客於脾則瀉寒氣客於胃則吐亦由飲酒食肉腥膾生冷過度或因居處坐卧濕地當風取涼風之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷水穀不消皆成霍亂其名有三一曰胃反胃氣反逆反吐飲食二曰霍亂言其病揮霍之間便致撩亂也三曰晡食變逆者也霍亂者脉必代又云七月間食蜜令人暴下霍亂此皆巢氏霍亂之論也予以為不然夫醫之治病猶書生之命題如秋傷於濕

冬生欬嗽是獨以濕為主此書生之獨腳題也風濕暍三氣合而成霍亂吐瀉轉筋此須書生之鼎足題也風者風木也內應足厥陰肝木濕者雨化也內應於足太陰脾土暍者火熱也內應於手少陰心火此風濕暍三氣之所生也內經曰土氣之下木氣乘之是肝木乘脾土也又曰厥陰所至為腸痛嘔泄少陽所至為嘔涌注云食不下也太陰所至為中滿霍亂吐下太陰所至為濡化也注云濕化也又曰太陰所至為濕生終為注雨故轉筋者風主肝肝主筋風急甚故轉筋也吐者暍也火主心心主炎上故嘔吐也

泄注者土主濕濕主脾濕下注故泄注也此三者豈非風濕暍如書生鼎足題耶脾濕土氣為風木所克土化不行矣亢無雨火盛過極土怒發焉極則為雷霆驟雨烈風蓋土氣在上木氣乘之故也是以大水橫流山崩岸落石迸沙飛豈非太陰濕土怒發之象耶故人病心腹滿脹腸鳴而為數便甚則心痛脇䐜嘔吐霍亂厥發則注下胕腫身重啓玄子云已上病證皆脾熱所生也乃知巢氏所論正與素問啓玄子相違故內經治法病急則治其標緩則治其本先可用淡劑流其濕辛凉以退其風鹹苦以解其暍氷水

以救其內涸大忌食粟米粥飲者立死偉哉王冰之言脾熱一句可以為方世俗止知取其頭巾而濯之以飲其水亦取黑豆皂礬頭垢寒凉然近似終不足以制其甚也又有以寒水沃其手足者大非也四肢已厥更以寒水沃之則益厥矣曷若以寒水沃其心之為愈也泰和間余親見陳下廣濟禪院其主僧病霍亂一方士用附子一枚及兩者乾薑一兩炮水一椀同煎放冷服之服訖嘔血而死頃合流鎮李彥甫中夜忽作吐瀉自取理中丸而服之醫者至以為有食積以巴豆下之三五丸藥亦不動至明而死可不

京戲遂平李仲安携一僕一佃客至郾城夜宿邵輔之書齋中是夜僕逃仲安覺其時也騎馬與佃客往臨潁急追之時七月天大熱炎風如箭埃塵幔天至辰時而還曾不及三時往返百二十里既不獲其人復宿於邵氏齋忽夜間聞呻呼之聲但言救我不知其誰也執火尋之乃仲安之佃客也上吐下泄目上視而不下胸脇痛不可動搖口欠而脫曰四肢厥冷此正風濕暍三者俱合之證也其婿曾聞余言乃取六一散以新汲水剉生薑而調之頓服半升其人復吐乃再調半升而令徐服之良久方息至明又飲數服遂能調養三日平復而去嗚呼若此三人其生死豈不如反掌哉彼世醫往往以謂六一散治得其病此無學之輩也可勝恨哉

目疾頭風出血最急說八

內經曰目得血而能視此一句聖人論人氣血之常也後世之醫不達其旨遂有惜血如金之說自此說起目疾頭風諸證不得而愈矣何以言之聖人雖言目得血而能視然血亦有太過不及也太過則目壅塞而發痛不及則目耗竭而失睛故年少之人多太過年老之人多不及但年少之人則無不及但年老之人其間猶有太過者不可不察也夫目之內眥太陽經之所起血多氣少目之銳眥少陽經也血少氣多目之上綱太陽經也亦血多氣少目之下綱陽明經也血氣俱多然陽明經起於目兩傍交鼻頞之中與太陽少陽俱會於目惟足厥陰肝經連於目系而已故血太過者太陽陽明之實也血不及者厥陰之虛也故血出者宜太陽陽明蓋此二經血多故也少陽一經不宜出血血少故也刺太陽陽明出血則目愈明刺少陽出血則目愈昏要知無使太過不及以血養目而已此內經所謂目得血而能視者此也凡血之爲物太多則溢太少則枯人熱則血行疾而多寒則血行遲而少此常理也至於目者肝之外候也肝主目在五行屬木然木之爲物太茂則蔽密太衰則枯瘁蔽密則風不疎通故多摧拉枯瘁則液不浸潤故無榮華又況人之有目如天之有日月也人目之有翳如日月之有雲霧也凡雲之興未有不因蒸騰而起者雖隆冬之時猶且然耳況於炎夏之時乎故目暴赤腫起羞明隱澁淚出不止暴寒目瞞皆工熱之所爲也夫目之五輪乃五臟六腑之精華宗脉之所聚其氣輪屬肺金肉輪屬脾土赤脉屬心火黑

水神光屬腎水兼屬肝木此世俗皆知之矣及有目疾則又不知病之理豈知目不因火則不病何以言之氣輪變赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光被翳火乘肝與腎也赤脉貫目火自甚也能治火者一句可了故內經曰熱勝則腫治火之法在藥則鹹寒吐之下之在鍼則神廷上星顖會前頂百會血之翳者可使立退痛者可使立已昧者可使立明腫者可使立消惟小兒不可刺顖會爲肉分淺薄恐傷其骨然小兒水在上火在下故目明老人火在上水不足故目昏內經曰血實者宜決之又經曰虛者補

之實者瀉之如雀目不能夜視及內障暴怒大憂之所致也皆肝主目血少禁出血止宜補肝養腎至於暴赤腫痛皆宜以排針刺前五穴出血而已次調鹽油以塗髮根甚者雖至于再至三可以也量其病勢平爲期少白可黑落髮可生有此神驗不可輕傳人年四十五十不問男女目暴赤腫隱澁難開者以三稜鍼刺前頂百會穴出血大妙至如年少髮早白落或白屑者此血熱而太過也世俗止知髮者血之餘也血衰故耳豈知血熱而寒髮反不茂肝者木也火多水少木反不榮火至于頂炎上之甚也大熱病汗

後勞病之後皆髮多脫落豈有寒耶故年衰火勝之人最宜出血但人情見出血皆不悅矣豈知出血者乃所以養血也凡兎雞猪狗酒醋湿麪動風生冷等物及憂忿勞力等事如犯之則不愈矣惟後頂強間腦戶風府四穴不可輕用鍼灸以避忌多故也若有誤不幸令人瘖啞宜慎之其前五穴非徒治目疾至於頭痛腰脊強外腎囊燥痒出血皆愈凡針此勿深深則傷骨唐甄權尤得出血之法世俗云熱湯沃眼十日明此言謬之久矣火方乘目更以熱湯沃之兩熱相搏是猶投賊以刃也豈知涼水沃之暫澁而久

滑熱水沃之暫滑而久澁不然胡以病目者忌沐浴或曰世俗皆言涼水沃眼血脉不行余聞大笑之眼藥中用黃連硼砂朴硝龍腦熊膽之屬皆使人血脉不行耶何謬之甚也又若頭風之甚者久則目昏偏頭風者少陽相火也久則目束小大腸閟澁者目必昏何也久病滑泄者目皆明惟小兒利久反痟眼昏蓋極則反與此稍異其餘皆宜出血而大下之余嘗病目赤或腫或翳作止無時偶至親息帥府間病目百餘日羞明隱澁腫痛不已忽眼科姜仲安云宜上星至百會速以鈹針刺四五十刺攅竹穴絲竹穴上

新眉際一十刺反鼻兩孔內以草莖彈之出血三處出血如泉約二升許來日愈太半三日平復如故余自嘆曰百日之苦一朝而解學醫半世尚闕此法不學可乎惟小兒瘡疱入眼者乃餘熱不散耳止宜降心火瀉肝風益腎水則愈矣若大人目暴病者宜汗下吐以其血在表故宜汗以其火在上故宜吐以其熱在中故宜下出血之與發汗名雖異而實同故錄銅人中五穴照用

過愛小兒反害小兒說九

小兒初生之時腸胃綿脆易饑易飽易虛易實易寒

易熱方書舊說天下皆知之矣然禮記曲禮所以王符潛夫論云天下皆不知曲禮云童子不衣裘裳說云裘大溫消陰氣且人十五歲成童尚不許衣裘今之人養稚子當正夏時以綿夾裹腹日不下懷人氣相蒸見天稍寒即封閉密室睡煖下幕燒炕紅爐使微寒不入大煖不泄雖衰老之人尚猶不可況純陽之小兒乎然君子當居密室亦不當如是之煖也王符潛夫論云嬰兒之病傷於飽也今人養稚子不察腸胃所容幾何但聞一聲哭將謂饑號急以潼乳納之兒口豈復知量不吐不已及稍能食應口輒與夫

小兒初生別無伎倆惟善號泣為強良耳此二者乃自病之源也小兒除胎生病外有四種曰驚曰疳曰吐曰瀉其病之源止有二口飽日煖驚者火乘肝之風木也疳者熱乘脾之濕土也吐者火乘胃膈甚則上行也瀉者火乘肝與大腸而瀉者也夫乳者血從金化而大寒小兒食之肌肉充實然其體為水故傷乳過多反從濕化濕熱相蒸吐痢之病作矣醫者不明其本輒以紫霜進食比金白餅之屬其中皆巴豆杏仁其巴豆大熱有大毒杏仁小熱有小毒小兒陽熱復以熱毒之藥留毒在內久必變生故劉河間先

生以通聖涼膈神芎益元治之皆無毒之藥或曰此大人所服之藥非小兒所宜也余聞笑曰大人小兒雖年壯不同其五臟六腑豈復殊耶大人服多小兒服少其實一也故不可下者宜解毒可下者宜調胃瀉心然有逐濕為之方者故余嘗以牽牛大黃木通三味末之為丸以治小兒諸病皆效蓋食乳小兒多濕熱相兼故也今之醫者多以此藥誚予及既不明造化難與力辯故予書此方以俟來世知道者然善治小兒者當察其貧富貴賤治之蓋富貴之家衣食有餘生子常夭貧賤之家衣食不足生子常堅貧家

之子不得縱其欲雖不如意而不敢怒怒少則肝病少富家之子得縱其欲稍不如意則怒多怒多則肝病多矣夫肝者木也甚則乘脾矣又况貧家無財少藥故死少富家有財多藥故死多故貧家之育子雖薄於富家其成全小兒反出於富家之右其暗合育子之理者有四焉薄衣淡食少欲寡怒一也無財少藥其病自痊不爲庸醫熱藥所攻二也在母腹中其母作勞氣血動用形得充實三也母既作勞多易生產四也此四者與富家相反也俚諺曰兒哭即兒歌不哭不僂㑩此言雖鄙切中其病世俗豈知號哭者

乃小兒所以泄氣之熱也老子曰終日號而不嗄余嘗授人以養子之法兒未坐時卧以赤地及天寒時不與厚衣布而不綿及能坐時以鐵鈴木壺雜戲之物連以細繩置之水盆中使一浮一沉弄之有聲當炎暑之時令坐其傍掬水弄鈴以散諸熱內經曰四肢者諸陽之本也手得寒水陰氣達於心中乃不藥之藥也余嘗告于陳敬之若小兒病緩急無藥不如不用庸醫但恐妻妾怪其不醫宜湯浸蒸餅令軟丸作白丸紿其妻妾以爲真藥使兒服之以聽天命最爲上藥忽歲在丙戌群兒皆病泄瀉但用藥者皆死

蓋醫者不達濕熱之理以溫燥行之故皆死惟陳敬之不與藥用余之言病兒獨存噫嗚呼班固真良史嘗曰有病不治得中醫除暴得大疾病服藥者當謹熟陰陽無與衆謀若未病之前從予奉養之法亦復不生病縱有微疾雖不服藥可也

服藥一差轉成他病說十

語云子之所慎齋戰疾又曰丘未達不敢嘗此言服藥不可不畏慎也然世有百十年相襲之弊至今不除者敢略數一二使後車改轍不蹈前覆夫傷寒溫疫時氣中暑風溫風痓與中酒傷食者其初相類此

最誤人或先一日頭痛曾傷酒便歸過于酒曾傷食便歸過于食初覺滿悶醫者不察其脉不言其始徑用備急丹纏積丹軟金丸酒癥丸此藥犯巴豆或出油不盡大熱大毒走泄五七行或十餘行其人必津液枯涸腸胃轉燥發黃瘀熱目赤口乾恍惚潮熱昏憒惑狂諸熱交作如此誤死者不可勝舉若其人或本因酒食致過亦能頭痛身熱戰慄惡寒醫者不察其脉不究其原反作傷食發之桂枝麻黃升麻之屬以汗解之汗而不解輾轉變或又生他證如此誤死者可勝計哉又如久病咳嗽形體羸瘦食飲減少日

輕夜劇醫者不察便與烏梅罌粟殼紫菀枯礬如此
峻攻嗽疾未除澁滯之病作矣嗽加之澁飲食減
醫者不察更以熱劑養胃溫劑和脾致令頭面汗出
燥熱潮發形容瘦瘁涎液上出流如湧泉若此死者
不可勝數又如婦人產餘之疾皆是敗血惡物發作
寒熱臍腹撮痛乳潼枯涸食飲稍減醫者不察便謂
產後血出數斗氣血俱虛便用溫熱之劑養血補虛
止作寒治舉世皆然豈知婦人之孕如天地之孕物
也物以陰陽和合而後生人亦以陰陽和合而後孕
偏陰偏陽豈有孕乎此與禾黍瓜果之屬何異哉若

水旱不時則華之與實俱痿落矣此又與孕而不育
者復何異哉七月立秋後十八日寸草不結者猶天
寒故也今婦人姙娠終十月無難而生反謂之寒何
不察其理之甚也竊嘗之治塼者炎火在下以水沃
其窯之巔遂成塼矣塼既出窯窯頓寒耶世俗竟傳
黑神散之屬治產後一十八證非徒其不愈則經脉
涸閉前後淋閟嘔吐嗽痰凡百熱證生矣若此誤死
者不可計之曷若四物湯與涼膈散停對大作湯劑
而下之利以數行惡物俱盡後服淡甘之劑自愈矣
又如小兒腹滿喘嗽痰涎不利醫者不察便用白餅

子之屬夫白餅子巴豆大熱有大毒兼用膩粉其後
必生口瘡上喘欬嗽嘔吐不嗜飲食之疾然此治貧
家小兒猶或可效膏粱之家必生他病又何疑哉又
如瀉利之疾歲歲有之醫者不察便用聖散子之屬
乾薑赤石脂烏梅罌粟殼官桂石榴皮龍骨牡蠣之
屬變生小便癃閟甚者為脹又甚者水腫之疾生矣
間有愈者病有微者也甚則必不愈矣又如人病停
飲或因夏月傷冷過多皆為脾胃客氣有餘也宜逐
而去之醫者不可以為脾衰而補之則痞者更痞滿
者更滿復有巴豆丸下之者病雖少解必不嗜食上

燥之病生矣又如人因閃肭膝髁肘腕大痛醫者不
察便用鈹針出血如未愈者再三刺血出血既多遂
成跛躄內經曰足得血而能步血盡安得步哉若余
治閃肭則不然以禹功散或通經二三錢下神祐丸
或除濕丹百餘丸峻瀉一二十行則痛出當痒發痛
屬夏痒屬秋出則夏衰矣此五行勝復之理也故凡
腰胯脇痛杖瘡落馬墜墮打撲莫不同然蓋此痛得
之於外非其先元虛元弱古人云痛隨利減宜峻瀉
一二十行畢但忌熱酒可一藥而愈勿謂峻瀉輕侮
此法昔有齒痛連月不止以鉄鈴鈕取之血不止而

死又有人因上下齒痛凡百痛者輒取不數年上下齒盡至五十歲生硬之物皆不能食夫上下齒痛皆由手足陽明二經風熱甚而痛矣可用大小承氣湯藏用丸袪風丸等藥瀉之則痛當自止內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火啓玄子云百端之起皆自心生心者火也火生土之故也出牙之誤不可不知又如治水之病者多用水銀輕粉曰九子大毒之藥下之水腫未消而牙齒落牙齒落而不進食水盡而立斃復有人於兩足針之水出如泉水盡亦斃矣

儒門事親卷之一

儒門事親卷之二

戴人張子和著
新安吳勉學校

偶有所遇厥疾獲瘳記十一

余昔過夏邑西有婦人病腹脹如鼓飲食乍進乍退寒熱更作而時吐嘔且三年矣師覡符呪無所不至惟俟一死會十月農隙田夫聚獵一犬役死磔于大樹根盤遺腥在其上病婦偶至樹根頓覺昏憒眩瞀不知人枕于根側口中蟲出其狀如蛇口眼皆具以舌舐其遺腥其人驚見長蟲兩袖裹其手拔蟲頭極力而出之且二尺許重幾斤剖而視之以示諸人其婦遂愈蟲亦無名此正與華元化治法同蓋偶得吐法耳又有一書生瘧間日一作將秋試及試之日乃瘧之期書生憂甚誤以葱蜜合食大吐涎數升瘀血宿食皆盡同室驚畏至來日入院瘧亦不發亦偶得吐法耳正隆間有聖旨取汴梁諸匠氏有木匠趙作頭鐵匠杜作頭行次失路迷至大宅乞宿主人不納曰家中有人重病不敢納君杜作頭紿曰此趙公乃汴梁太醫之家今蒙上司見召迷路至此蓋病者當愈而遇此公也主人默而入良久復出將邀二人入

寳貴之食已主人起請曰頻太醫看病何如趙見了
笑曰一藥可愈二人竊議曰來時所携熟藥寄他車
上此中實無柰何杜曰此甚易耳潛出門得牛糞一
塊作三十粒下以温水少頃病人覺胸中如虫行一
涌而出狀若小蜣蜋一二升以手探之又約一升頓
覺病去明日主人出謝曰百歲老人未嘗見此神効
之藥也禮餞二人遂歸嗚呼此二子小人也欲苟一
時之寢遂以穢物治人亦偶得吐法耳又有一婦病
風癎從六七歲因驚風得之自後三二年間一二作
至五七年五七作逮三十餘歲至四十歲日作或一

日十餘作以至昏癡健忘求死而已會興定歲大饑
遂採百草而食於水瀕採一種草狀若葱屬泡蒸而
食之食訖向五更覺心中不安吐涎如膠連日不止
約一二斗汗出如洗初昏困後三日輕健非曩之比
病去食進百脉皆和省其所食不知何物訪問諸人
乃憨葱苗也憨葱苗者本草所謂藜蘆苗是也圖經
云藜蘆苗吐風病此亦偶得吐法耳又有一婦年三
十餘病滑泄經年皆云虛中有積以無憂散五七日
一服至二十服不効又服纏積丹軟金丸諸藥皆不
効其人服藥愈速病勢愈甚食飲日減人或謂曰此

休息痢也宜灸中脘及左右穴臍下氣海及膀胱穴
以三里引之每年當冬至日夏至日灸之前後僅萬
餘壯忽門外或者曰此病我屢識蓋大傷飲之故即
目桃花正開俟其落時以長棘針刺之得數十萼勿
犯人手以白麵和作餅子文武火燒令熟嚼爛以米
飲湯下之病人如其言服之不一二時瀉如傾前後
瀉六七日僅數百行昏困無所知覺惟索冷水徐徐
而飲至六七日少省爾後食日進神日昌氣血日和
不數年生二子此人本不知桃花萼有取積之神効
亦偶得瀉法耳余昔過株林見一童子誤吞銅鐵之

物成疾而羸足不勝身會六七月淫雨不止無薪作
食過饑數日一旦隣牛死聞作葵菜粳飯病人乘饑
頓食之良久泄注如傾覺腸中痛遂下所吞之物余
因悟內經中肝苦急食甘以緩之牛肉大棗葵菜皆
甘物也故能寬緩腸胃且腸中久空又遇甘滑之物
此銅鐵所以下也亦偶得瀉法耳頃有老人年八十
歲臟腑澁滯數日不便每臨後時目前星飛頭目昏
眩鼻塞腰痛積漸食減纔得食便結燥如彈一日友
人命食血藏葵羹油渫菠薐菜遂頓食之日日不乏
前後皆利食進神清年九十歲無疾而終圖經云菠

萊菔利腸胃芝麻油炒而食之利大便葵菜滑腸利小
溲年老之人大小便不利最爲急切此亦偶得爲法
耳昔一士人趙仲温赴試暴病兩目赤腫睛翳不能
識路大痛不任欲自尋死一日與同儕釋悶坐於茗
肆中忽鈎窻脫鈎其下正中仲温額上髮際裂長三
四寸紫血流數升血止自快能通路而歸來日能辨
屋脊次見瓦溝不數日復故此不藥不針誤出血而
愈矣夫出血者乃發汗之一端也亦偶得出血法耳
嗚呼世人欲論治大病舍汗下吐三法其餘何足言
哉此一說讀之者當大笑耳今之醫者宜熟察之可

也人能謹察其眞中之誤精究其誤中之眞反覆求
之無病不愈余之所以書此者庶後之君子知余之
用心非一日也又有病目不覩者思食苦苣頓頓不
闕醫者以爲有蟲曾不周歲兩目微痛如蟲行大眥
漸明俄然大見又如北方貴人愛食乳酪牛酥羊生
魚膾鹿脯豬腊海味甘肥之物皆蟲之萌也然而不
生蟲者蓋筵會中多胡荽蕪荑醬鹵汁皆能殺九蟲
此二者亦偶得服食法耳智者讀此當觸類而長之

攻裏發表寒熱殊塗箋十二

有一言而可以該醫之旨者其惟發表攻裏乎雖千
枝萬派不過在表在裏而已矣欲攻其裏者宜以寒
爲主欲發其表者宜以熱爲主雖千萬世不可易也
内經言之詳矣今人多錯解其旨故重爲之箋發表
不遠熱攻裏不遠寒此寒熱二字謂六氣中司氣之
寒熱司氣用寒時用藥者不可以寒藥司氣用熱時
用藥者不可以熱藥此常理也惟攻裏發表則反之
然而攻裏發表常分作兩塗若病在表者雖畏日流
金之時不避司氣之熱亦必以熱藥發其表若病在
裏者雖堅氷積雪之時不避司氣之寒亦必以寒藥
攻其裏所謂發表者出汗是也所謂攻裏者涌泄是

也王太僕注云汗泄下痢皆以其不住於中也夫不
住其中則其藥一去不留雖以寒藥犯司氣之寒熱
藥犯司氣之熱亦無害也若其藥留而不出適足以
司氣增邪是謂不發不攻寒熱內賊其病益甚無病
者必生病有病者必甚若司氣用寒之時病在表而
不在裏反以寒藥氷其裏不涌不泄堅腹滿痛急下
痢之病生矣若司氣用熱之時病在裏而不在表反
以熱藥燥其中又非發汗則身熱吐下霍亂癰疽瘡
瘍昏鬱注下瞤瘛腫脹嘔吐鼽衄頭痛骨節攣肉痛
血泄淋閟之病生矣以此知非熱不能解表非寒不

能攻裏是解表當宜熱攻裏當宜寒若反此法是謂
妄造今之用藥者以荆黃湯解表以薑桂藥攻裏此
與以水濟水以火濟火何異哉故非徒不効輕者危
甚者死夫本草一書不過酸苦甘辛鹹淡六味而已
聖人既以辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰又以淡味
滲泄爲陽是辛甘淡三味以解表酸苦鹹三味以攻
裏發表與滲泄非解表而何涌泄非攻裏而何此二
者聖人之法盡矣茂以加矣然則醫之法果多乎哉
攻裏以寒解表以熱而已矣雖然表病而裏不病者
可專以熱藥發其表裏病而表不病者可專以寒藥

攻其裏表裏俱病者雖可以熱解表亦可以寒攻裏
此仲景之大小柴胡湯雖解表亦兼攻裏最爲得體
今之用藥者只知用熱藥解表不察裏之已病故前
所言熱證皆作矣醫者不知罪由己作反謂傷寒變
證以誣病人非一日也故劉河間自製通聖散加益
元散名爲雙解千古之下得仲景之旨者劉河間一
人而已然今之議者以爲雙解不可攻裏謗議紛紜
坐井小天誠可憾也豈知雙解煎以葱鬚豆豉涌而
汗之一劑立愈所苦終不全瘥亦可小瘥向所謂熱
證亦復不作俟六經傳畢微下而已今醫者不知其

濟物無窮之功乃妄作損胃無窮之謗情劉河間有
能醫之名設堅白之論以求世譽孰肯剖璞一試而
追悔和氏之刖足哉余之所以屢書此者歎知音之
難遇也近者余之故人某官不欲斥言其名因病頭
項強狀類傷寒服通聖散雖不得其法猶無害也醫
者見其因通聖散也立毀其非仲景之藥也渠不察
其熱已甚矣復以辛熱發之汗出不解發黃血泄竟
如前所言後雖以承氣下之不能已又復下之至絕
汗出其脈猶搏擊然余親見其子言之甚詳至今士
大夫皆不知辛熱一發之過也獨歸罪于通聖散嗚

呼甚矣道之難明也頃余之舊契讀孟堅漢書藝文
志載五苦六辛之說而顏師古輩皆無注解渠特以
問余余顧其内經諸書中亦不見其文既相別矣乘
蹇且十里外颯然而悟欲復廻以告予之舊契已歸
且遠乃令載之以示來者夫五者五臟也臟者裏也
六者六腑也腑者表也病在裏者屬陰分宜以苦寒
之藥涌之泄之病在表者屬陽分宜以辛温之劑發
之汗之此五苦六辛之意也顏師古不注蓋闕其疑
也乃知學不博而欲爲醫難矣余又徐思五積六聚
其用藥亦不外于是夫五積在臟有常形屬裏宜以

苦寒之藥涌之泄之六聚在肪無常形屬表宜以辛溫之藥發之汗之與前五苦六辛亦合亦有表而可用柴胡之凉者猶宜熱而行之裏寒而可用薑附之熱者猶宜寒而行之余恐來者不明內經發表攻裏之旨故併以孟堅五苦六辛之說附于卷末

汗下吐三法該盡治病詮十三

人身不過表裏氣血不過虛實表實者裏必虛裏實者表必虛經實者絡必虛絡實者經必虛病之常也良工之治病者先治其實後治其虛亦有不治其虛時粗工之治病或治其虛或治其實有時而幸中有時而不中謬工之治病實實虛虛其誤人之迹常著故可得而罪也惟庸工之治病純補其虛不敢治其實舉世皆曰平穩誤人而不見其迹渠亦自不省其過雖終老而不悔且曰吾用補藥也何罪焉病人亦曰彼以補藥補我彼何罪焉雖死而亦不知覺夫粗工之與謬工非不誤人惟庸工誤人最深如鯀湮洪水不知五行之道夫補者人所喜攻者人所惡醫者與其逆病人之心而不見用不若順病人之心而獲利也豈復計病者之死生乎嗚呼世無真實誰能別之今余著此吐汗下三法之詮所以該治病之法也

庶幾來者有所憑藉耳夫病之一物非人身素有之也或自外而入或由內而生皆邪氣也邪氣加諸身速攻之可也速去之可也攬而留之可也雖愚夫愚婦皆知其不可也及其聞攻則不悅聞補則樂之今之醫者曰當先固其元氣元氣實邪自去世間如此妄人何其多也夫邪之中人輕則傳久而自盡頗甚則傳久而難已更甚則暴死若先論固其元氣以補劑補之真氣未勝而邪已交馳橫騖而不可制矣惟脉脫下虛無邪無積之人始可議補其餘有邪積之人而議補者皆鯀湮洪水之徒也今予論吐汗下三法先論攻其邪邪去而元氣自復也況予所論之法識練日久至精至熟有得無失所以敢為來者言也天之六氣風暑火濕燥寒地之六氣霧露雨雹冰泥人之六味酸苦甘辛鹹淡故天邪發病多在乎上地邪發病多在乎下人邪發病多在乎中此為發病之三也處之者三出之者亦三也諸風寒之邪結搏皮膚之間藏于經絡之內留而不去或發疼痛走注麻痺不仁及四肢腫痒拘攣可汗而出之風痰宿食在膈或上脘可涌而出之寒濕固冷熱客下焦在下之病可泄而出之內經散論諸病非一狀也流言治法

非一階也至真要大論等數篇言運氣所生諸病各
斷以酸苦甘辛鹹淡以總括之其言補時見一二然
其補非今之所謂補也文具于補論條下如辛補肝
鹹補心甘補腎酸補脾苦補肺若此之補乃所以發
腠理致津液通血氣至其統論諸藥則曰辛甘淡三
味爲陽酸苦鹹三味爲陰辛甘發散淡滲泄酸苦鹹
湧泄發散者歸于汗湧者歸于吐泄者歸于下滲爲
解表歸于汗泄爲利小溲歸于下殊不言補乃知聖
人止有三法無第四法也然則聖人不言補乎曰蓋
汗下吐以若草木治病者也補者以穀肉果菜養口

體者也夫穀肉果菜之屬猶君之德教也汗下吐之
屬猶君之刑罰也故曰德教興平之粱肉刑罰治亂
之藥石若人無病粱肉而已及其有病當先誅伐有
過病之去也粱肉補之如世已治矣刑措而不用豈
可以藥石爲補哉必欲去大病大瘵非吐汗下未由
也已然今之醫者不得盡汗下吐法各立門墻誰肯
屈己之高而一問哉且予之三法能兼衆法用藥之
時有按有蹻有揃有導有減有增有續有止今之醫
者不得予之法皆仰面傲天曰吐者瓜蒂而已矣汗
者麻黄升麻而已矣下者巴豆牽牛朴硝大黄甘遂

芫花而已矣既不得其術從而誣之予固難與之若
辯故作此詮所謂三法可以兼衆法者如引涎漉涎
嚏氣追淚凡上行者皆吐法也炙蒸熏渫洗熨烙針
刺砭射導引按摩凡解表者皆汗法也催生下乳磨
積逐水破經泄氣凡下行者皆下法也以余之法所
以該衆法也然予亦未嘗以此三法遂棄衆法各相
其病之所宜而用之以十分率之此三法居其八九
而衆所當纔一二也或言內經多論鍼而少論藥者
蓋聖人欲明經絡豈知針之理即所謂藥之理即今
著吐汗下三篇各條藥之輕重寒温于左仍於三法

之外別著原補一篇使不預三法恐後之醫者泥于
補故置之三篇之末使用藥者知吐中有汗下中有
補止有三法內經曰知其要者一言而終是之謂也

凡在上者皆可吐式十四

夫吐者人之所畏且順而下之尚猶不樂況逆而上
之不悅者多矣然自胸已上大滿大實病如膠粥微
丸微散皆兒戲也非吐病安能出仲景之言曰大法
春宜吐蓋春時陽氣在上人氣與邪氣亦在上故宜
吐也涌吐之藥或丸或散中病則止不必盡劑過則
傷人然則四時有急吐者不必直待春時也但仲景

言其大法耳今人不得此法遂廢而不行試以名方所記者略數之如仲景傷寒論中以葱根白豆豉湯以吐頭痛梔子厚朴湯以吐懊憹瓜蔕散以吐傷寒六七日因下後腹滿無汗而喘者如此三方豈有殺人者乎何今議予好涌者多也又如孫氏千金方風論中散方往往皆効近代本事方中稀涎散吐膈實中滿痰厥失音牙關緊閉如喪神守萬全方以鬱金散吐頭痛眩運頭風惡心沐浴風近代普濟方以吐風散追風散吐口噤不開不省人事以皂角散吐涎潮總錄方中以常山散吐瘧孫尚方以三聖散吐發

狂神驗方吐舌不正補亡篇以遠志去心春分前服之預吐瘟疫此皆前人所用之藥也皆有効者何今之議予好涌者多也惜養生必用方言如吐其涎令人跛躄校正方已引風門中碧霞丹爲證予不須辨也但內經明言高者越之然名醫錄中惟見太倉公華元化徐文伯能明律用之自餘無聞乃知此法廢之久矣今予驟用于千載寂寞之後宜其驚且駭也惜乎黃帝岐伯之書伊摯仲景之論棄爲閑物縱有用者指爲山野無韻之人豈不謬哉予之用此吐法非偶然也曾見病之在上者諸醫盡其技而不效余

反思之投以涌劑少少用之頗獲徵應既久乃廣訪多求涌劑精妙過則能止少則能加一吐之中變態無窮屢用屢驗以至不疑故凡可吐令條達者非徒木鬱然凡在上者皆宜吐之且仲景之論胸上諸實鬱而痛不能愈使人按之及有涎唾下利十餘行其脉沉遲寸口脉微滑者此可吐之吐之則止仲景所謂胸上諸實按之及有涎唾者皆邪氣在上也內經曰下痢脉遲而滑者內實也寸口脉微滑者上實也皆可吐之王冰曰上盛不已吐而奪之仲景曰宿食在上脘當吐之又如宿飲酒積在上脘者亦當吐之

在中脘者當下而去之仲景曰病人手足厥冷兩手脉乍結以客氣在胸中心下滿而煩欲食不能食者知病在胸中當吐之余常用吐方皆是仲景方中瓜蔕散吐傷寒頭痛用葱根白豆豉湯以吐雜病頭痛或單瓜蔕名獨聖加茶末少許以吐痰飲食加全蝎梢以吐兩脇肋刺痛濯濯水聲者內經所謂濕在上以苦吐之者其是謂歟今人亦有竊予之法者然終非口授或中或否或涌而不能出或出而不能止豈知上涌之法名曰撩痰撩之一字自有擒縱卷舒頃有一工吐陳下一婦人半月不止涎至數斗命懸須

史倉皇失計求予解之予使煎麝香湯下咽立止或問麝香何能止吐予謂之曰瓜苗聞麝香即死吐者瓜蒂也所以立解如藜蘆吐者不止以葱白湯解之以石藥吐者不止以甘草貫眾解之諸草木吐者可以麝香解之以本草考之吐藥之苦寒者有豆豉瓜蒂茶末梔子黃連苦參大黃黃芩辛苦而寒者有鬱金常山藜蘆甘苦而寒者有地黃汁苦而溫者有木香遠志厚朴辛苦而溫者有薄荷芫花辛而溫者有穀精草葱根鬚辛而寒者有輕粉辛甘而溫者有烏頭附子尖酸而寒者有晉礬綠礬虀汁酸而平者有

銅碌甘酸而平者有赤小豆酸而溫者有飯漿酸辛而寒者有膽礬酸而寒者有青鹽白米飲辛鹹而溫者有皂角甚鹹而寒者有滄鹽甘而寒者有牙硝甘而微溫且寒者有參蘆頭甘辛而熱者有蝎梢凡此三十六味惟常山膽礬瓜蒂有小毒藜蘆芫花輕粉烏附尖有大毒外二十六味皆吐藥之無毒者各對證擢而用之此法宜先小服不涌積漸加之余之撩痰者以釵股雞羽探引不出以虀投之投之不吐再投之且投且探無不出者吐至昏眩慎勿驚疑書曰若藥不瞑眩厥疾弗瘳如發頭眩可飲冰水立解如無冰時新汲水亦可強者可一吐而安弱者可作三次吐之庶無損也吐之次日有頓快者有轉甚者蓋引之而吐未平也俟數日當再涌之如覺渴者冰水新水瓜梨柿及涼物皆不藥惟禁貪食過飽硬物乾脯難化之物心火既降中脘冲和陰道必強大禁房勞大憂悲思病人既不自責衆議因而噪之歸罪于吐法起謗其由此也故性行剛暴好怒喜淫之人不可吐左右多嘈雜之言不可吐病人頗讀醫書實非深解者不可吐主病者不能辨邪正之說不可吐病人無正性妄言妄從反覆不定者不可吐病勢巇危

老弱氣衰者不可吐自吐不止亡陽血虛者不可吐諸吐血嘔血咯血衄血嗽血崩血失血者皆不可吐吐則轉生他病侵成不救反起謗端雖懇切求慎勿強從恐有一失愈令後世不信此法以小不忍累大善也必標本相得彼此相信真知此理不聽浮言審明某經某絡某臟某腑某氣某血某邪某病決可吐者然後吐之是子之所望于後之君子也庶幾不使此道湮微以新傳新耳

凡在表者皆可汗式 十五

風寒暑濕之氣入于皮膚之間而未深欲速去之莫

如發汗聖人之刺熱五十九刺爲無藥而設也皆所以開玄府而逐邪氣與汗同然不若以藥發之使一毛一竅無不啓發之爲速也然發汗亦有數種世俗止知惟溫熱者爲汗藥豈知寒凉亦能汗也亦有薰漬而爲汗者亦有導引而爲汗者如桂枝湯桂枝麻黃各半湯五積散敗毒散皆發汗甚熱之藥也如升麻湯葛根湯解肌湯通聖散皆辛溫之藥也如大柴胡湯小柴胡湯柴胡飲子苦寒之藥也如通聖散雙解散當歸散子皆辛凉之藥也故外熱內寒宜辛溫外寒內熱宜辛凉平準所謂導引而汗者華元化之

虎鹿熊猴鳥五禽之戲使汗出如傅粉百疾皆愈所謂薰漬而汗者如張苗治陳廪丘燒地布桃葉蒸之大汗立愈又如許胤宗治許太后感風不能言作防風湯數斛置於牀下氣如煙霧如其言遂愈能言此皆前人用之有驗者以本草校之荆芥香白芷陳皮半夏細辛蒼朮其辛而溫者乎蜀椒胡椒茱萸大蒜其辛而大熱者乎生薑其辛而微溫者乎天麻葱白其辛而平者乎青皮薄荷其辛苦而溫者乎防已秦艽其辛而且苦者乎麻黃人參大棗其甘而溫者乎葛根赤茯苓其甘而平者乎桑白皮其甘而寒者乎防風當歸其甘辛而溫者乎附子其甘辛而大熱者乎官桂桂枝其甘辛而大熱者乎厚朴其苦而溫者乎桔梗其苦而微溫者乎黃芩知母枳實地骨皮其苦而寒者乎前胡柴胡其苦而微寒者乎羌活其苦辛而微溫者乎升麻其苦甘且平者乎芍藥其酸而微寒者乎浮萍其辛酸而寒者乎凡此四十味皆發散之屬也惟不善擇者當寒而反熱當熱而反寒此病之所以變也仲景曰大法春夏宜汗春夏陽氣在外人氣亦在外邪氣亦在外故宜發汗然仲景舉其略耳設若秋冬得春夏之病當不發汗乎但春夏易

汗而秋冬難耳凡發汗欲周身漐漐然不欲如水淋漓欲令手足俱周遍汗出一二時爲佳若汗暴出邪氣多不出則當重發汗則使人亡陽凡發汗中病則止不必盡劑要在劑當不欲過也此雖仲景調理傷寒之法至於雜病復何異哉且如傷寒麻黃之類爲表實而設也桂枝之類爲表虛而設也承氣湯爲陰虛而設也四逆湯爲陽虛而設也表裏俱實者所謂陽盛陰虛下之則愈表裏俱虛者所謂陰盛陽虛汗之則愈也所謂陽爲表而陰爲裏也如表虛亡陽發汗則死發汗之法辨陰陽別表裏定虛實然後汗

之隨治隨應設若飧泄不止日夜無度完穀下出發汗可也內經曰春傷於風夏生飧泄此以風爲根風非汗不出昔有人病此者腹中雷鳴泄注米穀不分小便澁滯皆曰脾胃虛寒故耳豆蔻烏梅罌粟殼乾薑附子曾無一効中脘臍下灸已數十燥熱轉甚小溲涸竭瘦削無力飲食減少命予視之余以謂應象論曰熱氣在下水穀不分化生飧泄寒氣在上則生䐜脹而氣不散何也陰靜而陽動故也診其兩手脉息俱浮大而長身表微熱而桂枝麻黃湯以薑棗煎大劑連進三服汗出終日至旦而愈次以胃風湯和

平臟腑調養陰陽食進病愈又貧家一男子年二十餘病破傷風搐牙關緊急角弓反張棄之空室無人問者時時呻呼余憐其苦以風藥投之口噤不能下乃從兩鼻竅中灌入咽喉約一中椀死中求生其藥皆大黃甘遂牽牛硝石之類良久上涌下泄吐且三四升下一二十行風搐立止肢體柔和旦已自能起口雖開尚未能言予又以桂枝麻黃湯三兩作一服使啜之汗出周匝如洗不三日而痊又如小兒之病驚風搐搦涎潮熱鬱舉世皆用大驚丸抱龍丸鎮心丸等藥間有不愈者余潛用瓜蔕赤小豆等分共爲

細末以猪膽汁浸蒸餅爲丸衣以螺青或丹砂以漿水乳汁送之良久風涎涌出一兩杓三五日一涌涌三五次漸以通聖散稍熱服之汗染染然病日已矣頃又治一狂人陰不勝其陽則脉流薄厥陽并乃狂難經曰重陽者狂重陰者癲陽爲腑陰爲臟非陽熱而陰寒也熱并於陽則狂狂則生寒并於陰則癲癲則死內經曰足陽明有實則狂故登高而歌棄衣而走無所不爲是熱之極也以調胃承氣大作湯下數十行三五日復上涌一二升三五日又復下之凡五六十日下百餘行吐亦七八度如吐時暖室置火以

助其熱而汗少解數汗方平又治一酒病人頭痛身熱惡寒狀類傷寒診其脉兩手俱洪大三兩日不圊余以防風通聖散約一兩用水一中椀生薑二十餘片葱鬚根二十莖豆豉一大撮同煎三五沸去滓稍熱分作二服先服一服多半須臾以釵股探引咽中吐出宿酒酒之香味尚然約一兩杓頭上汗出如洗次服少半立愈內經曰火鬱發之發爲汗之令其踈散也又嘗治一税官病風寒濕痺腰脚沉重浮腫夜則痛甚兩足惡寒經五六月間猶綿胫靴足腰膝皮膚少有跣露則冷風襲之流入經絡其痛轉劇小注

上下往來無定其痛極者便摩急而痺起肉色不變腠理閒如虫行每遇風冷病必轉增飲食轉減肢體瘦乏須人扶掖猶能行立所服者烏附薑桂種種燥熱燔針着灸莫知其數前後三年不獲一愈一日命予脉之其兩手皆沉滑有力先以導水丸通經散各一服是夜瀉三十餘行痛減半遂漸服赤茯苓湯川芎湯防風湯此三方在宣明論中治痺方是也日三服煎七八錢漐漐然汗出余又作玲瓏竈法薰蒸血熱病必增劇諸汗法古方亦多有之惟以此發汗者世罕知之故予嘗曰吐法兼汗良以此夫

凡在下者皆可下式十六

下之攻病人亦所惡聞也然積聚陳莝于中留結寒熱於內留之則是耶逐之則是耶內經一書惟以氣血通流為貴世俗庸工惟以閉塞為貴又止知下之為瀉又豈知內經之所謂下者乃所謂補也陳莝去而腸胃潔癥瘕盡而榮衛昌不補之中有真補者存焉然俗不信下之為補者蓋庸工妄投下藥當寒反熱當熱反寒未見微功轉成大害使聰明之士亦復不信者此也所以謂寒藥下者調胃承氣湯泄熱之上藥也大小桃仁承氣次也陷胸湯又其次也大柴胡又其次也以涼藥下者八正散泄熱兼利小溲洗心散抽熱兼治頭目黃連解毒散治內外上下畜熱而不泄者四物湯涼血而行經者也神芎丸解上下畜熱而泄者也以溫藥而下者無憂散下諸積之上藥也十棗湯下諸水之上藥也以熱藥下者煮黃丸纏金丸之類也急則用湯緩則用丸或以湯送丸量病之微甚中病即止不必盡劑過而生愆仲景曰大法秋宜瀉謂秋則陽氣在下人氣與邪氣亦在下故宜下此仲景言其大槩耳設若春夏有可下之疾當不下乎此世之庸工跼蹐遷延誤人大病者也皆曰

夏月豈敢用過藥瀉脫胃氣嗚呼何不達造化之甚也內經稱土火之鬱發四之氣以五月先取化源瀉土補水又曰土鬱則奪之王太僕注云奪謂下之令無壅礙也然則於五月先防土壅之發令人下奪素問之言非歟然隨證不必下奪在良工消息之也余所以言此者矯世俗期不誤大病暴病者耳故土鬱之為奪雖大承氣湯亦無害也試舉大承氣之藥論大黃苦寒通九竅利大小便除五臟六腑積熱芒硝鹹寒破痰散熱潤腸胃枳實苦寒為佐使散滯氣消痞滿除腹脹厚朴辛溫和脾胃寬中通氣此四味雖

寒下藥有泄有補卓然有奇功劉河間又加甘草以爲三一承氣以甘和其中最得仲景之秘也余嘗以大承氣改作調中湯加以薑棗煎之俗見薑棗以爲補脾胃而喜服不知其中有大黃芒硝也惡寒喜暖取補故自古及今天下皆然此內經之法抑屈而不伸者也此藥治中滿痞氣不大便者下五七行殊不困乏次日必神清氣快膈空食進內經曰脾爲之使胃爲之市人之食飲酸鹹甘苦百種之味雜湊于此壅而不行蕩其舊而新之亦脾胃之所望也況中州之人食雜而不勞者乎中州土也兼載四象木金水火皆聚此中故脾胃之病奈何中州之醫不善掃除倉廩使陳莝積而不能去也猶曰我善補大罪也此藥有奇功皆謂服之便成傷敗乃好丹而非素者也或言男子不可久瀉婦人不可久吐何妄論之甚也可吐則吐可下則下豈問男女乎大人小兒一切所傷之物在胃脘如兩手脉遲而滑者內實也宜下之何以别乎蓋傷宿食者惡食傷風者惡風傷寒者惡寒傷酒者惡酒至易辨也故凡宿食在胃脘皆可下之則三部脉平若心下按之而硬滿者猶宜再下之如傷寒大汗之後重復勞發而爲病者蓋下之後熱

氣不盡故也當再下之若雜病腹中滿痛不止者此爲內實也金匱要畧曰痛而腹滿按之不痛爲虛痛者爲實難經曰痛者爲實腹中滿痛裏壅爲實故可下之不計雜病傷寒皆宜急下之宜大承氣湯或導水丸或泄水丸等藥過十餘行如痛不已亦可再服痛已則止至如傷寒大汗之後發熱脉沉實及寒熱往來時時有涎嗽者宜大柴胡湯加當歸煎服之下三五行立愈産後慎不可作諸虛不足治之必變作骨蒸寒熱飲食不入肌膚瘦削經水不行經曰寒則衰飲食熱則消肌肉人病瘦削皆粗工以藥消鑠之故也嗚呼人之死者豈爲命乎難經曰實實虛虛損不足而益有餘如此死者醫殺之耳至如目黃九疸食勞皆屬脾土可下之宜茵蔯蒿湯或用導水丸禹攻散瀉十餘行次以五苓散桂苓甘露散白朮丸等藥服之則愈矣或腰脚胯痛可用甘遂粉二三錢以猪腰子薄批七八片摻藥在內以濕紙包數重文武火燒熟至臨臥細嚼以温酒或米飲湯調下至平明見一二十行勿訝意欲止瀉則飲水或新水頓服之瀉立止次服通經和氣定痛烏金丸蹁馬丹之類則愈矣內經有不因氣動而病生於外者太僕以爲

疳氣賊魅蟲毒蠱尸鬼擊衝薄墜墮風寒暑濕斫射刺割搐撲之類至如諸落馬墮井打撲閃肭損折湯沃火燒車碾大傷腫發焮痛日夜號泣不止者予尋常談笑之間立獲大効可峻瀉三四十行痛止腫消乃以通經散下導水丸等藥如瀉水少則可再加湯劑瀉之後服和血消腫散毒之藥病去如掃此法得之睢陽高大明侯德和使外傷者不致癃殘跛躄之患余非敢掩人之善意在救人耳曾有鄰人杖瘡發作腫痛焮及上下語言錯亂時時嘔吐數日不食皆曰不救余以通經散三四錢下神祐丸百餘丸相併

而下聞有嘔出者大半已下膈矣良久大瀉數行穢不可近膿血涎沫瘀毒約一二斗其病人困睡不省一日一夜鄰問予予曰喘息勻停腫消痛減故得睡也來旦語清食進不數日痊救杖瘡欲死者四十年間二三百余追思舉世杖瘡死者皆枉死也自後凡見冤人被責者急以導水丸禹功散大作劑料瀉驚涎一兩盆更無腫發痛焮之難如導水丸禹功散泄瀉不動更加之通經散神祐丸瀉之瀉訖須忌熱物止可喫新汲水一二頓瀉止立愈至如沉積多年羸劣者不可便服陡攻之藥可服緩積丹三稜丸之類

內經曰重者因而減之若人年老衰弱有虛中積聚者止可五日一服萬病無憂散故凡積年之患豈可一藥而愈即可減而去之以本草攷之下之寒者有戎鹽之鹹犀角之酸鹹滄鹽澤瀉之甘鹹枳實之苦酸膩粉之辛澤漆之苦辛杏仁之苦甘下之之微寒者有豬膽之苦下之大寒者有牙硝之甘大黃瓜蒂牽牛苦瓠子藍汁牛膽羊蹄根苗之苦大戟甘遂之苦甘朴硝芒硝之苦辛下之溫者有檳榔之辛芫花之苦辛石蜜之甘皂角之辛鹹下之熱者有巴豆之辛下之辛涼者有豬羊血之鹹下之平者有郁李仁

之酸桃花萼之苦右三十味惟牽牛大戟芫花皂角羊蹄根苦瓠子瓜蒂有小毒巴豆甘遂膩粉杏仁之有大毒餘皆無毒設若疫氣冒風中酒小兒瘡疹及產後潮熱中滿敗血勿用銀粉杏仁大毒之藥下之必死不死即危且如檳榔犀角皂角皆溫平可以殺蟲透關節除腸中風火燥結大黃芒硝朴硝等鹹寒可以治傷寒熱病時氣瘟毒發斑瀉血燥熱發狂大作湯劑以蕩滌積熱澤瀉羊蹄苗根牛膽藍葉汁苦瓠子亦苦寒可以治水腫遍身腹大如鼓大小便不利及目黃濕毒九疸食癆疳蟲食土生米等物分利

滑通利大小便蕩滌腸胃間宿穀相搏又若備急丸以巴豆乾薑大黃三味蜜和丸之亦是下藥然止可施於辛苦勞力貧食粗硬之輩或心腹脹滿脇肋刺痛暴痛不住服五七丸或十丸瀉五七行以救急若施之富貴城郭之人則非矣此藥用砒石治瘧相類止可施之於貧食之人若備急丸治傷寒風溫中酒冒風及小兒瘡疹產後滿悶用之下膈不死則危及夫城郭之人富貴之家用此下藥亦不死則危矣柰何庸人畏大黃而不畏巴豆粗工喜巴豆而不喜大黃蓋庸人以巴豆性熱而不畏以大黃性寒而畏

粗工以巴豆劑小而喜以大黃劑大而不喜皆不知理而至是也豈知諸毒中惟巴豆爲甚去油匱之蠟猶能下後使人津液涸竭留毒不去胸熱口燥他病轉生故下藥以巴豆爲禁余嘗用前十餘藥如身之使臂臂之使手然諸洞泄寒中者不可下俗謂休息痢也傷寒脈浮者不可下表裏俱虛者不宜下內經中五痞心證不宜下厥而唇青手足冷內熱深者宜下寒者不宜下以脈別之小兒內瀉轉生慢驚及兩目直視魚口出氣者亦不宜下若十二經敗甚亦不宜下止宜調養溫以和之如下則必誤人病耳若其餘大積大聚大病大秘大涸大堅下藥乃補藥也嘗曰瀉法兼補法良以此夫

推原補法利害非輕說十七

原補一篇不當作由近論補者與內經相違不得不作耳夫養生當論食補治病當論藥攻然聽者皆逆耳以予言爲怪蓋議者嘗知補之爲利而不知補之爲害也論補者蓋有六法平補峻補溫補寒補筋力之補房室之補以人參黃耆之類爲平補以附子硫黃之類爲峻補以豆蔻官桂之類爲溫補以天門冬五加皮之類爲寒補以巴戟肉蓯蓉之類爲筋力之補

以石燕海馬起石丹砂之類爲房室之補此六者近代之所謂補者也若施之治病非徒功効疏濶至其害不可勝言者難經言東方實西方虛瀉南方補北方此言肝木實而肺金虛瀉心火補腎水也以此論之前所謂六補者了不相涉試舉補之所以爲害者如瘧本夏傷於暑議者以爲脾寒而補之溫補之則危峻補之則死傷寒熱病下之後若以溫辛之藥補之熱當復作甚則不救瀉血血止之後若溫補之血復熱小溲不利或變水腫霍亂吐瀉本風濕暍合而爲之溫補之則危峻補之則死小兒瘡疱之後有溫

補之必發癰腫瘀痛婦人大產之後心火未降腎水未升如黑神散補之輕則危甚則死老人目瞖耳聵腎水衰而心火盛也若峻補之則腎水彌涸心火彌盛老人腎虛腰脊痛腎惡燥腰者腎之府也峻補之則腎愈虛矣老人腎虛無力夜多小溲腎主足腎水虛而火不下故足痿心火上乘肺而不入脬囊故夜多小溲若峻補之則火益上行脬囊亦寒矣老人喘嗽火乘肺也若溫補之則甚峻補之則危停飲之人不可補補則痞悶轉增脚重之人不可補補則痹膝轉重男子二十上下而精不足女人二十上下而血

不流皆二陽之病也時人不識便作積冷極憊治之以溫平補之夫積溫尚成熱而況燔鍼於臍下火灸手足腕骨內經本無勞證由此變而為勞煩渴咳嗽涎痰肌瘦寒熱往來寢汗不止日高則顏赤皆以為傳尸勞不知本無此病醫者妄治而成之耳夫二陽者陽明也胃之經也心受之則血不流脾受之則味不化故男子少精女子不月皆由使內太過故隱蔽委曲之事各不能為也惟深知涌泄之法者能治之又如春三月風傷於榮榮為血故陰受之溫傷於衛衛為氣故陽受之初發之後多與傷寒相似頭痛身

熱口乾潮熱數日不大便仲景所謂陰陽俱浮自汗出身重多眠睡目不欲開者是也若以寒藥下之則傷臟氣若以溫藥補之則火助風溫發黃發斑溫毒熱增劇矣風溫外甚則直視潮熱譫語撏衣撮空驚惕而死者溫補之罪也內經雖言形不足者溫之以氣精不足者補之以味氣屬陽天食人以五氣血屬陰地食人以五味者戒乎偏勝非便以溫為熱也又若經云損者補之勞者溫之此溫乃溫存之溫也豈以溫為熱哉又如虛則補其母實則瀉其子者此欲權衡之得其平也又烏在燔鍼壯火煉石燒砒硫舊

烏附然後為補哉所謂補上欲其緩補下欲其急者亦焉在此等而為急哉自有酸苦甘辛鹹淡寒涼溫熱平更相君臣佐使耳所謂平補者使陰陽兩停是謂平補奈時人往往惡寒喜溫甘受酷烈之毒雖死而不悔也可勝歎哉余用補法則不法取其氣之偏勝者其不勝者自平矣醫之道損有餘乃所以補其不足也余嘗曰吐中自有汗下中自有補豈不信然余嘗用補法必觀病人之可補者然後補之昔維陽府判趙顯之病虛羸泄瀉褐色乃洞泄寒中證也每聞大黃氣味即注泄余診之兩手脉沉而微余令灸

水穴一百餘壯次服桂苓甘露散胃風湯白术丸等藥不數月而愈又息城酒監趙進道病腰痛歲餘不愈診其兩手脉沉實有力以通經散下五七行次以杜仲去粗皮細切炒斷絲爲細末每服三錢猪腰子一枚薄批五七片先以椒鹽淹去腥水摻藥在內裹以荷葉外以濕紙數重封以文武火燒熟臨臥細嚼以溫酒送下每旦以無比山藥丸一服數日而愈又相臺監酒岳成之病虛滑泄日夜不止腸鳴而口瘡俗呼爲心勞口瘡三年不愈予以長流水同薑棗煎五苓散五七錢空心使服之以治其下以宣黃連與

白茯苓去皮二味各等分爲末以白麪糊爲丸食後溫水下三五十丸以治其上百日而愈又汝南節度副使完顏君寶病臟毒下衃血發渴寒熱往來延及六載日漸瘦弱無力面黃如染余診其兩手脉沉而身涼內經寒以爲榮氣在故生可治先以七宣丸下五七行次以黃連解毒湯加當歸赤芍藥與地榆散同煎服之一月而愈若此數證余雖用補未嘗不以攻藥居其先何也蓋邪未去而不可言補補之則適足資寇故病蠲之後莫若以五穀養之五果助之五畜益之五菜充之相五臟所宜毋使偏傾可也凡藥

有毒也非止大毒小毒謂之毒雖甘草苦參不可不謂之毒久服必有偏勝氣增而久夭之由也是以君子貴流不貴滯貴平不貴強盧氏云強中生百病其知言哉人惟恃強房勞之病作矣何貴於補哉以太宗憲宗高明之資猶陷於流俗之蔽爲方士燥藥所誤以韓昌黎元稹之猶死於小溲不通水腫有服丹置數妾而死於暴脫有服草烏頭如聖丸而死於鬚瘡有服乳石硫黃小溲不通有習氣求嗣而死於精血有嗜酒而死於發狂見鬼有好茶而爲癖乃知諸藥而不可久服但可攻邪邪去則已近年運使張伯

英病宿傷服硫黃盞附數月一日喪明監察陳威卿病嗽服鍾乳粉數年嘔血而殞嗚呼後之議補者尚監茲哉

證口眼喎斜是經非竅辯十八

口眼喎斜者俗工多與中風掉眩證一槩治之其藥則靈寶至寶續命清心一字急風烏犀鐵彈丸其方非不言治此病也然而不愈者何也蓋知竅而不知經知經而不知氣故也何謂知竅而不知經蓋人之首有七竅如日月五星七政之在天也故肝竅目目爲肝之外候肺竅鼻鼻爲肺之外候心竅舌舌無竅

心與腎合而寄竅於耳故耳與舌俱為心之外候俗
工止知目病歸之肝口病歸之脾耳病歸之腎舌病
歸之心更無改張豈知目之內眥上下二綱足太陽
及足陽明起於此目之銳眥足少陽起於此手少陽
至焉此鼻之左右足陽明手陽明俠乎此口之左右
亦此兩經環乎此故七竅有病不可獨歸之五臟當
歸之六陽經也余曰俗工知竅而不知經者此也何
謂知經而不知氣蓋世之談方藥者不啻千萬世不
過本草性味其知十二經所出所入所循所環所交
所合所過所注所起所會所屬所絡所上所下所俠
所貫所布所散所結所繞所抵所連所係所約所同
所別千萬人中或見一二名明可謂難其人矣然而
不過執此十二經便為病本將陽經為熱陰經為寒
向本草中尋藥藥架上撿方而已矣病之不愈又何
訝焉豈知靈樞經曰足之陽明手之太陽筋急則口
目為僻此十二經及受病之處也非為病者也及為
病者天之六氣也六氣者何風暑燥濕火寒是也故
曰俗工知經而不知氣者此也然則口目喎斜者此
何經也何氣也足之太陽足之陽明左目有之右目
亦有之足之陽明手之陽明口左有之口右亦有之

此兩道也靈樞又言足陽明之筋其病頰筋有寒則
急引頰移口熱則筋弛縱緩不勝收故僻是左寒右
熱則左急而右緩右寒左熱則右急而左緩故偏於
左者左寒而右熱偏於右者右寒而左熱也夫寒不
可徑用辛熱之劑蓋左中寒則逼熱於右右中寒則
逼熱於左陽氣不得宣行故也而況風者甲乙木也
口眼陽明皆為胃土風偏賊之此口目之所以僻也
是則然矣七竅惟口目喎斜而耳鼻獨無此病者何
也蓋動則風生靜則風息天地之常理也考之易象
有足相符者震巽主動坤艮主靜動者皆屬木靜則
皆屬土觀卦者視之理也視者目之用也目之上綱
則眨下綱則不眨故觀卦上巽而下坤頤卦者養之
理也養者口之用也口之下頷則嚼上頷則不嚼故
頤卦上艮而下震口目常動故風生焉耳鼻常靜故
風息焉當思目雖斜而目之眶眶未嘗斜口之喎而
口之輔車未嘗喎此經之受病非氣之受病明矣而
況目有風輪唇有飛門者耶余嘗治此證未嘗用世
俗之藥非故與世參商方鑿圓枘自然齟齬者過頃
一長吏病此命予療之目之斜灸以承泣口之喎灸
以地倉俱效苟不效者當灸人迎夫氣虛風入而為

伸上不得出下不得泄真氣爲風邪所陷故宜灸內
經曰陷下則灸之正謂此也所以立愈又嘗過東杞
一夫亦患此予脉其兩手急數如弦之張甚力而實
其人齒壯氣充與長吏不同蓋風火交勝余調承氣
湯六兩以水四升煎作三升分四服令稍熱啜之前
後約瀉四五十行去一兩盆次以苦劑投之解毒數
服以升降水火不旬日而愈脉訣云熱則生風若此
者不可純歸其病於隠隙之間而得亦風火素感而
然也蓋火勝則制金金衰則木茂木茂則風生若東
杞之人止可流溼潤燥大下之後使加飧通鬱爲大

靈樞雖有馬膏桂酒雙塗之法此但治其外耳非治
其內也今人不知其本欲以单服熱水強引而行之
未見其愈者也向之用薑附烏桂起石硫黃之劑者
是耶非耶

疝本肝經宜通勿塞狀十九

疝有七前人論者甚多非靈樞素問銅人之論余皆
不取非余好異也但要窮其原耳七疝者何寒疝水
疝筋疝血疝氣疝狐疝㿗疝是謂七疝俗工不識因
立謬名或曰膀胱或曰腎冷或曰小腸氣小兒曰偏
氣立名既謬併喪其實何哉蓋醫者既斷爲膀胱腎

冷小腸氣又曰虛寒所致其藥之用也不鹿茸巴戟
則杜仲蓯蓉不附子烏頭則乾薑官桂不練實懐香
則金鈴補骨脂朝吞暮餌曾無殊効三二十年牢不
可去間因微病稍似開通執此微芒浸成大錯標旣
不除本必歸甚處處相傳曾無覺者豈知諸疝皆歸
肝經其奈痛流歸之小腸脬囊夫膀胱水府專司滲
泄小腸水道專主通流腎爲少陰總統二水人之小
溲自胃入小腸滲入膀胱膀胱者脬囊也氣化則水
出莖端此常道也及其爲疝乃屬足厥陰肝經蓋環
陰器而上入小腹者足厥陰肝經也夫肝腎皆屬于

下與衝任督相附然靈樞經言足厥陰肝經病則有
遺溺癃閉狐疝主腎與膀胱小腸三經則不言疝是
受疝之處乃肝之部分也且內經男子宗筋爲束骨
之會也而肝主筋睾者囊中之丸雖主外腎非厥陰
環而引之與玉莖無由伸縮在女子則爲篡戶其內
外爲二其一曰廷孔其二曰窈漏此足厥陰與衝任
督之所會也靈樞言足厥陰之經筋聚于陰器其病
傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清
陰氣故陽則與太陰厥陰之筋皆會于陰器惟厥陰
主筋故爲疝者必本之厥陰靈樞又言足厥陰之別

名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽循脛上睾結於莖其病氣逆睾腫卒疝實則挺長虛則暴癢取之所別矣豈非厥陰爲受病之處耶靈樞又言邪在小腸連睾係屬於脊貫肝絡肺心系氣盛厥逆上衝腸胃燻肝散於肓結於臍故取之肓原以散之刺太陰以平之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之此其初雖言邪在小腸至其治法必曰取厥陰以下之乃知諸疝關於厥陰可以無疑以脉考之素問云厥陰滑爲狐疝少陽滑爲肺風疝太陰滑爲脾風疝陽明滑爲心風疝太陽滑爲腎風疝少陰滑爲肝風疝凡此六疝雖見於他脉中皆言風疝者足厥陰肝經之氣也靈樞亦曰心脉微滑爲心疝肝脉滑甚爲㿗疝腎脉滑甚爲癃㿗凡此三藏脉之疝亦以滑爲疝也素問又云脉大急皆爲疝心脉滑傳爲心疝肺脉沉傳爲肺疝三陰急爲疝三陽急爲瘕王太僕云太陽受寒血凝爲瘕太陰受寒氣聚爲疝此言太陰受寒傳之肝經也可以溫藥逐之不可以溫藥補之若補之者是欲病去而強挽留之也歷考素問三陽爲病發寒熱其傳爲㿗疝此亦言膀胱非受病之處必傳於厥陰部分然後爲疝也又言病在

少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒言脉急者曰疝瘕少腹痛凡言少腹者豈非厥陰之部分耶又言脾風傳胃名曰疝瘕此謂非肝木不能爲風氣名曰厥疝蓋脾土虛而不能制水又爲肝木所凌也又言督脉爲衝疝蓋厥陰與衝任督俱會於前陰也豈不明哉至如運氣中又言歲太陽在泉寒淫所勝民病少腹控睾蓋寒客於小腸膀胱則肝木縮而不得伸行毋傳之子也陽明司天燥淫所勝丈夫㿗疝婦人少腹痛此言肝氣不得上行爲金所抑鬼賊故也又言太陰在泉土勝則寒氣逆滿食飲不下甚則爲疝此亦言寒客太陰濕土土不勝水水傳之肝經也又嘗徧閱銅人俞穴亦相表裏如背上十三椎俞肝經言寒疝腹部中行惟陰交一穴言寒疝任脉之所發也關元一穴言暴疝小腸之募足三陰任脉之會也中極一穴言疝瘕膀胱之募亦足三陰任脉之會也曲骨一穴言㿗疝任脉足厥陰之會也其腹部第二行肓腧二穴言寒疝衝脉足少陰之會也四病上穴言疝瘕衝任脉足少陰腎之會也其腹部第三行大巨二穴言㿗疝足陽明脉氣之所發也氣衝二穴言㿗疝莖中痛兩丸寒痛亦足陽明脉氣之所發也

其腹部第四行府舍二府言疝痛足六陰厥陰陰維之交會也亦太陰部三陰陽明支別也衝門二穴言陰疝足太陰厥陰之會也其在側脇者五樞二穴言寒疝陰邪上入少腹帶脉下三寸也其在足六經者足厥陰穴十名言疝者七謂大敦行間太衝中封蠡溝中都曲泉足少陽穴十四名言疝者一謂丘墟穴也足太陰穴十一名言疝者一謂陰陵泉也足陽明穴十五名言疝者一謂陰市穴也足少陰穴十名言疝者五謂然谷大谿照海交信築賓也足太陽穴十八名言疝者二謂金門合陽也由是言之惟厥陰言

疝獨多爲疝之主也其穴經穴雖亦治疝終非受疝之地但與足厥陰相連耳或在泉寒勝木氣攣縮禁於此經或司天燥勝木氣抑鬱於此經或忿怒悲哀憂抑頓挫結於此經或藥淋外固閉尾縮精壅於此經其病差別如此不知世間之藥多熱補從誰而受其方也信其方則素問靈樞銅人皆非也信素問靈樞銅人則俗方亦皆非也不知後之君子以孰爲是嗚呼余立於醫四十餘歲使世俗之方人人可療余亦莫知敢廢也識練日久因經識病然後不惑且夫遺溺閉癃陰痿脬痺精滑白淫皆男子之疝也不可

妄歸之腎冷血涸不月月罷腰膝上熱足躄嗌乾癃閉少腹有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕若年少而得之不計男子婦人皆無子故隱蔽委曲之事了不干脬腎小腸之事乃足厥陰肝經之職也奈俗方止言脬腎小腸殊不言肝木一句惑人甚矣且肝經乙木也木屬東方爲心火之母也凡疝者非肝木受邪則肝木自甚也不可便言虛而補之難經所謂東方實西方虛瀉南方補北方此言瀉火木自平金自清水自旺也昔審言爲蔡之蔡寧也因坐濕地疝痛不可堪

諸藥莫救余急以導水丸禹功散瀉三十餘行腫立消痛立減又項關一男子病卒疝暴痛不任倒于街衢人莫能動呼予救之余引經證之邪氣客于足厥陰之絡令人卒疝故病陰丸痛也余急瀉大敦二穴大痛立已夫大敦穴者乃是厥陰之二穴也殄寇鎮一夫病痟癃發渴痛飲蜜漿剌傷水水醫者莫知瀉去其濕反雜進藍附濕爲燥熱所壅三焦閉澁水道不行陰道不興陰囊腫墜大於升斗余先以導水百餘丸少頃以猪腎散投之是夜瀉青赤水一斗遂失痛之所在近穎尾一夫病卒疝赤腫大痛數日不止

諸藥如水投石令以導水一百五十九令三次咽之次以通經散三錢空腹淡酒調下五更下臟腑壅積之物數行痛腫皆去不三日平復如故內經曰木鬱則達之達謂吐也令條達肝之積本當吐者然觀其病之上下以須爲貴仲景所謂上宜吐下宜瀉者此也敢列七疝圖于左以示後之君子庶幾有所憑藉者焉

寒疝其狀囊冷結硬如石陰莖不舉或控睪丸而痛得於坐卧濕地或寒月涉水或冒雨雪或卧坐磚石或風冷處使內過勞宜以温劑下之久而無子

水疝其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫而狀如水晶或囊痒而燥出黃水或少腹中按之作水聲得於飲水醉酒使內過勞汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故水多令人爲卒疝宜以逐水之劑下之有漏鍼去水者人多不得其法

筋疝其狀陰莖腫脹或潰或膿或痛而裏急筋縮或莖中痛痛極則痒或挺縱不收或白物如精隨溲而下久而得於房室勞傷及邪術所使宜以降心之劑下之

血疝其狀如黃瓜在少腹兩傍橫骨兩端約中俗云便癰得於重感春夏大燠勞動使內氣血流溢滲入脬囊留而不去結成癰腫膿少血多宜以和血之劑下之

氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣鬱之而脹怒哭號罷則氣散者是也有一治法以鍼出氣而愈者然鍼有得失宜以散氣之藥下之或小兒亦有此疾俗曰偏氣得於父已年老或年少多病陰痿精怯強力入房因而有子胎中病也此疝不治惟築賓一穴言之

狐疝其狀如瓦卧則入小腹行立則出小腹入囊中狐則晝出穴而溺夜則入穴而不溺此疝出入上下往來正與狐相類也亦與氣疝大同小異今人帶鉤鈴是也宜以逐氣流經之藥下之

㿗疝其狀陰囊腫縋如升如斗不痒不痛者是也得之地氣卑濕所生故江淮之間湫塘之處多感此疾宜以去濕之藥下之女子陰戶突出雖亦此類乃熱則不禁固也不可便謂虛寒而濇之燥之補之本名曰瘕宜以苦下之以苦堅之王冰云陽氣下墜陰氣上爭上爭則寒多下墜則筋緩故睪垂縱緩因作㿗疝也已上七疝下去其病之後可調則調可補則補

各量病勢勿拘俗法經所謂陰盛而腹脹不通者癩
癃疝也不可不下

五虛五實攻補懸絶法二十

虛者補之實者瀉之雖三尺之童皆知之矣至於五
實五虛豈可與泛泛虛實用藥哉內經明言其狀如
俗工不識何此二證所以見殺於委靡之手也坐視
人之死猶相夸曰吾藥穩以誑病家天下士大夫亦
誠以爲然以誑天下後世豈不怪哉夫一身猶一國
也如尋邑百萬圍昆陽此五實證也故蕭王親犯中
原而篤戰如河內饑而又經火災此五虛證也故汲
黯不避矯詔而發倉此可與達權知變者論不可與
貪常嗜瑣者說也故曰庸人誤天下庸工誤病人正
一理也內經曰五實者死五虛者亦死夫五實者謂
五臟皆實也五虛者謂五臟皆虛也腑病爲陽易治
而鮮死臟病爲陰而難治多死經明言脉盛皮熱腹
脹前後不通悶瞀者五實也脉盛爲心皮熱爲肺腹
脹爲脾前後不通爲腎悶瞀爲肝五臟皆實之證也
五虛者反是脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入者
五虛也脉細爲心皮寒爲肺氣少爲肝泄利前後爲
腎飲食不入爲脾此五臟皆虛之證也夫五實爲五

臟俱太過五虛爲五臟俱不及內經言此二證皆死
非謂必死也謂不救則死救之不得其道亦死也其
下復言漿粥入胃則虛者活身汗後利則實者活此
兩證自是前二證之治法也後人不知是治法只作
辨驗生死之斷句直謂病人有此則生無此則死虛
者聽其漿粥自入胃實者聽其自汗自利便委之死
地豈不謬哉夫漿粥入胃而不注泄則胃氣和胃氣
和則五虛皆實也是以生也汗以泄其表利以泄其
裏併泄則上下通上下通則五實皆啓矣是以生也
此二證異常却不宜用班氏所謂有病不服藥之言
蓋其病大且驚故也余向日從軍於江淮之上一卒
子病予診之乃五實也余自幼讀醫經嘗記此五實
之證竟未之遇也既見其人竊私料之此不可以常
法治乃可大作劑而下之殊不動摇計竭智窮無如
之何忽憶桃花蕚丸頓下七八十丸連瀉二百餘行
與前藥相兼而下其人昏困數日方已蓋大疾之已
去自然卧憩不如此則病氣無由衰也徐以調和胃
氣之藥饘粥日加自尔平復又嘗過鳴鹿邸中聞有
人呻吟聲息瘦削痿然無力余視之乃五虛也余急
以聖散子二服作一服此藥非三錢二錢可塞也續

以胃風湯五苓散等藥各大作劑使頓服注瀉方亡而漿粥入胃不數日而其人起矣故五虛之受不加峻塞不可得而實也彼庸工治此二證草草補瀉如一杯水救一車薪之火也竟無成功反曰虛者不可補實者不可瀉此何語也吁不虛者强補不實者强攻此自是庸工不識虛實之罪也豈有虛者不可補實者不可瀉之理哉予他日又思之五實證汗下吐三法俱行更快五虛證一補足矣今人見五實證猶有塞之者見五虛者雖補之而非其藥本當生者反鈍滯遷延竟至於死耳夫聖散子有乾薑尋常瀉利

勿用各有標本胃風五苓有桂所以溫經散表而分水道聖散子之滿燥胃風五苓之能分皆辛熱辛溫之劑也俗工往往聚訕以予好用寒凉然予豈不用溫補但不遇可用之證也譊譊謗喙咸欲夸已以標名從誰斷之悲夫

儒門事親卷之三

戴人張子和著
新安吳勉學校

喉舌緩急砭藥不同解二十一

咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異喉以候氣故喉氣通於天咽以嚥物故咽氣通於地會厭與喉上下以司開闔食下則吸而掩氣上則呼而出是以舌抵上齶則會厭能閉其咽矣四者相交爲用闕一則飲食廢而死矣此四者乃氣與食出入之門户最急之處故難經言七衝門而會厭之下爲吸門及其爲病也一言可了一言者何曰火内經曰一

陰一陽結謂之喉痺王太僕註云一陰者手少陰君火心主之脉氣也手少陽相火三焦之脉氣也二火皆主脉並絡於喉氣熱則内結結甚則腫脹腫脹甚則痺痺甚而不通則死矣夫足少陰循喉嚨俠舌本少陰上俠咽此二者誠是也至於足陽明下人迎循喉嚨足太陰俠咽連舌本手太陽循咽下鬲足厥陰循喉嚨之後此數經皆言咽喉獨少陽不言咽喉而内經言一陰一陽結謂之喉痺何也蓋人讀十二經多不讀靈樞經中別十二篇見載十二經之正其文云

足少陽之正繞髀入毛際合於厥陰別者入季脇間
循胸裏屬膽散之上肝貫心以上挾咽出頤頷散於
面繫目系合少陽於外眥也又手心主之正別下淵
腋三寸入胸中別屬三焦出循喉嚨出耳後合少陽
完骨之下是手少陽三焦之氣與手心主少陰之氣
相合而行于喉嚨也推十二經惟足太陽別項下其
餘皆湊于喉嚨然內經何爲獨言一陰一陽結爲喉
痺蓋君相二火獨勝則熱結正絡故痛且速也余謂
一言可了者火是也故十二經中言嗌乾嗌痛咽腫
頷腫舌本強皆君火爲之也唯喉痺急速相火之所

爲也夫君火者猶人火也相火者猶龍火也人火焚
木其勢緩龍火焚木其勢速內經之言喉痺則咽與
舌在其間耳以其病同是火故不分也後之醫者各
詳其狀強立八名曰單乳蛾雙乳蛾單閉喉子舌脹
木舌脹纏喉風走馬喉閉熱氣上行結薄於喉之兩
傍近外腫作以其形似是謂乳蛾一爲單二爲雙也
其比乳蛾差小者名閉喉熱結於舌下復生一小舌
子名曰子舌脹熱結於舌中舌爲之腫名曰木舌脹
木者強而不柔和也熱結於咽項腫遶於外且麻且
痒腫而大者名曰纏喉風喉痺暴發暴死者名走馬

喉痺此八種之名雖詳若不歸之火則相去遠矣其
微者可以鹹耎之而大者以辛散之今之醫者皆有
其藥也如薄荷烏頭殭蠶白礬朴硝銅綠之類也至
于走馬喉痺何待此乎其生死人反掌之間耳其最
不誤人者無如砭鍼出血血出則病已易曰血去惕
出良以此夫首余以治一婦人木舌脹其舌滿口諸
藥不愈余以鈹鍼小而銳者砭之五七度腫減三日
方平計所出血幾至盈斗又治一男子纏喉風腫表
裏皆作藥不能下余以涼藥灌於鼻中下十餘行外
以拔毒散傅之陽起石燒赤與伏龍肝各等分細末

每日以新水掃百遍三日熱始退腫始消又嘗治一
貴婦喉痺蓋龍火也雖用涼藥而不可使冷服爲龍
火宜以火逐之人火者烹飪之火是也乃使爆於烈
日之中登于高堂之上令侍婢携火爐坐藥銚于上
使藥常極熱不至大沸通口時時呷之百餘次龍火
自散此法以熱行寒不爲熱病扞格故也大抵治喉
痺用鍼出血最爲上策但人畏鍼委曲傍求瞬息喪
命凡用鍼而有鍼創者宜擣生薑一塊調以熱白湯
時時呷之則創口易合銅人中亦有灸法然痛微者
可用病速者恐遲則殺人故治喉痺之火與救火同

不容少待内經火鬱發之發謂發汗然咽喉中豈能發汗故出血者乃發汗之一端也後之君子毋執小方而曰吾藥不動臟腑又妙於出血若卒遇小疾而發功不幸遇大病而死矣毋遺後悔可矣

五積六聚治同鬱斷二十二

先賢說五積六聚甚明惟治法獨隱其言五積曰肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不已令人發欬逆痎瘧連歲不已者是也心之積名曰伏梁起於臍大如臂上至心下久不已令人病煩心脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久不已令人四肢不

收發黄疸飲食不爲肌膚俗呼爲食勞黄也肺之積名曰息賁在左脇下大如覆杯久不愈令人洒淅寒熱喘欬發肺癰腎之積名曰賁豚發于少腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣此五積之狀前賢言之豈不分明徧訪醫門人人能道及問治法不過三稜廣茂乾漆硇砂陳皮礞石巴豆之類復有不明標本者又從而補之豈有病積之人大邪不出而可以補之乎至于世之磨積取積之藥余初學醫時苦曾用之知其不効遂爲改轍因考内經驟然大悟内經曰木鬱則達之火鬱發之土

鬱奪之金鬱泄之水鬱折之王太僕曰達謂吐發謂汗奪謂下泄謂利小便折謂折其衝逆此五者五運爲司天所刺故立此五法與五積若不相似然蓋五積者因受勝已之邪而傳於已之所勝適當旺時拒而不受復還於勝已者勝已者不肯受因留結爲積故肝之積得於季夏戊巳日心之積得於秋庚辛日脾之積得於冬壬癸日肺之積得於春甲乙日腎之積得於夏丙丁日此皆抑鬱不伸而受其邪也豈待司天尅運然後爲之鬱哉且積之成也或因暴怒喜悲思恐之氣或傷酸苦甘辛鹹之食或停溫涼熱寒

之飲或受風暑燥寒火濕之邪其初甚微可呼吸按導方寸大而去之不幸而遇庸醫強補而留之留而不去遂成五積夫肥氣者不獨氣有餘也其中亦有血矣蓋肝藏血故也伏梁者火之鬱也以熱藥散之則益甚以火灸之則彌聚況伏梁證有二名同而實異不可不詳焉其一伏梁上下左右皆有根在腸胃之外有大膿血此伏梁義同肚癰其一伏梁身體髀股胻皆腫環臍而痛是爲風根不可動動則爲水溺濇之病此二者内經雖言不可動止謂不可大下非謂全不可下恐病去而有害痞氣者舉世皆言寒則

痞內經以爲濕則痞雖因飲冷而得其陽氣爲濕所畜以熱攻之則不散以寒攻之則濕去而寒退矣息賁者喘息憤而上行也此舊說也余以謂賁者賁門也手太陰之筋結胸裏而貫賁入賁下抵季脇其病支轉筋痛甚則成息賁手心主結於臂其病胸痛息賁又云肺下則居賁迫肝善脇下痛肝高則上支賁兩脇悗爲息賁若是言之是積氣於賁而不散此靈樞說五臟處言此賁自是多故予發之賁豚者賁與奔同銅人言或因讀書得之未必皆然也腎主骨此積最深難療大忌吐涌以其在下止宜下之故予嘗

以獨聖散吐肥氣揃以木架必燠室中吐兼汗也肝之積便是風也吐出數升後必有血一二滴勿疑病當然也續以磨積之藥調之嘗治伏梁先以茶調散吐之兼汗以禹功導水奪之繼之以降火之藥調之又嘗治痞氣萬舉萬全先以瓜蒂散吐其酸苦黃膠腥腐之物三二升次以導水禹功下二三十行末以五苓淡劑等藥調之又嘗治息賁用瓜蒂散不計四時置之燠室中更以火一爐以助其汗吐汗下三法齊行此病不可逗遛久則傷人又嘗治賁豚以導水通經三日一下之一月十下前後百行次用治血化氣磨積之藥調之此積雖不傷人亦與人偕老若六聚之物在腑屬陽而無形亦無定法故此而行之何難之有或余言之治積太峻予曰不然積之在臟如陳莝之在江河且積之在臟中間多着脂膜曲折之處區曰之中陳莝之在河江不在中流多在汀灣洄薄之地遇江河之溢一漂而去積之在臟理亦如之故予先以丸藥驅逐新受之食使無梗塞其碎着之積已離而未下次以散藥滿胃而下橫江之筏一壅而盡設未盡者以藥調之惟堅積不可用此法宜以漸除內經曰堅者削之今人言塊癖是也因述九積

圖附于篇末以俟來哲知余用心獨苦久矣而世無知者

食積酸心腹滿大黃牽牛之類甚者礞石巴豆

酒積目黃口乾葛根麥蘖之類甚者甘遂牽牛

氣積噫氣痞塞木香檳榔之類甚者枳殼牽牛

涎積咽如拽鋸朱砂膩粉之類甚者瓜蒂甘遂

痰積涕唾稠粘半夏南星之類甚者瓜蒂藜蘆

癖積兩脇刺痛三稜廣茂之類甚者甘遂蝎梢

水積足脛脹滿郁李商陸之類甚者甘遂芫花

血積打撲肭瘀產後不月桃仁地榆之類甚者䖟蟲水蛭

肉積癥瘤核癧賦粉白丁香砭刺出血甚者硇砂信石九積皆以氣爲主各據所屬之狀而對治之今人總此諸藥併爲一方曰可治諸積大謬也吾無此病焉用此藥吾無彼病焉用彼藥十羊九牧何所適從非徒無益而又害之

斥十膈五噎浪分支派疏二十三

病派之分自巢氏始也病失其本亦自巢氏始也何者老子曰少則得多則惑且俗謂噎食一證在內經苦無多語惟曰三陽結謂之膈三陽者謂大腸小腸膀胱也結謂結熱也小腸熱結則血脉燥大腸熱結

則後不圊膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後閟塞下既不通必反上行此所以噎食不下縱下而復出也謂胃爲水穀之海日受其新以易其陳一日一便乃常度也今病噎者三日五日或五七日不便是乖其度也亦明矣豈非三陽俱結於下廣腸枯涸所食之物爲咽所拒縱入太倉還出喉嚨此陽火不下推而上行也故經曰少陽所至爲嘔涌溢食不下此理豈不曉然又氣厥論云肝移寒於心爲狂膈中陽氣與寒相薄故膈食而中不通此膈陽與寒爲之也非獨專於寒也六節藏象又云人迎四盛以上爲格

陽王太僕云陽盛之極故膈拒而食不得入正理論曰格則吐逆故膈亦當爲格後世強分爲五噎謂氣憂食思勞也後又分爲十膈五噎其派既多其惑滋甚人之溢食初未必遽然也初或傷酒食或胃熱欲吐或冒風欲吐醫氏不察本原火裏燒薑湯中煮桂丁香未已豆蔻繼之蓽撥未已胡椒繼之雖曰和胃胃本不寒雖曰補胃胃本不虛設如傷飲止可逐飲設如傷食止可逐食豈可言虛便將熱補素問無者於法猶非素熱之人三陽必結三陽既結食必上潮醫氏猶云胃寒不納燔鍼鑽肉炷艾灼肌苦楚萬千

三陽熱結分明一句到了難從不過抽薪最爲緊要揚湯止沸愈急愈增歲月彌深爲醫所誤人言可下退陽養陰張眼吐舌恐傷元氣止在冲和閉塞不通經無來路腸宜通暢是以鳴腸腸既不通遂成噎病世傳五噎寬中散有薑有桂十膈散有附有烏今予既斥其方信乎與否以聽後賢或云憂恚氣結亦可下乎余曰憂恚磐礴便同火鬱太倉公見此皆下法廢以來千年不復今代劉河間治膈氣噎食用承氣三湯獨超

近代今用藥者不明主使如病風狂嘻嘻不及觀其

效猶昧本原旣懶問咨妄與非毀今予不恤姑示后人用藥之時更詳輕重假如閼久愼勿陡攻縱得攻開必慮後患宜先潤養小着湯丸累累加之門戶自透其或咽噎上阻延痰輕用苦酸微微涌出因而治下藥勢易行設或不行蜜鹽下導始終勿引兩藥相通結散陽消飲食自下莫將巴豆耗却天眞液燥津枯留毒不去人言此病曾下奪之從下奪來轉虛轉痞此爲巴豆非大黃牽牛之過箕城一酒官病嘔吐踰年不愈皆以胃寒治之丁香半夏靑陳薑附種種燥熱燒錐燎艾莫知其數或少愈或復劇且十年大

便澀燥小便赤黃命予視之予曰諸痿喘嘔皆屬于上王太僕云上謂上焦也火氣炎上之氣謂皆熱甚而爲嘔以四生丸下三十行燥糞腸垢何啻數升其人昏困一二日頻以氷水呷之漸投凉乳酪芝蔴飲時時嚥之數月外大啜飲食精神氣血如昔繼生三子至五旬而卒

飮當去水溫補轉劇論二十四

留飮止證也不過畜水而已王氏脉經中派之爲四痰飮懸飮支飮溢飮千金方又派之爲五飮皆觀病之形狀而定名也今予皆不論此論飮之所得其來有五有憤鬱而得之者有困乏而得之者有思慮而得之者有痛飮而得之者有熱時傷冷而得之者飮證雖多無出于此夫憤鬱而不得伸則肝氣乘脾脾氣不化故爲留飮肝主慮久慮而不決則飮氣不行脾主思久思而不已則脾結故亦爲留飮人因勞役遠來乘困飮水脾胃力衰因而嗜臥不能布散於脉亦爲留飮人飮酒過多腸胃已滿又復增之脬經不及滲泄久久如斯亦爲留飮因隆暑津液焦涸喜飮寒水本欲止渴乘快過多逸而不動亦爲留飮人若病飮者豈能出此五者之外乎夫水者陰物也但積

水則生濕停酒則生燥久則成痰在左脇者同肥氣在右脇者同息賁上入肺則多嗽下入大腸則爲瀉入腎則爲涌水濯濯如囊漿上下無所之故在太陽則爲支飮皆由氣逆而得之故濕在上者目黃面浮在下者股膝腫厥在中者支滿痞隔痰逆在陽不去者久則化氣在陰不去者久則成形今之用方者例言飮爲寒積皆用溫熱之劑以補之燥之夫寒飮在中反以熱藥從上投之爲寒所拒水濕未除反增心火火旣不降水反下注其上焦枯其下寒慄內經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危渠不信夫

況乎留飲下無補法氣方隔塞補則轉增豈知內經
所謂留者攻之何後人不師古之甚也且以白朮參
苓飲者服之尚加閉塞況燔鍼艾火其痞可知前人
處五飲丸三十餘味其間有礬石巴豆附子烏頭雖
是下攻終同燥熱雖亦有寒藥相參力孤無援故今
代劉河間依仲景十棗湯製三花神祐丸而加大黃
牽牛所得之疾下三五十丸氣流飲去昔有病此者
數十年不愈予診之左手脉三部皆微而小右手脉
三部皆滑而大微小為寒滑大為燥余以瓜蔕散湧
其寒痰數升汗出如沃次以導水禹功去腸胃中燥

垢亦數升其人半愈然後以淡劑流其餘蘊以降火
之劑開其胃口不踰月而痊夫黃連黃柏可以清上
燥涎黃芪茯苓可以補下滲濕二者可以收後不可
以先驅後未盡者可以苦葶藶杏仁桑白皮椒目逐
水之藥伏水皆去矣夫治病有先後不可亂投邪未
去時慎不可補也大邪新去恐反增其氣轉甚於未
治之時也昔河內有人病飲者所為脾濕以木香
牽牛二味散之下十餘行因紿病人復變散為丸又
下十餘行復變丸為散又十餘行病者大困睡幾一
晝夜既覺腸胃寬潤惟思粥食少許日漸愈雖同斷

為濕但補瀉不同其差至此內經曰歲土太過雨濕
流行腎水受邪甚則飲發中滿太陽司天濕氣變物
水飲內蓄中滿不食註云此年太陰在泉濕監於地
病之原始地氣生焉少陰司天濕土為四之氣民病
鼽衄飲發又土鬱之發民病飲發注下胕腫身重又
太陰所至為積飲否隔又太陰所至蓄滿又太陰之
勝與太陰之復皆云飲發于中以此考之土主濕化
不主寒水主寒化不主溫天多驟雨地有積潦皆以
為水在內經屬土冰霜凝冱風氣凄凛此水之化也
故曰丑未太陰濕土辰戌太陽寒水二化本自不同

其病亦異夫濕土太過則飲發于中今人以為脾土
不足則軒岐千古之書可從乎不可從乎

嗽分六氣毋拘以寒述二十五

嗽與咳一證也後人或以嗽為陽欬為陰亦無考據
且內經欬論一篇純說嗽也其中無欬字由是言之
咳即嗽也嗽即咳也陰陽應象大論云秋傷於濕冬
生咳嗽又五藏生成篇云欬嗽上氣又診要經終云
春刺秋分環為欬嗽又示從容篇云欬嗽煩寃者腎
氣之逆也素問惟以四處連言欬嗽其餘篇中止言
咳不言嗽乃知咳嗽一證也或言嗽為別一證如傷

寒書中說欬逆即咽中作梯橙之聲者是也此一說非內經止以嗽為咳生氣通天論云秋傷於濕上逆而欬與大象論文義同而無嗽字乃知欬即是嗽明矣余所以若論此者孔子曰必也正名乎嗽之為病自古歸之肺此言固不易也素問言肺病喘欬逆又曰欬嗽上氣厥在胸中過在手太陰陽明靈樞十二經惟太陰肺經云肺脹滿膨膨而喘咳他經則不言素問欬論雖言五臟六腑皆有欬要之止以肺為主素問言皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣註云邪謂寒氣經又曰邪氣以從其合也其寒飲食入胃從脾脈上至于肺則肺寒肺寒則內外合邪因而客之則為肺欬後人見是言斷嗽為寒更不參較他篇豈知六氣皆能嗽人若謂欬止為寒邪何以歲火太過炎暑流行金肺受邪民病欬嗽歲木不及心氣晚治上勝肺金欬而鼽從革之紀金不及也其病嚔欬堅成之紀金太過也上徵與正商同其病欬少陽司天火氣下臨肺金上從欬嚏衄少陽司天火淫所勝欬唾血煩心少陽司天主勝則胸滿欬少陽司天之氣熱鬱於上欬逆嘔吐三之氣炎暑至民病欬嘔終之氣陽氣不藏而欬少陽之復枯燥煩熱驚瘛欬衄甚則

欬逆而血泄少陰司天熱氣生於上清氣生於下寒熱凌犯而生於中民病欬喘三之氣天政布大火行餘火內格腫於上欬喘甚則血溢少陰司天客勝則鼽嚏甚則咳喘少陰之復燠熱內作氣動於左上行於右欬皮膚痛則入肺欬而鼻淵若此之類皆生於火與熱也豈可專於寒乎謂欬止於熱與火耶厥陰司天客勝則耳鳴掉眩甚則欬若此之類乃生於風豈可專於熱與火也謂欬專於風耶太陰司天濕淫所勝欬唾則有血太陰之復濕變乃舉飲發于中欬喘有聲若此之類乃生於濕豈可專於風也謂咳止於濕耶金鬱之發民病欬逆心脇痛歲金太過燥氣流行肝木受邪民病欬喘逆逆甚而嘔血陽明司天金火合德民病欬嗌塞陽明司天燥淫所勝欬腹中鳴陽明司天清復內餘則欬衄嗌塞心膈中熱欬不止而目血出者死陽明之勝清發于中嗌塞而欬陽明之復清氣大舉欬噦煩心若此之類皆生于燥豈可專於濕也謂欬止於燥耶太陽司天客氣勝則胸中不利出清涕感寒則欬若此之類乃生於寒豈可專於燥也又肺風之狀多汗惡風色皏然白時欬短氣晝日則差夜暮則甚亦風欬也勞風咳出青黃涕

其狀如膿大如彈丸亦風咳也有所亡失所求不得則發肺鳴鳴則肺熱葉焦亦熱欬也陽明厥逆喘欬身熱亦熱欬也一陽發病少氣善欬亦火欬也喘欬者水氣并於陽明亦溼欬也風水不能正偃則欬亦溼欬也腎氣腹大脛腫喘欬身重亦溼欬也脾痺者四肢懈墮發咳嘔汁上為大寒亦寒欬也欬之六氣固然可以辨其六者之狀

風乘肺者日夜無度汗出頭痛涎痰不利非風欬之云乎

熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手足寒乳子亦多有

之非暑欬之云乎

火乘肺者咳喘上壅涕唾出血甚者七竅血溢非火欬之云乎

燥乘肺者氣壅不利百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾枯細瘡燥痒大便秘澀涕唾稠粘非燥欬之云乎

寒乘肺者或因形寒飲冷冬月坐臥溼地或冒冷風寒秋冬水中感之嗽急而喘非寒咳之云乎其法治也風之嗽治以通聖散加半夏大人參半夏丸甚者汗之暑之嗽治以白虎湯洗心散涼膈散加蜜一匙為呷之火之嗽治以黃連解毒湯洗心散三黃丸甚者加以鹹寒大下之溼之嗽治以五苓散桂苓甘露散及白术丸甚者以三花神祐丸下之燥之嗽治以木香葶藶散大黃黃連阿膠丸甚者以鹹寒大下之寒之嗽治以寧神散寧肺散有寒痰在上者以瓜蒂散越之此法雖已幾於萬全然老幼強弱虛實肥瘦不同臨時審定權衡可也病有變態而吾之方亦與之俱變然則枯礬乾薑烏梅罌粟殼其誤人也不為少矣嗚呼有人自幼欬嗽至老不愈而亦不死者余平生見此等無限或小年咳嗽不計男女不數月而

殞者亦無限矣夫寧神寧肺散此等之人豈有不曾服者哉其不愈而死者以其非寒嗽故也彼執欬冬花佛耳草至死不移者雖與之割席而坐可也曹魏時軍吏李成苦欬嗽晝夜不寐時吐膿血華佗以謂欬之所吐非從肺來以苦劑二錢匕吐膿血二升餘而瘥若此之嗽人不可不知也

九氣感疾更相為治衍二十六

天以氣而燾地以氣而持萬物盈乎天地之間咸以氣而生及其病也莫不以氣而得且風之氣和平而發啟熱之氣暄而舒榮火之氣炎暑而出行溼之氣

埃溽而員盈燥之氣清勁而悽愴寒之氣寒氣而歸藏此六氣時化司化之常也及其變風之氣飄怒而反大涼熱之氣大暄而反寒火之氣飄風燔燎而反霜凝濕之氣雷霆驟注而反烈風燥之氣散落而反濕寒之氣寒雪霜雹而反白埃此六氣之變也故天久寒則治之以暑天久涼則治之以暄天久晦則治之以明天久晴則治之以雨天天地之氣常則安變則病而況人稟天地之氣五運迭侵於其外七情交戰於其中是以聖人嗇氣如持至寶庸人役物而反傷太和此軒岐所以論諸痛皆因於氣百病皆生於

氣遂有九氣不同之說氣本一也因所觸而為九所謂九者怒喜悲恐寒炅驚思勞也其言曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣逆上矣王太僕曰怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚則嘔血及飧泄也喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精却精却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣王太僕云恐則傷精却上而不下流下焦陰氣亦迴環而不散故聚而脹也然上焦固禁下焦氣還故氣不行也新校正云不行當作下行寒則腠理閉氣不行

故氣收矣王太僕云身涼則衛氣沉故皮膚之理及滲泄之處皆閉密而氣不流行衛氣收斂于中而不散也炅則腠理開榮衛通汗大出故氣泄矣王太僕云人在陽則舒在陰則慘故熱則膚腠開發榮衛大通津液而汗大出也驚則心無所依神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出內外皆越故氣耗矣王太僕云疲勞役則氣奔速故喘息氣奔速則陽外發故汗出內外皆踰越於常紀故氣耗損也思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣王太僕云繫心不散故氣亦停留此素問之論九氣其變甚

詳其理甚明然論九氣所感之疾則略惟論嘔血及飧泄餘皆不言惟靈樞論思慮悲哀喜樂愁憂盛怒恐懼而言其病其言曰知者知養生也必順四時而適寒暑和喜怒而安居處節陰陽而和剛柔如是則辟邪不至而長生久視是故怵惕思慮則傷神神傷則恐懼流淫而不至因悲哀動中者竭絕而失生喜樂者神憚散而不藏愁憂者氣閉塞而不行盛怒者神迷惑而不治恐懼者神蕩憚而不收怵惕思慮而傷神神傷則恐懼自失破䐃脫肉毛悴色夭死于冬脾愁憂而不解則傷意意傷則悗亂四肢不舉毛悴

色夭死于春肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精
不正當人陰而攣筋兩脇不舉毛瘁色夭死于秋肺
喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦
毛瘁色夭死于夏腎盛怒而不止則傷志志傷則喜
忘其前腰脊不可俛仰屈伸毛瘁色夭死于季夏恐
懼不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下是故五臟
主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛虛則無氣無
氣則死矣靈樞論神意魂魄志精所主之病然無寒
暑驚勞四證余以是推而廣之怒氣所至爲嘔血爲
飧泄爲煎厥爲薄厥爲陽厥爲胸滿脇痛食則氣逆

而不下爲喘渴煩心爲消痺爲肥氣爲目暴盲耳暴
閉筋解發于外爲疽癰喜氣所至爲笑不休爲毛髮
焦爲內病爲陽氣不收甚則爲狂悲氣所至爲陰縮
爲筋攣爲肌痺爲脉痿男爲數溲血女爲血崩爲酸
鼻辛頞爲目昏爲少氣不足以息爲泣則臂麻恐氣
所至爲破䐃脫肉爲骨酸痿厥爲暴下綠水爲面熱
膚急爲陰痿爲懼而脫頤驚氣所至爲潮涎爲目睘
爲口呿爲癡癇爲不省人爲僵仆久則爲痛痺勞氣
所至爲咽噎病爲喘促爲嗽血爲腰痛骨痿爲肺鳴
爲高骨壞爲陰痿爲唾血爲冥視爲耳閉男爲少精

女爲不月衰甚則潰潰乎若壞都汨汨乎不可止思
氣所至爲不眠爲嗜卧爲昏瞀爲中痞三焦閉塞爲
咽嗌不利爲膽癉嘔苦爲筋痿爲白淫爲得後與氣
快然如衰爲不嗜食寒氣所至爲上下所出水液澄
徹清冷下痢清白吐痢腥穢食已不饑堅痞腹滿急
痛癥瘕癩疝屈伸不便厥逆禁固炅氣所至爲喘嘔
吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大而鼓之有聲
如鼓瘡疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂瞀鬱腫脹鼻窒
鼽衄血溢血泄淋閟身熱惡寒甚則瞀瘛目昧不明
耳鳴或聾躁擾狂越罵詈驚駭禁慄如喪神守氣逆

衝上嚏腥涌溢食不下附腫疾瘦暴瘖暴注暴病暴
死凡此九者內經有治法但以五行相勝之理治之
夫怒傷肝肝屬木怒則氣并於肝而脾土受邪木太
過則肝亦自病喜傷心心屬火喜則氣并於心而肺
金受邪火太過則心亦自病悲傷肺肺屬金悲則氣
并於肺而肝木受邪金太過則肺亦自病恐傷腎腎
屬水恐則氣并於腎而心火受邪水太過則腎亦自
病思傷脾脾屬土思則氣并於脾而腎水受邪土太
過則脾亦自病寒傷形形屬陰寒勝熱則陽受病寒
太過則陰亦自病炅傷氣氣屬陽熱勝寒則陰受病

然太過則陽亦自病凡此七者更相爲治故悲可以治怒以愴惻苦楚之言感之喜可以治悲以謔浪褻狎之言娛之恐可以治喜以迫遽死亡之言怖之怒可以治思以汚辱欺罔之言觸之思可以治恐以慮彼志此之言奪之凡此五者必詭詐譎怪無所不至然後可以動人耳目易人視聽若胸中無材器之人亦不能用此五法也炅可以治寒寒在外者以焠鍼焫熨烙灸湯而汗之寒在內者以熱食溫劑平之寒可以治炅炅在外者以清房涼榻薄衣以清劑汗之炅在內者以寒飲寒劑平之惟逸可以治勞經曰勞

者溫之溫謂溫存而養之今之醫者以溫爲溫之藥差之久矣岐伯曰以平爲期亦謂休息之也惟習可以治驚經曰驚者平之平謂平常也夫驚以其忽然而遇之也使習見習聞則不驚矣此九者內經自有是理庸工廢而不行今代劉河間治五志獨得言外之意諷五志所發皆從心造故凡見喜怒悲驚思之證皆以平心火爲主至於勞者傷於動動便屬陽驚者駭于心心便屬火二者亦以平心爲主今之醫者不達此旨遂有寒涼之謗羣聚而譏之士大夫又從而惑之公議何時而定耶昔余治一書生勞苦太過

大便結燥欬逆上氣時喝喝然有音唾嘔鮮血余以苦劑解毒黃連湯加木香漢防已煎服時時啜之復以木香檳榔丸泄其逆氣不月餘而痊余又嘗以巫躍妓抵以治人之悲結者余人嘗以鍼下之時便雜無忽笛鼓應之以治人之憂而心痛者余嘗擊拍門窗使其聲不絕以治因驚而畏響魂氣飛揚者余又嘗治一婦人久思而不眠余假醉而不問婦果呵怒是夜困睡又嘗以酸棗仁丸治人多憂以白虎湯不計四時調理人之暑余又以無憂散瀉人冬月得水中之寒痹次以麻黃湯數兩作一劑煎以寢蓋熱服

汗出而愈如未愈者以苽蒂散涌之以火助其汗治寒厥亦然余嘗治大暑之病諸藥無效余從其頭數刺其痛出血立愈余治此數者如探囊然惟勞而氣耗恐而氣奪者爲難治喜者少病百脈舒和故也昔聞山東楊先生治府主洞泄不已楊初未對病人與衆人談日月星辰躔度及風雲雷雨之變自辰至未而病者聽之而忘其圊楊嘗曰治洞泄不已之人先問其所好之事好碁者與之碁好樂者與之笙笛勿輟又聞莊先生者治以喜樂之極而病者莊切其脈爲之失聲佯曰吾取藥去數日更不來病者悲泣辭

其親友曰吾不久矣莊如其將愈戲之詰其故莊引
素問司天勝喜此二人可謂得玄關者也然華元化
以怒郡守而幾見殺文摯以怒齊王而竟殺之千萬
人中僅得一兩人而反招暴禍若乃醫本至精至微
之術不能自保果賤技也哉悲夫

三消之說當從火斷二十七

八卦之中離能烜物五行之中惟火能焚物六氣之
中惟火能消物故火之爲用燔木則消而爲炭焚土
則消而爲伏龍肝煉金則消而爲汁煆石則消而爲
灰煮水則消而爲湯煎海則消而爲鹽乾汞則消而

爲粉熬錫則消而爲丹故澤中之潦涸於炎暉鼎中
之水乾於壯火蓋五臟心爲君火正化腎爲君火對
化三焦爲相火正化膽爲相火對化得其平則烹煉
飲食糟粕去焉不得其平則燔灼臟腑而津液竭焉
故入水之物無物不長入火之物無物不消夫一身
之心火甚於上爲膈膜之消甚於中則爲腸胃之消
甚於下爲膏液之消甚於外爲肌肉之消上甚不已
則消及於肺中甚而不已則消及於脾下甚而不已
則消及於肝腎外甚而不已則消及于筋骨四臟皆
消盡則心始自焚而死矣故素問有消癉消中消渴

能也之人一作止

風消膈消肺消之說消之證不同歸之火則一也故
消癉者衆消之總名消中者善饑之通稱消渴者善
飲之同謂惟風消膈消肺消此三說不可不分風消
者二陽之病二陽者陽明也陽明者胃與大腸也心
受之則血不流故女子不月脾受之則味不化故男
子少精皆不能成隱曲之事火伏於內久而不已爲
風所鼓消渴腸胃其狀口乾雖飲水而不嗌此風熱
格拒於賁門也口者病之上源故病如是又經曰二
陽結謂之消此消乃腸胃之消也其善食而瘦者名
曰食㑊此消乃肌肉之消也膈消者心移熱於肺傳

爲膈消王太僕云心肺兩間中有斜膈膜下際內連
橫膈膜故心移熱于肺久久傳化內爲膈熱消渴多
而飲者此雖肺金受心火之邪然止是膈消未及于
肺也故飲水至斗亦不能也其渴也其狀多飲而數
溲或不數溲變爲水腫者皆是也此消乃膈膜之消
也肺消者心移寒于肺肺主氣經曰飲食入胃遊溢
精氣上輸於脾脾之精氣上歸于肺通調水道下輸
膀胱水精四布五經並行以爲常也靈樞亦曰上焦
如霧中焦如漚下焦如瀆今心爲陽火先受陽邪陽
火內鬱火鬱內傳肺金受制火與寒邪皆來乘肺肺

外爲寒所薄陽氣得施內爲火所爍亢極水復故皮膚索澤而肸著溲溺積濕而頻并上飲半升下行十合故曰飲一溲二者死膈消不爲寒所薄陽氣得宣散於外故可治肺消爲寒所薄陽氣自潰于中故不可治此消乃消及於肺臟者也又若脾風傳之腎名曰疝瘕少腹寃熱而痛出白液名曰蠱王太僕云消爍脂肉如虫之蝕日漸損削此消乃胃液之消也故後人論三焦指以爲腎消此猶可治久則變損不救必死此消乃消及於腎臟者也夫消者必渴渴亦有三有甘之渴有石之渴有火爍之渴肥者令人內熱

甘者令人中滿其氣上溢轉爲消渴經又曰味厚者發熱靈樞亦由鹹走血多食之人渴鹹入于胃中其氣上走中焦注於肺則血氣走之血與鹹相得則凝乾而善渴血脉者中焦之道也此皆肥甘之渴夫石藥之氣悍適足滋熱與熱氣相遇必內傷脾此藥石之渴也陽明司天四之氣嗌乾引飲此心火爲寒水所鬱故然少陽司天三之氣炎暑至民病渴太陽司天甚則渴而欲飲水行凌火火氣鬱故然少陰之復渴而欲飲少陽之復嗌絡焦槁渴引水漿色變黃赤又傷寒五日少陰受之故口燥舌乾而渴腎熱病者

苦渴數飲此皆燥熱之渴也故膏粱之人多肥甘之渴石藥之渴藜藿奔走之人多燥熱之渴二者雖殊其實一也故火在上者善渴火在中者消穀善饑火在上中者善渴多飲而數溲火在中上者不渴而溲白液火徧上中下者飲多而數溲此其別也後人斷消渴爲腎虛水不勝火則是也其藥則非也何哉以八味丸治渴水未能生而火反助也此等本不知書妄引王太僕之注益水之原以消陰翳壯火之主以制陽光但益心之陽寒熱通行強腎之陰熱之猶可豈知王太僕之意以寒熱而行之也腎本惡燥又益

之以火可乎今代劉河間自製神芎丸以黃芩味苦入心牽牛大黃驅火氣而下以滑石引入腎經此方以牽牛滑石爲君以大黃黃芩爲臣以芎連薄荷爲使將離入坎真得黃庭之秘旨也而又以人參白朮湯消痞丸大人參散碧玉雞蘇散數法以調之故治消渴最爲得體昔有消渴者日飲數升先生以生薑自然汁一盆置之密室中具罌杓于其間使其人入室從而鎖其門病人渴甚不得已而飲汁盡渴減內經辛以潤之之旨內經治渴以蘭除其陳氣亦辛平之劑也先生之湯劑雖用此一味亦必有傍藥助之

上先一本作者

奏苦本一作

初虞世曰凡渴疾未發瘡瘍便用大黄寒藥利其勢使大困大虛自勝如發瘡瘍膿血流漓而殞此真俗言也故巴郡太守奏三黄丸能治消渴余嘗以膈數年不愈者減去朴硝加黄連一斤大作劑以長流千里水煎五七沸放冷日呷之數百次以桂苓甘露散白虎湯生藕節汁淡竹瀝生地黄汁相間服之大作劑料以代飲水不日而痊故消渴一證調之而不下則小潤小濡固不能殺炎上之勢下之而不調亦旋飲旋消終不能沃膈膜之乾下之調之而不減滋味不戒嗜慾不節喜怒病已而復作能從此三者消渴

亦不足憂矣況靈樞又說心脉滑爲善渴經又曰滑者陽氣勝又言五臟脉心脉微小爲消癉又言五臟脆爲消癉又言消癉之人薄皮膚而肉堅固以深長衝直揚其心剛剛者多怒怒則氣逆上胸中蓄積血氣逆留臗皮充肌肉脉不行轉而爲熱熱則消肌膚故爲消癉又言五臟皆柔弱者善病消癉夫柔弱者必有剛強剛強者多怒柔弱者易傷也余以是述悟氣逆之人非徒病消渴若寒熱共外亦爲痺厥少氣狂膈中肺消涌水者熱留客其臟則亦爲驚衄膈消柔痓虛腸澼熱客其腑則爲癃閉溺血口糜瘀瘕爲沉食衍辛頞鼻淵衄蔑瞑目蓋此二十一證皆在氣厥論中經曰諸逆衝上皆屬於火一言可了善讀書者以是求之

蟲蠶之生濕熱爲主訣二十八

巢氏之衍九蟲三蠱詳矣然蟲之變不可勝窮要之皆以濕熱爲主不可純歸三氣虛與食生具巢氏之衍九蟲也曰伏蚘白肉肺胃弱赤蟯伏蟲長四分群蟲之主也蚘蟲長一尺亦有長五六寸其發動則腹中痛發種聚行往來上下痛有休息亦攻心痛口喜吐涎及吐清水貫傷心則死診其脉腹中痛其脉法

當沉弱今脉反洪大是蚘蟲也白蟲長一寸相生子孫轉多長四五尺亦能殺人寸白蟲色白頭偏小因飲白酒以桑枝貫牛肉炙食之并生栗所成又云食生魚後即飲乳酪亦生其發動則損人精氣腰脚疼此蟲長一尺則令人死肉蟲狀如爛杏令人煩滿肺蟲狀如蚕令人咳嗽胃蟲狀如蝦蟆令人嘔逆吐喜噦弱蟲狀如瓜瓣又名鬲蟲令人多唾赤蟲狀如生肉動則腹鳴蟯蟲至微形如菜蟲居胜腸中多則爲痔劇則爲癩因人瘡處以生癰疽癬瘻瘑疥齲蟲無故不爲人患亦不盡有有亦不必盡多或偏無者

此諸虫依腸胃之間若人臟腑氣實則不爲害虛則侵蝕隨其虫之動能變成諸疾也三𧏾者濕𧏾由脾胃虛爲水濕所乘腹內蟲動侵蝕成𧏾若上脣生瘡是蟲蝕五臟則心煩懊若下唇生瘡是虫蝕下部則肛門爛開心𧏾者因虛而動攻食心謂之心𧏾疳𧏾者有五曰白赤蟯𧏾黑凡五疳白者輕赤者次蟯者又次𧏾者又次黑者最重皆從腸裏上食咽喉齒齦並生瘡下至穀道傷爛下利膿血嘔逆也足心熱腰脚痛膂卧秋冬可春夏甚巢氏之論虫𧏾爲病之狀固詳矣然蟲之變此數者天地之間氣之所至百虫

母出加厥陰所至爲毛化其應春其虫毛其畜犬其應夏其蟲羽其畜馬其應長夏其蟲倮其應秋其虫介其畜雞其應冬其蟲鱗其畜彘其來如雞其蟲毛介其畜彘其蟲羽鱗其畜牛犬其蟲倮毛其畜雞羊其蟲介羽其畜彘牛其蟲鱗倮其臟肝脾其蟲毛介其臟心肺其蟲羽鱗其臟脾腎其蟲倮毛其臟肺肝其蟲介羽其臟腎心其蟲鱗倮地氣制已勝天氣制勝已天制色地制形色者青黃赤白黑形者毛羽倮介鱗其生也胎卵濕化其成也跂行飛走故五氣五味根于中五色五類形于外而有一歲之中互有勝

復故厥陰司天毛蟲靜羽蟲育介蟲不成居泉毛蟲育倮蟲耗羽蟲不育少陰司天羽蟲靜介蟲育毛蟲不成居泉羽蟲育介蟲耗不育太陰司天倮蟲靜鱗蟲育羽蟲不成少陽居泉倮蟲育鱗蟲不成蟲不成居泉羽蟲育介蟲耗毛蟲不育陽明司天介蟲靜羽蟲育介蟲不成居泉介蟲育毛蟲耗羽蟲不成太陽司天鱗蟲靜倮蟲育居泉鱗蟲耗倮蟲不育如風勝則倮蟲不滋此之類也皆五行之相尅也惟濕復則虫見于陸爲濕土相尅水長則反增水鱗雖然見于陸則反當死故不同也切巢氏言脾胃虛而爲水

濕所乘者非也乃脾胃大甚熱爲水濕多也以玄珠考之蟲得木之氣乃生得雨之氣乃化以知非厥陰風木之氣不生非大陰濕土之氣不成豈非風木主熱雨澤主濕所致耶故五行之中皆有蟲惟金之中其蟲寡水之中無蟲且諸木有蠹諸果有螬諸菜有蟲諸菽有蚄五穀有螟螣蝥蠈麥有蛾粟破蟲出草腐而螢蚊蒼積而蜞蟀若此者皆木之蟲也烈火之中有鼠爛灰之中有蠅若此者皆火之蟲也土中盤蛇坯中走蚓穴蟻牆蠍田螻石蜴此者皆土之蟲也科斗孕於古池蝦馬躍于[illegible]皆[illegible]滿江湖蛟鼉

亦有若此者皆水中之蟲也昔有冶者砕一破釜將入火煽其鐵斷處窠臼有一蟲如米中蟲其色正赤此釜烹飪不啻千萬不知何以生了不可曉亦金火之氣也惟冰之中未嘗見蟲焉北方雖有冰鼠止是食冰非生于冰也乃知木火屬春夏濕土屬季夏水從土化故多蟲金從秋氣水從冬氣故無蟲焉若以生物有被翅有翅蟲醬有醬蟲醯有醯蟲飲食停久皆有蟲若以為動物不生蟲如戶樞不蠹之類然動勞之人亦有蟲豈有不動者耶且文籍衣服故不閱不衣而不蠹然非經季夏陰注或暴乾不待冷納

于笥中亦不生蟲蠹也或云炷傍地濕鼠婦來明墻下濕乾狗蚤居中豈均生于濕耶蟲蚤蝨不生于濕亦有生于冬熱則蝨生寒則不生理故然也夫蟲之所居必于脾胃深處藥之所過在于中流蟲聞藥氣而避之群者安得取之予之法先令饑甚次以檳榔雷丸為引予別下蟲藥大下十數行可以搞而空虛上張子政用此法下蟲數百相銜長丈餘若夫瘡久而蝕蛆者以木香檳榔散傅之神良別有墜蛔之藥皆其方中此不具陳也

補論二十九

予幼歲留心于醫而未嘗見其達者貞祐間自沃來河之南至頓丘而從遊張君仲傑之縣舍得遇太醫張子和先生誨仲傑以醫而及於游公君寶暨不肖猗歟大哉先生之學明妙道之淵源造化之根本講五運之抑鬱發越六氣之勝復淫鬱定以所制之法配以所宜之方準繩既陳曲直自正規矩既設方圓自成先生之學其學者之準繩規矩歟雖為人天師可也望而知之以盡其神聞而知之以盡其聖問而知之以盡其工切而知之以盡其巧何假飲上池之水而照見人五臟乎一目而無餘矣至約之法其治

有三所用之藥其品有六其治王則汗下吐其品六則辛甘酸苦鹹淡也雖不云補理實具焉予恐人之惑于補而莫之解故續補說於先生汗下吐三論之後我輩所當聞醫所當觀而人之所當共知也予考諸經檢諸方試為天下好補者言之夫人之好補則有無病而補者有有病而補者無病而補者誰與上而縉紳之流次而豪富之子有金玉以榮其身芻豢以悅其口寒則衣裘暑則臺榭動則車馬止則裀褥味則五辛飲則長夜醉飽之餘無所用心而厭致力于床第以欲竭其精以耗散其真故年半百而衰

也然則柰何以藥爲之補矣或咨諸庸醫或問諸遊
客庸醫故要用相求以所論者輕輕之則草木而已
草木則蓯蓉牛膝巴戟天兎絲之類遊客以好名自
高故所論者重重之則金石而已金石則丹砂起石
硫黄之類吾不知此爲補也而補何臟乎以爲補心
耶而心爲丁火其經則手少陰熱則瘡瘍之類生矣
以爲補肝耶肝爲乙木其經則足厥陰熱則掉眩之
類生矣脾爲已土而經則足太陰以熱補之則病腫
滿肺爲辛金而經則手太陰以熱補之病憤鬱心不
可補肝不可補脾不可補肺不可補莫非爲補腎乎

人皆知腎爲癸水而不知經則子午君火焉補腎之
火火得熱而益熾補腎之水水得熱而益涸既熾其
火又涸其水上接于心之丁火火獨用事肝不得以
制脾土肺金不得以制肝木五臟之極傳而之六腑
六腑之極遍而之三焦則百病交起萬疾俱生小不
足言大則可懼不疽則中不中則暴瘖而死矣以爲
無病而補之者所得也且如有病而補之者誰歟上
而仕宦豪富之家微而農商市庶之輩嘔而補吐而
補泄而補痢而補瘧而補欬而補勞而補産而補嘔
吐則和胃丸丁沉煎瀉痢荳蔻丸御米殻散欬不五

味則寧神散勞不桂附則山藥産不烏金則黑神吾
不知此爲補果何意邪殊不知嘔得熱而愈酸吐得
熱而愈暴泄得熱而清濁不分痢得熱而休息繼至
瘧得熱而進不能退欬得熱而濕不能除勞得熱而
火益煩産得熱而血愈崩蓋如是而死者八九生者
一二死者枉生者幸幸而一生憔悴之態人之所不
堪也視其寒用熱以補之矣若言其補則前所補者
此病何如子請爲言補之法大抵有餘者損之不足
者補之是則補之義也陽有餘而陰不足則當損陽
而補陰陰有餘而陽不足則當損陰而補陽熱則芒

硝大黄損陽而補陰也寒則乾薑附子損陰而補陽
也豈可以熱藥而云補乎哉而寒藥亦有補之義也
經曰因其盛而減之因其衰而彰之此之謂也或曰
形不足者温之以氣精不足者補之以味執此温補
二字便爲温補之法惟用温補之藥且温補二字特
爲形精不足而設豈爲病不病而設哉雖曰温之止
言其氣雖曰補之止言其味曷嘗言熱藥哉至於天
之邪氣感則害人五臟實而不滿可下而已水穀之
寒熱感則害人六腑滿而不實可吐而已地之濕氣
感則害人皮肉筋脉邪從外入可汗而已然發表不

柔甚之而無補之意人之所謂有弱强而病病而愈愈而後必能復其舊矣弱而病病而愈愈而後不必復其舊矣是以有保養之說然有是說然亦安所用哉慎言語節飲食是矣以日用飲食言之則黍稷禾麥之餘食粳者有幾雞豚牛羊之餘食血者有幾桃杏李梅之餘食黎者有幾葱韭薤蒜之餘食葵者有幾其助則薑桂椒蒔甘和則鹽油醯醬常而粥羮別而焦炒異而燒炙甚則以五辣生鮮而薦酒之殽以薑醋羮手而按酒之病大而富貴北此尤甚小而市庶亦得以享此吾不知何者爲寒何物爲冷而

以熱藥爲補哉日用飲食之間已爲太過矣嘗聞人之所欲者生所惡者死今反忘其寒之生甘於熱之死則何如由其不明素問造化之理本草藥性之源一切委之於庸醫之手醫者曰寒凉之藥雖可去疾柰何腑臟不可使之久冷脾胃不可使之久寒保養則固可溫補之是宜斯言方勝諸口已深信於心矣如金石之不可投山嶽之不可移以至於殺身而心無少悔嗚呼醫者之罪固不容誅而用之者亦當分受其責也病者之不悔不足怪也而家家若是何難見而難察耶人惟不學故耳亦有達者之論以素問

爲規矩準繩以本草爲斤斧法則矣其藥則寒凉少劑則兩其丸則百人之間者如享美饌而見蛆蠅惟恐去之不亟也何哉而所見者丘垤及見談泰山則必駭不敢唾而遠則幸矣尚敢僉其言之能從乎茲正之所以難立而邪之所以易行也吾實憂之且天下之不知過不在天下而已在醫流尚不知何責於天下哉噫春秋之法責賢不責愚所謂我輩者猶且棄道學之本源而拘言語之末節以文章自富以談辯自強坐而昂昂立而行行潤其步翼其手自以爲高人而出塵表以天下聰明莫已若也一旦疾之臨

身瞶然無所知茫若捕風之不可得迷若捕影之不可獲至於不得已則聽庸醫之裁判疾之愈則以爲得人不愈則以爲疾之既極無可柰何委之於命而甘於泉下矣嗚呼賢與愚夫殆去相遠此吾所以言之喋喋也然而未敢必其聽之何如耳雖然吾之說非此欲我輩共知欲醫流共知欲天下共知也我輩共知醫流共知天下共知愜吾之意滿吾所望矣

水解三十

余昔訪靈臺閱太史見銅壺之漏水焉太史召司水者曰此水已三環過六滑則漏迅漏迅則刻差當易

新水余謂然而悞曰天下之水用之滅火則同濡槁則同至於性從地變質與物遷未嘗囿焉故蜀江濯錦則鮮濟源烹楮則潔南陽之潭漸于菊其人多壽遼東之澗通于葠其人多髮晉之山產礬石泉可愈疽戎之麓伏硫黄湯可浴癘揚子宜荈淮萊宜醪滄鹵能鹽阿井能膠澡垢以污茂田以苦癭消于藻帶之波痰破于半夏之洳冰水咽而霍亂息流水飲而癃閟通雪水洗目而赤退鹹水濯肌而瘡乾菜之以為虀韲之以為漿麴之以為酒蘖之以為醋千派萬種言不容盡至于井之水一也尚數名焉况其他者乎及酌而傾曰倒流出甃未放曰無根無時初出曰新汲將旦首汲曰井華夫一井之水而功用不同豈烹者之間將行藥勢獨不擇夫水哉昔有患小溲閟者衆工不能瘥予易之長川之急流取前藥而沸之一飲立溲元好問聞之曰精乎哉論也近讀靈樞經有半夏湯治不瞑以流水千里外者八升揚之萬遍取其清五升炊以葦薪火正與此論合乃知子和之於醫觸一事一物皆成治法如張長史草書妙天下得之公孫劍器用心亦勞矣後之用水者當以子和之言為制余于是乎作水解

儒門事親卷之三

儒門事親卷之四

戴人張子和著
新安吳勉學校

風一

夫風者厥陰風木之主也諸風掉眩風痰風厥涎潮不利半身不遂失音不語留飲飧泄痰實嘔逆旋運口喎搐搦僵仆目眩小兒驚悸狂妄胃脘當心而痛上支兩脇咽膈不通偏正頭痛首風沐風手足攣急肝木為病人氣在頭

防風通聖散　防風天麻湯　防風湯

祛風丸　排風湯　小續命湯

消風散

暑二

夫暑者為少陰君火之主也諸痛痒瘡瘍癰疽腫毒及胃煩熱嗌乾欬喘唾血泄血胕腫肩臑背内痛心痛肺脹腹脹鬱悶風温病多發風傷于榮温傷於衛血為榮氣為衛其脉兩手多沉自汗出身重多睡必鼾三日以裏且宜辛凉解之或辛温解之如不已裏症未罷大不可下如下則胃中虛空四日之外表熱入裏則譫語口乾發疹潮熱直視失溲者十死八九

肺金爲病人氣在胸及小兒瘡疹丹熛但發人氣在腹

白虎湯　桂苓甘露散　化痰玉壺丸
益元散　玉露散　石膏散

濕三

夫濕者爲太陰濕土之主也諸濕腫滿霍亂泄注胕腫骨痛及腰膝頭項痛風痺痿厥唾有血心懸如飢熱痛始作三陽受之一日太陽二日陽明三日少陽可汗而已如四日太陰五日少陰六日厥陰可下而已或七日不愈再傳至十三日大邪皆去六經悉和則愈矣腎水爲病

五苓散　葶藶木香散　白朮木香湯
益元散　大橘皮湯　神助散
桂苓白朮丸

火四

夫火者少陽相火之主也諸暴死發熱惡寒痛病大作傳爲水腫面黃身痿泄注膿血赤白爲利癰腫疽毒丹熛瘍疹小兒瘡瘍腹脹暴下如水心胸中熱甚則鼽衄胸脇皆痛耳聾口苦舌乾與膈毒下血米穀不化腸鳴切痛消渴上喘肺金爲病

涼膈散　黃連解毒湯　瀉心散
神芎丸　八正散　調胃散
調胃承氣湯

燥五

夫燥者是陽明燥金之主也諸氣憤鬱腸胃乾涸皮膚皴揭脇痛寒瘧喘咳腹中鳴注泄鶩溏脇肋暴痛不可反側嗌乾面塵肉脫色惡及丈夫㿗疝婦人少腹痛帶下赤白瘡瘍痤癤喘咳潮熱大便澁燥及馬刀挾癭之瘡肝木爲病

神功丸　脾約丸　麻仁丸
潤體丸　四生丸

寒六

夫寒者是太陽寒水之主也諸寒冷濕痺肘臂攣急秋濕既多寒咳爲嗽痰厥心痛心中澹澹大動胸脇胃脘痛不可食食已不饑吐利腥穢屈伸不便上下所出不禁目盲堅痞色炲渴而飲冷積水足浮腫囊縮四肢冷爪甲青心火爲病

薑附湯　四逆湯　二薑湯
朮附湯　大已寒丸　理中湯

解利傷寒七

人冒風時氣濕病傷寒三日以裏頭痛身熱惡寒可

用通聖散益元散各五七錢水一大椀入生薑十餘片葱白連鬚者十餘莖豆豉一撮同煎三五沸去滓稍熱先以多半投之良久用釵子於咽喉中探引吐了不宜嗽口次用少半亦稍熱投之更用葱醋酸辣湯投之衣被蓋覆汗出則愈矣如遇世亂內經曰歲火太過炎暑流行火氣太盛肺金受邪上應熒惑大而明現若用辛涼之劑解之則萬舉萬全也若遇治世人安可用升麻湯葛根湯敗毒散辛溫之劑解之亦加葱根白豆豉上涌而表汗內經曰因其輕而揚之揚者發揚也吐汗發揚寒熱之邪既吐汗之後必

大將息旬日之後其邪不復作也

又一法或於無藥之處可用酸虀汁一大椀煎三五沸去菜葉猛服訖少間用釵子咽喉中探引吐了如此三次後煎葱醋辣湯投之以衣被蓋覆汗出則解內經曰酸苦涌泄為陰涌者吐也傷寒三日頭痛身熱是病在上也在上者固宜涌之然後以淡漿粥養之一二日則愈矣

又一法可用不卧散解之於兩鼻內嗃之連嚏噴三二十次以衣被蓋覆用此藥時當於暖室中嚏罷以酸辣漿粥投之汗出如洗嚏噴者同吐法也此法可與雙解散為表裏也

又有導引一法可於一閑處用之先教病人盤脚而坐次用兩手交十指攀腦後風池風府二穴乃是風門也向前叩首幾至于地如此連點一百二十數急以葱醋粥辛辣湯投之汗出立解

傷寒溫疫時氣冒風中暑俱四時不正之氣也人若初感之皆頭痛惡寒身熱及寒熱往來腰脊強是太陽經受之也內經曰可先治內而後治外先用生薑葱白豆豉煎雙解散上涌及汗出則解如不解者至五六日或不大便喘滿譫語實熱兩手脉沉可用調

胃大小承氣湯下之慎不可用銀粉巴豆霜杏仁芫花熱藥下之則必死此先治外而後治內也如大汗之後慎不可食葱羹藿菜羊猪雞犬魚兎等肉惟不先明心致重困後必難治也傷寒七八日發黃有斑潮熱腹滿者或痰實作止雖諸承氣湯下過者仲景曰寸口脉浮滑者可用瓜蒂散吐之然傷寒寸口脉浮滑者可用雜病寸口脉沉者可吐叔和云寸脉沉兮胸有痰啓玄子曰上盛不已吐而奪之是也

風八

夫中風失音悶亂喎斜口眼內經曰風之為病善行

而散發故百病皆生於風也可用三聖散吐之如不省人事牙關緊閉粥菜不能下者煎三聖散鼻內灌之吐出涎口自開也次服通聖散凉膈散大人參半夏丸桂苓甘露散等大忌雞豬魚兎酒醋蕎麪動風引痰之物吐痰之法在方論中

頭風眩運手足時復麻痹胃脘發痛心腹滿悶按之如水聲可用獨聖散吐之吐訖可服辛凉清上之藥仲景曰此寒痰結於胸中之致然也

痺九

夫大人小兒風寒濕三氣合而爲痺及手足麻木不仁者可用鬱金散吐之吐訖以導水丸通經散泄之泄訖以辛溫之劑發散汗出則可服當歸芍藥乳没行經和血等藥如不愈則便不宜服此等藥

痿十

夫男女年少面黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧更加涎嗽不止或喘滿面浮此名曰肺痿可用獨聖散吐之吐訖次用人參柴胡飲子小柴胡飲子加當歸桂苓甘露散之類內經曰男女之病皆同也男子精不足是味不化也女子血不流是氣不用也又曰形不足者溫之以氣精不足者補之以味是也

厥十一

夫厥之爲病手足及膝下或寒或熱也舉世傳爲脚氣寒濕之病豈知內經中本無脚氣陽氣衰于下則爲寒厥陰氣衰于上則爲熱厥熱厥爲手足熱寒厥爲手足寒也陽經起于足指之表陰經起于足心之下陽氣勝則足下熱陰氣勝則足下寒熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也寒在上者以溫劑補肺金熱在上者以凉劑清心火則愈矣尸厥痿厥風厥氣厥酒厥可以涌而醒次服降火益水和血通氣之藥使粥食調養無不瘥者若其餘諸厥做此行之慎勿當疑似之間便作風氣相去遠矣

癇十二

夫癇病不至於目瞪如愚者用三聖散投之更用大盆一箇於暖室中令汗下吐三法俱行次服通聖散百餘日則愈矣至於目瞪愚者不可治內經曰神不得守謂神亂也

瘧十三

夫富貴膏粱之人病瘧或間日或頻日或作熱或作寒或多寒少熱或多熱少寒宜以大柴胡湯下之下過三五行次服白虎湯玉露散桂苓甘露散之類如

不愈者是積熱大甚宜以神芎藏用丸三花神祐丸調胃承氣湯等藥大作劑料下之下訖以長流水煎五苓散服之或服小柴胡湯數服亦可如不愈復以常山散吐之後服凉膈散白虎湯之類必愈矣大忌熱麵及羊肉雞猪魚兎等物如食之瘧疾復作以至不救

貧賤芻蕘之人病瘧以飲食踈糲衣服寒薄勞力動作不可與膏粱之人同法而治臨發日可用野夫多効方溫脾散治之如不愈用辰砂丹治之則愈矣如服藥訖宜以長流水煎白虎湯五苓散服之不宜食

熱物及燥熱之藥以瘧疾是傷暑伏熱之故也內經曰夏傷於暑秋必痎瘧可不信哉忌物同前

泄痢十四

夫大人小兒暴注瀉水不已內經曰注下也注下者水利也火運太過之病火主暴逆之故也急宜用水調桂苓甘露散五苓散益元散或以長流水煎過放冷服則愈慎不可驟用罌粟殼乾薑豆蔻聖散子之類縱瀉止則腸胃不通轉生他疾止可以分陰陽利水道而已

疳利十五

夫病疳利米穀不化日夜無度腹中雷鳴下利完穀出可用導水丸禹功散瀉訖一二日可服胃風湯不愈則又可與桂枝麻黃湯發汗則愈矣內經曰久風入中為腸澼飱泄啓玄子云風在腸中上薰於胃所食不化而出又云飱泄者是暮食不化也又經云春傷於風夏必飱泄故可汗而愈內經曰風隨汗出痛隨利減若服豆蔻罌粟殼之類久而不輟則變為水腫以成不救也

臟毒下血十六

夫臟毒下血可用調胃承氣湯加當歸瀉訖次用芎

藭蘖皮丸黃連解毒湯五苓益元各停調下五七錢服之內經曰腸澼便血何如答曰澼者腸間積水也身熱則死寒則生熱為血氣敗故死寒為榮氣在則生七日而死者死於火之成數也

下利膿血十七

夫下利膿血腹痛不止可用調胃承氣湯加生薑棗煎更下藏用七八十丸量虛實加減瀉訖次用長流水調五苓散五七錢或加燈心煎調下亦得調益元散五七錢亦可大忌油膩一切熱物則愈矣

水泄不止十八

夫男子婦人病水濕瀉注不止因服豆蔻烏梅薑附峻熱之劑遂令三焦閉澀水道不行水滿皮膚身體否腫面黃腹大小便赤澀兩足按之陷而復起內經曰諸濕腫滿皆屬脾土可用獨聖散吐之如時月寒涼宜於燠室不透風處用火一盆以藉火力出汗次以導水禹功散量虛實瀉十餘行濕去腫減則愈矣是汗下吐三法齊行既汗下吐訖臟腑空虛宜以淡漿粥養腸胃二三日次服五苓散益元同煎燈心湯調下如勢未盡更宜服神功散舊名導水散可以流濕潤燥分陰陽利小便不利小便非其法也既平之

後宜大將息忌魚鹽酒肉菓木房室等事如此三年則可矣如或不然決死而不救也

痔漏腫痛十九

夫痔漏腫痛內經曰因而大飽筋脈橫解腸澼為痔痔而不愈變而為漏同治濕法而治之可先用導水丸禹功散瀉訖次服枳殼丸木香檳榔丸更加以葵羹菠菜豬羊血等通利腸胃大忌房室雞魚酒醋等物勿食之

霍亂吐瀉二十

夫霍亂吐瀉不止者可用五苓散益元散各停冰水調下五七錢如無冰水可用新汲水調下桂苓甘露散玉露散清涼飲子調下五七錢或香薷湯調下五七錢亦可如無已上諸藥可服地漿三五盞亦可地漿者可於淨地掘一井子用新汲水一桶並於井子攪令渾候澄清連飲三五盞立愈大忌白术湯薑桂烏附種種燥熱之藥若服之則必死矣巢氏云霍者揮霍而成疾亂者陰陽亂也皆由陰陽清濁二氣相干故也

大便澀滯二十一

夫老人久病大便澀滯不通者可服神功丸麻仁丸

四生丸則愈矣時復服葵菜菠菜豬羊血自然通利也內經云以滑養竅是也此病不愈令人失明也

五種淋瀝二十二

夫大人小兒病沙石淋及五種淋瀝閉癃并臍腹痛益元散主之以長流水調下八正散石葦散依方服用此三藥皆可加減服之

酒食不消散二十三

夫一切冷食不消宿酒不散亦同傷寒身熱惡寒戰慄頭項痛腰脊強及兩手脉沉不可用雙解止可用導飲丸五六十丸量虛實加減利五七行所傷冷食

瘡汗若推盡則頭痛等病自愈也次以五苓散生薑棗長流水煎服五六服不可服酒癥進食丸此藥皆犯巴豆有熱毒之故也

酒食所傷二十四

夫膏粱之人起居閒逸奉養過度酒食所傷以致中脘留飲脹悶痞膈醋心可服木香導飲丸以治之夫蒭蕘之人飲食粗糲衣服寒薄勞役動作一切酒食所傷以致心腹滿悶時嘔酸水可用進食丸治之

沉積水氣二十五

夫一切沉積水氣兩脇刺痛中滿不能食頭目眩者

可用茶調散輕涌訖冷涎一二升次服七宣丸則愈矣木香檳榔丸導飲丸亦妙不可用巴豆銀粉等藥

諸積不化二十六

夫諸積不化可服無憂散每月瀉三五次可用桂苓白朮丸散妙功丸大忌生硬粘滑動風發熱等物

骨蒸熱勞二十七

夫男子婦人骨蒸熱勞皮膚枯乾痰唾稠粘四肢疼痛面赤脣乾煩燥睡臥不寧或時喘嗽飲食少味困弱無力虛汗黃瘦等疾內經曰男子因精不足而成女子因血不流而得也可先以茶調散輕涌訖次以導水禹功散輕瀉三兩行後服柴胡飲子桂苓甘露散搜風丸白朮調中湯木香檳榔丸人參犀角散之類量虛實選而用之如咯血吐血便血此乃亡血也並不宜吐吐之則神昏內經曰血者人之神也故亡血則不宜吐慎不可服峻熱薑附之藥若服之則飲食難進肌肉消削轉成危篤也五勞之病乃今人不明發表攻裏之過也大忌暑月於手腕足外踝上着灸手腕者陽池穴也此穴皆肌肉淺薄之處灸瘡最難痊可及胸次中脘臍下背俞三里等穴或有灸數十者及以燔針終無一効病人反受苦可不思之勞

疾多饞所思之物但可食者宜食療本草而與之菠菜葵菜冰水凉物慎不可禁以爲水穀入胃脉道乃行也若過忌慎則胃口閉胃口閉則形必瘦形瘦脉空乃死之候也諸勞皆可倣此

虛損二十八

夫病人多日虛損無力補之以無比山藥丸則愈矣

上喘中滿二十九

夫上喘中滿醋心腹脹時時作聲否氣上下不能宣暢叔和云氣壅三焦不得昌是也可用獨聖散吐之吐訖次用導水禹功散輕瀉三五行不愈更以利膈丸

瀉之使上下宣通不能壅滯後服平胃散五苓散益元散桂苓甘露散三和散分陰陽利水道之藥則愈

一切涎嗽三十

夫富貴之人一切涎嗽是飲食厚味熱痰之致然也先用獨聖散吐之吐訖可服人參散通聖散加半夏以此止嗽更服大人參半夏丸以之化痰也大忌酸鹹油膩生硬熱物也

咳嗽三十一

夫貧難之人咳嗽內外感風冷寒濕之致然也內經曰秋傷於濕冬生咳嗽可服寧神散寧肺散加白朮之類則愈矣忌法同前

欬逆三十二

夫男子婦人欬逆俗呼曰吃忒乃陰陽不和也乃傷寒亦有欬逆者並可用既濟散治之忌寒熱物宜食溫淡物以養胃氣耳

風痰三十三

夫風痰酒痰或熱在膈上頭目不清涕唾稠粘或欬嗽上喘時發潮熱可用獨聖散吐之吐訖可服搜風丸涼膈散之類內經曰流濕潤燥是也

咯血衄血嗽血三十四

夫男子婦人咯血衄血嗽血欬膿血可服三黃丸黃連解毒湯涼膈散加桔梗當歸大煎劑料時時呷之內經曰治心肺之病最近藥劑不厭頻而少時時呷之者是也

消渴三十五

夫三消渴內經曰三消渴者肺消膈消風消也右以繅絲煮繭湯澄清頓服之則愈或取生藕汁頓服之亦愈矣

雷頭三十六

夫雷頭懶子乃俗之謬名也此疾是胸中有寒痰多沐之致然也可以茶調散吐之吐訖冷痰三二升次用神芎丸下三五行然後服愈風餅子則愈矣雷頭者是頭上赤腫核或如生薑片酸棗之狀可用鈹針剌而出血永除根本也

頭痛不止三十七

夫頭痛不止乃三陽之受病也三陽者各分部分頭與項痛者是足太陽膀胱之經也攢竹痛俗呼為眉稜痛者是也額角上痛俗呼為偏頭痛者是少陽經也如痛久不已則令人喪目以三陽受病皆胸膈有宿痰之致然也先以茶調散吐之後以香薷散白虎

湯投之則愈然頭痛不止可將葱白鬚豆豉湯吐之吐訖可服川芎薄荷辛凉清上搜風丸香芎散之類仲景曰葱根豆豉亦吐傷寒頭痛叔和云寸脉急而頭痛是也

兩目暴赤三十八

夫兩目暴赤發痛不止可以長流水煎鹽湯吐之次服神芎丸四物湯之類內經曰暴病皆屬火也又曰治病有緩急急則治其標緩則治其本標者赤腫也本者火熱也以草莖鼻中出血最妙

目腫三十九

夫目暴赤腫痛不能開者以青金散鼻內搐之鼻內出血更捷

病目經年四十

夫病赤目經年不愈者是頭風所加之令人頭痛可用獨聖散八正散之類赤目腫作是足厥陰肝經有熱利小便能去肝經風熱也

風衝泣下四十一

夫風衝泣下者俗呼風冷淚者是也內經曰太陽經不禁固也又曰熱則五液皆出肝熱故淚出風衝於外火發於內風火相搏由此而泣下也治之以貝母一枚白膩者胡椒七粒不犯銅鐵研細點之愈

風蚛牙疼四十二

夫風蚛牙疼久不愈者用針插巴豆一枚於燈焰上燎煙未及存性於牙窩根盤上熏之則愈

口瘡四十三

夫大人小兒口瘡唇緊用酸漿水洗去白痂臨困點綠袍散如或不愈貼赴筵散又不愈貼鉛白霜散則愈

喉閉四十四

夫男子婦人喉閉腫痛不能言未刺兩手大拇指去爪甲如韭葉是少商穴少商是肺金之井穴也以鈹針刺血出立愈如不愈以溫白湯口中含嗽是以熱導熱也

癭四十五

夫癭囊腫悶稽叔夜養生論云頸如險而癭水土之使然也可用人參化癭丹服之則消也又以海帶海藻昆布三味皆海中之物但得二味投之於水瓮中常食亦可消矣

背疽四十六

夫背疽初發便可用藏用丸玉燭散大作劑料下臟腑一二十行以鈹針於腫焮處亂刺血出如此者三

後以陽起石散傳之不可便服乃托散内犯官桂更用酒煎男子以背爲陽更以熱投熱無乃太熱乎如瘡少愈或以瘡未合瘡痂未歛風痒時作可服内托散以辟風邪耳

瘰癧四十七

夫人頭目有瘡㾜瘰癧及胸臆肚脇之間或有瘡痂腫核不消及有膿水不止可用滄鹽一二兩炒過以長流水一大椀煎放温作三五次頓服訖候不多時於咽喉中探引吐涎三二升後服和血通經之藥如玉燭散四物湯之類是也内經曰鹹味涌泄爲陰涌者吐也瀉者泄也銅人曰少陽起于目鋭眥行耳後下脇肋過期門瘰癧結核馬刀挾癭是少陽膽經多氣少血之病也

便癰四十八

夫便癰者乃男子之疝也俗呼爲便癰言於不便處害一癰故名便癰也便癰者謬名也難素所不載也然足厥陰肝之經絡是氣血行流之道路也衝任督脉亦屬肝經之傍絡也難經曰男子有七疝是也便癰者血疝也治之以導水丸桃仁承氣湯或抵當湯投之同瘀血不散而治大作劑料峻瀉一二十行次以三稜散和氣血通經絡之類則是也世之多用大黄牡蠣而已間有不愈者是不知和血通經之道也

惡瘡四十九

夫一切惡瘡久不愈者以木香檳榔散貼之則愈

下疳五十

夫下疳久不愈者俗呼曰臊疳是也先以導水禹功先瀉肝經外以木香散傅之日上二兩度然後服淡粥一二日則止

儒門事親卷之四

戴人張子和著
新安吳勉學校

瘡癤瘤腫五十一

夫大人瘡癤小兒赤瘤腫發之時疼痛不止內經曰夫諸痛痒瘡瘍皆生於心火可用一呪法禁之法者是心法呪曰

龍鬼流兮諸毒腫　癰瘡膿血甚被痛
忿心稱念大悲呪　三唾毒腫隨手消

右一氣念呪三遍望日月燈火取氣一口吹在瘡腫丹瘤之上右手在瘡上虛收虛撮三次左手不動每一氣念三遍虛收虛撮三次百無禁忌如用之時心正為是此法得於祖母韓氏相傳一百餘年用之救人百發百中若不食葷酒之人其法更靈病瘡腫者大忌雞猪魚兔發熱動風之物此法不得輕侮無藥處可用之

瘡腫丹毒五十二

夫大人小兒瘡腫丹毒發熱疼痛不止又有一法咒北端想北海雪浪滔天冰山無際大寒嚴冷之氣取此氣一口吹在瘡腫處立止用法之人大忌五辛之菜五厭之肉所病之人切忌雞猪魚兔酒醋濕麵等物無藥之處可用此法救之

凍瘡五十三

夫凍瘡者因寒月行於冰雪中而得之有經年不愈用陂野中淨土曝乾以大蒜搗如泥和土捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小而貼之泥餅子上以火艾灸之不計艾壯多少以泥乾為度去乾餅以換濕餅貼定灸之不問灸數多少有灸一二日者直至瘡痂內覺痒微痛是凍瘡活也然後不舍漿水澄清用雞翎一二十莖縛作刷子於瘡口上洗淨以此而洗之後肌膚猶痛也用軟帛拭乾次用木香檳榔散傅之夏月醫之大妙

金瘡五十四

夫一切刀箭所傷有刀箭藥用風化石灰一斤龍骨四兩二味為細末先於端四日採下刺薊菜於端午日五更合杵臼內搗和得所團作餅子若酒麯中心穿眼懸於背陰處乾陰搗羅為細末於瘡口上摻貼亦治裏外臁骭諸瘡腫大効

又有呪法　呪曰

今日不祥　正被物傷　一禁不疼

二禁不痛　三禁不膿不作血

急急如律令奉勅攝

又每念一遍以右手收一遍收在左手中如此七遍則放手吹去却望太陽取氣一口吹在所傷處如陰晦夜間望北斗取氣亦得所傷之人大忌雞猪魚兎酒醋熱麵動風之物如食之則瘡必發

又一法　黙想東方日出始取氣一口日出一半取氣一口日大圓滿取氣一口吹在所傷之處如此三次則止用法之人並無所忌所傷之人禁忌同前可於無藥之處用之

誤吞銅鐵五十五

夫誤吞銅鐵以至羸瘦者宜用肥猪豚與葵菜羹同飡數頓則銅鐵自然下也神驗如不食葷腥者宜以調胃承氣湯大作其劑下之亦可也

魚刺麥芒五十六

夫魚刺麥芒一切竹木籤刺咽喉及鬚髮悲作在咽喉中不能下者內經曰不因氣動而病生於外可用道藏經一呪法治之

呪曰　吾萌老君東流順　老君奉勅攝攝

攝法毒水吾託大帝尊不到稱吾者各各現帝身急

急如律令奉勅攝一氣念遍又以左手屈中指無名指作三山印印上坐淨水一盞右手搯卯文作金鎗印左手在下右手在上左手象地右手象天虛挽虛卓九次爲定左足橫右足竪作丁字立如作法時望日月燈火取氣一口吹在盞內此法百無禁忌用法之時以正神氣是也如所傷物下不可便與米湯米飯喫恐米粒誤入瘡口中潰作膿也姑以拌麵羹養之數日可也

蛇虫所傷五十七

夫犬咬蛇傷不可便貼膏藥及生肌散之類謂毒氣不出也內經曰先治內而後治外可也當先用導水丸禹功散或通經瀉十餘行即時痛減腫消然後用膏藥生肌散傳貼愈此是先治內而後治外之法也

杖瘡五十八

夫一切虫獸所傷及背瘡腫毒杖瘡焮發或透入裏者可服木香檳榔丸七八十丸至百丸或百五十丸至二百丸生薑湯下過五七行量虛實加減則可矣

禁蠍五十九

大甚蠍有一呪法　呪曰

王女傳仙攝　勅斬蝍蝛

若如有蝎螫之人來求治者於蝎螫處望而取氣一口默念七遍怒着作法吹在蝎螫處內經曰蜂蠆之毒皆屬於火用可新水一盆浸之如浸不得處速以手帛蘸水搭之則痛止也用法之人大忌五厭肉

落馬墜井六十

夫一切男子婦人落馬墜井因而打撲便生心恙是痰涎發於上也內經曰不因氣動而病生於外可用三聖散空心吐訖如本人虛弱瘦瘁可用獨聖散吐之吐訖可服安魂寧魄之藥定志丸酸棗仁伏神之類是也

婦人月事沉滯六十一

夫婦人月事沉滯數月不行肌肉不減內經曰此名為瘕為沉也沉者月事沉滯不行也急宜服桃仁承氣湯加當歸大作劑料服不過三服立愈後用四物湯補之更可用宜明方檳榔丸

血崩六十二

夫婦人年及四十以上或悲哀太甚內經曰悲哀太甚則心系急心系急則肺布葉舉而上焦不通熱氣在中故經血崩下心系者血山也如久不愈則面黃肌瘦慎不可與燥熱之藥治之豈不聞血得熱而流

散先以黃連解毒湯次以涼膈散四物湯等藥治之而愈四物者是涼血也乃婦人之仙藥也量虛實加減以意消息用之

腰胯疼痛六十三

夫婦人腰胯疼痛兩脚麻木惡寒喜暖者內經曰乃是風寒濕痺先可服除濕丹七八十丸量虛實以意加減次以禹功散投之瀉十餘行清冷積水青黃涎沫為驗後以長流水同生薑棗煎五苓散服之風濕散而血氣和也

頭風眩運六十四

夫婦人頭風眩運登車乘船亦眩運眼澀手麻髮退健忘喜怒皆胸中有宿痰之使然也可用瓜蔕散吐之吐訖可用長流水煎五苓散大人參半夏丸兼常服愈風餅子則愈矣

經血暴下六十五

夫婦人年及五十以上經血暴下者婦人經血終于七七之數數外暴下內經曰火主暴速亦因暴喜暴怒憂結驚恐之致然也慎不可作冷病治之如下峻熱之藥則死止可用黃連解毒湯以清於上更用蓮殼灰棕毛以滲於下然後用四物湯加玄胡散涼血

和經之藥是也

赤白帶下六十六

夫婦人赤白帶下或出白物如脂可服導水丸禹功散或單用無憂散量虛實加減瀉訖次用桂苓丸五苓散葶藶木香散同治濕治瀉法治之或用獨聖散上涌亦可也室女亦可

月事不來六十七

夫婦人月事不來室女亦可內經曰月事不來者是胞脉閉也胞脉者屬火而絡於胞中令氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也可用茶調散吐之吐訖可用玉燭散當歸散或三和湯桂苓白术散柴胡飲子量虛實選而用之降心火益腎水開胃進食分陰陽利水道之藥是也慎勿服峻熱之藥若服之則變成肺痿骨蒸潮熱咳嗽咯膿嘔血而喘小便澀滯寢汗不已漸至形瘦脉大雖遇良醫亦成不救嗚呼人之死者豈爲命耶

婦人無子六十八

夫婦人年及二三十者雖無病而無子經血如常或經血不調乃陰不升陽不降之故也可獨聖散上吐訖冷痰三二升後用導水丸禹功散瀉訖三五行及十餘行或用無憂散瀉十餘行次後喫葱醋白粥三五日胃氣既通腸中得實可服玉燭散更助以桂苓白术丸散二藥是降心火益腎水既濟之道不數月而必有孕也

若婦人有癃閉遺溺嗌乾之諸證雖服藥針灸亦不能孕也蓋衝任督三脉之病故不治也表證見內證及熱論中

小產六十九

夫婦人半產俗呼曰小產也或三月或四五六月皆爲半產已成男女故也或因憂恐暴怒悲哀太甚或因勞力打撲傷損及觸風寒或着暴熱不可用黑神散烏金散之類內犯乾薑之故止可用玉燭散和經散湯之類是也

大產七十

夫婦人大產十月滿足降誕者是也或臍腹痛乃敗血惡物之致然也舉世便作虛寒以燥熱治之誤人多矣雖經曰諸痛爲實實者熱也可用導水丸禹功散瀉五七行慎不可便服黑神散烏金散燥之同一產治之則可矣

產後心風七十一

夫婦人產後心風者則用調胃承氣湯一二兩加當歸半兩細剉用水三四盞同煎去滓分作二服大下三五行則愈如不愈三聖散吐之

乳汁不下七十二

夫婦人有本生無乳者不治或因啼哭悲怒鬱結氣溢閉塞以致乳脉不行用精豬肉清湯調和美食於食後調益元散五七錢連服三五服更用木梳梳乳房周回百餘遍則乳汁自下也

又一法用豬蹄湯調和美味服之乳汁亦下合用熟豬蹄四枚食之亦効

又一法針肩井二穴亦効

產後潮熱七十三

夫婦人產後一二日潮熱口乾可用新汲水調玉露散或冰水調服之亦可或服小柴胡湯加當歸及柴胡飲子亦可慎不可作虛寒治之

乳癰七十四

夫乳癰發痛者亦生於心也俗呼曰吹乳是也吹者風也風熱結薄於乳房之間血脉凝注久而不散潰腐為膿也可用一法禁之

咒曰 謹請東方護司族吹妳是灰妳子

右用之時當先問病人曰甚病病人答曰吹妳取此氣一口但吹在兩手坎字文上用大拇指緊捏定面北立一氣念七遍吹在北方如此者三遍若作法時以左右二婦人面病人立於病乳上痛揉一二百數如此亦三次則愈

雙身大小便不利七十五

夫婦人雙身大小便不利者可用八正散大作劑料除滑石加葵菜子煎服內經曰膀胱不利為癃癃者是小便閉而不通也如八正散加木香取効更捷經曰膀胱氣化則能出矣後服五苓散三五服則愈矣

雙身病瘧七十六

夫雙身婦人病瘧可煎白虎湯小柴胡柴胡飲子等藥如大便結硬可用大柴胡散微溏過不可大吐瀉恐傷其孕也內經曰夏傷於暑秋必病瘧

雙身傷寒七十七

夫雙身婦人傷寒時氣溫疫頭痛身熱可用升麻散一兩水半椀大煎剉料去滓分作二服先一服吐了後一服不吐次以長流水加生薑棗煎五苓散熱啜之汗出盡頭痛立止

身重瘖瘂七十八

夫婦人身重九月而瘖瘂不言者是胞生絡脉不相接也則不能言經曰無治也雖有此論可煎玉燭散二兩水一椀同煎至七分去滓放冷入蜜少許時時呷之則心火下降而肺金自清故能作聲也

懷身入難七十九

夫婦人懷身入難月可用長流水調益元散日三服欲其易產也產後自無一切虛熱血氣不和之疾如未八月則不宜服也以滑石滑胎故也

眉煉八十

夫小兒眉煉在面曰眉煉在耳曰輙耳在足曰鞾癬此三者皆謬名也內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火乃心火熱盛之致然也可用鈹針刺之而出血一刺不愈當再刺之二刺則必愈矣內經云血實者宜決之決者破其血也眉煉者不可用藥傅之其瘡多痒則必爬若藥入眼則眼必損矣

牙疳八十一

夫小兒牙疳牙疳者齒䶧也䶧者是牙斷腐爛也上下牙者是手足陽明二經也或積熱於內或服銀粉巴豆大毒之藥入於腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而上至於齒斷齒斷牙縫為嫩薄之分反為害也可以射香玉綠子治之乳母臨卧當服黃連解毒湯一服疳病則愈

夜啼八十二

夫小兒夜啼不止者當用燈花一枚研細隨乳汁下併三服則每服用燈花一枚服罷此藥於淨室中卧一兩日則止也

丹瘤八十三

夫小兒丹瘤浮赤走引或遍身者乃邪熱之毒在於皮膚以磁片撥出血則愈如不愈則以拔毒散掃三二十度必愈矣內經曰丹熛赤瘤火之色也相火之病是也

疳眼八十四

夫小兒疳澁眼數日不開者乃肝木風熱之致然也可調服涼膈散數服眼開而愈

身瘦肌熱八十五

夫小兒身瘦肌熱面黃腹大或吐瀉腹有青筋兩脇結塊如椀之狀名乳癖癖俗呼曰妳脾是也乳癖得之綿帛太厚乳食傷多大熱則病生肌大飽則必傷於腸胃生於肌表者赤眼丹瘤疥癬癰癤眉煉赤白口瘡牙疳宣爛及寒熱往來此乳母抱不下懷積熱

薫蒸之故兩手脉浮而数也傷於腸胃者吐瀉驚癖嗄氣腹脹肌瘦面黄肚大筋豆喜食泥土揉鼻鼓頭髮作穗乳癖不化此皆大飽之致然也久而不愈則成乳癖兩手脉沉而緊也此其辨也已上諸症皆乳母懷抱乖養過度之罪癖之疾可以丁香化癖散取過數服牛黄通膈丸甘露散益黄散等藥磨之如不愈者有揉脾一法

呪曰　日精月華　助吾手法　勅斬癖消

驅毒勅攝

右用法之人每念一遍望日取氣一口吹在手心自

揉之如小兒病在左壁上用法之人亦左手揉之在右壁以右手揉之亦吹在乳脾上令母揉之男孩兒用單日女孩兒用雙日大忌風雨陰晦産婦孝子見之用法之時宜於日中前晴明好日色則可矣

大小便不利八十六

夫小兒大小便不利通者内經曰三焦約也約者不行也可用長流水煎八正散時時灌之候大小便利即止也

久瀉不止八十七

夫小兒久瀉不止者至八九月間變爲秋深冷痢瀉泄清白時復撮痛乳癖不化可用養脾丸丸如黍米大每服二三十丸米飲下日三服則愈若治藕羌之兒萬舉萬全富家且宜消息

通身浮腫八十八

夫小兒通身浮腫是水氣腫也小便不利者通小便則愈内經曰三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體否腫是風乘濕之症也可用長流水加燈心煎五苓散時時灌之更於不透風暖處頻治汗出則腫消腫消則自愈内外兼治故也

發驚潮搐八十九

夫小兒三五歲時或七八歲至十餘歲發驚潮搐涎如拽鋸不省人事目瞪喘急將欲死者内經曰此皆得於母胎中所授悸惕怕怖驚駭恐懼之氣故令小兒輕者爲驚弔重者爲癇病風搐爲腹中積熱爲臍風已上諸病可用吐涎及吐之藥如吐訖宜用朱犀腦射清涼墜涎之藥若食乳之子母亦宜服安魂定魄之劑定志丸之類如婦人懷孕之日大忌驚憂悲泣縱得子必有諸疾

拗哭不止九十

夫小兒拗哭不止或一二日或三四日乃邪祟之氣

湊于心和哭不止也有藏經一法以綿絹帶繫手足
請所三姓婦人净驢槽卧小兒於其中不令傍人知
而覷之候移時則拗哭自止也

身熱吐下九十一

夫小兒身熱吐下腹滿不進乳者可急用牛黄通膈
丸下過四五行則愈

風熱涎嗽九十二

夫小兒風熱涎嗽可用通聖加半夏多煎少少服之
不過三五日愈

水瀉不止九十三

夫小兒水瀉不止可服五苓與益元各停用新水調
下一二錢不拘時服

瘡疥風癬九十四

夫小兒瘡疥風癬可用雄黄散加芒硝少許油調傳
之如面上有瘡癬不宜搽藥恐因而入眼則損目矣

甜瘡九十五

夫小兒甜瘡久不愈者俗呼曰香瘡是也多於面部
兩耳前有一法令母口中嚼白米成膏子臨卧塗之
不過三五上則愈矣小兒并乳母皆忌雞猪魚兔酒
醋動風發熱之物如治甜瘡亦可

白禿瘡九十六

夫小兒白禿瘡者俗呼爲雞糞禿者是也可用甜瓜
蔓龍頭不以多少河水浸之一宿以沙鍋熬取極苦
汁濾去苽蔓以文武慢火熬成如稀餳狀盛於磁器
中可先剃頭去盡瘡痂死血出盡着河水洗净却用
熬下苽蔓膏子一水盞加半夏末二錢生薑自然汁
一兩匙狗膽一枚同調不過三兩上立可大忌雞猪
魚兔動風發熱之物

瘧疾不愈九十七

夫瘧疾連歲不愈者可用呪菓法治之果者謂桃杏

棗梨栗是也　呪曰

吾從東南來　路逢一池水　水裏一條龍
九頭十八尾　問伊食甚的　只喫瘧病鬼

右念一遍吹在菓子上念七遍吹七遍在上令病人
於五更雞犬不聞時面東而立食乾於净室中安困
忌食瓜菓葷肉熱物此法十治八九無藥處可救人

腰痛氣刺九十八

夫一切男子婦人或因欬嗽一聲或因悲哭啼泣擡
舁重物以致腰痛氣刺不能轉側及不能出氣者可
用不卧散嚏之汗出痛止如不食可用通經散導水

丸瀉十餘行瀉訖服益金丸和血丹痛減則止矣

赤瘤丹腫九十九

夫小兒有赤瘤丹腫先用牛黄通膈丸瀉之後用陽起石掃傳則丹毒自散如未散則可用鈹針砭刺出血而愈矣

瘡疱癮疹一百

夫小兒瘡疱癮疹䟍瘡丹熛等疾如遇火運勝時不可便用升麻湯解之升麻湯者是辛溫之劑止可用辛溫之劑解之太平之時可用辛溫之劑發散後便可用涼膈加當歸白虎湯化班湯玉露散煎服之甚

者解毒湯調胃承氣湯投之古人云瘡瘍者首尾俱不可下此言誤人久矣豈不聞揚湯止沸釜底抽薪內經曰五寅五申歲多發此病此病少陽相火之歲也少陽客氣勝丹熛瘡疱癮疹之疾生矣又內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬於心火由是言之皆明心生不可用辛溫之劑發散以至熱勢轉增漸成臟毒下血咬牙搐搦為大熱之症明矣如白虎湯加人參涼膈加桔梗當歸不論秋冬但有瘡疱之症便可用之亦且瘡疱癮疹丹熛䟍瘡者是人之一氣以傷人也且如瘡疱癮疹以少為吉以稠為凶希少者不服藥而自愈稠密者以寒涼藥拯死而治之十痊其一二髮家親眷相知信服此藥獲効多矣

儒門事親卷之五

儒門事親卷之六

戴人張子和著

新安吳勉學校

風形

因驚風搐一

新寨馬叟年五十九因秋欠稅官杖六十得驚氣成風搐已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則令人代哺口目張睒脣舌嚼爛抖擻之狀如線引傀儡每發市人皆聚觀夜臥發熱衣被盡去遍身燥痒中熱而反外寒久欲自盡手不能繩傾產求醫至破其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以父母病訊戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一涌再涌奪則愈矣今已秋寒可三之如未更刺腧穴必愈先以通聖散汗之繼服涌劑則痰一二升至晚又下五七行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如雞黃成塊狀如湯熱叟以手顫不能自探妻與代探咽嗌腫傷昏憒如醉約一二時許稍稍省又下數行立覺足輕顫減熱亦不作足亦能步手能巾櫛自持匙筯未至三涌病去如濯病後但覺極寒戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾之去衛氣未復故宜以散風

導氣之藥切不可以熱劑溫之恐反成他病也

風搐反張二

呂君玉之妻年三十餘病風搐目眩角弓反張數日不食諸醫皆作驚風暗風風癇治之以天南星雄黃天麻烏附用之殊無少効戴人曰諸風掉眩皆屬肝木曲直動搖風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金衰不能平木肝木茂而自病先涌風痰二三升次以寒劑下十餘行又以鈹針刺百會穴出血二盃愈

飧泄三

趙明之米穀不消腹作雷鳴自五月至六月不愈諸醫以為脾受大寒故併與聖散子豆蔻丸雖止一二日藥力盡而復作諸醫不知藥之非反責明之不忌口戴人至而笑曰春傷於風夏必飧泄飧泄者米穀不化而直過下出也又曰米穀不化熱氣在下久風入中中者脾胃也風屬甲乙脾胃屬戊己甲乙能尅戊己腸中有風故鳴經曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄診其兩手脈皆浮數為病在表也可汗之直斷曰風隨汗出以火二盆暗置床之下不令病人見火恐增其熱紿之入室使服涌劑以麻黃投之乃閉其戶從外鎖之汗出如洗待一時許開戶減

火一半須臾汗止泄亦止

因風鼻塞四

常仲明常於炎暑時風快處披露肌膚以求爽爲風所賊三日鼻窒雖坐於暖處少通終不大解戴人使服通聖散入生薑葱根豆豉同煎三兩服大發汗鼻立通矣

風痰五

常仲明之子自四歲得風痰疾至十五歲轉甚每月發一兩次發必頭痛痛則擊數百拳出黃綠涎一兩盞方已比年發益頻目見黑花發作昏不知人三四

日方省諸醫皆用南星半夏化痰之藥終無一効偶遇戴人于㶏水之南鄉戴人以雙解散發汗次以苦劑吐痰病去八九續以分劑平調自春至秋如此數次方獲全瘥

癩六

朱葛解家病癩疾求治于戴人戴人辭之待五六月間可治之時也今春初尚寒未可服藥我已具行裝到宛丘待五六月製藥朱解家以爲託辭後戴人果以六月間到朱葛乃具大蒜浮萍等藥使人召解家曰藥已成矣可來就治解爲他藥所惑竟不至戴人曰向日我非託也以春寒未可發汗暑月易發汗內經論治癩疾自目眉毛再生針同發汗也但無藥者用針一汗可抵千針故高供奉採萍歌曰不居山兮不在岸採我之時七月半選甚癱風與瘓風些小微風都不筭豆淋酒內下三丸鐵幞頭上也出汗噫文士相輕醫氏相疾文士不過自損醫氏至於害人其解家之謂與陽夏張主簿病癩十餘年眉鬚皆落皮膚皴澁如樹皮戴人斷之曰是有汗者可治之當大發汗其汗出當臭其涎當腥乃置燠室中徧塞風隙以三聖散吐之汗出周身如卧水中其汗果粘臭不

可聞痰皆腥如魚涎兩足心微有汗次以舟車丸濬川散大下五七行如此數次乃瘳

手足風裂七

陽夏胡家婦手足風裂其兩目昏漫戴人曰厥陰所至爲璺又曰鳴紊啓坼皆風之用風屬木木鬱者達之達謂吐也先令涌之繼以調胃承氣湯加當歸瀉之立効

胃脘痛八

一將軍病心痛不可忍戴人曰此非心痛也乃胃脘當心痛也內經曰歲木太過風氣流行民病胃脘當

心而痛乃與神祐丸一百餘粒病不減武問曰此胃
脘有寒宜溫補將軍素知戴人明了復求藥於戴人
戴人復與神祐丸二百餘粒作一服大下六七行立
愈矣

搐搦九

黄如村一叟兩手搐搦狀如拽鋸冬月不能覆被適
戴人之舞陽道經黄如不及用藥針其兩手大指後
中注穴上戴人曰自肘已上皆無病惟兩手搐搦左
氏所謂風淫末疾者此也或刺後谿手太陽穴也屈
小指握紋盡處是穴也

面腫風十

南鄉陳君俞將赴秋試頭項徧腫連一目狀若半壺
其脉洪大戴人出視內經面腫者風此風乘陽明經
也陽明氣血俱多風腫宜汗乃與通聖散入生薑葱
根豆豉同煎一大盞服之微汗次日以草莖鼻中大
出血立消

驚風十一

戴人常曰小兒風熱驚搐乃常病也常搦時切戒把
捉手足握持太急必半身不遂也氣血偏勝必痺其
一臂漸成細瘦至老難治當其搐時置一竹簟鋪之
涼地使小兒寢其上待其搐風力行徧經絡茂極自
止不至傷人

風溫十二

陽夏賀義夫病傷寒當三日以裏醫者下之而成結
胸求戴人治之戴人曰本風溫證也不可下又下之
太早故發黄結胸此已有瘀血在胸中欲再下之恐
已虛惟一涌可愈但出血勿驚以茶調瓜蒂散吐之
血數升而衄且噎逆乃以巾捲小鍼而使枕其刃不
數日平復

風水十三

張小一初病疥爬搔變而成腫喘不能食戴人斷為
風水水得風而暴腫故遍身皆腫先令浴之乘腠理
開發就煖室中用酸苦之劑加全蝎一枚吐之節次
用藥末至三錢許出痰約數升汗隨涌出腫去八九
分隔一日臨臥向一更來又下神祐丸七十餘粒三
次嚥之至夜半動一行又續下水煮桃紅丸六十丸
以麝香湯下又利三四行後二三日再以舟車丸通
經散及白术散以調之愈

右

曹典吏妻産後憂恚抱氣渾身腫繞陰器皆腫大小

便知當其脈浮而大此風水腫也先以虀水撩其痰以火助之發汗次以舟車丸濬川散瀉數行後四五日方用苦劑涌吐用舟車丸通經散過十餘行又六日舟車濬川復下之末後用水煮桃紅丸四十餘丸不一月如故前後涌者二瀉凡四通約百餘行當時議者以為倒布袋法耳病再來則必死世俗只見塵中貨藥者用銀粉巴豆瀉腫者暫去復來必死以為驚俗豈知此法乃內經治鬱之玄兼此藥皆小毒其毒之藥豈有反害者哉但愈後忌慎房室等事况風水不同從水無復來之理

小兒風水十四

郾之營兵秋家小兒病風水諸醫用銀粉粉霜之藥小溲反澁飲食不進頭腫如腹四肢皆滿狀若水晶家人以為勉強求治于戴人戴人曰此證不與壯年同壯年病水者或因留飲及房室此小兒纔七歲乃風水證也宜出汗乃置燠室以屏帳遍遮之不令見火若內火見外火必昏憒也使大服胃風湯而浴之浴訖以布单重覆之凡三五重其汗如水腫乃減五分隔一二日乃依前治之汗出腫減七分乃二汗而全減尚未能食以檳榔丸調之兒已喜笑如常日矣

腎風十五

桑惠民病風面黑色畏風不敢出爬搔不已眉毛脫落作癩醫三年一日戴人到棠谿來求治于戴人戴人曰非癩也乃出素問風論曰腎風之狀多汗惡風脊痛不能正立其色炲面疣然浮腫今公之病腎風也宜先刺其面大出血其血當如墨色三刺血變色矣於是下針自額上下鈹針直至顛頂皆出血果如墨色偏腫處皆針之惟不針目鋭眥外兩旁蓋少陽經此少血多氣也隔日又針之血色乃紫二日外又刺其血色變赤初鍼時痒再刺則額覺痛三刺其痛

不可任蓋邪退而然也待二十餘日又輕刺一遍方已每刺必以冰水洗其面血十日黑色退一月面稍赤三月乃紅白但不服除根下熱之藥病再作戴人在東方無能治者

勞風十六

戴人見一男子目下腫如附蚕狀戴人曰目之下陰也水亦陰也腎以為水之主其腫至于目下故也此由房室交接之時勞汗遇風風入皮腠得寒則閉風不能出與水俱行故病如是不禁房則死

中風十七

高評事中風稍緩張令涌之後服鉄彈丸在普濟加減方中或問張曰君常笑人中風服鉄彈丸今以用之何也張曰此收後之藥也今人用之於大勢方來之時正猶蚍蜉撼大樹不識次第故也

暑形

中暑十八

小郞年十五田中中暑頭痛困卧不起戴人以雙解散汗之又以米醋湯投之未解薄晚又以三花神祐丸大下之遂愈

又

張叟年七十一暑月田中因饑困傷暑食欲不進時時嘔吐口中常流痰水腹脇作痛醫者槩用平胃散理中丸導氣丸不効又加鍼灸皆云胃冷乃問戴人戴人曰痰屬胃胃熱不收故流痰水以公年高不可上涌乃使一筯探之不藥而吐之痰涎一升次用黃連淸心散導飲丸玉露散以調之飲食加進惟大便秘以生薑大棗煎調胃承氣湯一兩夺之遂愈

痎瘧十九

故息城一男子病瘧求治于戴人診兩手脉皆沉伏而有力内有積也此是肥氣病者曰左脇下有肥氣腸中作痛積亦痛形如覆杯間發止今已三年祈禳避匿無所不至終不能療戴人曰此痎瘧也以三花神祐丸五七十丸以冷水送過五六行次以冷水止之冷主收斂故也濕水旣盡一二日煎白虎湯作頓啜之瘧猶不愈候五六日吐之以常山散去冷痰涎水六七次若翻漿次以柴胡湯和之間用妙功丸磨之瘧悉除

火形

馬刀二十

襄陵馬國卿病左乳下二脇間期門穴中發癰堅而不潰痛不可忍醫瘍者皆曰乳癰或曰紅系漏或曰覷心瘡使服内托散百日又服五香連翹湯數月皆無驗國卿傴僂而來求治于戴人遇諸市戴人見之曰此馬刀癰也足少陽膽經之病出靈樞十二經以示之其狀如馬刀故曰馬刀堅而不潰乃邀之於食肆中使食水浸湯餅國卿曰稍覺緩次曰先以滄鹽上涌又以凉劑滌去熱勢約數十行腫已散矣

又朱葛黃家妾左脇病馬刀癰增寒發痛已四五日矣戴人適避暑於寺中來乞藥戴人曰此足少陽膽經病也少血多氣堅而不潰不可急攻當以苦劑涌

之以五香連翹湯托之既而痛止然終根未散有一盜醫過見之曰我有妙藥可潰而爲膿不如此何時而愈既紝毒藥痛不可忍外寒内熱嘔吐不止大便黑色食飲不下號呼悶亂幾至于死諸姑惶懼夜投戴人戴人曰當尋元醫者余不能治其主母亦來告至于再三戴人曰脇間皮薄肉淺豈可輕用毒藥復令洗出以凉劑下之痛立止腫亦消也

項瘡二十一

戴人在西華寄於夏官人宅忽項上病一瘡狀如白頭瘡腫根紅硬以其微小不慮也忽遇一故人見邀以羊羔酒飲雞魚醢蒜皆在焉戴人以其故舊不能辭又忘其禁忌是夜瘡疼痛不可忍項腫及頭口發狂言因見鬼神夏君甚懼欲報其家戴人笑曰諸無憂來日當平乃以酒調通經散六七錢下舟車丸百餘粒次以熱麪羹投之上涌下泄一時齊作合去半盆明日日中瘡腫已平一二日腫消而愈夏君見大奇之

伐指痛二十二

麻先生妻病伐指痛不可忍酒調通經散一錢半夜先吐吐畢而痛減余因歎曰向見陳五曾病此醫以

爲小蟲傷或以草上有毒物手因漸之遷延數月膿盡方已以今日觀之可以大笑

瘰癧二十三

一婦人病瘰癧延及胸臆皆成大瘡相連無好皮肉求戴人療之戴人曰火淫所勝治以鹹寒命以滄鹽吐之一吐而着痂次用凉膈散解毒湯等劑皮肉乃復如初

咽喉腫塞二十四

一婦人病咽喉腫塞漿粥不下數日腫不退藥既難下鍼亦無功戴人以當歸荊芥甘草煎使熱嗽之以冷水拔其兩手不及五六日痛減腫消飲食如故咽喉之病甚急不可妄用鍼藥

舌腫二十五

南鄰朱老翁年六十餘歲身熱數日不已舌根腫起和舌尖亦腫腫至滿口比元舌大二倍一外科以燔鍼刺其舌兩旁下廉泉穴病勢轉凶將至顛巇戴人曰血實者宜決之以鈹鍼磨令鋒極尖輕砭之曰砭八九次血出約一二盞如此者三次漸而血少痛減腫消夫舌者心之外候也心主血故血出則愈又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火燔鍼艾火是何義也

腰胯痛二十六

一戴人女僮冬間自途來面赤如火至㶏陽病腰胯大痛裏急後重痛則見鬼神戴人曰此少陽經也在身側爲相火使服舟車丸通經散瀉至數盆病猶未瘥人皆怪之以爲有祟戴人大怒曰驢鬼也復令調胃承氣湯二兩加牽牛頭末一兩同煎服之太過數十行約一二缶方捨其杖策但發渴戴人恣其飲水西瓜梨柹等戴人曰凡治火莫如冰水天地之至陰也約飲水一二桶猶覺微痛戴人乃刺其陽陵穴以伸其滯足少陽膽經之穴也自是方寧女僮自言此病每一歲須瀉五七次今年不曾瀉故如是也常仲明悟其言以身有濕病故一歲亦瀉十餘行病始已此可與智者言難與愚者論也

狂二十七

一叟年六十值徭役煩擾而暴發狂口鼻覺如蟲行兩手爬搔數年不已戴人診其兩手脈皆洪大如絙繩斷之曰口爲飛門胃爲賁門曰口者胃之上源也鼻者足陽明經起於鼻交頞之中旁納太陽下循鼻柱交人中環脣下交承漿故其病如是夫徭役煩擾便屬火化火乘陽明經[illegible]以發狂故經言陽明之病登高而歌棄衣而走罵言不避親疎又況肝主謀膽主決徭役迫遽則財不能支則肝屢謀而膽屢不能決屈無所伸怒無所泄心火磅礴遂乘陽明金然胃本屬土而肝屬木膽屬相火火隨木氣而入胃故暴發狂乃命置燠室中涌而汗出如此三次內經曰木鬱則達之火鬱則發之良謂此也又以調胃承氣湯半斤用水五升煎半沸分作三服大下二十行血水與瘀血相雜而下數升取之乃康以通聖散調其後矣

痰厥二十八

一夫病痰厥不知人牙關緊急諸藥不能下候死而已戴人見之問侍病者口中曾有涎否曰有戴人先以防風藜蘆煎湯調瓜蔕末灌之口中不能下乃取長蛤甲磨去刃以紙裹其尖灌於右鼻竅中咽然下咽有聲後灌其左竅亦然戴人曰可治矣良久涎不出遂以砒石一錢又投之鼻中忽偃然仰面似覺有痛斯須吐噦吐膠涎數升頗腥砒石尋常勿用以其病大非如此莫能動然無瓜蔕亦不可便用宜消息之大凡中風涎塞往往止斷爲風專求風藥靈寳至寳誤人多矣劉河間治風捨風不論先論二火故令將此法實於火形中

是當作足

滑泄乾嘔二十九

麻先生妻當七月間病臟腑滑泄以去濕降火之藥治之少愈後腹脹及乳痛狀如吹乳頭重壯熱面如渥丹寒熱往來嗌乾嘔逆胸脇痛不能轉側耳鳴食不可下又復瀉余欲瀉其火臟腑已滑數日矣欲以溫劑止利又禁上焦已熱實不得其法使人就諸葛寺禮請戴人比及戴人至因檢劉河間方惟益元散正對此證能降火解表止渴利小溲定利安神以青黛薄荷末調二升置之枕右使作數次服之夜半徧身出冷汗如洗元覺足冷如水至此是大暖頭頓輕肌涼痛減嘔定痢止及戴人至余告之已解戴人曰益元固宜此是少陽證也能使人寒熱偏劇他經縱有寒熱亦不至甚既熱而有痢不欲再下何不以黃連解毒湯服之乃令診脉戴人曰娘子病來心常欲痛哭爲快否婦曰欲如此余亦不知所謂戴人曰少陽相火凌爍肺金金受屈制無所投告肺主悲但欲痛哭而爲快也麻先生曰余家諸親無不敬服脉初洪數有力自服益元散後已半又聞戴人之言使以當歸芍藥以解毒湯中味數服之大瘥矣

笑不止三十

戴人路經古亳逢一婦病喜笑不止已半年矣衆醫治者皆無藥術矣求治于戴人戴人曰此易治也以滄鹽成塊者二兩余用火燒令通赤放冷研細以河水一大椀同煎至三五沸放溫分三次啜之以釵探於咽中吐出熱痰五升次服大劑大黃連解毒湯是也不數日而笑定矣內經曰神有餘者笑不休此所謂神者心火是也火得風而成焰故笑之象也五行之中惟火有笑矣

膈食中滿三十一

遂平李官人妻病咽中如物塞食不下中滿他醫治之不効戴人診其脉曰此痰膈也內經曰三陽結爲膈王啓玄又曰格陽云陽盛之極故食格拒而不入先以通經散越其一半後以舟車丸下之凡三次食已下又以瓜蒂散再越之健啖如昔日矣

目盲三十二

戴人女僮至西華目忽暴盲不見物戴人曰此相火也太陽陽明氣血俱盛乃刺其鼻中攢竺穴與頂前五穴大出血目立明

小兒悲哭不止三十三

夫小兒悲哭彌日不休兩手脉弦而緊戴人曰心火

甚而乘肺肺不受其屈故哭肺主悲王太僕云心灼則痛甚故熱甚悲亦甚今浴以温湯漬形以爲汗也肺主皮毛汗出則肺熱散矣浴止而啼亦止仍命服凉膈散加當歸桔梗以竹葉生薑朴硝同煎服瀉膈中之邪熱

小兒手足搐搦三十四

李民一小兒病手足搐搦以示戴人戴人曰心火勝也勿持捉其手當從搐搦此由乳母保抱太極所致乃令掃淨地以水洒之乾令復洒之令極濕俛卧兒于地上良久渾身轉側泥浣皆滿仍以水洗之少頃而瘥矣

目赤三十五

李氏範目常赤至戊子年火運君火司天其年病目者往往暴盲運火炎烈故也民範是年目大發遂遇戴人以苽蒂散涌之赤立消不數日又大發其病之來也先以左目内眥赤發牽睛狀如鋪麻左之右次鋭眥發亦左之右赤貫瞳子再涌之又退凡五次交亦五次皆涌又刺其手中出血及頭上鼻中皆出血上下中外皆奪方能戰退然不敢觀書及見日張云當候秋凉再攻則愈又云方旺而在皮膚雖攻其裏無

益也秋凉則熱漸入裏方可擒也惟宜暗處閉目以養其神水暗與静屬水明與動屬火所以不宜見日也盖民範因初愈後曾目暑出門故痛連發不愈如此涌泄之後不可常攻使服黍粘子以退翳方在別集中矣

熱形

沙石淋三十六

酒監房善良之子年十三病沙石淋已九年矣初因瘡疹餘毒不出作便血或告之令服太白散稍止後又因積熱未退變成淋閉每發則見鬼神號則驚隣適戴人客鄧墻寺以此病請戴人曰諸醫作腎與小腸病者非也靈樞言足厥陰肝之經病遺溺閉癃閉謂小溲不行癃爲淋瀝也此乙木之病非小腸與腎也木爲所抑火來乘之故熱在脬中下焦爲之約結成沙石如湯瓶煎煉日久熬成湯鹼今夫羊豕之脬吹氣令滿常不能透豈真有沙石而能溺者邪以此知前人所說服五石丸散而致者恐未盡然内經曰木鬱則達之先以瓜蒂散越之次以八正散加湯鹼等分頓啜之其沙石自化而下

又屈村張氏小兒年十四歲病約一年半矣得之麥

其發則小腸大痛至握其峻跳躍旋轉號呼不已小溲數日不能下下則成沙石大便秘澁肛門脫出一二寸諸醫莫能治聞戴人在朱葛寺避暑乃負其子而哀請戴人戴人曰今日治今日効時日在辰巳間矣以調胃承氣僅一兩加牽牛頭末三錢汲河水煎之令作三五度嚥之又服苦末丸如芥子許六十粒日加晡上涌下泄一時齊出有膿有血涌瀉既覺定令飲新汲水一大盞小溲已利一二次矣是夜凡飲新水二三十遍病去九分止哭一次明日困卧如醉自晨至暮猛然起走索食與母歌笑自得頓釋所苦

繼與太白散八正散等調一日大瘥恐暑天失所養留五日而歸戴人曰此下焦約也不吐不下則下焦何以開不令飲水則小溲何以利大抵源清則流清者是也

又栢亭劉十三之子年六歲病沙石淋戴人以苦劑三涌之以益腎散三下之立愈

膏淋三十七

鹿邑一男閥家有子二十三歲病膏淋三年矣鄉中醫不能治往京師徧訪多作虛損補以溫燥灼以鍼艾無少減聞戴人僑居㶏東見戴人曰惑蠱之疾也亦曰白淫實由少腹冤熱非虛也可以涌以泄其人以時暑憚其法峻不決者三日浮屠一僧曰予以有暑病近覺頭痛戴人曰亦可涌願與君同之毋畏也於是涌痰三升色如黑礬汁內有死血并黃綠水又瀉積穢數行尋覺病去方其來時面無人色及治畢次日面如醉戴人慮其暑月路遠又處數方使歸以自備云

二陽病三十八

常仲明病寒熱往來時欬一二聲面黃無力懶思飲食夜多寢汗日漸變削諸醫作虛損治之用二十四

味燒肝散鹿茸牛膝補養二年口中痰出下部轉虛戴人斷之曰上實也先以涌劑吐痰二三升次以柴胡飲子降火益水不月餘復舊此症名何乃內經中曰二陽病也二陽之病發心脾不得隱曲心受之則血不流故女子不月脾受之則味不化故男子少精此二證名異而實同仲明之病味不化也

小兒面上赤腫三十九

黃氏小兒面赤腫兩目不開戴人以鈹鍼刺輕砭之除兩目尖外亂刺數十鍼出血三次及愈此法人多不肯從必欲治病不可謹護

頭熱痛四十

丹霞僧病頭痛常居暗室不敢見明其頭熱痛以布圍其頭上置冰於其中日易數次熱不能已諸醫莫識其證求見戴人戴人曰此三陽畜熱故也乃置炭火於煖室中出汗涌吐三法併行七日方愈僧頓從者曰此神仙手也

勞嗽四十一

驢口鎮一男子年二十餘歲病勞嗽數年其聲欲出不出戴人曰問曾服藥否其人曰家貧未嘗服藥戴人曰年壯不妄服藥者易治先以苦劑涌之次以舟車濬川大下之更服重劑果瘥

一田夫病勞嗽一涌一泄已減大半次服人參補肺湯臨卧更服檳榔丸以進食

又東門高三郎病嗽一年半耳鳴三月矣嗽膿血面多黑點身表俱熱喉中不能發聲戴人曰嗽之源心火之勝也秋傷於濕冬生咳嗽冬水既旺水濕相接隔絕於心火火不下降反而炎上肺金被爍發而爲嗽金燬既久聲反不發醫者補肺腎皆非也戴人令先備西瓜冰雪等物其次用涌泄之法又服去濕之藥病日已矣

勞嗽咯血四十二

鄜陽劉氏一男子年二十餘歲病勞嗽咯血吐唾粘臭不可聞秋冬少緩春夏則甚寒熱往來日晡發作狀如痎瘧寢汗如水累服麻黄根敗蒲扇止汗汗自若也又服寧神散寧肺散止嗽嗽自若也戴人先以獨聖散涌其痰狀如雞黄汗隨涌出昏憒三日不省時時飲以凉水精神稍開飲食加進又與人參半夏丸桂苓甘露散服之不經數日乃愈

吐血四十三

岳八郎常日嗜酒偶大飲醉吐血近一年身黄如橘昏憒發作數日不省飲粥不下痰且如膠兩手脉皆沉細戴人視之曰脉沉細者病在裏也中有積聚用舟車丸百餘粒濬川散五六錢大下十餘行狀如葵菜汁中燥糞氣穢異常忽開兩目伸挽問左右曰我緣何至此左右曰你吐血後數日不省得戴人治之乃醒自是五六日必以瀉凡四五次其血方止但時欬一二聲潮熱未退以凉膈散加桔梗當歸各秤二兩水一大盂加老竹葉入蜜少許同煎去滓時時呷之間與人參白虎湯不一月復故

嘔血四十四

棠谿李民範初病嗽血戴人以調胃湯一兩加當歸使服之不動再以舟車丸五六十粒過三四行又嘔血一椀若庸工則必疑不再宿又與舟車丸百餘粒通經散三四錢大下之過十餘行已愈過半仍以黄連解毒湯加當歸煎服之次以草莖鼻中出血半升臨晩又用益腎散利數行乃愈

因藥燥熱四十五

高樂巡檢之子八歲病熱醫者皆爲傷冷治之以熱藥攻矣欲飲水水禁而不與內水涸竭煩燥轉生前後皆閉口鼻俱乾寒熱往來嗽欬時作遍身無汗又

欲灸之適遇戴人戴人責其母曰重裀厚被煖炕紅爐兒已不勝其熱矣尚可灸乎其母謝以不明戴人令先服人參柴胡飲子連進數服下爛魚腸之類臭氣異常渴欲飲水聽其所欲氷雪凉水連進數杯節次又下三四十行大熱方去又與牛黄通膈丸復下十餘行兒方大痊前後約五十餘行略無所困氷雪水飲至一斛向灸之當何如哉

肺癰四十六

武陽仇天祥之子病發寒熱諸醫作骨蒸勞治之半年病愈甚以禮來聘戴人戴人往視之診其兩手脉尺寸皆潮於關關脉獨大戴人曰癰象也問其乳媪曾有痛處否乳媪曰無戴人令兒去衣舉其兩手觀其兩脇下右脇稍高戴人以手側按之兒移身乃避之按其左脇則不避戴人曰此肺部有癰也非肺癰也若肺癰已吐膿矣此不可動止可以藥托其裏以待自破家人皆疑之不以爲然服藥三日右脇有三點赤色戴人連辭云此兒之病若早治者談笑可已今已失之遲然破之後方驗其死生矣若膿黄赤白者生也膿青黒者死也遂辭而去私告天祥之友李簡之曰數月之後即此兒必有一症也其症乃死矣

肺死于巳至期而頭眩不擧不數日而死也其父曰羣醫治之斷爲骨蒸證戴人獨言其肺有癰也心終疑之及其死家人輩以火焚其棺既燃天祥以杖破其脇下果出青黒膿一椀天祥仰天哭曰諸醫誤殺吾兒矣

痿四十七

宛丘營軍校三人皆病痿積年不瘥腰已下腫痛不擧遍身瘡赤兩目昏暗唇乾舌燥求療于戴人戴人欲投瀉劑二人不從爲他醫温補之藥所惑皆死其同病有宋子玉者俄省曰彼已熱死我其改之敬邀

戴人戴人曰公之疾服熱藥久矣先去其藥邪然後及病邪可下三百行子玉曰敬從教先以舟車丸濬川散大下一盆許明日減三分兩足旨不仁是日覺痛痒累至三百行始安戴人曰諸痿獨取陽明陽明者胃與大腸也此言不止謂鍼也鍼與藥同也

口瘡四十八

一男子病口瘡數年上至口中至咽嗌下至胃脘皆痛不敢食熱物一涌一泄一汗一去其九次服黃連解毒湯不十餘日皆釋

虛勞四十九

西華束茂之病虛勞寖汗面有青黃色自臍以下冷痛無汗腹中燥熱醫以薑附補之五晦朔不令飲水又禁梳頭作寒治之請于戴人戴人曰子之病不難愈難於將護恐愈後陰道轉茂子必不慎束生曰不敢戴人先以舟車丸濬川散下五七行心火下降覺渴與冰水飲之又令澡浴數日間面紅而澤後以河水煮粥溫養脾胃河水能利小溲又以活血當歸丸人參柴胡散五苓散木香白朮散調之病大瘥寢汗皆止兩足日煖食進戴人常曰此本肺痺當以涼劑蓋水之一物在目為淚在皮為汗在下為小溲穀多少為常無水可乎若禁飲水必內竭內竭則燥熱生焉人若不渴與水亦不肯飲之矣束生既愈果忘其戒病復作戴人已去乃殂

心痛五十

酒官楊仲臣病心氣痛此人常好飲酒初飲三二杯必奔走跛懶兩足三五十次其酒稍散方能復席飲至前量一醉必五七次至明嘔青黃水數日後變魚腥臭六七日始安戴人曰宜涌乃吐虫一條赤黃色長六七寸口目鼻皆全兩目膜瞞狀如蛇類以鹽淹乾示人

傷寒極熱五十一

戴人之僕常與隣人同病傷寒俱至六七日下之不通隣人已死僕發熱極投於井中撈出以汲水貯之檻使坐其中適戴人遊他方家人偶記戴人治法曰傷寒三下不通不可再攻便當涌之試服瓜蒂散良久吐膠涎三椀許與宿食相雜在地狀如一帚頓快乃知世醫殺人多矣戴人之女僮亦嘗吐一吏傷寒吐訖使服太白散甘露散以調之

失笑五十二

戴人之次子自出妻之後日瘦語如甕中此病在中

也常撚第三指失笑此心火也約半載日飲水雪更服涼劑戴人曰惡雪則愈矣其母懼其大寒戴人罵曰汝親也吾用藥如鼓之應桴何惡涼藥宜乎世俗之謗我也至七月厭水不飲病日解矣

赤目五十三

安喜趙君玉目暴赤腫點洗不退偶思戴人語曰凡病在上者皆宜吐乃以茶調散涌之一涌赤腫消散君玉歎曰法之妙其迅如此乃知法不遠人自遠法也

目衆五十四

清州王之一子年十餘歲目赤多淚衆工無効戴人見之曰此兒病目衆當得之母腹中被驚其父曰妊娠時在臨清被圍戴人令服瓜蔕散加鬱金上涌而下泄各去涎沫數升人皆笑之其母亦曰兒腹中無病何吐瀉如此至明日其目耀然爽明李仲安見而驚曰奇哉此法救人其目又與頭上出血及眉上鼻中皆出血吐時次用通經散二錢舟車丸七十粒自吐却少半又以通經散一錢投之明日又以舟車丸三十粒投之下十八行病更不作矣

瘡後嘔吐五十五

河門劉光濟之子纔二歲病瘡後嘔吐發昏用丁香豆蔻之類不効適麻先生寄其家乃謂光濟曰余有小方無毒人皆知之公肯從乎光濟曰先生之言必中於理何敢不從麻先生曰劉河間常言涼膈散可治瘡瘍張戴人用之如神況內經言少陽所至爲嘔涌少陽者相火也非寒也光濟欣而從之此日利二行適王德秀自外入聞其利之也乃曰瘡瘍首尾不可下麻自悔其多言業也已然姑待之比至食時下黃涎一合日午問之兒已索遊于街矣

熱厥頭痛五十六

彭吳張叟年六十餘歲病熱厥頭痛以其用涌藥時已一月間矣加之以火其人先利臟腑年高身困出門見日而仆不知人家人驚惶欲揉撲之戴人戴人曰大不可擾續與西瓜涼水蜜雪少頃而蘇蓋病人年老涌泄目脉易亂身體內有炎火外有太陽是以跌自若是擾之便不救矣惟安定神思以涼水投之待之以淨淨便屬水自然無事君他醫必惑足以知戴人之諳練

產前喘五十七

武安胡產祥之妻臨難月病喘以涼膈散二兩四物

湯二兩朴硝一兩分作二服煎令冷服之一服病減大半次又服之病痊効矣産之後第六日血迷又用涼膈散二兩四物湯三兩朴硝一兩都作一服大下紫黑水其人至今肥健戴人常曰孕婦有病當十月九月內朴硝無礙八月者當忌之七月却無妨謂陽月也十月者已成形矣

血崩五十八

孟官人母年五十餘歲血崩一載僉用澤蘭丸黑神散保安丸白薇散補之不効戴人見之曰天癸已盡本不當下血蓋血得熱而流散非寒也夫女子血崩多因大悲哭悲甚則肺葉布心系爲之恐血不禁而下崩內經曰陰虛陽搏之爲崩陰脉不足陽脉有餘數則內崩血乃下流舉世以虛損治之莫有知其非者可服大劑大劑者黃連解毒湯是也次以揀香附子二兩炒白芍二兩焙當歸一兩焙三味同爲細末水調下又服檳榔丸不拘日而安

婦人二陽病五十九

一婦月事不行寒熱往來口乾頰赤喜飲旦暮聞欬一二聲諸醫皆云經血不行宜虻蟲水蛭乾漆硇砂元濟紅娘子沒藥血竭之類惟戴人不然曰古方中雖有此法奈病人服之必臍腹發痛飲食不進乃命止藥飲食稍進內經曰二陽之病發心脾心受之則血不流故女子不月既心受積熱宜抑火升水流濕潤燥開胃進食乃涌出痰一二升下泄水五六行濕水上下皆去血氣自行沸流月事不爲水濕所膈自依期而至矣亦不用虻蟲水蛭之類有毒之藥如用之則月經縱來小溲反閉他證生矣凡精血不足當補之以食大忌有毒之藥偏勝而成夭閼

月閉寒熱六十

一婦年三十四歲經水不行寒熱往來面色痿黃脣焦頰赤時欬三兩聲向者所服之藥黑神散烏金丸四物湯燒肝散鱉甲散建中湯寧肺散鍼艾百千病轉劇家人意倦不欲求治戴人憫之先涌痰五六升午前涌畢午後食進餘證悉除後三日復輕涌之又去痰一二升食益進不數日又下通經散瀉訖一二升後數日去死皮數重小者如麩片大者如葦膜不一月經水行神氣大康矣

惡寒實熱六十一

一婦身冷脉微食沸熱粥飯六月甫一衣以狐帽蒙其首猶覺寒泄注不止常服薑附硫黃燥熱之劑僅得

平和稍用寒凉其病轉增三年不愈戴人診其兩手脉皆如絙繩有力一息六七至脉訣曰六數七極熱生多以凉布搭心次以新汲水淋其病處婦乃叫殺人不由病者令人持之復以冷水淋其三四十桶大戰汗出昏困一二日而向之所惡皆除此法華元化已曾用拂無知者

遇寒手熱六十二

常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛戴人曰四肢者諸陽之本也當夏時散越而不痛及乎秋冬收斂則痛以三花神祐丸大下之熱遂去

嘔逆不食六十三

柏亭王論夫本因喪子憂抑不思飲食醫者不察以爲胃冷血燥之劑盡用之病變嘔逆而瘦求治于戴人一視涌泄而愈愈後忘其禁忌病復作大小便俱秘臍腹撮痛嘔吐不食一日大小便不通十有三日復問戴人戴人曰令先食葵羮菠薐菜猪羊血以潤燥開結次與導飲丸二百餘粒大下結糞又令恣意飲水數升繼搜風丸桂苓白朮散以調之食後服導飲丸三十餘粒不數日前後皆通藥止嘔定食進此人臨別又留潤腸丸以防復結又留滌腸散大閟則用之凡服大黄牽牛四十餘日方瘳論夫自歎曰向使又服向日熱藥已非今日人矣一僧問戴人云腸者湯也不暢何以此一句儒多

[illegible]癤六十四

一省掾背項常有痤癤愈而復生戴人曰太陽血有餘也先令涌泄之次於委中以鈹鍼出紫血病更不復作也

牙痛六十五

澤州李繼之忽病牙痛皺眉不語欒景先見之曰何不藥也曰牙痛藥曰曾記張戴人云陽明經熱有餘也宜大下之乃付舟車丸七十粒服畢遏數知交留

飲強飲熱酒數杯藥爲熱酒所發盡吐之吐畢而痛止李大笑曰戴人神仙也不三五日又痛再服前藥百餘粒大下數行乃愈

淋六十六

戴人過息城一男子病淋戴人令頓食鹹魚少頃大渴戴人令恣意飲水然後以藥下之立通淋者無水故澁也

口臭六十七

趙平尚家一男子年二十餘歲病口中氣出臭如發

厠雖親戚莫肯與對語戴人曰肺金本主腥金爲火所煉火主焦臭故如是也久則成腐腐者腎也此極熱則反兼水化也病在上宜涌之先以茶調散涌而去其七分夜用舟車丸濬川散下五七行比旦而臭斷嗚呼人有病口臭而終其老者世訛以爲肺系偏而與胃相通故臭妄論也

濕形

疝六十八

汝南司候李審言因勞役王事飲水坐濕地乃濕氣下行流入脬囊大腫痛不可忍以金鈴川楝子等藥

不效求治于戴人曰可服泄水丸審言惑之又數日痛不可堪竟從戴人先以舟車丸濬川散下青綠沫十餘行痛止次服茴香丸五苓以調之三日而腫退至老更不作夫疝者乃肝經也下青沫者肝之色也

水疝六十九

律科王敏之病水疝其法在於寒形中

留飲七十

郭敬之病留飲四日浮腫不能食脚腫連腎囊痛先以苦劑涌之後以舟車丸濬川散瀉之病去如拾遺

又棠谿張鳳村一田叟姓楊其病嘔酸水十餘年本留飲諸醫皆以燥劑燥之中脘臍胻以火艾燔鍼刺之疾未嘗合戴人以苦劑越之其涎如膠乃出二三升談笑而愈

黃疸七十一

蔡寨成家一童子年十五歲病疸一年面黃如金遍身浮腫乏力惟食鹽與焦物戴人以茶調散吐之涌涎一盂臨晚又以舟車丸七八十粒通經散三錢下四五行待六七日又以舟車丸濬川散下四五行鹽與焦物見而惡之面色變紅後再以茶調散涌之出痰二升方能愈矣

又一男子作贅偶病疸善食而瘦四肢不舉面黃無力其婦翁欲棄之其女子不肯曰我已生二子矣更適他乎婦翁本農者召婿意欲作勞見其病甚每日辱詈人教之用膽礬丸三稜丸了不關涉鍼灸祈禳百無一濟戴人見之不診而療使服涌劑去積痰宿水一斗又以泄水丸通經散下四五十行不止戴人命以冰水一盂飲之立止次服平胃散等間服檳榔丸五七日黃退力生蓋脾疸之證濕熱與宿穀相搏故也俗謂之金勞黃

又朱葛周黃劉三家各有僕病黃疸戴人曰僕役之

職飲食寒熱風暑濕寒暑常觸冒也恐雖調攝庶少
治功其二家留僕於戴人所從其飲餌其一僕不離
主人執役三人同服苦散以涌之又服三花神祐丸
下之五日之間果二僕愈而一僕不愈如其言

黃病七十二

菜寨一女病黃遍身浮腫面如金色困乏無力不思
飲餌惟喜食生物泥煤之屬先以苦劑蒸餅爲丸涌
痰一椀又舟車丸通經散下五七行如墨汁更以導
飲丸磨食散氣不數日肌肉如初

病發黃七十三

安喜趙君玉爲掾省日病發遍身黃往問醫者醫云
君乃陽明證公等與麻知幾皆受訓於張戴人是商
議喫大黃者難與論病君玉不悅歸自揣無別病乃
取三花神祐丸八十粒服之不動君玉乃誤曰予之
濕熱盛矣此藥尚不動以舟車丸濬川散作劑大下
一斗糞多結者一夕黃退君玉由此益信戴人之言

水腫七十四

南鄉張子明之母極肥偶得水腫四肢不舉戴人令
上涌汗而下泄之去水三四斛初下藥時以草貯布
囊高支兩足而卧其藥之行自腰以上水覺下行自
足以上水覺上行水行之狀如蛇走隧如綫牽四肢
森然涼寒會於臍下而出不旬日間病大減餘邪未
盡戴人更欲用藥竟不能從其言

涌水七十五

李七老病涌水證面黃而喘兩足皆腫按之陷而復
起行則濯濯有聲常欲飲水不能睡卧戴人令上涌
去痰而汗之次以舟車丸濬川散下之以益腎散復
下之以分陰陽利水道之劑復下之水盡皆瘥

停飲腫滿七十六

涿郡周敬之自京師歸鹿邑道中渴飲水過多漸成

腫滿或用三花神祐丸悼其太峻或用五苓散分利
水道又太緩淹延數多終無一效蓋粗工之技止於
此耳後手足與腎皆腫大小便皆秘澁常仲明求治
于戴人戴人令仲明付藥比及至已歿矣戴人曰病
水之人其勢如長川泛溢欲以杯勺取之難矣必以
神禹決水之法斯愈矣

濕痺七十七

常仲明病濕痺五七年矣戴人令上涌之後可瀉五
七次其藥則舟車濬川通經神祐益腎自春及秋必
十餘次方能愈公之病不畀鍼灸與令嗣皆宜涌但

臘月非其時也欲候春時恐于東適今姑屏病之大勢至春和時人氣在上可再涌之以去其根卒如所論矣

又一衲子因陰雨卧湿地一半手足皆不隨若遇陰雨其病轉加諸醫皆作中風偏枯治之用當歸芍藥乳香沒藥自然銅之類久反大便澁風燥生經歲不已戴人以舟車丸下三十餘行去青黃沫水五升次以淡劑滲泄之數日手足皆舉戴人曰夫風湿寒之氣合而成痺水痺得寒而浮畜於皮腠之間久而不去內舍六腑曰用去水之藥可也水湿者人身中之寒物也寒去則血行血行則氣和氣和則愈矣

又息帥病腰股沉痛行步坐馬皆不便或作脚氣寒湿治之或作虛損治之烏附乳沒活血壯筋骨之藥無不用之至六十餘日目赤上熱大小便澁腰股之病如故戴人診其兩手脉皆沉遲沉者為在裏也在裏者泄之以舟車丸濬川散各一服去積水二十餘行至早辰服齏白粥一二頓與之馬已能跨鞍矣

又宗室李十八郎病腰脚大不伸傴僂蹩躄而行已數年矣服藥無効止藥却愈因秋暮涉水病復作醫氏使服四斤丸其父李仲安乃乞藥于戴人戴人曰

近日服何藥仲安曰四斤丸公目昏赤未其父驚曰目正暴發戴人曰宜速來不來則喪明既來則策杖而行目腫無所見戴人先令涌之藥忽下走去二十行兩目頓明策已棄矣比再涌泄能讀官歷日調至一月令服當歸丸健步而歸家矣

又息城邊校白公以隆暑時飲酒覺極熱於涼水池中漬足使其冷也為湿所中股膝沉痛又因醉卧湿地其痛轉加意欲以酒解痛遂以連朝而飲反成赤痛發間止且六十年往往斷其寒溫脚氣以辛熱治之不効或使服神芎丸數服痛微減他日復飲疾作如前羈囊痒湿且腫硬臍下似有物難於行以此免軍役令人代之來訪戴人戴人曰余亦斷為寒湿但寒則陽火不行故為痛湿則經隧有滯故腫先以苦劑涌之次以舟車丸百餘粒濬川散四五錢微一兩行戴人曰如激剝尚不能攻何况于熱藥補之乎與日又用神祐丸百二十丸通經散三四錢是用僅得四行又來日以神祐八十丸投之續見一二行又次日服益腎散四錢舟車丸百餘粒約下七八行白公已覺膝睪寒者煖硬者軟重者輕也腫者亦退飲食加進又以涌之其病全瘳臨別又贈之以疏風丸併

以其方與之此公以其不肯妄服辛熱藥故可治也

屈膝有聲七十八

嶺北李文卿病兩膝臏屈伸有聲剝剝然或以為骨鳴戴人曰非也骨不妄鳴焉能鳴此筋湿也湿則筋急有獨緩者緩者不鳴急者鳴也若用予之藥一涌一泄上下去其水水去則自無聲矣李文卿乃從其言既而果然矣

白帶七十九

息城李左衙之妻病白帶如水窈漏中綿綿不絕穢臭之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷

起石硫黃薑附之藥重重燥補污水轉多常以袽日易數次或一藥以木炭十斤置藥在鉗鍋中鹽泥封固三日三夜炭火不絕燒令通赤名曰火龍丹服至數升污水彌甚焫艾燒鍼三年之間不可勝數戴人斷之曰此帶濁水本熱乘太陽經其寒水不可勝如此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃涌痰水二三升次日下泄水十餘行三遍汗出周身至明旦病人云污已不下矣次用寒凉之劑服及半載産一子内經曰少腹冤熱溲出白液帶之為病溶溶然若坐水中故治帶下同治湿法瀉痢皆宜逐水利小溲勿

以赤為熱白為寒今代劉河間書中言之詳矣

濕嗽八十

趙君玉妻病嗽時已十月矣戴人處方六味陳皮當歸甘草白术枳殼桔梗君玉疑其不類嗽藥戴人笑曰君怪無烏梅罌粟囊乎夫冬嗽乃秋之湿也湿土逆而為嗽此方皆散氣除湿解急和經三服帖然効矣

瀉兒八十一

一婦年三十四歲夜夢與鬼神交驚怕異常及見神堂陰府舟楫橋梁如此一十五年竟無娠孕巫所覡

禱無所不至鑽肌灸肉孔穴萬千黃瘦發熱引飲中滿足腫委命于天一日苦請戴人戴人曰陽火盛於上陰火盛于下鬼神者陰之靈神堂者陰之所舟楫橋梁水之用兩手寸脉皆沉而伏知胸中有痰實也凡三涌三泄三汗不旬日而無夢一月而有孕戴人曰余活婦人使有娠此法不誣

湿癬八十二

一女子年十五兩股間湿癬長三四寸下至膝發痒時爬搔湯火俱不解痒定黃赤水流痛不可忍灸焫薰揲硫黃藺茹白僵蚕羊蹄根之藥皆不効其人姿

性研巧以此病不能出嫁其父母求療于戴人戴人曰能從余言則瘥父母諾之戴人以鈹鍼磨令尖快當以痒時於癬上各刺百餘鍼其血出盡煎鹽湯洗之如此四次大病方除此方不書以告後人恐為癬藥所誤湿淫于血不可不砭者矣

又蔡寨成家童子一歲病滿腹腳湿癬毋爬搔則黃水出已年矣戴人先以苦末作丸上涌涌訖次以舟車丸濬川散下三五行次服凉膈加朴硝煎成時時呷之不數日而愈

湿䘌瘡八十三

潁皐韓吉卿自髀至足生湿䘌瘡大者如錢小者如豆痒則搔破水到則浸淫狀類虫行袴韈愈而復生瘢痕成凹一餘年不瘥戴人哂之曰此湿䘌瘡也由水湿而得故多在足下以舟車濬川大下十餘行一去如掃渠素不信戴人之醫至此大服

泄瀉八十四

古郾一講僧病泄瀉數年丁香豆蔻乾薑附子官桂烏梅等燥藥燔針燒脐焫脘無有闕者一日發將不省檀那贈紙者盈門戴人診兩手脉沉而有力脉訣云下利微小生者脉洪浮大者無瘥以瓜蒂散涌之

出寒痰數升又以無憂散泄其虛中之積及燥糞僅盈斗次以白术調中湯五苓散益元散調理數日僧已起矣非術精識明誰敢負荷如此

洞泄八十五

一講僧顯德明初聞家遭兵革心氣不足又為寇賊所驚得臟腑不調後入京不伏水土又得心氣以至危篤前後三年八仙丸鹿茸丸燒肝散皆服之不効乃求藥于戴人戴人曰此洞泄也以謀慮久不決而成肝主謀慮甚則乘脾久思則脾湿下流乃上涌痰半盆末後有血數點肝藏血故也又以舟車丸濬川散下數行仍使澡浴出汗自尔日勝一日常以胃風湯白术散調養之一月而强食復故矣

又李德卿妻因產後病泄一年餘四肢瘦乏諸醫皆斷為死證當時戴人在朱葛寺以舟載而乞治焉戴人曰兩手脉皆微小乃痢病之生脉況洞泄屬肝經肝木尅土而成此疾亦是腸澼澼者腸中有積水也先以舟車丸四五十粒又以無憂散三四錢下四五行寺中人皆駭之病羸如此尚可過耶衆人雖疑然亦未敢誚且更看之復導飲丸又過之渴則調以五苓散向晚使人伺之已起而緝牀前後約三四十年

以胃風湯調之半月而能行一月而安健由此因求
服德源之是仲歲大異之
又劉德源病洞泄逾年食不化肌瘦力乏行步欹傾
面色黧黑舉世治痢之藥皆用之無効適戴人治濾
陽往問之戴人乃出示內經洞泄之說雖不已疑然
畏其攻劑夜焚香禱神曰某以病久不瘥欲求治于
戴人戴人以謂宜下之欲不從戴人名醫也欲從之
形羸如此恐不任藥母已老矣無人侍養來日不得
已須服藥神其相之戴人先以舟車丸無憂散下十
餘行殊不困已頗喜食後以檳榔丸磨化其滯待數

日病已大減戴人以為去之未盡當以再服前藥德
源亦欣然請下之又下五行次後數日更以苦劑越
之往問其家彼云已下村中收索去也忽一日入城
面色極佳語言壯健但怪其跛足而立問何故如此
德源曰足上患一瘡戴人曰此裏邪去而於外病痊
之後凡病皆如是也

大便少而頻八十六

太康劉倉使病大便少而頻日七八十次常於兩股
間懸半枚瓠蘆如此十餘年戴人見之而笑曰病既
頻而少欲通而不得通也何不大下之此通因通用
也此一服藥之力乃與藥大下三十餘行頓止

暑泄八十七

殷輔之父年六十餘暑月病泄瀉日五六十行自建
碩鎮來請戴人于陳州其父喜飲二家人輩爭止之
戴人曰夫暑月年老津液衰少豈可禁水但勸之少
飲比及用藥先令速歸以菉豆雞卵十餘枚同煮卵
熟取出令豆軟下陳粳米作稀粥攪令寒食雞卵以
下之一二頓病減大半蓋粳米雞卵皆能斷痢然後
製抑火流濕之藥調順而方愈

腹滿面腫八十八

蕭令腹滿面足皆腫痰黃而喘急食減三年之間醫
者皆盡而不驗戴人以瓜蒂散湧之出寒痰三五升
以舟車丸濬川散下之青黃涎沫缶平年以桂苓白
朮散五苓散調之半月復舊矣

儒門事親卷之七

戴人張子和著
新安吳勉學校

燥形

臂麻不便八十九

郾城梁賈人年六十餘忽曉起梳髮覺左手指麻斯須半臂麻又一臂麻斯須頭一半麻比及梳畢從脇至足皆麻大便二三日不通往問他醫皆云風也或藥或鍼皆不解求治于戴人戴人曰左手三部脉皆伏比右手小三倍此枯澁痺也不可純歸之風亦有

火燥相兼乃命一涌一泄一汗其麻立已後以辛涼之劑調之潤燥之劑濡之惟小指次指尚麻戴人曰病根已去此餘烈也方可鍼谿谷谿谷者骨空也一日晴和往鍼之用靈樞中雞足法向上卧鍼三進三引訖復卓鍼起向下卧鍼送入指間皆然手熱如火其麻全去昔劉河間作原病式常以麻與澁同歸燥門中真知病機者也

大便燥結九十

戴人過曹南省親有姨表兄病大便燥澁無他證常不敢飽食飽則大便極難結實如鍼石或三五日一如圊目前星飛鼻中血出肛門連廣腸痛痛極則發昏服藥則病轉劇烈巴豆芫花甘遂之類皆用之過多則困瀉止則復燥如此數年遂畏藥性暴急不服但卧病待盡戴人過診其兩手脉息俱滑實有力以大承氣湯下之繼服神功丸麻仁丸等藥使食菠䔖葵菜及猪羊血作羹百餘日充肥親知見駭之嗚呼粗工不知燥分四種燥於外則皮膚皺揭燥於中則精血枯涸燥於上則咽鼻焦乾燥於下則便溺結閉夫燥之為病是陽明化也水液寒少故如此然可下之當擇之藥之巴豆可以下寒甘遂芫花可下濕大

黄朴硝可以下燥內經曰辛以潤之鹹以輭之周禮曰以滑養竅

孕婦便結九十一

戴人過東杞一婦人病大便燥結小便淋澁半生不娠惟常服踈導之藥則大便通利暫廢藥則結滯忽得孕至四五月間醫者禁踈導之藥大便依常為難臨圊則力努為之胎墜凡如此胎墜者三又孕已經三四月弦望前後溲溺結澁甘分胎隕乃訪戴人戴人診其兩手脉俱滑大脉雖滑大以其且妊不敢陡攻遂以食療之用花減煮菠菱葵菜以車前子苗作

如雜豬手血作羹食之半載居然生子其婦燥病方愈戴人曰余屢見孕婦利膿血下迫極努損胎但同前法治之愈者莫知其數也爲醫拘常禁不能變通非醫也非學也識醫者鮮是難說也

偏頭痛九十二

一婦人年四十餘病額角上耳上痛嗚呼爲偏頭痛如此五七年每痛大便燥結如彈丸兩目赤色眩運昏澁不能遠視世之所謂頭風藥餅子風藥白龍丸芎犀丸之類連進數服其痛雖稍愈則大便稍秘兩目轉昏澁其頭上鍼灸數千百矣連年著灸其兩目且將失明由病而無子一日問戴人戴人診其兩手脉急數而有力風熱之甚也余識此四五十年矣遍察病目者不問男子婦人患偏正頭痛必大便澁滯結硬此無他頭痛或額角是三焦相火之經及陽明燥金勝也燥金勝乘肝則肝氣鬱肝氣鬱則氣血壅氣血壅則上下不通故燥結於裏尋至失明治以大承氣湯令河水煎三兩加芒硝一兩煎殘頓令溫合作三五服連服盡蕩滌腸中垢滯結燥積熱下泄如湯二十餘行次服七宣丸神功丸以潤之菠薐葵菜豬手血爲羹以滑之後五七日十日但遇天道晴明

用大承氣湯夜盡一劑是痛隨利減也三劑之外目豁首輕燥澤結釋得三子而終

腰胯痛九十三

一男子六十餘病腰尻脊胯皆痛數載不愈晝靜夜躁大痛往來屢求自盡天年旦夕則痛作必令人以手槌擊至五更雞鳴則漸減向曙則痛止左右及病者皆作神鬼陰譴白虎齧朝禱暮祝覡巫僧道禁師至則其痛以減又夢鬼神戰鬬相擊山川神廟無不祭者淹延歲月肉瘦皮枯飲食減少暴怒日增惟候一死有書生曰既云鬼神虎齧陰譴之禍如此禱祈何無一應聞陳郡有張戴人精於醫可以問其鬼神白虎與病乎彼若術窮可以委命其家從之戴人診其兩手脉皆沈滯堅勁力如張絙謂之曰病雖瘦難於食然腰尻脊胯皆痛者必大便堅燥其左右曰有五七日或八九日見燥糞一兩塊如彈丸結硬不可言曾令人剜取之僅下一兩塊渾身燥痒皮膚皺揭枯澁如麩片戴人既得病之虛實隨用大承氣湯以薑棗煎之加牽牛頭末二錢不敢言是瀉劑蓋病者聞燥則悅聞寒則懼說補則從說瀉則逆此弊非一日也而況一齊人而傳之衆楚人咻之乎及煎成使

稍熱啖之從少至多累至三日天且晚臍腑下燕鳴五行約半盆以燈視之皆燥糞燥痺塊及瘀血雜臟穢不可近須臾痛減九分昏睡鼻息調如常人睡至明日將夕始覺饑而索粥溫涼與之又困睡一二日其痛盡去次令飲食調養日服導飲丸甘露散滑利便溺之藥四十餘日乃復嗚呼再傳三十六虎書三十六黃經及小兒三十六吊誰爲之耶始作俑者其無後乎古人以醫爲師故醫之道行今之人以醫辟奴故醫之道廢有志之士恥而不學病者亦不擇精粗一槩待之常見官醫迎送長吏馬前唱喏眞可羞

也由是通今博古者少而所傳遂絕靈樞經謂刺與汗雖久猶可拔而虛結與閉雖久猶可解而決去腰脊胯痛者足太陽膀胱經也胯痛足少陽膽經之所過也難經曰諸痛爲實內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火注曰心寂則痛微心燥則痛甚人見巫覡僧道禁師至則病稍去者心寂也然去其後來者終不去其本也古之稱痛隨利減不利則痛何由去病者既苦乃壽八十歲故凡燥結皆三陽病也

寒形

因寒腰強不能屈伸九十四

北人衛德新因之析津冬月飲寒則冷痛腰常直不能屈伸兩足沉重難於行步途中以牀舁之還程程醫皆云腎虛以蓯蓉巴戟附子鹿茸皆用之大便反秘潮熱上周將經歲矣乃乞拯於戴人戴人曰此疾十日之効耳衛曰一月亦非遲戴人曰足太陽經血多病則腰似折膕如結腨如裂太陽所至爲屈伸不利況腰者腎之府也身中之大關節今既強直而不利宜鹹以軟之頓服則和柔矣難經曰強力入房則腎傷而髓枯枯則高骨乃壞而不用與此用同今君之證太陽爲寒所遏血墜下滯腰間也

必有積血非腎也節次以藥可下數百行約去血一二斗次以九曲玲瓏竈蒸之汗出三五次而愈初蒸時至五日問曰腹中鳴否德新曰未也至六日覺鳴七日而起以能揖人戴人曰病有熱者勿蒸蒸則損人目也

寒疝亦名水疝九十五

律科王敏之病寒疝臍下結聚如黃瓜每發繞腰急痛不能忍戴人以舟車丸猪腎散下四五行覺藥繞病三五次而下其瀉皆水也猪腎甘遂皆苦寒經言以寒治寒萬舉萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食

乾物以寒疝本是水故也即日病減八分食進一倍又數日以舟車丸百餘粒通經散四五錢服之利下候三四日又服舟車丸七八十粒猪腎散三錢乃健步如常矣

一僧病疝發作冷氣上貫齒下貫腎緊若繩挽兩睾時腫而冷戴人診兩手脉細而弱斷之曰秋脉也此因金氣在上下伐肝木木畏金抑而不伸故病如是肝氣磐礴不能下榮於睾丸故其寒實非寒也木受金制傳之胃土胃為陽明故上貫齒病非齒之病肝木者心火之母也母既不伸子亦屈伏故下冷而水

化乘之經曰木鬱則達之土鬱則泄之令涌泄四次果覺氣和睾丸痒而暖戴人曰氣已入睾中矣以茴香木茂之藥使常服之首尾一月而愈

感風寒九十六

戴人之常谿也雪中冒寒入浴重感風寒遂病不起但使煎通聖散單服之一二日不食惟渴飲水亦不多飲時時使人捶其股按其腹凡三四日不食日飲水一二十度至六日有譫語妄見以調胃承氣湯下之汗出而愈戴人常謂人曰傷寒勿妄用藥惟飲水最為妙藥但不可使之傷常令揉散乃大佳耳至六七日見有下證方可下之豈有變異哉奈何醫者禁人飲水至有渴死者病人若不渴強與水飲亦不肯飲耳戴人初病時鼻塞聲重頭痛小便如灰淋汁及服調胃承氣一兩半覺欲嘔狀探而出之汗出漐漐然須臾下五六行大汗一日乃瘳當日飲冰水時水下則痰出約一二椀痰即是病也痰去則病去也戴人時年六十一

凍瘡九十七

戴人女僮足有寒瘍俗云凍瘡戴人令服舟車丸濬川散大下之其瘡遂愈人或疑之戴人曰心火降則

寒消何疑之有

寒痰九十八

一婦人心下臍上結硬如斗按之如石人皆作病胎鍼灸毒藥禱祈無數如捕風然一日戴人見之曰此寒痰診其兩手寸脉皆沉非寒痰而何以瓜蔕散吐之連吐六七升其塊立消過半俟數日後再吐之其涎沫類雞黃腥臭特殊約二三升凡如此者三後以人參調中湯五苓散調之腹已平矣

濡利惡寒九十九

東門一男子病濡利不止腹鳴如雷不敢冷坐坐則

下法矣俗諸醫例斷爲寒證乾薑官桂丁香豆蔻之屬枯礬龍骨皆服之矣何以不瘥何以不效遷延將二十載矣一日問于戴人戴人曰兩手寸脉皆滑余不以爲寒然其所以寒者水也以茶調散涌寒水五七升無憂散泄積水數十行乃通因通用之法也次以五苓散淡劑滲泄利之道又以甘露散止渴不數日而冷食寒飲皆如故此法王啓玄稔言之矣奈無人用之哉

內傷形

因憂結塊一百

息城司候聞父死于賊乃大悲哭之罷便覺心痛日增不已月餘成塊狀若覆杯大痛不住藥皆無功議用燔鍼炷艾病人惡之乃求于戴人戴人至適巫者在其傍乃學巫者雜以狂言以謔病者至是大笑不忍回面向壁一二日心下結塊皆散戴人曰內經言憂則氣結喜則百脉舒和又云喜勝悲內經自有此法治之不知何用鍼灸哉適足增其痛耳

病怒不食一百一

項關令之妻病怒不欲食常好叫呼怒罵欲殺左右惡言不輟衆醫皆處藥幾半載尚爾其夫命戴人視之戴人曰此難以藥治乃使二娼各塗丹粉作伶人狀其婦大笑次日又令作角牴又大笑其旁常以兩個能食之婦誇其食美其婦亦索其食而爲一嘗之不數日怒減食增不藥而瘥後得一子夫醫貴有才若無才何足應變無窮

不寐一百二

一富家婦人傷思慮過甚二年不寐無藥可療其夫求戴人治之戴人曰兩手脉俱緩此脾受之也脾主思故也乃與其夫以怒而激之多取其財飲酒數日不處一法而去其人大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寤自是而食進脉得其平

驚一百三

衛德新之妻旅中宿于樓上夜值盜劫人燒舍驚墮牀下自後每聞有響則驚倒不知人家人躡足而行莫敢冒觸有聲歲餘不痊諸醫作心病治之人參珍珠及定志丸皆無效戴人見而斷之曰驚者爲陽從外入也恐者爲陰從內出驚者爲自不知故也恐者自知也足少陽膽經屬肝木膽者敢也驚怕則膽傷矣乃命二侍女執其兩手按高椅之上當面前下置一小几戴人曰娘子當視此一木猛擊之其婦大

驚戴人曰我以木擊几何以驚乎伺少定擊之驚也
緩又斯須連擊三五次又以杖擊門又暗遣人畫背
後之窗徐徐驚定而笑曰是何治法戴人曰內經云
驚者平之平者常也平常見之必無驚是夜使人擊
其門窗自夕達曙夫驚者神上越也從下擊几使之
下視所以收神也一二日雖聞雷亦不驚德新素不
喜戴人至是終身厭服如有人言戴人不知醫者執
戈以逐之

兒寐不寤一百四

陳州長吏一小兒病寐而不寤一日諸醫作睡驚治

之或欲以艾火灸之或以大驚丸及水銀餅子治之
其父曰此子平日無疾何驟有驚乎以子之病乃問
于戴人戴人診其兩手脈皆平和戴人曰若驚風之
脈當洪大而強今則平和非驚風也戴人竊其乳母
爾三日前曾飲醉酒否遽然笑曰夫人以煮酒見餉
酒味甚美三飲一器而睡陳酒味甘而戀膈酒氣滿
乳兒亦醉也乃剉甘草乾葛花縮砂仁貫衆煎汁使
飲之立醒

孕婦下血一百五

劉先生妻有娠半年因傷損下血乞藥于戴人戴人
診之以三和湯一名玉燭散承氣湯四物湯對停加
朴硝煎之下數行痛如手拈下血亦止此法可與智
識高明者言高梁之家慎勿舉似非徒駭之抑又謗
之嗚呼正道難行正法難用古今皆然

收產傷胎一百六

一孕婦年二十餘臨產召穩媼三人其二媼極拽婦
之臂一其媼頭抵婦之腹更以兩手扳其腰極力爲
之胎死于腹良久乃下兒亦如血乃穩媼殺之也豈
知瓜熟自落何必如此乎其婦因茲經脈斷閉腹如
刀剜大渴不止小溲閟絕主病者禁水不與飲口舌

枯燥牙齒黧黑臭不可聞食飲不下昏憒欲死戴人
先以冰雪水恣意飲之約二升許痛緩渴止次以舟
車丸通經散前後五六服下數十行食大進仍以桂
苓甘露散六一散柴胡飲子等調之半月獲安
又一婦人臨產召村嫗數人侍爲先產一臂出嫗不
測輕重拽之臂爲之斷子死于腹其母面青身冷汗
漐漐不絕時微喘嗚呼病家甘于死忽有人曰張戴
人有奇見試問之戴人曰命在須臾鍼藥無及急取
秤鈎續以壯繩以膏塗其鈎令其母分兩足向外偃
坐左右各一人腳上立足次以鈎其死胎命一壯力

扶脇身按出死胎下敗血五七升其母昏困小柴
少頃以氷水灌之漸醒二日大醒食進次日四物湯
調血數日方愈戴人常曰産後無他事因侍婢非其
人轉爲害耳

懷恐脇痛一百七

洛陽孫伯英因誣獄妻子被繫逃于故人是夜覺胃
脘痛託故人求藥故人曰有名醫張戴人適在焉當
與公同往時戴人宿酒未醒强呼之故人曰吾有一
親人病欲求診戴人隔窻望見伯英曰此公伏大驚
恐故人曰何以知之戴人曰面青脫色膽受怖也後
會赦乃出方告戴人

背疽一百八

一富家女子十餘歲好食紫櫻每食即二三斤歲歲
如此至十餘年一日潮熱如勞戴人診其兩手脉皆
洪大而有力謂之曰他日必作惡瘡腫毒熱上攻目
陽盛陰脫之證其家大怒不肯服解毒之藥不一二
年患一背疽如盤痛不可忍其女忽思戴人曾有是
言再三悔過請戴人戴人以鈹鍼繞疽節刺數百鍼
去血一斗如此三次漸漸痛減腫消微出膿而斂將
作痂時使服十補内托散乃痊終身忌口然目亦昏

亡身無子

肺癰一百九

汝永一富家有二子長者年十三歲幼者十一歲
好食紫櫻一二斤每歲須食半月後一二年幼者
發肺癰長者發肺痿相繼而死戴人常歎曰人之死
者命耶天耶古人有詩爽口味多終作疾眞格言也
夫生白果所以養人非欲害人然富貴之家失教縱
欲遂至於是

咽中刺塞一百十

戴人過隱陽强家一小兒約五六歲同隊小兒以蜀
黍楷相擊逆芒倒刺於咽中數日不下粥藥腫大發
其家告戴人戴人命取水依道經中呪水法以左手
屈中指及無名指作三山印坐水盞于其上右手指
印文是金鎗印脚踏丁字立望太陽或燈火取氣一
口吹在淨水盞中呪曰吾取老君東流順老君奉勅
攝去毒水吾托大帝尊所到稱吾者各各現帝身急
急如律令攝念七遍吹在盞中虛攪三次爲定其
兒嚥水下咽曰我可也二五日腫散乃知法亦有不
可侮者

誤吞物咽中一百十一

一小兒誤吞一錢在咽中不下諸醫皆不能取亦不能下乃命戴人戴人熟思之忽得一策以淨白表紙令卷實如箸以刀縱橫亂割其端作鬅鬙之狀又別取一箸縛針鉤於其端令不可脫先下咽中輕提輕抑一探之覺鉤入於錢竅然後以紙卷納之咽中與鉤尖相抵覺鉤尖入紙卷之端不礙肌肉提之而出

腸澼下血一百十二

棠谿欒彥剛病下血醫者以藥下之默默而死其子企見戴人而問之曰吾父之死竟無人知是何證戴人曰病剉其心也心主行血故被剉則血不禁若血溫身熱者死火數七死必七日治不當下若下之不滿數企曰四日死何謂病剉心戴人曰智不足而強謀力不足而強與心安得不剉也欒初與邪爭屢不勝遂得此病企由是大服拜而學醫

水腫睪丸一百十三

霍秀才之子年十二歲睪丸一旁腫腿戴人見之曰此因驚恐得之驚之爲病上行則爲嘔血下則腎傷而爲水腫以琥珀通經散一瀉而消散

伏驚一百十四

上渠卜家一男子年二十八歲病身弱四肢無力面色蒼黃左脇下身側上下如臂狀每發則痛無時食不減大便如常小便微黃已二三載矣諸醫計窮求戴人治之視其部分乃足厥陰肝經兼足少陽膽經也張曰甲膽乙肝故青其黃者脾也診膽脈小此因驚也驚則膽受邪腹中當有驚涎綠水病人曰昔曾也車被火自是而疾戴人夜以舟車百五十丸濬川散四五錢加生薑自然汁平旦果下綠水四五行或問大加生薑何也答曰辛能伐木也下後覺微痛令再下之比前藥減三之一又下綠水三四行痛止思食反有力戴人謂卜曰汝妻亦當病卜曰太醫未見

吾妻何以知之曰爾感此驚幾年矣卜省曰當被火時我正在草堂中熟寐人驚喚我睡中驚不能言火已塞門我父拽出我火中今五年矣張曰汝膽伏火驚甲乙乘脾土是少陽相火乘脾脾中有熱故能食而殺穀熱雖能化穀其精氣不完汝必無子蓋敗經反損婦人汝妻必手足熱四肢無力經血不時卜曰吾妻實如此亦已五年矣他日門人因觀內經言先瀉所不勝次瀉所勝之論其法何如以問張張曰且如膽木乘胃土此土不勝木也不勝之氣尋救于子已土能生庚金庚爲大腸味辛者爲金故大加生薑

伐伐木然先不開脾土無由行也遂用舟車丸先
其閉塞之路是先瀉其所不勝後用薑汁調濬川散
大下之次瀉其所勝也大抵陽干尅陽干腑尅腑臟
尅臟

外傷形

孕作病治一百十五

一婦人年四十餘得孕自以爲年衰多病故疾復作以告醫氏醫者不察加燔鍼於臍兩旁又以毒藥致磨轉轉腹痛食減形羸巳在床枕來問戴人戴人診其脉曰六脉皆平惟右尺洪大有力此孕脉也兼擇

食爲孕無疑左右皆笑之不數月生一女子兩目下各有燔鍼痕幾喪其明凡治病婦當先問娠不可倉卒矣

杖瘡一百十六

戴人出遊道經故息城見一男子被杖瘡痛焮發毒氣入裏驚涎堵塞牙禁不開粥藥不下前後月餘百治無功甘分於死戴人先以三聖散吐青蒼驚涎約一大半次以利膈丸百餘粒下臭惡燥糞又一大盆通聖散數錢熱服之更以酸辣葱醋湯發其汗汗吐交出其人活矣此法可以救冤

落馬發狂一百十七

一男子落馬發狂起則目瞪狂言不識親疎棄衣而走罵言涌出氣力加倍三五人不能執縛燒符作醮問鬼跳巫殊不知顛丹砂牛黃犀珠腦麝資財散去室中蕭然不遠二百里而求戴人一往戴人以車輪埋之地中約高二丈許上安之中等車輪其輞上鑿一穴如作盆之狀縛狂病人於其上使之伏臥以軟裀襯之又令一人於下坐機一枚以捧攪之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斗許繞車輪數匝其病人曰我不能任可解我下從其言而解之索凉水與之氷水飲數升狂方罷矣

太陽脛腫一百十八

麻先生兄村行爲犬所嚙舁至家脛腫如罐堅若鐵石毒氣入裏嘔不下食頭痛而重往問戴人女僮曰痛隨利减以槟榔丸下之見兩行不瘥適戴人自舞陽回謂麻曰脛腫如此足之二陰三陽可行乎麻曰俱不可行如是何不大下之乃命夜臨臥服舟車丸百五十粒通經散三四錢比至夜半去十曰行腫立消作胡桃紋反細於不傷之脛戴人曰慎勿貼膏紙當令毒氣出流膿血水常行又一日戴人恐毒氣未

盡又服舟車丸百餘粒濬川散三四錢見六行病人門十四行易當六行反難何也戴人曰病盛則勝藥病衰則不勝其藥也六日其膿水盡戴人曰膿水行時不畏風盡後畏風也乃以愈風餅子日三服之又三日方與生肌散一傅之而成痂嗚呼用藥有多寡使差別相懸向使不見戴人則利減之言非也以此知知醫已難用醫尤難

足閃肭痛一百十九

谷陽鎮酒監張仲溫謁一廟觀匠者砌露臺高四尺許因登之下臺或肭一足外踝腫起熱痛如火一醫

欲以鈹鍼刺腫出血戴人急止之曰肭已痛矣更加鍼二痛俱作何以忍也乃與神祐丸八九十丸下二十餘行禁食熱物夜半腫處發痒痛止行步如常戴人曰吾之此法十治十愈不誑後人

膝肭跛行一百二十

葛塚馮家一小兒七八歲膝被肭跛行行則痛數月矣聞戴人不醫令人問之戴人曰小病耳教來是夜以舟車丸通經散温酒調而下之夜半涌泄齊行上吐一椀下泄半缶既上牀其小兒爲母曰膝膕痒不可往來日使服烏金丸壯其筋骨一月疾愈而走矣

杖瘡入水一百二十一

小渠袁三因强盜入家傷其兩胻外臁作瘡數年不已膿血常涓涓然但飲冷則瘡間冷水浸淫而出延爲濕瘡來求治于戴人曰爾中焦當有緑水二三升涎數掬袁曰何也戴人曰當被盜時感驚氣入腹驚則膽傷足少陽經也兩外臁皆少陽之部此膽之甲木受邪甲木色青當有緑水少陽在中焦如漚既成爲涎在中焦飲冷水嚥爲驚涎所阻水隨經而旁入於中故飲水則瘡中水出乃上涌寒痰汗如流水必下緑水果二三升一夕而瘡乾真可怪也

儒門事親卷之七

儒門事親卷之八

戴人張子和著
新安吳勉學校

内積形

傷冷酒一百二十二

戴人出遊道經陽夏問一舊友其人病已危矣戴人往視之其人曰我別無病三年前當隆暑時出村野有以煮酒餽予者適村落無湯器令飲數升便覺左脇下悶漸痛結硬至今不散鍼灸磨藥殊不得効戴人診其兩手脉俱沉實而有力先以獨聖散吐之一涌二三升色如煮酒香氣不變後服和脾散去濕藥五七日百脉冲和始知鍼灸無功增苦楚矣

心下沉積一百二十三

顯慶寺僧應公有沉積數年雖不卧牀枕每於四更後心頭悶硬不能安卧須起行寺中習以為常人莫知為何病以藥請于戴人戴人令涌出膠涎一二升如黒礬水繼出黄綠水又下膿血數升自爾胸中如失巨山飲餌無算安眠至曉

茶癖一百二十四

一緇侶好茶成癖積在左脇戴人曰此與肥氣頗同

然瘧不作便非肥氣雖病十年不勞一日況兩手脉沉細有積故然吾治無鍼灸之苦但小惱一餉享壽盡期先以茶調散吐出宿茶水數升再以水如意揃之又涌數升皆作茶色次以三花神祐丸九十餘粒是夜瀉二十餘行膿水相兼燥糞瘀血雜然而下明日以除濕之劑服十餘日諸苦悉蠲神清色瑩

腹脹水氣一百二十五

蹙踘張承應年幾五十腹如孕婦面黄食減欲作水氣或令服黄芪建中湯及温補之劑小溲涸閉從戴人療焉戴人曰建中湯攻表之藥也古方用之攻裏已誤也今更以此取積兩重誤也先以涌劑吐之置火於其旁大汗之次與猪腎散四錢以舟車丸引之下六缶殊不困續下兩次約三十餘行腹平軟健啖如昔常仲明曰向聞人言瀉五六缶人豈能任及聞張承應渠云誠然乃知養生與攻痾本自不同今人以補劑療病宜乎不効

痎氣一百二十六

王亭村一童子入門狀如鞠恭而行戴人曰痎氣也令解衣揣之二道如臂其家求療于戴人先刺其左如刺重紙剝然有聲而斷令按磨之立軟其右亦然

觀者感嘆異之或問曰石關穴也

胸膈不利一百二十七

沈丘王宰妻病胸膈不利口流涎沫自言咽下胃中常雷聲心間作微痛又復發昏胸乳之間灸瘢如碁化痰利膈等藥服之三載病亦依然其家知戴人痰藥不損來求之一涌而出雪白虫一條長五六寸有口鼻牙齒走於涎中病者忿而斷之中有白髮一莖此正與徐文伯所吐宮人髮瘕一同虫出立安

冷疾一百二十八

戴人過醮都營中飲會鄰席有一卒說出妻事戴人問其故答曰吾婦爲室女心下有冷積如覆杯按之如水聲以熱手熨之如水聚來已十五年矣恐斷我嗣是故棄之戴人曰公勿黜也如用吾藥病可除孕可得卒從之戴人診其脉沈而遲尺脉洪大而有力非無子之候也可不踰年而孕其良人笑曰試之先以三聖散吐涎一斗心下平軟次服白术調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣血合度數月而娠二子戴人常曰用吾此法無不子之婦此言不誣矣

積塊一百二十九

果菌劉子平妻腹中有塊如瓢十八年矣經水斷絕

諸法無措戴人令一月之內涌四次下六次所去痰約一二桶其中不化之物有如葵菜者爛魚腸之狀涌時以木如意揃之覺病積如刮漸漸而平及積之旣盡塊痕反窪如臼略無少損至是而面有童色經水旣行若當年少可以有子

肥氣積一百三十

陽夏張主簿之妻病肥氣初如酒杯大發寒熱十五餘年後因性急悲感病益甚惟心下三指許無病滿腹如石片不能坐臥鍼灸匝矣徒勞力耳乃敬邀戴人而問之旣至斷之曰此肥氣也得之季夏戊巳日在左脇下如覆杯久不愈令人發痎瘧痎瘧者寒熱也以瓜蒂散吐之魚腥黃涎約一二缶至夜繼用舟車丸通經散投之五更黃涎膿水相半五六行凡有積處皆覺痛後用白术散當歸散和血流經之藥如斯涌泄凡三四次而方愈

伏瘕一百三十一

汴梁曹大使女年既笄病血瘕數年太醫宜企賢以破血等藥治之不愈企賢曰除得陳州張戴人方愈一日戴人承語至汴京曹大使乃邀戴人問焉戴人曰小腸遺熱於大腸爲伏瘕故結硬如塊面黃不月乃

用涌泄之法數年之疾不再旬而効女由是得聘今之
賢問誰治之曹大使曰張戴人企賢立使人邀之

停飲一百三十二

一婦從年少時因大哭罷痛飲冰水困卧水停心下漸發痛悶醫氏咸以為冷積治之以温熱劑及禁食冷物一聞茶氣病輒内作如此數年燎鍼燒艾瘡孔數千十餘年後小便赤黄大便秘悶兩目加昏積水轉甚流於兩脇世謂水癖或謂支飲硇漆稜茂攻磨之藥竟施之矣食日衰積日茂上至鳩尾旁至兩脇及臍下但發之時按之如水聲心腹結硬手不可近

者月發五七次甚則欲死諸藥皆厭二十餘年求戴人發藥診其脉寸口獨沉而遲此胸中有痰先以瓜蔕散涌痰五七升不數日再越痰水及斗又數日上涌數升凡三涌三下汗如水者亦三其積皆去以流濕飲之藥調之月餘大瘥

積氣一百三十三

寄西華縣庠山東顏先生有積二十年目覗物不真細字不覩當心如頑石每發痛不可忍食減肉消黑䵟滿面腰不能直因遇戴人令涌寒痰一大盂如片粉夜以舟車丸通經散下燭魚腸葵菜汁七八行病十去三四以熱漿粥投之復去痰一盆次日又以舟車丸通經散前後約百餘行略無少困不五六日面紅䵟去食進日明心中空曠遂失頑石所在旬日外來謝

沉積疑胎一百三十四

脩弓杜匠其子婦年三十有孕已歲半矣每發痛則召侍媪待之以為將產也一二日復故凡數次乃問戴人戴人診其脉濇而小斷之曰塊病也非孕也脉訣所謂濇脉如刀刮竹形主丈夫傷精女人敗血治之法有病當瀉之先以舟車丸百餘粒後以調胃

承氣湯加當歸桃仁用河水煎乘熱投之三兩日又以舟車丸桃仁承氣湯瀉青黄膿血雜然而下每更衣以手向下推之揉之則出後三二日又用舟車丸以猪腎散佐之一二日又以舟車丸通經如前數服病十去九俟晴明當未食時以鍼瀉三陰交穴不再旬塊已没矣此與膈腹覗五臟者復何異哉

是胎非積一百三十五

霍王之妻病臍下積塊呕食面黄肌瘦而不月或謂之乾血氣治之無効戴人見之曰孕也其人不信再三求治于戴人與之平藥以應其意終不肯下毒藥

後月到果胎也人問何以別之戴人曰尺脉洪大也
素問陰陽別論所謂陰搏陽別之脉

外積形

瘤一百三十六

戴人在西華衆人皆訕以爲吐瀉一日魏壽之與戴人入食肆中見一夫病一瘤正當目之上網內皆色如灰李下垂覆目之睛不能視物戴人謂壽之曰吾不待食熟立取此瘤魏未之信也戴人曰吾與爾取此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割別有一術焉其人從之乃引入一小室中令俛卧一

牀以繩束其胻刺乳中大出血先令以手揉其目瘤上亦刺出雀糞立平出戶壽之大驚戴人曰人之有技可盡窺乎

膠瘤一百三十七

郜城戴人之鄉也一女子未嫁年十八兩手背皆有瘤一類雞距一類角丸腕不能釧向明望之如桃膠然夫家欲棄之戴人見之曰在手背爲膠瘤在面者爲粉瘤此膠瘤也以鈹鍼十字刺破按出黄膠膿三兩匙立平瘤核更不再作婚事復成非素明者不敢用此法矣

癭一百三十八

新寨婦人年四十餘有癭三瓣戴人令以鹹吐之三涌三汗三下癭已半消次服化癭之藥遂大消去夫病在上者皆宜吐亦自有消息之法耳

痔一百三十九

趙君玉常病痔戲眼草刺蝟皮槐根貍首之類皆用之或以乾蟾作末塗猪肉炙食之人便燥結不利此痛後數日因病黄大涌瀉數次不言痔作麻先生偶說而書之君玉自識戴人之後痔更不發耳

儒門事親卷之八

儒門事親卷之九

戴人張子和著
新安吳勉學校

雜記九門

誤中涌法　嗽

張板村鹿子春一小兒七八歲夏月病嗽羸甚戴人欲涌之子春以為兒幼弱懼其不勝少難之一日因飲酒家人與之酒傷多乃大吐吐定而嗽止蓋酒味苦苦屬涌劑子春乃大悟戴人之言也

疥

一貨生藥焦百善云有荛夫來買苦參欲治疥不識藥性緩急但聞人言可治遂煎一挑服之須臾大吐涎一盆三二日疥作痂矣

赤目

一小兒名德孫眼發赤其母買銅碌欲洗兒目煎成家人誤與兒飲之須臾大吐吐訖立開

感風寒

焦百善偶感風寒壯熱頭痛其巷人點蜜茶一椀使啜之焦因熱服之訖偶思戴人語曰凡苦味皆能涌百善兼頭痛是病在上試以筯探之卑其痛立解

誤中寒涼　經閉

一婦人年二十餘歲病經閉不行寒熱往來欬嗽潮熱庸醫禁切無物可食一日當暑出門忽見賣凉粉者以冰水和飲大為一食頓覺神清骨健數月經水自下

下血

一男子臟毒下血當六月間熱不可堪自甘於死忽思冰蜜水猛捨性命飲一大盂痛止血住

痢

一男子病膿血惡痢痛不可忍忽見水浸甜瓜心酷

喜之連皮食數枚膿血皆已人言下痢無正形是何言也人止知痢是虛冷溫之溫之澁之截之此外無術矣豈知風暑火濕燥寒六者皆為痢此冰蜜甜瓜所以效也

臨變不惑　涌法

戴人在西華夏公宅其僕郝瘻病法當吐命女僮下藥藥失不製又用之又多涌之不出反昏亂不醒乃告戴人戴人令以薪實中欄其半舁郝瘻臥其上倒垂其頭須臾大吐吐訖而快戴人曰先宜少進不涌旋加

西華一老夫病法當吐令門人欒景先下藥景先初學其人不吐反下走二行乃告戴人戴人令取溫虀汁飲二椀再下涌藥一錢以雞翎探之乃吐既藥行方大吐吐訖又安戴人曰凡用吐藥先以虀汁一椀橫截之藥既咽下待少頃其雞翎勿令離口酸苦鹹雖能吐人然不撩何由出也

李仲安宅四婦人病同日下涌劑置燠室中火兩盆其一婦人發昏眾人皆驚戴人笑曰內火見外火故然耳之門外使飲氷雪水立醒時正雪晴戴人曰熱見寒則醒眾由是皆服非老手識練必不能鎮眾人之驚也

涌嗽

楊壽之妻病嗽十餘年法當吐之一日不止以麝香湯止之夜半猶不定再止之明旦頗覺惡心更以人參湯止之二日稍寧自下藥凡三來問戴人不顧謂欒景先曰病久嗽藥已擒病自然遲解涌後調理數日乃止戴人常言涌後有頓快者有徐快者有反悶悶者病未盡也有反熱者不可不下也大抵三日後無不快者凡下不止者以氷水解之凡藥熱則行寒則止矣

當禁不禁　病愈後犯禁而死

孟太亨病腫既平當節食及鹽血房室等不慎病再適戴人歸家無救之者乃死

鄖城董德固病勞嗽戴人曰愈後當戒房事其病愈恃其安觸禁而死死後妻生一子正當病瘥之日也董初堅諱至是乃彰

一宦家小兒病痢自郾頭車載至朱葛寺入門而死戴人曰有病遠行不可車載馬馱病已擾矣又以車馬動搖之是為重擾其即死

陽夏韓氏為犬所嚙大痛不可忍偏癢燥自庄頭載至家二十里一夕而死時人皆不知車之誤也戴人

常言傷寒之後忌葷肉房事勞水腫之後禁房及油鹽滋味等三年滑泄之後忌油膩此三者決不可不禁也戴人常曰病久否閉忽得涌泄氣血冲和心腎交媾陽事必舉尤切戒房室元氣新至犯之則病再作恐罪於涌泄

不忌反忌　不忌口得愈

一男子病泄十餘年豆蔻阿膠訶子龍骨烏梅枯礬皆用之矣中脘臍下三里歲歲灸之皮肉皴槁神昏足腫泄如泔水日夜無度戴人診其兩手脈沉且微

曰生也病人忽曰羊肝生可食乎戴人應聲曰羊肝止泄尤宜服病人悅而食一小盞許可以漿粥送之病人飲粥數口幾半升續又食羊肝生一盞許次日泄幾七分加此月餘而安此皆忌口太過之罪也戴人常曰胃爲水穀之海不可虛怯虛怯則百邪皆入矣或思葷茹雖與病相反亦令少食圖引漿粥此權變之道也若專以淡粥責之則病人不悅而食減久則病增損命世俗誤人矣

不可忌口

戴人常曰臟毒酒毒下血嘔血婦人三十已下血閉

六月七月間膿血惡痢疼痛不止婦人初得孕擇食者已上皆不忌口

高技常孤

戴人常曰人言我不接衆工戴人曰余豈不欲接人但道不同不相爲謀醫之善惟素問一經爲祖有平生不識其面者有看其文不知其義者此等雖曰相親欲何說止不過求一二藥方而已矣大凡藥方前人所以立法病有百變豈可執方設於富貴之家病者數工同治戴人必不能從衆工衆工亦不能從戴人以此常孤惟書生高士推者復來曰不離門戴人

又曰我之術止可以教書生不能受醫者忽授老書生曰我是書生豈不知書生固多許可以易慢戴人問之曰彼未嘗見予治病故有是言若親見予治病數十人自反思矣凡謗我者皆望風取信於群醫之口也孔子曰浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂明也已矣

群言難正　謗吐

或言人有病不可吐人身骨節皆有涎若吐出骨節間涎令人偏枯戴人問之曰我之藥止是吐腸胃間久積或腹肓間宿沫皆是胃膈中溢出者天下與一

理也但病有上下故用藥有逆順耳

謗三法

或言戴人汗下吐三法欲該天下之醫者非也夫古人醫法未備故立此三法後世醫法皆備自有成說豈可廢後世之法而從遠古譬猶上古結繩今日可廢書契而從結繩乎戴人問之曰易之法雖多不離八卦五行刑章雖多不過笞杖徒流岐伯曰知其要者一言而終然則岐伯亦誑人乎大抵舉綱則簡計目則繁

謗峻藥

或言戴人用醫皆峻激乃本草中下品藥也豈可服哉戴人曰甚矣人之不讀書本草言上藥爲君中品爲臣下品爲佐使者所以辯其性剛柔也內經言所謂君臣佐使者非本草中三品之謂也主治之爲君次君之謂臣應臣之爲佐使假如大黃能治此病則大黃爲君甘遂能治此病則甘遂爲君矣若專以人參黃耆治人之邪氣此庸工所以常誤人命也李嗣榮言京中閒人云戴人醫殺二婦遂辭太醫之職而去又有人云昔曾醫殺潁守私遁而去麻知幾初聞亦疑之乃載見戴人于潁陽觀其用藥百發百中論

議該贍應變無窮其所治之疾則不三二十年即十年或五六年應手輒愈群醫之領袖無以養生及其歸也謗言滿市皆曰戴人醫殺倉使耿四而去時倉使以病卒與余未嘗通姓名耿曰病嗽咯血曾問戴人戴人曰公病消困不可峻攻宜以調養戴人已去後而卒矣麻先生乃肖李嗣榮所言皆誣也凡余所治之病皆衆壞之證將危且死而治之死則當怨於戴人又戴人所論按經切理衆誤皆露以是嫉之又戴人治病多用峻激之藥將愈未愈之間適戴人去群醫毀之曰病爲戴人攻損急補之遂用相反之藥如病愈則我藥可久服攻疾之藥可暫用我方攻疾豈欲常服哉疾去則止藥若果欲養氣五穀五肉五菜非上藥耶亦安在枯草死木之根核哉

病人負德愈後吝財

南鄉刁鍋工衛氏病風半身無汗已再中矣戴人以三法療之尋愈恐其求報乃紿曰余夜夢一長髯人鍼余左耳故愈巫者武媼年四十病勞三年羸瘦不足觀諸醫技絕適五六月間求治願奉白金五兩戴人治之五六日而安止答曰白金三兩乃曰一道士投我一符焚而吞之乃痊如此等人不可勝計若病

再作何以求治至有恥前言而不敢復求治療而殺其身者此所以世之庸工常於病時以犀珠龍麝丁沉木乳乘其急而巧取之然兆于傳受賢愚亦不當効若輩也

同類妬乎　群口誣戴人

有扶救之功如死我則有攻擊之罪明者不可不察也麻徵君常見他醫言戴人能治奇病不能治常病能治雜病不能治傷寒他日見戴人問以傷寒事超然獨出仲景言外之意謂余曰公慎勿殢仲景紙上語惑殺世人余他日再讀仲景方省其旨戴人云人

仲景傷寒疫氣動時輒避日去傷寒多變須朝夕再視若十人病已不能給况闔邪之中皆親故人乎其死生常在六七日之間稍不然視别發矣以此他醫咸誚之以爲不能治傷寒蓋去常窺其涯涘浪稱之醫云

儒門事親卷之九

難素撮要究治識病用藥之圖

太易 未見氣也

太初 氣之始也

太極

太始 形之始也

太素 質之始也

甲膽　乙肝　丙小腸　丁心　戊胃　己脾　庚大腸　辛肺　壬膀胱　癸腎

三焦 寅相火 手少陽

大腸 卯燥金 手陽明

小腸 辰寒水 手太陽

包絡 巳風木 手厥陰

心 午君火 手少陰

肺 未濕土 手太陰

膽 申相火 足少陽

胃 酉燥金 足陽明

膀胱 戌寒水 足太陽

肝 亥風木 足厥陰

腎 子君火 足少陰

脾 丑濕土 足太陰

從其氣則和　違其氣則病

是動則病者氣之所感也

天之邪感則害人五臟肝心脾肺腎實而不滿可下之而已也

水穀之寒熱感則害人六腑膽胃三焦膀胱大腸小腸滿而不實可吐之而已也

地之濕氣感則害人皮肉筋脉肌膚從外而入可下之而已也

所生病者血之所成也

天此（屬上在三天） 屬 （屬中二在人） 屬 （屬下三在地） 屬
地論 大虛 天面 風雲萬物 地面 黃泉
六元 之路之路
位無 （金金火合德） 大 （木火合德） 火 （未二合德） 水
藏此 為金主清 君火主熱 風木主溫 相火主極熱 濕土主涼 寒水主寒
象圖 肺（上焦 象天） 心包絡 肝（中焦 象人） 膽次 脾（下焦 象地） 腎 黃泉
之添
圖之下絡大腸下絡小腸下絡膽經卷 終 下絡腎旁絡膀胱

外有風寒暑濕屬天之四令無形也
內有饑飽勞逸屬天之四令有形也
一者始因氣動而內有所成者謂積聚癥瘕瘤氣癭
起結核狂瞀癲癇踈曰癥堅也積也瘕氣血也
二者始因氣動而外有所成者謂癰腫瘡瘍疥癬疽
痔掉瘈浮腫目赤熛痓胕腫痛痒之類是也
三者不因氣動而病生于內者謂留飲癖食饑飽勞
損宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類是也
四者不因氣動而病生于外者謂瘴氣賊魅虫蛇蠱
毒伏尸鬼擊衝薄墜墮風寒暑濕斫射割刺之類是
也

風木鬱之病
故民病胃脘當心而痛四肢兩脇咽膈不通飲食不
下甚則耳鳴眩轉目不識人善僵仆筋骨強直而不
用卒倒而無所知也

暑火鬱之病
故民病少氣瘡瘍癰腫脇肋胸背首面四肢䐜脹臚
脹瘍痱嘔逆瘛瘲骨痛節乃有動注下溫瘧腹
中暴痛血溢流注精液乃少目赤心熱甚則瞀悶懊
憹善暴死也

濕土鬱之病
故民病心腹脹腸鳴而為數後甚則心痛脇䐜嘔逆
霍亂飲發注下胕腫身重脾熱之生也

燥金鬱之病
故民病欬逆心腹滿引少腹善暴痛不可反側嗌乾
面塵色惡金勝而木病也

寒水鬱之病
故民病寒客心痛腰椎痛大關節不利屈伸不便善
厥逆痞堅腹滿陰乘陽故也

初之氣

自大寒至立春春分厥陰風木之位陽用事而氣微故曰少陽得甲子元頭常准以大寒交初之氣分以六周甲子以應六氣下做一月正月二月少陽三陰三陽亦同

二之氣

春分至小滿少陰君火之位陽氣清明之間又陽明之位

三之氣

小滿至大暑少陽相火之位陽氣發萬物俱成故亦云太陽旺其脉洪大而長天氣并萬物人脉盛衰造

物造化亦同

四之氣

大暑至秋分太陰濕土之位天氣吉咸夏後陰已用事故曰太陰旺此三陰三陽與天氣標本陰陽異矣脉緩大而長燥金旺緊細短濇以萬物乾燥明可見矣

五之氣

秋分至小雪陽明燥金之位氣衰陰盛故云金氣旺其脉細而微

終之氣

小雪至大寒太陽寒分之位陰極而盡天氣所以曰厥陰旺厥者盡也

風木肝酸　達鍼

與膽爲表裏東方木也色青外應目主治血芍藥味酸微寒澤瀉鹹平烏梅酸熱

諸風掉眩皆屬於肝木主動治法曰達者吐也其高者因而越之可刺大敦灸亦同

暑火心苦　發汗

與小腸爲表裏南方火也色赤外應舌主血運諸經大黃苦寒木香苦溫黃連苦涼沒藥苦熱

諸痛痒瘡瘍皆屬於心火治法曰熱者汗之令其脉散也可刺少衝灸之亦同

濕土脾甘　奪鍼

與胃爲表裏中央土也色黃應唇主肌肉應四時寄甘涼甘草甘平

諸濕腫滿皆屬于脾土治法曰奪者瀉也分陰陽利水道可刺隱白灸亦同

燥金肺辛　清鍼

與大腸爲表裏西方金也色白外應皮毛鼻亦行氣乾薑辛熱生薑辛溫薄荷辛涼

諸氣膹鬱皆屬于肺金治法曰清者清膈利小
表可刺少商灸亦同

寒水腎鹹　折鹹

與膀胱爲表裏北方水也色黑外應耳主骨髓壯蠣
鹹寒水蛭鹹寒
諸寒收引皆屬于腎水治法曰折之謂抑之制其衝
逆可刺涌泉灸亦同

大寒子上初之氣

初之氣爲病多發欬嗽風痰風厥涎潮痺塞口喎半
身不遂失音風癲風中婦人胸中留飲兩臍腹微痛

嘔逆惡心旋運驚悸狂陽心風搐搦顫掉初之氣病
宜以瓜蔕散吐之在下泄之

春分卯上二之氣

二之氣爲病多發風溫風熱經曰風傷於陽濕傷於
陰微頭痛身熱發作風溫之候風傷於衛氣也濕傷
於脾氣也是以風溫爲病陰陽俱自浮汗出身重多
眠鼻息語言難出此已上二證不宜下若與巴豆大
毒丸藥熱證併生重者必死二之氣病宜以桂枝麻
黃湯發汗而已

小滿巳上三之氣

三之氣爲病多發熱皆傳足經者多矣太陽陽明少
陽太陰少陰厥陰陽者發熱惡寒頭項痛腰脊強陽
明身熱目疼鼻乾不得臥少陽者胸脇痛耳聾口苦
寒熱往來而嘔此三陽屬熱太陰者腹滿咽乾手足
自溫自利不渴或腹滿時痛少陰者故口燥舌乾而
渴厥陰者腹滿囊縮喘熱悶亂四肢厥冷爪甲青色
三之氣病宜以清凉上溫下養不宜用巴豆丸下之

大暑未上四之氣

四之氣爲病多發暑氣頭痛身熱發渴不宜作熱病
治宜以白虎湯得此病不傳染次發脾泄胃泄大腸

泄小腸泄大瘕泄霍亂吐瀉下痢及赤白相雜水穀
不分消腸鳴切痛面浮足腫目黃口乾脹滿氣痞手
足無力小兒亦如此四之氣病宜滲泄五苓散之類

秋分酉上五之氣

五之氣爲病多發喘息嘔逆欬嗽及婦人寒熱往來
瘖瘂痺痔消渴中滿小兒斑癮瘡皰五之氣病宜以
大小柴胡湯宜解治表裏之類

小雪亥上終之氣

終之氣爲病多發風痰風寒濕痺四肢秋收多冬水
復旺水濕相搏肺氣又衰冬寒甚故發則收則痓厥

[illegible]通用水液澄清冷大寒之疾積滯痃癖寒疝
血瘕凡氣之疾終之氣病宜破積發汗之類

肝之經足厥陰風乙木

是動則病腰痛不可以俛仰丈夫㿗疝婦人少腹腫甚則嗌乾面塵脫色是肝所生病者胸滿嘔逆飧泄狐疝遺溺閉癃為此諸病

膽之經足少陽風甲木

是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨所生病者頭痛頷痛目內眥痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀俠

癭汗出振寒瘧胸脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用為此諸病

心之經手少陰君丁火

是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所生病者目黃脇痛臑臂內後廉痛厥掌中熱痛為此諸病

小腸經手太陽君丙火

是動則病嗌痛頷腫不可以顧肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸頷肩臑肘臂外後廉痛為此諸病

脾之經足太陰濕己土

是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛溏瘕泄水閉黃疸不能臥強立股膝內腫厥足大指不用為此諸病

胃之經足陽明濕戊土

是動則病洒洒振寒善呻數欠顏黑至則惡人與火聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉戶塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是為骭厥是主血所生病者狂瘧溫淫汗出鼽衄口喎唇胗頸腫喉痹

大腹水腫膝臏腫痛循膺乳氣衝股伏兔骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘于胃則消穀善饑溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿為此諸病

心包絡手厥陰為母血

是動則病手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支滿心中憺憺大動面赤目黃喜笑不休是主脈所生病者煩心心痛掌中熱為此諸病

三焦經手少陽為父氣

是動則病耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痹是主氣所生病

者汗出目銳眥痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指
不用爲此諸病

大腸經手陽明燥庚金

是動則病齒痛頸腫是主津液所生病者目黃口乾
鼽衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣有餘則當
脉所過者熱腫虛則寒慄不復爲此諸病

肺之經手太陰燥辛金

是動則病肺脹滿膨脖而喘欬缺盆中痛甚則交兩
手而瞀此爲臂厥是主肺所生病者欬上氣喘渴煩
心胸滿臑臂内前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩背
痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少

氣不足以息溺色變爲此諸病

腎之經足少陰寒癸水

是動則病饑不欲食面如漆柴欬唾則有血喝喝而喘坐
而欲起目䀮䀮如無所見心如懸若饑狀氣不足則
善恐心惕惕如人將捕之是爲骨厥是主腎所生病
者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸
澼脊股内後廉痛痿厥嗜臥足下熱而痛爲此諸病

膀胱經足太陽寒壬水

是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不
可以曲膕如結踹如裂是爲踝厥是主筋所生病
者痔瘧狂癲疾頭顖項痛目黃淚出鼽衄項背腰尻
踹脚皆痛小指不用爲此諸病

風治法風淫于内治以辛凉佐以甘草以甘緩之以
辛散之

防風通聖散　天麻散　防風湯　祛風湯
小續命湯　消風散　排風湯

暑治法熱淫于内治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以
苦發之

白虎湯　桂苓湯　玉壺丸　碧玉散
玉露散　石膏湯

濕治法濕淫于内治以苦熱佐以鹹淡以苦燥之以
淡泄之

白朮木香散　桂苓白朮丸　五苓散
葶藶木香散　益元散　神功散

火治法火淫于内治以鹹寒佐以甘辛以酸收之以
苦發之

凉膈散　解毒丸　神功丸
八正散　調胃散　大小承氣湯

燥治法燥淫于内治以苦溫佐以甘辛以辛潤之以

苦下之
神功丸　麻仁丸　脾約丸
潤體丸　潤腸丸　四生丸
葶藶散
寒治法寒淫于內治以甘熱佐以苦辛以辛散之以
苦堅之
薑附湯　四逆湯　二薑湯
朮附湯　大戊巳丸　附子理中湯

六門病證藥方
風門獨治於內者
防風通聖散　防風天麻丸　防風湯
小續命湯　消風散　祛風丸
承氣湯　陷胸湯　神芎丸
大黃丸　備急丹
暑門獨治於外者
白虎湯　桂苓甘露散　化痰玉壺丸
益元散　玉露散　石膏散
抜毒散　水澄膏　魚膽丸
金絲膏　生肌散
濕門兼治於內者
五苓散　葶藶木香散　白朮木香散
益元散　大橘皮湯　桂苓白朮丸
神助散　大柴胡湯　小柴胡湯
柴胡飲子　防風通聖散　防風當歸飲子
火門兼治於外者
涼膈散　黃連解毒湯　瀉心湯
神芎丸　八正散　調胃散
調胃承氣湯　桂苓湯　麻黃湯
小建中湯　升麻湯　五積散

燥門先治於內後治於外者
神芎丸　脾約丸　麻仁丸
潤體丸　四生丸
謂寒藥攻其裏大黃牽牛之類
謂熱藥攻其表桂枝麻黃升麻之類
薑附湯　四逆湯　二薑湯　朮附湯
寒門先治於外後治於內者
大巳寒丸　理中丸
謂熱藥攻其表　謂寒藥攻其裏
內經濕變五泄　六氣屬天無形風暑濕火燥寒
五形濕屬戊巳濕入脾經爲實

六味僃地有質酸苦甘辛鹹淡

五臟湿屬脾胃湿入大腸爲虛

胃泄風湿

夫胃泄者飲食不化完穀出色黄風乘胃也宜化劑之類

脾泄暑湿

夫脾泄者腹脹滿注實則生嘔逆三陰閉宜和劑淡劑甘劑清劑之類

大腸泄燥湿

夫大腸泄者腸鳴切痛先宜寒劑奪之次甘劑分其陰陽也

小腸泄熱湿

夫小腸泄者溲而便膿血少腹痛宜寒劑奪之淡劑甘劑分之

大瘕泄寒湿

夫裏急後重數至圊而不能便先宜清劑寒劑奪之後以淡劑甘劑分之或莖中痛亦同

金櫃十全之法

飱泄春傷於風夏必飱泄暴食不化亦成飱泄風邪飱泄者先宜發劑次宜淡劑甘劑分劑之類

洞泄春傷於風邪氣留連乃爲洞泄瀉下褐色治法同上又宜灸分水穴湿氣在下又宜以苦劑越之

洞泄寒中　洞泄寒中俗呼曰休息痢洞泄屬甲乙風木可灸氣海水分三里愼勿服峻熱之藥小便澁則生足腫腹脹滿者死於庚辛之日如屍臭者不治

霍亂　吐瀉水穀不化陰陽錯亂可服淡劑調以水水令頓服之則愈

注下　火氣太過宜凉劑又宜淡劑調水水令頓服之則愈此爲暴下不止也

腫蠱　三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體否腫宜越劑發劑奪劑

腹脹　濁氣在上不散可服木香檳榔丸青皮陳皮屬大腸爲濁氣逆肺金爲清氣逆氣化則愈矣

腸鳴　燥湿相搏爲腸鳴中有湿亦爲腸鳴火湿相攻亦爲腸鳴治法同上治之大効

支滿鶩溏　上滿而後泄下泄而後復上滿治法同上久則反寒治法同寒中如鶩溏而腸寒者亦斯義風湿亦有支滿者

腸澼　大小便膿血治法同上又宜不二丸地榆散駐車丸及車前子等藥次宜淡劑甘劑分劑之類

臟毒　下血治法同上又宜苦劑奪劑以苦燥之
酒毒下血同
大小便血　大小便治法同上血溫身熱者死火之成數七日而死如屍臭者不治
脫肛　大腸熱甚也用酸漿水煎三五沸稍熱滌洗三五度次以苦劑堅之則愈
廣腸痛　治法同上又大黃牽牛丸散奪之法燥濇亦同痔漏廣腸痛腸風下血皆同臟毒治法
乳痔腸風必肛門左右有核內經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔屬大腸經可服枳殼之屬大瘕生腸風乳痔相連

金櫃十全五泄法後論

天之氣一也一之用爲風火燥濕寒暑故濕之氣一之一也相乘而爲五變其化在天爲雨在地爲泥在人爲脾甚則爲泄故風而濕其泄也胃暑而濕其泄也脾燥而濕其泄也大腸熱而濕其泄也小腸寒而濕其泄也大瘕若胃不已變而爲飧泄飧泄不已變而爲洞泄洞泄不已變而爲脾泄寒中此風乘濕之變也若脾泄不已變而爲霍亂霍亂不已變而爲注下注下不已變而爲腫蠱此暑乘濕之變也若大腸泄不已變而爲腹脹腹脹不已變而爲腸鳴腸鳴不已變而爲支滿鶩溏此燥濕乘之變也若小腸泄不已變而爲腸澼腸澼不已變而爲臟毒臟毒不已變而爲前後便血此熱乘濕之變也若大瘕泄不已變而爲脫肛脫肛不已變而爲廣腸痛廣腸痛不已變而爲乳痔腸風此寒乘濕之變也凡此二十五變若無濕則終不成疾況脾胃二土共管中州脾好飲脾亦惡濕此泄之所由生也凡下痢之脈微小者生浮大者死水腫之反是浮大者生沉細者死夫病在裏脈沉在表脈浮裏當下之表當汗之下痢而脈浮

滑水腫者脈沉細表裏俱受病故不治也凡臟血便血兩手脈俱弦者死絶俱滑大者生血溫身熱者死王太僕曰若下血而身熱血溫是血去而外逸也血屬火故也七日而死者火之成數也夫飧泄得之於風亦汗可愈或伏驚怖則膽木受邪暴下綠水蓋謂戊己見伐於甲木也嬰兒泄綠水素問有嬰兒風理亦如之洞泄者飧泄之甚但飧泄近於洞泄洞泄久則寒中溫之可也治法曰和之則可也汗之則不可蓋在腑則易治入臟則難攻洞泄寒中自腑而入臟宜和解而勿爭水腫之作者未遽而然也由濕遍

於大腸小溲自濇水溼既瀦腫滿日倍面黄痩大改
體如泥溼氣周身難專一法越其高而奪其下發其
表而滲其中酸收而辛散淡滲而苦堅用攻劑以救
其甚緩劑以平其餘如是則孤精得氣獨魄反陽亦
可保形陳莝去而淨府絜矣彼豆蔻烏梅罌粟棗勿
驟用也設病形一變必致大悮或通而塞或塞而通
塞塞通通豈限一法世俗止知塞劑之能塞而不知
通劑之能塞者拘於方也凡治溼皆以利小溲爲主
諸泄不已宜灸水分穴謂水穀之所別也臍之上一
寸半灸五七壯腹鳴如雷水道行之候也凡溼勿鍼

内經雖云緩刺其處莫若以張長沙治傷寒法治之
蓋泄者亦四時傷寒之一也仲景曰上涌而下泄表
汗而裏攻半在表半在裏則宜和解之表裏俱見隨
證滲泄此雖以治傷寒其於治濕也同仍察脉以視
深淺問年壯以視虛實所投必如其意矣頃商水縣
白堤酒監單昭信病飧泄逾年不愈此邑劉繼先命
予藥之爲桂枝麻黄湯數兩一劑而愈因作五泄圖
揔難素本意書錄于上刊而行之誠有望于後之君
子戴人張子和述巳上之圖校改爲篇法

儒門事親卷之十

儒門事親卷之十一

戴人張子和著
新安吳勉學校

風論

論曰人之生也負陰而抱陽人居一氣道在其中矣
外有八邪之相盪内有喜怒之交侵真氣内弱風邪
襲之風之傷人或爲寒熱或爲疼痛或爲偏枯或爲
拘攣其候不一風者善行而數變此乃風者百病之
始萬病之長也蓋内不得通外不得泄此謂之病生
於變亂也或失音而昏冒或口目而喎斜可用二聖

散吐之或不知人事者或牙關緊急者粥不能下不
能嚥者煎三聖散鼻内灌之吐出涎沫口自開也次
服無憂散通解丸通聖凉膈人參半夏丸桂苓甘露
散消風散熱除溼潤燥養液之寒藥排而用之切忌雞
豬魚兎油膩酒醋蕎麪動風之物及引痰之食
大凡頭風眩運手足麻痺胃脘發痛心腹滿悶按之
有聲皆因風風寒溼三氣雜至合而爲痺也在上謂
之停飲可用獨聖散吐之吐訖後服清上辛凉之藥
通聖散加半夏之辛仲景云此痰結胸中而致也
大凡風癎病發項強直視不省人事此及肝經有熱

也或有咬牙者先用葶藶苦酒湯吐之吐後可服瀉青丸下之次服加減通聖散頭或牙疼用導赤散治之則愈如病發者可用輕粉白礬礞石代赭石發過米飲調之經云重劑以鎮之

大凡人病雷頭懶于俗呼之謬名也頭痛昏眩皆因浴髮而得之即為首風此因邪風在於胸中熱甚化而為痰風之所致也可以茶調散吐之吐訖次用藏用丸下之後可服烏荊丸若是雷頭者上部多有赤腫結核或面熱無汗經云火鬱發之開導之決之可用鈹鍼出血則愈靈樞經云奪血者無汗奪汗者無

血血汗俱蕩豈不妙哉衰老者可用凉膈解毒消風散熱為治年壯者可以蕩滌積熱大黃牽牛氣血宣通便無壅滯而愈

凡人患目腫經年不瘥俗言頭風所注更加頭痛者豈非頭風者歟此乃足厥陰肝之經手少陰心之經兼五臟俱有大熱也可先用通解丸通利大小便大黃越桃飲子治肝熱者羌活決明散服之大有神效驗矣

凡目有淚出俗言作冷淚者非也內經曰肝液不禁此大熱熏蒸於肝也熱極生風風衝於外火發於內風熱相搏此大淚出也內外皆治可以愈也治外貝母一枚白膩者加胡椒七枚不犯銅鐵細研臨臥點之治內者去風散熱之劑可用當歸飲子服之陽熱極甚者目睛發痛不可忍者可用四物湯加漢防已草龍膽送下神芎丸五七十丸利三五行則愈

凡人病痰發者其證不一蓋有五焉一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰沫痰諸痰在於膈上使頭目不能清利涕唾稠粘或欬唾喘滿或時發潮熱可用獨聖散吐之次服加減飲子或疏風丸間而服之內經曰所謂流濕潤燥之義也

凡人但冒風邪溫病前三日在表未入於裏其候頭項強痛身熱惡風寒有汗無汗腰痛不得俛仰可用益元散五錢通聖散五錢相合服之名曰雙解散用水一大椀生薑十餘片連鬚葱白五七莖荳豉一撮煎至三五沸去滓先服大半良久以釵子探咽喉中吐出痰涎不可嗽口次又服少半投之如未汗出更用葱醋酸辣湯再投之衣被蓋覆汗出則愈矣氣交變大論云歲火太過炎暑流行火氣太甚肺金受邪上應熒惑大而明現其病熱鬱可用辛凉之劑萬舉萬全夫擾攘之世藥宜辛凉以解火治世人民安靜

加升麻葛根湯敗毒散辛温之剤亦無加害亦
加葱白豔豉上而越之表而解之内經曰因其輕而
揚之揚者發揚也吐汗之後宜大將息旬日之後不
可犯之犯之其病復作也
凡傷寒疫癘一法若無藥之處可用酸虀汁一大椀
煎三五沸去菜葉飲訖候少時用釵子咽喉中探吐
如此三次再煎葱醋湯投之衣被蓋覆汗出而瘥内
經曰酸苦涌泄為陰傷寒三日頭痛身熱病在上宜
涌之涌後以淡粥養之
又一法用鳳凰臺散嗃於鼻内連嚏二三十次嗃藥
時坐于暖室中嚏罷以漿水粥投之衣被蓋之汗出

而愈嚏法同吐法用之
一法導引若無藥處用之令人盤兩足而坐以兩手
交十指攀頭後風池風府二穴此風之門也向前仰
首數至於地如此連折點地一百二十數急以酸醋
白湯投之汗出即解
凡男子婦人小兒手足麻痺肌肉不仁者風寒濕三
氣相雜至合為痺先用黄芩芍藥湯吐之吐訖次用
通解丸通經而瀉之瀉訖更用辛甘之剤汗之汗瀉
之後可用當歸清涼飲子蕪荑烏荊丸除濕丹和血行

經之藥則愈矣
凡人病痰證發者比前論更多有三證顯證共成五
也一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰食
痰諸痰在口上焦毒薰於頭者諸陽之會首也故令
病人頭重目澁涕唾稠粘或咳嗽喘滿時發寒熱可
用赤小豆湯吐之吐後各隨其證而治之可服消風
去熱導温化痰者可服通聖加半夏導氣之剤豈不
妙哉如新暴風痰者形寒飲冷熱痰者火盛制金濕
痰者停飲不散可服加減連翹飲子除濕丹無憂散
亦有酒痰者解毒三聖丸主之五者食痰可用漢防

己丸丹砂選而用之若依法服之决有神効

論火熱二門

凡傷寒中風温疫時氣冒暑感四時不正之氣若邪
毒之氣人或感之始于巨陽受之二日陽明受之三
日少陽受之前三日在于表陽也後三日在于裏陰
也内經熱論通謂之傷寒熱病者言一身之熱氣也
傷寒者外感于寒邪也夫傷寒之寒熱者惡寒為表
熱裏和故惡寒脉浮大也發熱為裏熱表和故發熱
脉滑實也可以吐法而解之用衣雪湯主之生薑葱
白豆豉同煎煎苦酒湯上而越之若病人脉沉實

者或不大便喘滿譫語不必拘日數急攻于宜以可用
通解丸胃中渴燥者大承氣湯下之慎不可用銀粉
巴豆粉霜杏仁芫花熱性之藥用之必致危殆仲景
云調理傷寒者皆在汗下之理當明表裏無不愈矣
差之毫釐失之千里深可慎之汗下之後切宜慎口
可服淡粥而養之不然其病復作
又論傷寒七八日潮熱腹滿發黃有班者何臟使然
內經云手太陰肺經足太陰脾經足陽明胃經手少
陰心經此四經受病也仲景云兩寸口脉俱浮滑胸
中有痰攻上者可用瓜蒂散吐之吐後隨證調治處

藥發黃之證皆因陽明中風太陽中濕瘀血與宿穀
相搏令人發黃煎梔子茵蔯蒿湯調加減五苓散服
之後利小便快者如皂角色汁此爲効矣發班者心
經受熱故有此證詳班輕重用藥之理輕者班紅可
用越桃飲子重者班紫毒氣胃中盛也大青四物湯
玄參升麻湯主之潮熱腹滿者謂邪熱在胃中也可
以蕩滌邪熱流濕潤燥宜急治之雜病寸口脉沉實
者亦在胸中有啓玄子注云上盈不愈者吐而奪之
此病乃疹矣班黑者危而難治也黃病血病問其小
便利與不利也驗又有頭痛數日不止者此乃六陽

受病也手之三陽從手走至於頭足之三陽從下走
至於上蓋六陽之聚會也久痛不愈者令人喪目以
胸膈亦有宿痰故也先以羌活散涌之以川芎石膏
散白虎湯選而服之則愈矣
又一法治頭痛不愈者可煎連鬚葱白豆豉湯多服
之後吐爲効吐後可服川芎薄荷湯辛凉之劑清上
之藥踈風丸散之類仲景云傷寒頭痛脉寸口急而
頭痛是也
凡男子有病面黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧狀更加
涎嗽不止或喘滿面目浮腫者或身體俱熱或有自

汗內經云病名傷寒夾勞之證也治之奈何病在上
者其高者因而越之可用防巴散吐之吐後切用通
解丸一服次服人參黃耆散當歸飲子加減小柴胡
湯擇而用之內經謂男女之證皆同類用其治法也
依此調治無不取効矣
凡人病心胸痞悶不欲飲食身體壯熱口燥舌乾大
小便不利有一工治之說下元虛冷便投煖藥十數
服其病不愈又一醫所論與前亦同又投煖藥五七
日其證轉加因請余治之診脉而說曰衛閉日數
飲食大小便何似小便赤色大便黑色便言傷寒瘀

血之證切用大黃芍藥湯二劑次服犀角地黃湯二
服後用通經丸一服換過大便黃色以爲効驗此藥
服十餘服方可病瘥矣
凡男子婦人所顯證候皮膚發熱肌肉消瘦四肢倦
怠兼有頭痛頰赤心忪脣乾舌燥日晡潮熱夜有盜
汗涕唾稠粘胸膈不利或時喘嗽五心煩熱睡卧不
安飲食減少多思水漿經脉不通病名曰何病荅病
論曰女子不月血滯之病也男子腎虛精不足也凡
治此證降心火益腎水此之謂也可先用通解丸瀉
三二行次服當歸飲子又用加減五苓散木香三稜

丸人參黃芪散犀角散之類詳其虛實選而用之若
咯膿咯血大小便血但亡血者不可宜吐勿服酸辛
熱物薑附之類藥不可不戒慎也若犯諸亡血之證
者不可發汗不可溫補脾胃之藥若服之雖進飲食
不生肌肉此病轉加危篤乃成虛勞之病也
凡醫人不明發表攻裏亂投湯劑有悮性命更大忌
夏月燔灸中脘臍下關元氣海背俞三里等穴灸于
百壯者全無一効使病者[illegible]又且[illegible]不[illegible]虛勞
之疾私啖肉食麪辛酸之物不可食之但可食[illegible]
按神農食療而與之蔬菜水水清涼之物不可

禁也且圖寒涼滑利腸胃使氣血並無凝燥澁經
曰穀入于胃脉道乃行水入於經其血乃成若不忌
慎致令病人胃口閉澁則形體漸瘦此乃死之由也
諸勞皆倣此但諸人咯膿血衂血大小便血者可服
三黃丸黃連解毒丸涼膈散加桔梗當歸大黃芍藥
犀角地黃湯大作劑料時時呷之內經曰所謂邪熱
傷於所心之病依此調治萬舉萬全矣
凡人年四十以上日久多言以致虛損面色黧黑飲
食無味心胸痞悶四肢倦怠肌體餘熱大小便不利
治之柰何內經曰不可熱補之夫男子腎虛水不足

也凡補虛之劑多用烏附天雄之類豈知腎惡燥也
女子陰虛血不足也凡補虛多以陽劑是以知陽勝
而陰虧也不可用性熱之藥補之空心可服加減八
物丸當歸飲子減桂五苓散煩渴加益元名曰淡滲
散更服通解丸顯仁丸亦可服之大有神効
凡人有臟毒下血何謂也生氣通天論曰邪熱傷肝
因而大飽筋脉横解腸澼爲痔故臟血者血隨熱行
參差入于腸胃之間乃成瀉血也若身體壯熱則爲
難治身涼者可治也可先調中消血湯除積丸瀉之
三二行瀉後服芍藥蘗皮丸黃連解毒湯五苓散合

元散各停新汲水調下五七錢甚者取地黃汁半盞服之則愈矣

凡下利膿血腹痛不止者何也諸痛痒皆屬於心火也可用通解丸加減瀉之量其虛實用之次用消溼散加生薑大棗芍藥服之瀉訖又用新水調五苓散服之

又一法煎燈心湯調下益元散五七錢此病大忌油膩腥葷熱物

溼熱門

凡吐嘔而瀉病名曰何也內經熱論云此乃轉筋霍

亂之證也何氣使然此乃邪氣在于中焦使陰陽二氣不能升降其證心痛而吐吐則先腹痛而瀉心腹俱痛則吐瀉並作使致揮霍之間自然撩亂此證喜寒凉之物可用冰水調五苓益元則愈矣大忌熱物轉筋之病治之奈何經曰勞者溫之溫者溫存之意也

又一法生薑湯益元散白术散禹攻散加冰沉冷細細呷之渴未止者頻頻飲之如無冰新汲水亦得用之大忌白粥米湯桂附種種之燥藥不可服之服之必死如無藥處可服地漿地漿者掘地作坑注新水于其中攪渾旋旋取澄清者飲三五盞立愈

凡大人小兒暴注水瀉不止內經曰此名暴速注瀉久而不愈者為涌泄注下此乃火運太過之病也火注暴速故也急宜用新汲水調下甘露飲子五苓散天水散或用井花水煎此藥放冷服之病即瘥矣不可用御米殼乾薑豆蔻聖散子之類縱然瀉止腸胃氣滯不通變為腹脹此法宜分陰陽利水道乃為治法之妙也

上古天真論云一陰一陽之謂道故男女有陰陽之質不同則天癸精血之形亦異陰靜而海滿血溢陽

動而應合精泄二者通和故能有子易繫辭曰男女構精萬物化生人禀天地而成形也

風門

凡風中失音悶亂口眼喎斜內經曰風之為病善行而數變感則害人有倉卒之變故百病皆生於風也可用三聖散鼻內灌之吐出涎口自開也如不省人事牙關緊閉粥藥不能下者用此藥如無此證可三聖散吐之次服通聖涼膈人參半夏丸桂苓甘露散等切忌雞猪魚兎酒醋蕎麪動風之物引痰之食吐痰之法在方論中

凡頭風眩運手足麻痺胃脘發痛心腹滿悶按如水
聲可用獨聖散吐之吐訖可用清上辛凉之藥仲景
曰此寒痰結在胸中而致然也
凡癲病至于呆證者用三聖散吐之於煖室中勿令
透風可以汗下吐三法俱行次服通聖散百餘日則
愈矣
凡雷頭懶干俗呼之謬名也此疾胸中有寒痰由多
沐之所致也可以茶調散吐之吐訖三二升次用神芎丸
下訖三五行然後服愈風餅子則愈矣此雷頭者是
頭上有赤腫結核或如酸棗狀可用鈹鍼出血則愈

凡赤目經年不愈是謂頭風所注更加頭痛可用獨
聖散吐之次服洗心散八正散之類赤目腫作是足
厥陰肝經有熱用利小便瀉肝經除風熱之寒藥則
愈矣
凡風衝泣下俗呼為冷淚者謬也內經曰太陽不能
禁固因風衝于外火焚于內風熱相搏由此泣下內
經曰熱則五液皆出熱甚則淚出治之以貝母一枚
白膩者佳胡椒七枚不犯銅鐵研細點之臨卧治法
曰風宜辛散寒宜甘發風遇寒則凝豆得熱則散
凡諸痰在於膈上使頭目不能清利涕唾稠粘或欬

嗽喘滿時發潮熱可用獨聖散吐之次服搜風丸之
類內經曰所謂流濕潤燥之義也
凡冒風時氣溫病傷寒三日已裏頭痛身熱惡寒可
用通聖散益元散各五七錢水一大碗入生薑十餘
片連鬚葱白十餘莖豆豉一撮同煎三五沸去滓先
服多半良久以釵子探於咽中吐了不得嗽口次用
少半投之更用酸辛葱醋湯投之衣被蓋覆汗出則
解夫擾攘之世常與內經歲火太過同法歲火太過
炎暑流行火氣太剩金肺受邪上應熒惑大而明顯
若用辛凉之劑解之萬舉萬全人民安靜則便同水

化可次升麻湯葛根湯敗毒散辛溫之劑解之雖有
潮熱亦無加害亦可加豆豉葱白上涌而表汗自出
內經曰因其輕而揚之揚者發揚也吐汗所以發寒
熱之邪也吐汗之後必大將息旬日之後其邪不復
作也
凡大人小兒風濕寒三氣合而為痺及手足麻痺不
仁內經曰榮虛衛實皮膚不仁痺而不知痒痛可用
鬱金散吐之次服導水丸輕寒之藥泄之泄訖次以
辛溫之劑發散汗出後常服當歸芍藥烏附行經和
血之藥則愈矣

凡風蚛牙疾久不愈者用鍼巴豆一枚以燈燎之煙盡存性於牙根盤上熏之則愈

凡泄瀉米穀不化日夜無度腹中雷鳴下利完穀可用導水丸禹攻散泄之或病人老弱氣虛可用無憂散泄之再觀病勢強弱候一二可服胃風湯以治其風如不愈者更服桂枝麻黃湯汗之則愈內經曰夫風之中為腸風飧泄啓玄子云風入胃中上熏於胃故食不化而下泄又云暮食不化為飧泄又經云春傷於風夏為飧泄故風宜出汗腸中鳴者風以動之動而有聲慎不可用罌粟豆蔻乾薑大燥之藥病漸者燥之去其濕則愈病甚者攻之不動反能為害經曰其減則漸其加則甚可用五苓散去豬苓加人參散服之

凡富貴膏粱之家病瘧或間日或頻日發或熱多寒少或寒多熱少宜大柴胡湯下過三五行次服白虎湯或玉露散桂苓甘露散之類如不愈者是積熱太甚以神芎三花神祐丸調胃承氣湯等大作劑料下之下後以長流水煎五苓散服之或服小柴胡亦可或先以常山散吐之後服涼膈白虎之類必愈矣大忌發熱之物豬雞魚兔五辛之物犯之則再發也

凡田野貧寒之家病瘧為飲食麄糲衣服寒薄勞力動作不與膏粱同法臨發日可用野夫多效方中溫脾散治之如不愈服辰砂丹治之必愈矣如喫罷此藥以長流水煎白虎湯服之不服食熱物為瘧疾是傷暑伏熱故也內經曰夏傷於暑秋必病瘧

凡男子婦人骨蒸熱發皮膚枯乾痰唾稠粘四肢疼痛面赤唇焦盜汗煩燥睡卧不安或時喘嗽飲食無味困弱無力虛汗黃瘦等證內經曰男子因精不足女子因血不流而得此證可以茶調散輕涌訖次以導水丸禹功散輕瀉一五行後服柴胡飲子桂苓甘露散犀角散之類變服搜風丸白朮丸調中湯木香檳榔丸人參散量虛實選而用之或咯血便血諸亡血者並不宜吐不可不知慎勿服峻熱薑附之藥若服之飲食難進肌肉消減轉加危篤五勞之病令人不明發表攻裏遂候至此大忌暑月於手腕足踝上著灸以其手足者諸陽之表起于五指之外內經曰諸陽發四肢此穴皆是淺薄之處灸瘡最難痊也及胸穴中脘臍下背俞三里等穴或有灸數百壯者加以燔鍼略無寸效病人反受苦楚可不思之勞疾多饞所思之物但可食者宜照食療本草而與菠菜葵菜

氷水凉物慎不可禁且因水勢救入胃脉道乃行也若
遇禁則胃口閉而形體漸瘦而脉大乃死之候也諸
勞皆倣此
凡病人虛勞多日無力別無熱證者宜補之可用無
比山藥丸則愈矣
凡痔漏腫痛內經曰因而大飽筋脉横解腸澼爲痔
而不愈變爲漏痔與漏其治同法至真要大論云太
陽之勝凝凓且至非時水氷痔瘧取法注云水氣太
勝陽火不行此言陽火畏水鬱而爲痔又少陰之復
痱疹瘡瘍癰疽痤痔注云火氣內蒸金氣外拒陽熱

內鬱故爲痱疹瘡瘍疹甚亦爲瘡也熱少則外生痱
疹熱多則內結癰痤小腸有熱則中外爲痔其熱復
之變皆病於身後及外側也又靈樞云太陽經虛則
爲痔瘧癲疾蓋水虛則火所乘故也可先用導水丸
禹功散瀉訖次服枳殼丸木香檳榔丸更以葵菜菠
菜通利腸胃大忌房室雞魚酒醋辛熱之物
凡富貴之人痰嗽多是厚味所致內經云所謂味厚
則發熱可服通聖散加半夏以止嗽更服人參半夏
丸以化痰墜涎止嗽定喘貧乏之人多感風冷寒濕
內經曰秋傷於濕冬生欬嗽可服寧神散寧肺散加

白木之類若欬極面赤煩冤半晌者此火化乘肺也
宜詳辨之
凡大人小兒病沙石淋及五種淋澁癃閉幷臍腹痛
益元散主之以長流水調下蓋因熱在膀胱燥其津
液故俗謂冷淋者天下之通弊也五苓散减桂加益
元散名曰淡滲散凡兩目暴赤痛者腫不止睛脹努
肉結成翳膜速宜用稈草左右鼻竅內彈之出血立
愈病甚人頭上百會穴攅竹眉間皆可出血則愈矣
口噙水緊扣衣領不可便噴水候血盡便吐了水蓋
暴赤腫痛乃龍火之疾素成之熱也難經曰目得

血而能視不得已而用之血化淚痛而所出經曰本
病相傳先以治其氣急則治其標緩則治其本
又一法兩目赤腫發痛不止用長流水煎鹽湯吐之
次服神芎丸四物湯之類經曰暴病暴死皆屬於火
也又曰治病有緩急急則治其標緩則治其本標者
赤腫也本者火熱也鹽湯鹹寒所以制火兩目赤腫
痛不能開者以青金散鼻內嗃之嚏之真氣上涌邪
氣自出矣
凡大人小兒口瘡唇緊用酸漿水洗去白痂臨卧貼
赴筵散如不愈貼鉛白霜散必愈矣

凡婦人男子喉閉腫痛不能言者刺兩手大拇指爪甲如韭葉少商井穴也以排針刺去血立愈如不愈以温血湯口中含漱是以熱導熱之法也

凡頭腫痛瘰癧及胸臆胠脇之間或有瘡癤腫核不消及腰水不止可用滄鹽一二兩炒過以長流水一大椀煎之放温作三五次頓服訖良久於咽喉中以釵股探引吐之去冷痰三二升次服和血通經之藥内經曰鹹味涌泄為陰銅人記少陽起於目銳眥行耳後下腦肋過期門瘰癧結核馬刀挾瘻足少陽膽經多氣少血之病也

凡癭袋脹悶養生論云兩山挾水其人多癭疾土厚水深其人多癭地勢使然也此可服人參化癭丹自消癭瘵多用海藻海帶味屬鹹寒

凡背瘡初發便可用藏用丸玉燭散大作劑料下臟腑一二十行次用排針於腫焮處循紅暈周匝内密刺三層出血盡以温軟帛拭去血甚者百會委中皆出後用陽起散傳之不可便服十味内托散其中犯官桂更用酒煎男子以兆為陽更以熱投熱無乃太熱乎

凡便癰者謬名也乃男子血疝也難素所不載然而足厥陰肝之經絡是血流行之道路也衝脈任脈督脈亦屬肝經之旁絡也難經曰男子七疝血疝者乃七疝之一也治以導水丸桃仁承氣湯或抵當湯投之同瘀血法聚而不散可以大作劑料大瀉一二十行次以玉燭散和血通經之類是也世人多用大黃牡礪間有不愈者是不知和血通經之道也

凡下疳久不愈者俗呼曰臊疳可以導水丸禹功散先瀉肝經訖以木香散傳之日上三兩度後服淡粥一二日止

凡一切惡瘡久不愈者以木香檳榔散貼之則愈矣

凡男子婦人欬逆俗呼曰吃忒乃陰陽不和之故火欲上行為寒所抑寒不勝火故作凝滯之聲傷寒亦有此證並宜既濟散治之

濕門

凡男子婦人病水濕瀉注不止因服豆蔻烏梅薑附酸熱之劑經曰陽氣耗減於内陰精損削於外三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體痞腫面黃腹大小便赤色兩足按之陷而不起内經曰諸濕腫滿皆屬脾土可用獨聖散吐之如時月涼寒宜於燠室不透風處用火一盆藉火力出汗次以導水禹功量病人虛

實瀉十餘行濕去腫減則愈矣是汗下吐三法俱行
三法行畢臟腑空虛先宜以淡漿粥養腸胃三兩日
次服五苓益元同煎或燈心湯調下亦可加大勢矣
盡更服神功散可以流濕潤燥分陰陽利水道既平
之後宜大將息慎忌油鹽酒果房室等事三年則不
復作矣

凡上喘中滿酸心腹脹時時作聲痞氣上下不能宣
暢叔和云氣壅三焦不得昌是也可用獨聖散吐之
次用導水禹功散輕瀉三四行使上下無礙氣血宣
通並無壅滯後服平胃散五苓散益元甘露散分陰

陽利水道之藥則愈矣

凡老人久病大便澁滯不通者可服神功丸麻仁丸
時時服葵羮菠菜自然通利也

凡三焦者內經所謂肺消渴等可取生藕汁服則愈

寒門

經曰寒傷流水俗呼為凍瘡因冬月行於冰雪中而
得此證或經年不愈者用坡野中淨土曬乾以大蒜
研如泥土捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小貼
之以火艾加於餅上灸之不計壯數以泥乾為度去
乾餅子再換濕餅灸不問多少直至瘡痂覺痛癢是
效也然後口含漿水洗漬用雞翎一二十莖縛作
刷子於瘡上洗刷淨以此洗刷不致肌肉損傷也以
軟帛拭乾次用木香檳榔散傅之如夏月醫之更妙

內傷

凡一切冷食不消宿食不散亦類傷寒身熱惡寒戰
慄頭痛腰脊強不可用雙解散止可導飲丸木香檳
榔丸五六十丸量虛實加減利五七行所傷冷物宿
酒推盡頭痛病自愈矣次以五苓散生薑棗煎用長
流水煎取五六錢不可服酒癥丸進食丸此藥皆犯
巴豆有大毒故也

凡膏粱之人起居閑逸奉養過度酒食所傷以致中
脘留飲惡悶痞膈醋心可服木香導飲丸治之若田
野芻蕘之人食疏衣薄動作勞役若酒食所傷心腹
滿悶醋心時時吐酸水可用進食丸以其勝毒也病
甚者每月瀉三五次

凡一切沉積或有水不能食使頭目昏眩不能清利
可茶調散吐之次服七宣丸木香檳榔丸

凡人咳嗽一聲或作悲笑啼泣擡舁重物忽然腰痛
氣刺不能轉側或不能出氣者可用不卧散嚏之汗
出痛止

外傷治法

凡一切刃器所傷用風化石灰一斤龍骨四兩二味爲細末先於端四日採下刺薊菜於端午日五更合搗和成團子中間穿眼懸於背陰處陰乾搗羅爲末於瘡上摻貼亦得裹外臁瘡并諸雜瘡皆効

凡犬咬蛇傷不可便貼膏藥及生肌散之類内經云先治内而後治外可也先當用導水丸禹攻散之類可瀉驚恐不散毒氣或瀉十餘行即時痛減腫消然後可用膏藥生肌散之類傅之則愈矣

凡一切蟲獸所傷及背瘡腫毒杖瘡炊發或透入裏

者可服木香檳榔丸七八十丸或至百餘丸生薑湯下五七行量虛實加減用之内經曰先治内而後治外是也

凡落馬墜井因而打撲便生心恙是痰涎散於上也内經曰所謂因氣動而病生於外宜三聖散空心吐之如本人虛弱瘦瘁可用聖獨散吐之吐後服安魂之藥如定志丸之類牛黃人參朱砂之屬

婦人風門

凡婦人頭風眩運登車乘船眩運眼澁手麻髮脫健忘喜怒皆胸中宿痰所致可用瓜蒂散吐之次以長流水煎五苓散大人參半夏丸

凡婦人腰胯痛兩腳麻木惡寒喜暖内經曰風寒濕合而爲痺先用服除濕丹七八十丸量虛實以意加減次以禹攻散投之瀉十餘行清冷積水青黃涎沫爲驗後用長流水煎生薑棗同五苓散服之風濕散而氣血自和也

凡婦人乳癰發痛者亦生于心也俗呼吹妳是也吹者風也風熱結于乳房之間血脉凝注久而不散潰腐爲膿宜用益元散生薑湯調冷服或新汲水時時呷之勿輟晝夜可三五十次自解矣或煎解毒湯

頓服之

火類門

凡婦人月事沉滯數月不行肌肉漸減内經曰小腸熱已滿移熱於大腸則伏瘕爲沉沉者月事沉滯不行故云伏瘕急宜桃仁承氣湯加當歸大作劑料煎服不過三服立愈後用四物湯補之更宜服宜明中檳榔丸

凡婦人血崩或年及四十已上或悲哀太甚故然内經曰悲哀太甚則心系急心系急則肺舉而上焦不通熱氣在中故經云血崩下心系者血山也如久不

愈則面黃肌熱瘦弱慎不可以熱治之蓋血得熱而散故禁之宜以當歸散等藥治之

凡婦人年五十以上經脉暴下婦人經血終于七七之數數外暴下者此乃內經所謂火主暴速亦因暴喜暴怒憂愁驚恐致然慎勿作冷病治之如下峻熱藥治之必死止宜黃連解毒湯以清上更用蓮殼棕毛灰以滲其下然後用四物湯玄胡索散凉血和經之藥也

凡婦人月事不來室女亦同內經曰謂月事不來皆是胞脉閉也胞脉者屬心而絡于胞中令氣上通於

肺心下不通故月事不來也可用茶調散吐之次用玉燭散芎藭湯三和湯桂苓白朮散之類降心火益腎水開胃進食分陰陽利水道之藥皆是也慎勿服峻熱有毒之藥若服之變成肺痿骨蒸潮熱欬嗽咯膿嘔血喘滿小大不便寢汗不止漸至形瘦脉大雖遇良醫亦成不救嗚呼人之死者豈命使之然也

凡懷孕婦人病瘧可煎白虎湯小柴胡柴胡飲子等藥如大便結硬可用大柴胡湯下微利過不可大吐瀉恐傷其孕也經曰夏傷於暑秋必痎瘧

凡雙身婦人傷寒時氣温疫頭痛身熱可用升麻散一兩水半椀大作劑料去滓分作二服先一服吐了後一服勿吐次以長流水加生薑棗煎五苓散熱以之汗盡其痛立止

凡婦人雙身大小便不利可用八正散大作劑料去滑石加葵菜子煎服經曰膀胱不利為癃癃者小便閉而不通也如八正散加木香取効更捷經曰膀胱氣化則能出焉然後服五苓散三五服則愈矣

凡婦人身重九月而瘖瘂不言者是胞之絡脉不相續也故不能言經曰無治也然有是言不若煎玉燭散二兩水半椀同煎至七分去滓入蜜放温時時呷

之令大下降肺金自清故聲復出也肺主聲音也

凡婦人難產者皆因燥澀緊斂故產户不得開通宜先於降誕之月伯月之日用長流水調益元散日三服產必易產後亦無一切虛熱氣血不和之疾如未入月則不宜服之以滑石滑胎故也

凡婦人大產後或臍腹腰痛乃敗血惡物之致然也醫者便作虛冷以燥熱藥治之誤已久矣難經曰諸痛為實實者熱也可用導水丸禹功散瀉三五行然後以玉燭散和血通經降火益水之藥治之獨不可便服黑神散燥熱之藥當同半產治之

凡婦人産後心風者不可便作風治之宜調胃承氣
湯二兩加當歸半兩細剉用水三四盞同煎去滓分
作二服大下三五行則愈矣如未愈以三聖散吐之
蓋風狂便屬陽
凡婦人産後一二日潮熱口乾可用新汲水調玉燭
散或水調甘露散亦妙勿作虛寒治之
濕門
凡婦人赤白帶下或出白物如脂可服導水丸禹功
散或單用無憂散量虛實加減泄訖服桂苓散五苓
散葶藶木香散同治濕法或用獨聖散上涌亦是室

女白帶下可用茶調散吐之吐訖可服導水丸禹功
散瀉之次服葶藶木香散四物湯白朮散之類則愈
矣治白帶者同瀉濕法則是也婦人有濁污水不止
亦同此法也
寒門
凡婦人年二三十無病而無子經血如常或經血不
調者乃陰不升而陽不降此上下不得交通有所滯
礙不能爲用故也可用獨聖散涌訖寒痰二三升後
用導水丸禹功散泄三五行或十餘行單用無憂散
泄十餘行見虛寒熱虛實用之次服葱白粥三五日
胃氣宣通腸中得實可服玉燭散更助白朮散茯苓
之類降火益水既濟之道當不數月而有孕內經曰
婦人有癃痔遺溺嗌乾諸證雖服妙藥針灸亦不能
孕蓋衝脉督脉任脉有此病不能孕故也
半産
凡婦人半産俗呼曰小産或三四月或五六箇月皆
爲半産以男女成形故也或因憂恐暴怒悲哀太甚
或因勞力撲打損傷及觸冒暑熱慎勿用黑神散以
其犯熱藥恐轉生他疾止宜用玉燭散和經湯之類
凡婦人天生無乳者不治或因啼泣暴怒鬱結氣血

閉塞以致乳脉不通用精猪肉清湯調和美味於食
後調益元散五七錢連服三五服更用木梳梳乳房
週迴則乳汁自下也
又一法猪蹄調下益元散連服之
又一法針肩井二穴長驗
小兒風門
凡小兒三五歲或七八歲至十餘歲發驚涎潮搐搦
如拽鋸不省人事目瞪喘急將欲死者內經曰此者
得之在母胎胞之所受悸惕驚駭恐懼之氣故今小
兒輕者爲驚風天吊重者爲癇病風搐胎中積熱者

風已上諸風證可用吐涎散吐之吐訖宜服犀
[illegible]清涼墜痰之藥其食乳子母皆宜服之安魂定
魄之藥定志丸之類是也故婦人懷孕之月大忌悲
哀驚怖縱得子必有前疾小兒風熱涎嗽者可以通
聖加半夏同煎溫服

凡小兒赤澁眼數日不開皆風熱所致可服涼膈散
瀉肝經風熱鬱甚鬱結散而自開也

凡小兒通身浮腫是風水腫也小便不通者宜利小
便則愈內經曰三焦閉塞水道不利水滿皮膚身體
痞腫是乘之故可用長流水加燈心煎五苓散時時

呷之更於不透風處浴之汗出則腫消一汗減半再
汗減七八分三汗消盡內外俱行也

二火類

凡小兒瘡疱癮疹麩疹丹熛等疾如遇火運勝時發
惑亂行之者不可便用升麻散解之升麻湯味辛性
溫內經曰積溫而成熱是謂重火止可以辛涼之劑
解之如遇平時可以辛溫蓋平時無事便同水化然
而更宜審察病機甚者亦不可以辛溫但發散之後
便以涼膈散加當歸及白虎湯[illegible]散煎服之更其
者解毒湯調胃散下之古人云斑疹瘡疱首尾俱不
[illegible]皆誤矣豈不聞揚湯止沸不如抽薪內經曰下
[illegible]五申之歲多發此病者蓋明相火之所為也又曰
少陽客氣勝丹疹外發又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火
王太僕又謂百端之起皆自心生豈可便用辛溫發
散乎致熱勢增劇漸成臟毒下血咬牙發搐大熱明
矣如白虎加人參涼膈散加當歸桔梗勿問秋冬但
見瘡疹用之神良

凡小兒瘡疱癮疹麩瘡丹熛斑毒之後臟毒下血內
經曰少陽客氣勝則丹熛瘡疹于外也蓋餘熱不解
故臟毒下血治以黃連解毒湯白虎湯涼膈散臨證

選而用之所謂白虎[illegible]說秋冬勿用皆慢也但有此
證便用之蓋其證屬相火故也大人亦同

凡小兒丹瘤浮腫毒赤走引遍身者乃邪熱之毒者
可用磁片撥出紫血其病立愈如不愈者後用涼膈
散加大黃芒硝利三五行為妙次用拔毒散掃三五
度必愈矣經曰丹熛赤瘤火之色也相火主之

凡小兒有赤瘤暴腫可先用牛黃通膈丸瀉之後用
陽起石散傅之則腫毒自消如不消可用鈹針砭刺
血出而愈矣

凡小兒甜瘡久不愈者俗呼為香瘡是也多在面部

兩耳前一法令毋口中嚼白米成膏子卧塗之不過三上則愈矣小兒并毋皆忌雞猪魚兎酒醋動風發熱之物如治甜指亦同此法

凡小兒面上瘡謂眉煉瘡耳上謂之轍耳足上瘡謂靴癬此三者一究其本皆謬名也經曰諸痛瘡瘍皆屬心火乃血熱劇而致然也或謂內經曰大槩不可使熱以爲皆然此不明造化之道也慎勿妄信可用鈹鍼刺之出血一刺不愈當復刺之再刺不愈則三刺必愈矣內經曰血實者决之眉煉不可用藥傅之以其瘡多痒痒則爬矣藥入眼則目必損矣

凡小兒牙疳齒䘌者是齗腐爛也下牙屬手陽明大腸之經燥金爲主上牙屬足陽明胃經濕土上下是腸胃二經也或積熱於內或因服銀粉巴豆大毒之藥入于腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而至于齒齗牙縫嫩薄之分反內害也可以射香玉線子治之乳母臨卧常服黄連解毒湯一服牙疳病則愈矣

凡小兒身熱吐瀉腹滿不進飲食可急與牛黄通膈丸下過四五行則自愈矣盖乳食便屬水甚則成濕以治濕法治之用燥熱之藥…

凡小兒水泄不止可用五苓散與益元散各停用新水調下二三錢頻服不拘時候若暴速注下甚者屬火凉膈通聖等散治之用者勿輕非深於造化者未易此語

凡小兒大人小便不通內經謂三焦約約者不行也可用長流水煎八正散時時嚾之大小便利則止若不因熱藥所攻而致此者易治或因多服熱藥而燥劇至此者非惟難治不幸夭耳亦可用蜜水調益元散送通膈丸

凡小兒久瀉不止至八九月間變爲秋深冷痢泄瀉者清白時時撮痛乳癖不化可用養脾丸如黍米大

每服二三十丸米飲送下日進三服則愈益黄散亦可用之

凡治小兒之法不可用極寒極熱之藥及峻補峻瀉之劑或恨用巴豆杏仁硫黄膩粉之藥若用此藥反生他病小兒易虚易實腸胃嫩弱不勝其毒若治之用此陰陽利水道最爲急用桂苓甘露散之類

儒門事親卷之十二

戴人張子和著
新安吳勉學校

吐劑

三聖散

防風三兩去蘆 瓜蒂二兩揀淨碾破以紙卷定連紙剉細去紙用粗羅子羅過另放末將滓炒微黃次入末一處同和勻 藜蘆去苗及心加減用之或一兩或半兩或一分

右各為麄末每服約半兩以齏汁三茶盞先用二盞煎三五沸去齏汁次入一盞煎至三沸却將原二盞同一處熬二沸去滓澄清放温徐徐服之不必盡劑以吐為度

瓜蒂散

瓜蒂七十五箇 赤小豆七十五箇 人參半兩去蘆 甘草半兩或一錢五分

右為細末每服一錢或半錢或二錢量虛實加減用之空心虀汁調下服之

稀涎散

猪牙皂角不蛀者去皮弦一兩炙用之 綠礬 藜蘆半兩

右為細末每服半錢或一二錢斡開牙關漿水調下灌之

鬱金散

鬱金 滑石 川芎各半兩

右為細末每服一二錢量虛實加減以虀汁調下空心服之

茶調散 一名二仙散

瓜蒂不以多少 好茶中停

右為細末每服二錢虀汁調下空心用之

聖散

瓜蒂不以多少

右為細末每服一錢或二錢虀汁調下服之膈痛加全蝎頭痛加鬱金

碧雲散 治小兒驚風有涎

膽礬半兩 銅青一分 粉霜一錢 輕粉一分

右研為細末每服一字薄荷湯調下用之如中風用漿水調服

常山散

常山二兩 甘草一兩半

右為細末水煎空心服之

青黛散

豬牙皂角二箇　玄胡索一箇　青黛少

右為細末鼻內灌之其涎自出

汗劑

防風通聖散

防風　川芎　當歸　芍藥　大黃　薄荷

麻黃去根不去節　連翹　芒硝已上各半兩　石膏

黃芩　桔梗已上各二兩　滑石三錢　甘草二兩

荊芥　白朮　山梔子已上各一兩

右為麄末每服五七錢水一大盞生薑三片煎至七分去滓熱服如涎嗽加半夏五錢生薑製過

雙解散

通聖散與益元散相合中停水一鍾生薑豆豉葱白同煎

浮萍散　治癩風

浮萍一兩　荊芥　川芎　甘草　麻黃去根

已上各一兩或加當歸芍藥

右為麄末每服一兩水二盞煎至七分去滓溫服汗出則愈

升麻湯

升麻去土　葛根　芍藥　甘草炒　已上各一兩

右為麄末每服三錢水一盞半煎至七分去滓服不拘時候

麻黃湯

麻黃一兩去根　官桂七錢　甘草二錢炙

杏仁二十二箇去皮尖麩炒黃色用

右為麄末每服三錢水一鍾煎至七分去滓溫服汗出自解

桂枝湯

桂枝一兩半　茯苓一兩　芍藥一兩　甘草七錢

右為麄末每服三錢水一盞生薑棗一同煎溫服

下劑

導水丸

大黃二兩　黃芩二兩　滑石四兩　黑牽牛四兩取頭末

則加

甘遂一兩去濕熱腰痛泄水濕腫滿久病

白芥子一兩去遍身走注疼痛

加

朴硝一兩退熱散腫毒止痛久毒宜加

郁李仁一兩散結滯通關節潤腸胃行滯氣通血脈

樟柳根一兩去腰腿沉重

右爲細末滴水丸梧桐子大每服五十丸或加至百丸臨卧温水下

禹攻散

黑牽牛頭末四兩 茴香一兩炒 或加木香一兩

右爲細末以生薑自然汁調一二錢臨卧服

通經散

陳皮去白 當歸各一兩

甘遂以麪包不令透水煮百餘沸取出用冷水浸過去麪焙乾

右爲細末每服三錢温湯調下臨卧服

神祐丸

甘遂依前製用 大戟醋浸煮焙乾用 芫花醋浸煮各半兩

黑牽牛一兩 大黄乙兩

右爲細末滴水丸小豆大每服五七十丸臨卧温水下

琥珀丸

右爲前神祐丸加琥珀一兩是也

益胃散

甘遂依前製不過用

右爲細末每服三錢以猜猪腰子一個細批破以塩椒等物淹透爛切摻藥在内以荷葉裹燒熟温淡酒

調服

大承氣湯

大黄半兩 厚朴乙兩 枳實乙枚麩炒 芒硝半兩

右爲麄末每服三五錢水一盞煎至七分去滓服

以意加減

小承氣湯

大黄 厚朴已上各乙兩 枳實乙枚

右爲麄末同前煎服

調胃承氣湯

大黄 甘草炙 朴硝已上各半兩

右爲粗末每服五七錢水一盞煎三五沸去滓温服食後

桃仁承氣湯

桃仁乙十二箇去皮尖 官桂 甘草 芒硝

已上各半兩

右剉如麻豆大每服三五錢水一大盞煎至七分去滓温服

玉井散

栝蔞根二兩 甘遂乙兩製用

右爲細末以射香湯調下三錢臨卧服

水煮桃紅丸
黑牽牛頭末半兩 瓜蔕末二錢 雄黃乙錢水飛用之
乾胭脂少許
右以黃水調麵爲丸以水煮令浮熟取出冷水拔
過射香湯水下
無憂散
黃耆 木通 桑白皮 陳皮已上各乙兩
胡椒 白朮 木香各半兩 牽牛頭末四兩
右爲細末每服三五錢以生薑自然汁調下食後
泄水丸又方藏用丸一料加芒硝半兩商陸半兩爲末水丸依前服之

大戟 芫花 甘遂 海帶 海藻 郁李仁
續隨子已上各半兩 樟柳根乙兩
右爲細末水煮棗肉爲丸如小豆大每服五七十
丸水下
牛黃通膈丸
黑牽牛 大黃 木通已上各半兩各另取末
右爲細末水丸如黍粒大量兒大小三五十丸或
百丸水下
四生丸一名搨腸丸
黑牽牛 大黃 朴硝 皂角去皮弦蜜炙

已上各等分
右爲細末水丸如梧桐子大每服七八十丸食
溫水下
內托散
大黃 牡蠣已上各半兩 甘草三錢 栝蔞二箇
右爲末水一大盞煎三五沸去滓露冷服
藏用丸
大黃 黃芩已上各二兩 滑石 黑牽牛各四兩
右爲末水丸桐子大每服五七十丸食後溫水下
神芎丸
藏用丸一料內加黃連薄荷川芎各半兩水丸

桐子大水下
進食丸
牽牛乙兩 巴豆三箇去油心膜
右爲末水丸每服二三十丸食後隨所傷物送下
牛黃白朮丸 治腰脚濕
黑牽牛末 大黃已上各二兩 白朮乙兩
右爲末滴水丸桐子大每服三十丸食前生薑湯
下要利加至百丸
玉燭散

以四物湯承氣湯朴硝各等分水煎去滓食前
服之

三和湯

以四物湯凉膈散當歸各中停水煎服

丁香化癖散　治小兒脾

白丁香　蜜陀僧　舶上硫黄 已上各二錢

硇砂 半錢　輕粉 少許

右研細末每兒一歲服半錢男病女乳調女病男
乳調後用通膈泄

抵當湯

水蛭 十箇　盲虫 十箇去翅足　大黄 一兩　桃仁 七枚去皮尖

右剉如麻豆作一服水二盞煎至七分去滓温服

抵當丸

盲虫 五箇　桃仁 六枚　大黄 三分　水蛭 五箇

右爲細末只作一丸水一大盞煮一丸至七分頓
服之

十棗湯

紫芫花 醋煮　大戟　甘遂 炒已上各等分

右爲末每服半錢水一盞棗十枚同煎取半盞服

除濕丹

檳榔　甘遂　威靈仙　赤芍藥　澤瀉

葶藶 已上各二兩　乳香 另研　没藥 另研

已上各一兩　黒牽牛末 半兩　大戟 二兩炒

陳皮 四兩去白

右爲細末麪糊和丸如桐子大每服三五十丸水
送下

利膈丸

牽牛 四兩生　槐角子 一兩炒　木香 一兩　青皮 一兩

皂角 去皮酥炙　半夏 洗各二兩

右爲細末生薑麪糊爲丸桐子大每服四五十丸
水送下

三一承氣湯

大黄　芒硝　厚朴 去皮　枳實 已上各五兩

甘草 一兩

右剉如麻豆大每服半兩水一大盞生薑三片煎
至六分入硝去滓熱服

大陷胸湯

大黄 半兩　芒硝 一兩八錢半　甘遂末 一字

右爲水一盞煮大黄至八分去滓入硝一沸下甘
遂末温服

小陷胸湯

半夏湯洗乙錢五分 黃連乙分半 苽蔞實之一 (依用四分)

右剉麻豆大水二盞先煮苽蔞至一盞半下諸藥

取八分去滓溫服未利再服

握宣丸

檳榔 肉桂 乾薑 附子 甘遂 良薑

韭子 巴豆已上各等分 入硫黃乙錢

一右爲細末軟米和丸桐子大早辰先椒湯洗手放

溫指乾用生油少許泥手心男左女右磨令熱握

一丸宜一二行

風門

防風通聖散方在瘡門中附

防風天麻散

防風 天麻 川芎 羌活 白芷 草烏頭

荊芥 當歸焙製 甘草 滑石 白附子

已上各半兩

右爲末熱酒化蜜少許調藥半錢加至一錢少時

覺藥行微麻爲度如作丸煉蜜和彈子大熱酒化

下一丸或半丸

防風湯

防風 麻黃 獨活 秦艽去蘆 黃芩 石

當歸 白朮已上各半兩

右爲粗末入半夏片子令攪勻每服四錢水二中

盞入生薑七片煎至一盞去滓取清汁六分入射

香少許帶熱食後服

祛風丸

川烏炮去皮臍 草烏炮 天南星 半夏薑製

菉豆粉 甘草 川芎 殭蚕 藿香

零苓香 地龍去土 蝎稍炒已上各乙兩

川薑半兩

右爲細末藥末一兩用菉豆粉一兩以白麵二兩

滴水和丸如桐子大陰乾細嚼茶清下三五丸至

五七丸食後初服三丸以漸加之

排風湯

當歸去芦 杏仁去皮尖麸炒 防風去芦 白蘚皮

白朮 芍藥 官桂去粗皮 川芎 甘草炒各三兩

獨活 麻黃去節 茯苓去皮各二兩

右爲粗末每用三錢水一盞半入生薑四片同煎

至八分去滓溫服不拘時候

小續命湯

麻黄去節 人參去蘆 黄芩 芍藥 川芎
甘草炙 杏仁湯泡去皮尖炒 防己 官桂去皮
防風去蘆各一兩 附子半兩去皮臍
右除附子杏仁外合擣爲粗末後入二味攪勻每
服三錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓少熱
服食後

消風散

川芎 羌活去蘆 人參去蘆 白茯苓去皮
白殭蚕炒 蟬殼同上已上各乙兩 陳皮去白
厚朴去粗皮薑製已上各乙兩

右爲細末每服二錢茶清調下

川芎散

川芎 荊芥 甘菊 薄荷 蟬殼 蔓荆子
已上各二兩 甘草乙兩炙
右爲細末茶酒任下二三錢食後服

搜風丸一名人參半夏丸

人參 茯苓 南星已上各半兩 半夏
乾生薑 白礬生 凝水石 已上各一兩
蛤粉二兩 薄荷半兩 藿香
右爲細末與蔵用丸末各中停水丸如菀豆大

服三十丸生薑湯送下

當歸川芎散

當歸 川芎 已上各半兩 甘草二兩
黄芩四兩 薄荷乙兩 縮砂仁一分
右爲細末溫水調下一二錢

愈風餅子

川烏半兩炮 川芎 甘菊 白芷 防風
細辛 天麻 羌活 荊芥 薄荷 甘草炙
已上各一兩
右爲細末水浸蒸餅爲劑捏作餅子每服三五餅

子細嚼茶酒送下不計時候

踈風丸

通聖散一料加天麻羌活 獨活細辛甘菊首烏
各半兩
右爲細末煉蜜和丸彈子大朱砂爲衣每服一丸
細嚼茶酒下

通頂散

石膏 川芎 瓜蒂 已上各等分
藜蘆少許
右爲細末鼻內嗃之

風湯

人參去蘆 茯苓去皮 川芎 官桂 當歸

芍藥 白朮

右件各等分爲末每服三錢水一盞入陳粟米煎

空心服之

香芎散

香附子炒 貫芎 石膏水飛 白芷 甘草

薄荷 已上各一兩 川烏半兩炒去皮臍

右爲細末每服二錢溫酒茶清調下無時

鐵彈丸

地龍去土 防風 白膠香 沒藥 木鱉去皮

草烏頭水浸炮 白芷 五靈脂 當歸

已上各一兩 細墨三錢 麝香另研 乳香另研

升麻各一錢

右爲末糯粥丸彈子大每服一丸生薑酒下

暑門 瘧附

白虎湯

知母一兩半去皮 甘草一兩 糯米一合

石膏四兩亂紋者另爲末

右剉如麻豆大粳米拌勻另水一盞煎至六分去

滓溫服無時日三四服或眩嘔者加半夏半兩薑

汁製過用之

桂苓甘露散

官桂半兩 人參 藿香 已上各半兩 茯苓

白朮 甘草 葛根 澤瀉 石膏 寒水石

已上各一兩 滑石二兩 木香一分

右爲細末每服三錢白湯點下新水或生薑湯亦

用可之

化痰玉壺丸

南星 半夏並生用 天麻 已上各半兩

白麵三兩

右爲細末滴水丸如桐子大每服三十丸用水一

大盞先煎令沸下藥煮候浮即熱漉出放溫別用

生薑湯下不拘時服

益元散

滑石六兩 甘草一兩

右爲細末每服三錢蜜調新水送下

玉露散 治暑

寒水石 滑石 石膏 栝蔞根

已上各四兩 甘草一兩

右爲細末每服五錢新水調下

石膏散

石膏一兩　人參去芦　甘草炙各半兩

右爲細末新水蜜水調三錢生薑湯亦可

辰砂丹　治瘧

信一錢　雄黑豆六十粒　朱砂二兩重

右爲細末朱砂爲衣端午日合不令雞犬婦人見

每服一丸無根水下

溫脾丸

信乙錢　甘草二錢　紫河車三錢　豆粉四兩

右爲末滴水丸每服半錢作十丸臨睡無根水下

溫脾散

紫河車　菉豆已上各乙兩　甘草半兩

砒乙錢另研

右爲細末後入砒研勻每服半錢新水送調下如是隔日發直待臨睡服藥如頻日發只夜深服忌葷酒魚兔等

濕門　嗽附

五苓散

官桂　澤瀉　猪苓去黑皮　茯苓去皮　白朮各半兩

右爲細末每服二錢熱湯或新水調下

葶藶木香散

苦葶藶　茯苓去皮　猪苓去皮已上各一分

木香半錢　澤瀉　木通　甘草各半兩

官桂一分　滑石三錢

右爲細末每服三錢生薑湯調下食前服

白朮木香散

白朮　猪苓　澤瀉　赤茯苓　各半兩

木香　檳榔　各三錢　陳皮一兩去白

官桂一錢　滑石三兩

右爲細末每服五錢水一盞生薑三片同煎至六分溫服食後

大橘皮湯

橘皮一兩半　木香一分　滑石六兩　檳榔三錢

茯苓一兩　猪苓去黑皮　澤瀉　白朮　官桂

已上各半兩　甘草二錢

右爲末每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服食後

神助散

苦葶藶炒二兩　黑牽牛三兩半微炒取頭末用之　澤瀉二兩

猪苓去皮二兩　椒目半兩
右爲細末每服葱白三莖漿水一盞煎至半盞入
酒半盞調藥三錢絕早面東服之
桂苓白朮丸
官桂　茯苓　半夏　已上各一兩　白朮
乾生薑一分　橘皮去白　澤瀉　黃連
各半兩　黃栢二兩
右爲末麵糊爲丸如小豆大每服三五十丸薑湯
食後服之

桂苓白朮散
官桂　茯苓　白朮　已上各半兩
甘草　澤瀉　石膏　寒水石已上各一兩
滑石二兩
右爲細末熱湯調下二錢新水生薑湯亦可食後服
白朮調中湯
白朮　茯苓　橘皮去白　澤瀉已上各半兩
甘草一兩　乾薑炒　官桂　縮砂仁　藿香
已上各一分
右爲末白湯化蜜少許調下二錢無時煉蜜每兩
作十丸名曰白朮調中丸

[illegible]散　治嗽
御米殼二兩蜜炙　人參　葶藶　已上各一
右爲末入烏梅同煎三五沸去滓稍熱服食後
寧肺散
御米去蒂蜜炒　甘草　乾薑　當歸　白礬
陳皮　已上各一兩
右爲末煎虀汁調三錢
人參補肺散
人參　麻黃去節　白朮　防巳　防風
各等分　桑白皮倍加
右剉㕮咀以漿水一椀煎至半去滓溫服每用半
兩各秤過

白朮湯
白朮　甘草　當歸　陳皮　桔梗
枳殼　各等分
右爲粗末水煎去滓溫服三五錢
薏苡仁湯
桔梗一兩　甘草二兩　薏苡仁三兩
右剉如麻豆大每服五錢水煎入糯米爲引米軟
爲度食後服之

治小兒痢

陳皮乙兩　青皮　柯子肉　甘草炙已上各半

丁香二錢

右為細末每服二錢水煎食前服之

香連丸

木香　柯子肉麵炒　黃連炒已上各半兩

龍骨二錢

右為細末飯丸如黍米大每服二十丸米飲湯下

火門

涼膈散

大黃乙兩　連翹四兩　甘草　黃芩　薄荷

朴硝　山梔　已上各一兩

右粗末每服三五錢水一盞入蜜竹葉煎三五沸

去滓溫服無時

黃連解毒湯

黃連　黃蘗　黃芩　大梔子　已上各等分

右剉為麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓

溫服之

瀉心湯

大黃　甘草炙　當歸　芍藥　麻黃　荆芥

已上各一兩半　白朮二錢半

右為細末每服二錢水一盞生薑薄荷少許同煎

至七分去滓溫服

八正散

大黃　瞿麥　木通　萹蓄　車前子　甘草

山梔子　已上各一兩　滑石二兩

加木香一兩尤佳

右為粗末每服三五錢水一盞入燈心煎至七分

去滓溫服

調胃散　治傷寒吐逆四肢厥冷

水銀　舶上硫黃　各半兩

右二味先研硫黃極細次入水銀同研至深黑每

服一錢病重者二錢溫米飲調服不拘時

三黃丸

大黃　黃芩　黃栢　已上各等分

右為末水丸每服三十丸水下

又方去黃芩用黃連

芍藥蘗皮丸

芍藥白者　黃栢去皮　各一兩　當歸　黃連

各半兩

右爲末水丸桐子大每服三十丸水下食前

大金花丸

黃連　黃蘗　黃芩　大黃各等分

右爲末水丸新水下三十丸加梔子減大黃名梔子金花丸

清凉飲子

大黃蒸　赤芍藥　當歸　甘草炒

已上各等分

右爲末每服一二錢水一盞煎至七分去滓溫服食後以意加減

黃連清心湯

凉膈散加黃連半兩是也

犀角散

黃連　大黃　芍藥　犀角　甘草各等分

右爲粗末每服五錢水一盞煎至七分去滓無時溫服之

黃連木通丸　治心經畜熱夏至則甚

黃連二兩　木通半兩

右爲末生薑汁打麵糊和丸每服三十丸食後燈心湯下日三服

燥門

神功丸

大黃麵裹蒸　訶子皮　麻子仁另搗　人參去蘆

已上各一兩

右爲細末入麻子仁搗研勻煉蜜丸如桐子大每服二十丸溫水下或酒米飲下食後臨卧如大便不通加服

脾約丸

麻仁一兩二錢半　枳實麩炒　厚朴去粗皮　芍藥

已上各二兩　大黃蒸四兩　杏仁去皮尖炒黃一兩二錢

右爲細末煉蜜爲丸桐子大每服二十丸臨卧溫水送下

麻仁丸

郁李仁去皮另搗　火麻子仁另搗　二味各二兩

大黃二兩半生半熟　檳榔半兩　乾山藥　防風去芦

枳殼七錢半炒去穰　羌活　木香各五錢半

右爲細末入另搗者三味攪勻煉蜜丸如桐子大每服二十丸至三十丸溫水下食後牽牛滑石

潤體丸

郁李仁　大黃　桂心　黑牽牛　當歸

厚朴並生用各半兩 輕粉少許

右爲末滴水丸如桐子大每服三十丸至四十丸溫水或生薑湯下

寒門

薑附湯

乾薑二兩另爲粗末 附子乙兩生用去皮臍細切

右二味攪勻每服三錢水一盞半煎至一盞去滓溫服食前

四逆湯

甘草三兩 乾薑半兩 附子半兩生用去皮臍切作片子

右爲粗末每服三五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服無時

二薑湯

良薑 乾薑炮 二味各三兩

右爲細末酒煮糊爲丸桐子大每服三十丸空心米飲湯下

朮附湯

黑附子重乙兩 白朮乙兩半 甘草七錢炙

右爲細末每服三五錢水一盞半生薑五片棗一枚劈破同煎至一盞去滓溫服食後

大已寒丸

附子炮去皮臍 川烏頭炮去皮臍作豆大再炒黃 乾薑炮製

良薑炒 官桂去粗皮 吳茱萸已上各乙兩

右爲細末醋糊爲丸桐子大每服五七十丸米飲下食前

理中丸

人參去芦 白朮 乾薑 甘草炙 附子炮去皮臍 已上各一兩

右爲細末煉蜜爲丸每兩作十丸彈子大每服一丸以水一盞化破煎至七分稍熱空心服之

平胃散

厚朴薑製 陳皮 二味各三兩 蒼朮五兩泔浸

甘草三兩炒

右爲末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分去滓食前溫服

養脾丸

乾薑炮 硇砂 各二兩 茯苓去皮 人參去芦

麥蘗炒 各一兩 白朮半兩 甘草半炒乙兩

右爲細末煉蜜爲丸每兩作八丸每服一丸細嚼生薑湯下

兼治於內者

大柴胡湯

柴胡四兩　黃芩　赤芍藥　各一兩半

半夏二兩乙錢半　枳實一錢　大黃乙兩

右爲粗末入半夏片子每服三錢水一盞半入生薑五片棗一枚煎至一中盞濾去滓温服食後

小柴胡湯

柴胡四兩去芦　黃芩　人參　半夏湯洗七次切片

甘草　已上各一兩半

右爲粗末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚劈破同煎至七分去滓温服不拘時候

柴胡飲子

柴胡　人參　黃芩　甘草　大黃　當歸

芍藥　已上各半兩

右爲粗末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓温服

防風當歸飲子

柴胡　人參　黃芩　防風　甘草　芍藥

大黃　當歸　滑石　已上各一兩

右爲粗末每服三五錢生薑三片水一盞煎至七

分去滓温服不拘時候

白朮湯　治牛姙娠嘔吐血

白朮　黃芩　當歸　各等分

右爲末每服二三錢水煎食前服

兼治於外者

桂苓湯　麻黃湯　升麻湯

已上三方在前汗法中附

五積散

蒼朮二兩四錢　桔梗乙兩四錢　枳殼麩炒　陳皮二味各六錢

白芷　川芎　當歸　甘草炙　官桂去粗皮

厚朴　乾薑　各四錢

半夏湯洗　茯苓各三錢　麻黃乙錢去節

右除官桂枳殼別爲末外以慢火炒令黃色爲末與官桂等攪勻每服三錢水一盞半入生薑五片葱白三寸鹽豉七粒同煎至七分去滓温服無時

青衿散　治咽痰

益元散加薄荷青黛生蜜丸如彈子大噙化

獨治於內者

陷胸湯

大黃二兩半　芒硝乙兩八錢半　甘遂乙字另爲末

右以水三盞先煮大黃至一盞去滓下芒硝☐
次下甘遂末放溫服之

大黃丸

大黃　黑牽牛　枳殼　木通　已上各一兩
右爲末滴水爲丸如桐子大每服三十丸食後以
生薑湯下

備急丸

巴豆去皮油　大黃　乾薑炮　已上各一兩
右爲細末煉蜜丸桐子大每服三丸溫水下不拘
時服之

枳殼丸

商枳殼麩炒二兩　牽牛頭末四兩
右爲細末水丸如桐子大每服三十丸食前溫酒
或生薑湯下

蓮殼散　治血崩

棕皮燒灰　蓮殼燒灰存性已上二味各半兩
香附子三兩炒
右爲末米飲調下三四錢食前

木香檳榔丸

木香　檳榔　青皮　陳皮　廣茂燒　黃連
麩炒　已上各一兩　黃連　大黃各三兩
香附子炒　牽牛各四兩
右爲細末水丸如小豆大每服三十丸食後生薑
湯送下

導飲丸

青皮　陳皮　京三稜炮　廣茂炮　黃連
枳殼麩炒　已上各一兩　大黃　黃蘗　已上
各三兩　香附子炒　黑牽牛　已上各四兩
右爲細末桐子大用水丸每服三五十丸食後生
薑湯下

五香連翹散

丁香　青木香　沉香　熏陸香　麝香
木通　連翹　桑寄生　獨活　升麻　大黃
已上各等分
右爲粗末以竹瀝煎五七錢末利加大黃去滓稍
熱以利爲度

四物湯

川芎　當歸　熟地黃　芍藥　已上各等分
右爲粗末每服三四錢水一盞煎三五沸去滓溫
空心加草龍膽防已名一醉散治目暴發加蒲黃

治婦人漏血
當歸散 治血崩
當歸一兩 龍骨二兩炒赤 香附子三錢
椶毛灰五錢
右為末米飲調三四錢空心服
又一方當歸白芍藥香附炒各等分為末米飲湯
調下食前服
又當歸散 行經
當歸 杜蒺藜 各等分
右為末米飲湯調服食前

葛根散 解酒毒
甘草 乾葛花 葛根 縮砂仁 貫衆
各等分
右為粗末水煎三五錢去滓服之
定志丸
柏子仁 人參 茯苓 遠志去心 茯神
酸棗仁
右為末酒糊丸小豆大每服五七十丸生薑湯下
檳榔丸
檳榔一錢半 陳皮一兩 木香二錢半 牽牛半兩

右為末醋糊丸桐子大每服三十丸生薑湯
小檳榔丸
枳殼 陳皮 牽牛 已上各等分
右為細末水丸食後生薑湯下三四十丸
瞿麥散 治酒積
甘遂半兩麵裹煨 瞿麥 葛根 麥蘖 已上各一兩
右為末每服二錢酒調服
治氣積方 香附子為末生薑湯調下三二錢
獨治於外者
青金散
芒硝半錢 青黛半錢 乳香 沒藥 各少許

右為細末鼻內嗃之
拔毒散
寒水石不以多少燒令赤
右研為末以新水調雞翎掃痛處
水澄膏
雄黃三錢水飛 黃連半兩 鬱金一錢 黃柏半兩
大黃半兩 黃丹半兩水飛
右為細末量所腫處用藥多少新汲水一盞半抄藥
在內須臾藥沉慢去其澄者水盡然後用槐柳枝

燒藥數百餘轉如麵糊相似勻以小紙花子攤瘡
塗腫處更以雞翎蘸涼水不住掃之

魚膽丸 方

草龍膽　青鹽　腦子　已上各半兩
黃連 乙兩去鬚　硇砂　南硼砂　射香　鯉魚膽
已上各二錢

右除草龍膽鯉魚膽外同為細末先將草龍膽同
微研破以河水三升浸春秋二宿夏一宿冬三宿
將浸者病揉極爛用絹袋濾去滓於石器內慢火
熬成膏子點於水內不散用指頭捏開有絲乃膏
子成然後入魚膽拌勻將膏和上藥件末作劑丸
如粟米徐徐點可視之

金絲膏

黃丹　代赭石　玄精石　已上各半兩
爐甘石 燒乙兩　腦子 半錢　黃連　蕤仁 去皮油
二味各三錢　白丁香　南硼砂二味各一錢

右除硼砂腦子外同為細末以河水一升白砂蜜
三兩同熬三五沸然後入藥末再熬至半茶盞以
上用綿子濾過去滓次入硼砂腦末攪勻定磁器
內放徐徐點眼大有神効

[illegible]水散

黃連二錢　蜜陀僧 乙兩　乾胭脂 二錢　雄黃
菉豆粉 二錢　輕粉 乙錢

右為細末以溫漿水洗過用無垢軟帛揾淨藥
之大有効矣

杜瘡帶

五倍子　蜜陀僧　已上各等分

右為細末先入漿水漱過乾貼

麝香玉線子

豆粉 半兩　信 乙錢　枯白礬 乙錢半

右三件同研入射香半錢再研為細末滴水和於
手背上撚作線如用時先以漿水嗽了口用毛翎
了縫中淨臨卧乾貼或為線子住於縫中

化癭丹 治贅

海帶　海藻　海蛤　昆布　已上四味皆焙
澤瀉 炒　連翹　已上並各等分　豬靨
羊靨 各十枚

右為細末蜜丸如雞頭大臨卧噙化一二丸

通氣丸 同上

海藻　海帶　昆布　木通　甘草　已上各

一兩 柯子 海荷 已上各半兩 杏仁者浸去皮尖用之
右爲細末煉蜜和丸每夜噙化一丸忌油膩物
又方
海藻 海帶 昆布 澤瀉 木通 猪靨
羊靨 各五枚 海蛤 連翹
右爲細末研靨爲丸如雞頭大每服一丸臨卧噙
化下效
消毒散 治喉腫
當歸 荊芥 甘草 各等分

右爲末水煎三五錢去滓熱嗽之
煮肝散 治雀目
青蛤粉 夜明砂 穀精草 各等分
右爲細末每服五七錢猪肝内者熟細嚼茶淸下
枯瘤方
硇砂 粉霜 雄黃 已上各二錢 輕粉
沒藥 乳香 已上各一錢 土黃一錢
射香 少許
右爲細末以津調塗瘤頂外邊歇一韮葉先花紙
貼之上以小黃膏貼之

小黃膏
黃栢 黃芩 大黃 已上各等分
右爲細末以水調爲糊比前藥大一遭三日一易
至八九上不取直候可取
剪刀藥
石灰一斤陳年者 龍骨四兩 刺薊一小束
右爲末杵作泥爲餅子或爲散貼端午日合
木香檳榔散
木香 檳榔 黃連 乳香 輕粉 密陀僧
已上各等分

右爲細末乾摻之先以口噙漿水洗之
又方加 黃栢 射香
陽起石散
陽起石 燒
右研末新水調塗腫處
鉛白霜散
鉛白霜 乾胭脂 寒水石 已上各等分
腦子 輕粉 各少許
右爲末摻之
雄黃散

雄黃 乳香 沒藥 射香少許

右為末量瘡大小乾貼

化斑湯

紫草 升麻 甘草炙 各半兩

右剉麻豆大水一盞糯米二十粒煎至一盞去滓
溫服

調治

無比山藥丸

乾山藥二兩 肉蓯蓉四兩剉酒浸焙 五味子六兩揀淨

兎絲子三兩酒浸 杜仲三兩去粗皮炒 牛膝乙兩酒浸

澤瀉乙兩 熟地黃乙兩 山茱萸乙兩 茯苓去皮乙兩 巴戟去心乙兩 赤石脂乙兩

右為細末煉蜜和丸桐子大每服二三十丸食前
溫酒下米飲亦可

當歸丸

當歸 香附子炒 杜蒺藜 芍藥 各等分

右為末酒糊為丸如小豆大每服三五十丸米飲
送下

香薷湯

香薷五錢去土 厚朴五錢薑製 白萹豆二錢半上炒

右為末每服三錢水一盞入酒煎去滓溫服

石葦散

石葦去毛 木通 各二兩 當歸 甘草

王不留行 已上各一兩 滑石 白朮

瞿麥 葵子 芍藥 已上各三兩

右為細末每服二錢煎小麥湯調下

妙功丸

京三稜炮乙兩 川烏去皮四錢生 大黃乙兩

已上同為細末好醋半升熬膏不破積水丸

神麴 麥蘗 已上各一兩 乾薑二錢炒裂用

巴豆兩箇去皮油心 半夏半兩 茴香乙兩炒香

官桂 牽牛三兩揀淨

右為細末用膏丸小豆大生薑湯下十丸十五丸
溫涼水亦可以意加減以利為度

人參散

石膏 甘草 已上各一兩 滑石四兩

寒水石二兩 人參半兩

右為末每服二錢溫水調下食後

茴香丸

茴香八兩炒 川楝子炒 川烏炮去皮 威靈仙

洗去土 防風去芦 陳皮 已上各三兩

地龍乙兩去土微炒 烏藥五兩 赤小豆八兩

右爲末酒糊爲丸每服三五丸茶酒下

七宣丸

大黄濕紙裹煨 枳實麩炒 木香 柴胡去芦

柯子皮各五兩 桃仁六兩炒去皮尖 甘草四兩炒

右爲末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸酒下

人參調中湯

沉香二兩 木香 白豆蔻乙兩用仁 甘草乙分

腦子乙錢 射香半錢 人參半兩

右爲細末每服半錢用沸湯點服或入生薑鹽少許食後服

烏金散

當歸乙兩 自然銅金色者煅爲末醋淬乙兩 烏金石鉄炭是也三兩 大黄乙兩童子小便浸用

右爲末每服二錢紅花酒半盞童子小便半盞同調下食前日二服

沉香降氣湯

沉香 木香 硇砂仁 白豆蔻仁 青皮去白

陳皮去白 廣茂煨 枳實麩炒 已上各一兩

蘿白子乙兩另末 黒牽牛二兩末 大黄二兩炒

右爲末生薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大每服三十丸橘皮湯下

枳朮丸 治氣不下降胸膈滿悶

枳實麩炒 白朮 各半兩

右爲細末燒飯爲丸如桐子大每服五十丸諸飲送下

儒門事親卷之十二

劉河間先生三消論　因在前此書未傳於世恐為沉沒故刊而行之

易言天地自太虛至黃泉有六位內經言人之身自頭至足亦有六位今余又言人胸腹之間自肺至腎又有六位人與天地造化五行同一爐備知彼則知此矣故立天之氣曰金與火立地之氣曰土與水立人之氣曰風與火故金與火合則熱而淸水土合則濕而寒風火合則溫而炎人胸腹之間亦猶是也肺最在上為金主燥淸心次為君火主熱肝又次之為風木主溫膽又次之為相火主極熱脾又次之為濕

土主涼腎又次之黃泉為寒水主寒故心肺象天脾腎象地肝膽象人不知此者不可與論人之病矣夫土為萬物之本水為萬物之元水土合德以陰居陰同處乎下以立地為氣萬物根於地是故水土濕寒若燥熱陽實則地之氣不立萬物之根索澤而枝葉枯矣五常政大論曰根於中者命曰神機是為動物根本在於中也根本者脾胃腎也食入胃則脾為布化氣味榮養五藏百骸故酸入肝而養筋膜苦入心而養血脈甘入脾而養肌肉辛入肺而養皮毛鹹入腎而養骨髓五氣亦然故淸以養肺熱以養心溫養肝濕

養脾寒養腎也凡此五味五氣太過則病不及亦病惟平則常安矣故六節藏象論曰五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生是其理也又太陰陽明論云脾病而四肢不用者何也岐伯曰四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟也今脾病不能為胃行其津液不得稟水穀氣脾日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉帝曰脾不主時何也岐伯曰脾者土也治中央常以四時長四臟各十八日寄治不得獨主於時也脾藏者常著胃土之精也土者生萬物而法天地

故上下至頭足不得獨主於時也帝曰脾與胃以膜相連耳而能行其津液何也岐伯曰足太陰者三陰也其脈貫胃屬脾絡嗌故太陰為之行氣於三陰足陽明者表也五臟六腑之海也亦為之行氣於三陽臟腑各因其經而受氣以益陽明故為胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以衰陰道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉不用者謂不能為之運用也由是觀之則五臟六腑四肢百骸皆稟受於脾胃行其津液相與濡潤滋養矣後之醫者欲以燥熱之劑以養脾胃滋土之氣不亦外乎況消渴之病者本濕寒

之陰氣極衰燥熱之陽氣太甚更服燥熱之藥則脾胃之氣竭矣叔世不分五運六氣之虛實而一槩言熱爲實而虛爲寒彼但知心火陽熱一氣之虛實而非臟腑六氣之虛實也蓋肺本清虛則溫心本熱虛則寒肝本溫虛則清脾本濕虛則燥腎本寒虛則熱假若胃冷爲虛者乃胃中陰水寒氣實甚而陽火熱氣衰虛也非胃土濕氣之本衰故當溫補胃中陽火之衰退其陰水寒氣之甚又如胃熱爲實者乃胃中陽火實而陰水虛也故當以寒藥瀉胃中之實火而養其虛水然此皆補瀉胃中虛熱水火所乘之邪非

胃爲濕者之本其餘例同法夫補瀉脾胃濕土之水氣者潤其濕者是補濕燥其濕者是瀉濕土本濕故也凡臟腑諸氣不必腎水獨當寒心火獨當熱要知每臟每腑諸氣和同宜而平之可也故余嘗謂五常之道陰中有陽陽中有陰孤陰不長獨陽不成但有一物皆備五行遞相濟養是謂和平交互克伐是謂衰與變亂失常災害由行故水少火多爲陽實陰虛而病熱也水多火少爲陰實陽虛而病寒也其爲治者寫實補虛以平爲期而已矣故治消渴者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚濟

身津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不澁則病日已矣況消渴者本因飲食服餌失宜腸胃乾涸而氣液不得宣平或耗亂精神過違其度或因大病陰氣損而血液衰虛陽氣悍而燥熱鬱甚之所成也故濟衆云三消渴者皆由久嗜鹹物恣食炙煿飲酒過度亦有年少服金石丸散積久石熱結于胸中下焦虛熱血氣不能制石熱燥甚於胃故渴而引飲若飲水多而小便多者名曰消渴若飲食多而不甚饑小便數而漸瘦者名曰消中若渴而飲水不絕腿消瘦而小便有脂液者名曰腎消如此三

消者其燥熱一也但有微甚耳余聞世之方多一方而通治三消渴者以其善消水穀而喜渴也然叔世論消渴者多不知本其言消渴者上實熱而下虛冷上熱故煩渴多飲下寒故小便多出本因下部腎水虛而不能制其上焦心火故上實熱而下虛冷又曰水數一爲物之本五行之先故腎水者人之本命之元不可使之衰弱根本不堅則枝葉不茂元氣不固則形體不榮消渴病者下部腎水極冷若更服寒藥則元氣轉虛而下部腎水轉衰則上焦心火亢甚而難治也但以暖藥補養元氣若下部腎水得實而勝

退上焦火則自然渴止小便如常而病愈也若此之
言正與仲景相反所以巧言似是於理實違者也非
徒今日之誤誤已久哉又如蔣氏藥證病原中論消
渴消中消腎病曰三焦五臟俱虛熱惟有膀胱冷似
氷又曰腰腎虛冷日增重又曰膀胱腎臟冷如泉始
言三焦五臟俱虛熱惟有膀胱冷似氷復言五臟亦
冷且腎臟水冷言爲虛其餘熱者又皆言其虛夫陰
陽興衰安有此理且其言自不相副其失猶小至於
寒熱差殊用藥相反過莫大焉或又謂腎與膀胱屬
水虛則不能制火虛既不能制火故小便多者愈失

之遠矣彼謂水氣實者必能制火虛則不能制火故
陽實陰虛而熱燥其液小便淋而常少陰實陽虛不
能制水小便利而常多豈知消渴小便多者非謂此
也何哉蓋燥熱太甚而三焦腸胃之腠理怫鬱結滯
緻密壅塞而水液不能滲泄浸潤於外榮養百骸故
腸胃之外燥熱太甚雖復多飲于中終不能浸潤於
外故渴不止小便多出者如其多飲不能滲泄於腸
胃之外故數溲也故金匱言原病式曰皮膚之汗孔
者謂泄汗之孔竅也一名氣門者謂泄氣之門戶也
一名腠理者謂氣液之隧道紋理也一名鬼門者謂

幽冥之門也一名玄府者謂玄微之府也然玄府者
無物不有人之臟腑皮毛肌肉筋膜骨髓爪牙至於
萬物悉皆有之乃出入升降道路門戶也故經曰出
入廢則神機化滅升降息則氣立孤危故非出入則
無以生長壯老非升降則無以生長化收藏是知出
入升降無器不有故知人之眼耳鼻舌身意神識能
爲用者皆由升降出入之通利也有所閉塞則不能
用也若目無所見耳無所聞鼻不聞香舌不知味筋
痿骨痺爪退齒腐毛髮墮落皮膚不仁腸胃不能滲
泄者悉由熱氣怫鬱玄府閉塞而致津液血脈榮衛

清氣不能升降出入故也各隨鬱結微甚而有病之
大小焉病在表則怫鬱腠理閉密陽氣不能散越故
燥而無汗而氣液不能出矣叔世不知其然故見消
渴數溲妄言爲下部寒爾豈知腸胃燥熱怫鬱使之
然也予之所以舉此世爲消渴之證乃腸胃之外燥
熱痞閉其滲泄之道路水雖入腸胃之內不能滲泄
於外故小便數出而復渴此數句足以盡其理也試
取內經凡言渴者盡明之矣有言心肺氣厥而渴者
有言肺痺而渴者有言脾熱而渴者有言腎熱而渴
者有言胃與大腸熱結而渴者有言脾痺而渴者有

言小腸癉熱而渴者有因病瘧而渴者有因肥甘石藥而渴者有因醉飽入房而渴者有因遠行勞倦遇大熱而渴者有因傷害胃乾而渴者有因腎熱而渴者有因病風而渴者雖五臟之部分不同而病之所遇各異其歸燥熱一也

所謂心肺氣厥而渴者厥論曰心移熱於肺傳爲膈消注曰心熱入肺久而傳化內爲膈熱消渴多飲也

所謂肝脾而渴者痺論曰肝痺者夜卧則驚多飲數小便如脾熱而渴者痿論曰脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發爲肉痿

所謂腎熱而渴者刺熱論曰腎熱病者先腰痛䯒痠苦渴數飲身熱熱論曰少陰脉貫腎絡於肺繫舌本故曰燥舌乾而渴叔世惟言腎虛不能制心火爲上實熱而下虛冷以熱藥溫補腎水欲令勝退心火者未明陰陽虛實之道也夫腎水屬陰而本寒虛則爲熱心火屬陽而本熱虛則爲寒若腎水陰虛則心火陽實是謂陽實陰虛而上下俱熱明矣故氣厥論曰腎氣衰陽氣獨勝宣明五氣論曰腎惡燥由燥腎枯水涸藏氣發時論曰腎苦燥急食辛以潤之夫寒物屬陰能養水而瀉心熱物屬陽能養火而耗水令腎水既不勝心火則上下俱熱奈何以熱藥養腎水欲令勝心火豈不繆哉又如胃與大腸熱結而渴者陰陽別論曰二陽結爲之消注曰陽結胃及大腸俱熱結也腸胃藏熱善消水穀又氣厥論曰大腸移熱於胃善食而瘦脉要精微論曰癉成爲消中善食而瘦如腸痺而渴者數飲而不得中氣喘而爭時發飧泄夫數飲而不得中其大便必不停留然則消渴數飲而小便多者止是三焦燥熱怫鬱而氣衰也明矣豈可以燥熱毒藥助其強陽以伐衰陰乎此真實實虛虛之罪也夫消渴者多變聾盲瘡癬痤痱之類皆腸胃

燥熱怫鬱水液不能浸潤於周身故也或熱甚而膀胱怫鬱不能滲泄水液妄行而面上腫也如小腸癉熱而渴者舉痛論曰熱氣留于小腸腸中痛癉熱焦渴則便堅不得出矣注曰熱滲津液而小便堅矣如言病瘧而渴者瘧論曰陽實則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故欲飲冷也然陽實陰虛而爲病熱法當用寒藥養陰瀉陽是謂瀉實補衰之道也如因肥甘石藥而渴者奇病論曰有口甘者病名爲何岐伯曰此五氣之所溢也病名脾癉癉爲熱也脾熱則四臟不稟故五氣上溢也先因脾熱故曰脾癉[illegible]

何已五味入口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故令人口甘也此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉而為消渴通乎虛實論曰消癉仆擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴之人膏粱之疾也或言人惟胃氣為本脾胃合為表裏脾胃中州當受溫補以調飲食今消渴者脾胃極虛益宜溫補若服寒藥耗損脾胃本氣虛乏而難治也此言乃不明陰陽寒熱虛實補瀉之道故妄言而無畏也豈知腹中論云帝曰夫子數言熱中消中不可服芳草石藥石藥發癲芳草發狂

注言多飲數溲謂之熱中多飲數溲謂之消中多喜曰癲多怒曰狂芳美味也石謂英乳乃發熱之藥也經又曰熱中消中皆富貴人也今禁膏粱是不合其心禁芳草石藥是病不愈願聞其說岐伯曰芳草之味美石藥之味悍二者之氣急疾堅勁故非緩心和人不可服此二者帝曰何以然岐伯曰夫熱氣慓悍藥氣亦然所謂飲一溲二者當肺氣從水而出也其水穀之海竭矣凡見消渴便用熱藥誤人多矣故內經應言渴者皆如是豈不昭晰歟然而猶有惑者諸氣過極反勝也者是以人多誤也如陽極反似陰者

是也若不明標本認似為是始終再矣故凡見下部覺冷兩膝如水此皆心火不降狀類寒水宜加寒藥下之三五次則火降水升寒化自退然而舉世皆同執迷至如易素二書棄如朽壞良可悲夫故處其方必明病之標本達藥之所能通氣之所宜而無加害者可以制其方也已所謂標本者先病而為本後病而為標此為病之本末也標本相傳先當救其急也又云六氣為本三陰三陽為標蓋為病藏病最急也又云六氣為胃之本假若胃熱者胃為標熱為本也處其方者當除胃中之熱是治其本也故六氣乃以

甚者為邪衰者為正法當瀉甚補衰以平為期養正除邪乃天之道也為政之理補賊之義也大凡治病明知標本按法治之何必謀於眾陰陽別論曰謹熟陰陽無與眾謀標本病傳論知標知本萬舉萬當不知標本是謂妄行至真要大論曰知標知本用之不殆明知逆順正行無問不知是者不足以言診適足以亂經故大要曰粗工嘻嘻以為可知言熱未已寒病復起同氣異形迷診亂經此之謂也夫標本之道要而博小而大可以言一而知百言標與本易而弗損察本與標氣可令調明知勝復為萬民式天之道

畢矣天元紀大論曰至數極而道不惑可謂明矣所謂藥之巧能者温涼不同寒熱相反燥濕木異云云前已言之矣斯言氣也至於味之巧能如酸能收甘能緩辛能散苦能堅鹹能軟酸屬木也燥金主於散落而木反之土濕主於緩而水勝之故能然也若能燥濕而堅火者苦也易曰燥萬物者莫熯乎火凡物燥則堅也甘能緩苦急而散結甘者土也燥能急結故緩則急散也辛能散抑散結潤燥辛者金也金主散落金生水故也況抑結散則氣液宣行而津液生也藏氣發時論曰腎苦燥急食辛以潤之開腠理致

津液通氣也鹹能軟堅鹹者水也水潤而柔故勝火之堅矣此五臟之味也其為五味之本也淡也淡胃土之味也胃土者地也地為萬物之本胃為一身之本天元紀大論曰在地為化化生五味故五味之本淡也以配胃土淡能滲泄利竅夫燥能急結而甘能緩之淡為剛土極能潤燥緩其急結令氣通行而致津液滲泄也故消渴之人其藥與食皆宜淡劑至真要大論曰辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽六者或散或收或緩或急或燥或潤或堅或軟所以利而行之調其氣也本草云藥

有三品上品為君主養命小毒以應天中品為臣主養性常毒以應人下品為佐使主治病大毒以應地不在三品者氣毒之物也凡此君臣佐使者所以明藥之善惡也處方之道主治病者為君佐君者為臣應臣之用者為佐使適其病之所根有君臣佐使奇偶小大之制明其歲政君臣脉位而有逆順反正主療之方隨病所宜以施用其治法多端能備所用者良工也寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫之結者散之散者收之微者逆而制之甚者從而去之燥者潤之濕者燥之堅者軟之軟者堅之急者緩之客

者除之留者卻之勞者溫之逸者行之驚者平之衰者補之甚者瀉之吐者下之摩之益之薄之劫之開之發之灸之制之適足為用各安其氣必清必靜而病氣衰去臟腑和平歸其所宗此治之大體也陰陽應象論曰治不法天之紀不明地之理則災害至矣又六節藏象論曰不知年之所加氣之所衰不可以為功也今集諸經驗方附于篇末

神白散　治真陰素被損虛多服金石等藥或嗜炙煿鹹物遂成消渴

桂府滑石 六兩　甘草 乙兩生用

一方爲細末每服二三錢温水調下或大渴欲飲冷者新汲水尤妙

猪肚丸　治消渴消中

猪肚 一枚　黄連 五兩　括蔞 四兩　麥門冬 去心四兩　知母 四兩如無以茯苓代之

右四味爲末納猪肚中線縫安置甑中蒸極爛熟就熱於木臼中搗可丸如硬少加蜜丸如桐子大每服三十丸漸加至四五十丸渴則服之如無木臼以沙盆中用木杵研亦可以爛爲妙矣

葛根丸　治消渴消腎

葛根 三兩　括蔞 二兩　鉛丹 二兩　附子 一兩炮去皮臍用

右四味搗羅爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十丸日進三服治日飲碩水者春夏去附子

胡粉散　治大渴百方療不瘥者亦治消腎

鉛丹　胡粉 各半兩　括蔞 一兩半　甘草 二兩半炙　澤瀉　石膏　赤石脂　白石脂 各半兩

右八味爲細末水服方寸匕日二服壯者一匕半一年病一日愈二年病二日愈消甚者二服腹痛者減之如丸服亦妙每服十丸多則腹痛也

三黄丸　主治男子婦人五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足發寒熱者

春三月　黄芩 四兩　大黄 二兩　黄連 四兩
夏三月　黄芩 六兩　大黄 一兩　黄連 一兩
秋三月　黄芩 六兩　大黄 二兩　黄連 三兩
冬三月　黄芩 三兩　大黄 五兩　黄連 二兩

右三味隨時加減搗爲細末煉蜜和丸如大豆大每服五丸日三服不去者加七丸服一月病愈嘗試有驗矣

人參白术散

治胃膈癉熱煩滿不欲食或癉成爲消中善食而瘦或燥鬱甚而消渴多飲而數小便或熱病或恣酒色誤服熱藥者致脾胃真陰血液損虚肝心相搏風熱燥甚三焦腸胃燥熱怫鬱而水液不能宣行則周身不得潤濕故瘦瘁黄黒而燥熱消渴雖多飲而水液終不能浸潤於腸胃之外渴不止而便注爲小便多也叔世俗流不明乎此妄爲下焦虚冷誤死多矣又如周身風熱燥鬱或爲目瘴癰疽瘡瘍上爲喘嗽下爲痿痺或停積而濕熱内甚

不能傳化者變水腫腹脹也凡多飲數溲爲消渴多
食數溲爲消中肌肉消瘦小便有脂液者爲消腎
此世之所傳三消病也雖無所不載以内經者之
但燥熱之微甚者也此藥兼療一切陽實陰虛風
熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過積毒一切腸胃
澁滯壅塞瘡癬痿痺并傷寒雜病煩渴氣液不得
宣通并宜服之

人參　白术　當歸　芍藥
大黄　山梔子　澤瀉　已上各半兩
連翹　瓜蔞根　乾葛　茯苓

已上各一兩　官桂　木香　藿香
各一分　寒水石二兩　甘草二兩
石膏四兩　滑石　盆硝各半兩

右爲粗末每服五錢水一盞生薑三片同煎至半
盞絞汁入蜜少許溫服漸加十餘錢無時日三服
或得臟腑疏利亦不妨取効更妙後却常服之或
兼服消痞丸似覺腸胃結滯或濕熱内甚自利者
去大黄芒硝

人參散

治身熱頭痛或積熱黄瘦或發熱惡寒蓄熱寒戰
或膈痰嘔吐煩熱煩渴或燥濕瀉痢或目疾口瘡
或咽喉腫痛或風昏眩或蒸熱虛汗肺痿勞嗽一
切邪熱變化真陰損虛並宜服之

石膏一兩　寒水石二兩　滑石四兩
甘草二兩　人參半兩

右爲細末每服二錢溫水調下或冷水亦得

三消之論劉河間之所作也因麻徵君寓汴梁暇日
訪先生後裔或舉教醫學者即其人矣徵君親詣其
家求先生平昔所著遺書乃出三消論氣宜病機三
書未傳于世者文多不全止取三消論於卷首增寫

六位藏象二圖其餘未遑潤色即付友人穆子昭子
昭乃河間門人穆大黄之後也時覓官于京師方且
告因徵君欲因是而惠之由是余從子昭授得一本
後置兵火遂失其傳偶於鄉人霍司承君祥處復見
其文然傳寫甚誤但依倣而錄之以符後之學者詳
爲刊正云時甲辰年冬至日錦溪野老書續方栢亭

東久亭寺僧悟大師傳經驗方

治飲水百盃尚猶未足小便如油或如杏色服此
藥三五日小便大出毒歸于下十日永除根本此
方令子和辯過云是重劑可用悟公師親驗過矣

水銀四錢 錫二錢用水銀研成砂子 牡礪乙兩
蜜陀僧乙兩 知母乙兩 紫花苦參乙兩
貝母乙兩 黄丹半兩 瓜蔞根半斤
右爲細末男子用不生兒猪肚一箇內藥婦人用獖猪肚一箇麻線縫之新瓦一合繩紮一兩遭米一升更用瓜蔞根末半斤却於新水煮熟取出放冷用砂盆內研爛就和爲丸如猪肚丸法用之

儒門事親卷之十三

儒門事親卷之十四

戴人張子和書
新安吳勉學校

扁鵲華陀察聲色定死生訣要

病人五臟已奪神明不守聲嘶者死
病人循衣縫譫語者不可治
病人陰陽俱絶掣衣撮空妄言者死
病人妄語錯亂及不能言者不治熱病者可治
病人陰陽俱絶失音不能言者三日半死
病人兩目眥有黄色起者其病方愈

病人面黄目青者至期而死重出在下文
病人面黄目赤不死赤如衃血者死
病人面黄目白者不死白如枯骨者死
病人面黄目黒者不死黒如苔死
病人面黒目青者不死
病人面目俱黄者不死
病人面青目白者死
病人面黒目白者不死
病人面赤目青者六日死
病人面黄目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪

入胃經臟氣妄泄目則爲青雖天救亦不可生
病人面赤口白者十日死憂恚思心氣內索面色反好急棺槨
病人面白目黑者死此謂榮華已去血脉空索
病人面黑目白八日死腎氣內傷病因留積
病人面青目白五日死
病人着牀心痛短氣脾氣內竭後百日復愈能起彷徨因坐於地其上倚牀能治此者也
病人耳目鼻口有黑色起于入口者必死
病人目無精光若土色不受飮食者四日死

病人目精光及牙齒黑色者不治
病人耳目及顴頰赤者死在五日中
病人黑色出于額上髮際直鼻脊兩顴上者亦死在五日中矣
病人黑色出天中下至上顴上者死
病人及徒人黑色若白色起入目及鼻口者死在三日中矣
病人及徒人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者必死矣
病人面黑直視惡風者死

病人面黑脣青者死
病人面青脣黑者死
病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死
病人目不回直視者一日死
病人頭目久痛卒視無所見者死
病人陰結陽絶目睛脫恍惚者死
病人陰陽竭絶目眶陷者死
病人眉系傾者七日死
病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者死
病人昏遺尿不覺者死

病人尸臭者不可治
肝病皮黑肺之日庚辛死
心病目黑腎之日壬癸死
脾病脣青肝之日甲乙死
肺病頰赤目腫心之日丙丁死
腎病面腫脣黃脾之日戊己死
青欲如蒼璧之澤不欲如藍
赤欲如帛裹朱不欲如赭
白欲如鵝羽不欲如枯骨
黑欲如黑漆不欲如炭

黄欲如羅裹雄黄不欲如土
目赤色者病在心白在肺黒在腎黄在脾青在肝黄
色不可名者病在胸中
診目病赤脉從上下者太陽病也從下上者陽明病
也從外入内者少陽病也
診寒熱瘰癧目中有赤脉從上下至瞳子見一脉一
歲死見一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半
二歲半死見三脉三歲死
診牙齒痛按其陽明之脉來太過者獨熱在右右熱
熱在左左熱熱在上上熱熱在下下熱

診血者脉多赤多熱多青多痛多黒多黄多痺多赤
多黒多青皆見者寒熱身痛面色微黄齒垢黄爪甲上
黄疸也安卧少黄赤脉小而濇者不嗜食

診百病死生訣第七

診傷寒熱盛脉浮大者生沉小者死傷寒已得汗脉
沉小者生浮大者死
温病三四日已下不得汗脉大疾者生脉細小難得
者死不治
温病穰穰大熱其脉細小者死 千金穰穰作特行
温病下痢腹中痛甚者死不治

脉汗不出出不至足者死厥逆汗出脉堅强
生虚緩者死
温病二三日身體熱腹滿頭痛食如故脉直而疾者
八日死四五日頭痛腹痛而吐脉來細强十二日死
八九日頭不疼身不痛目不變色不變而反利脉來
喋喋按之不彈手時時心下堅十七日死
熱病七八日脉不軟一作喘不散一作數者當有瘖
瘖後三日温汗不出者死
熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥脉代舌
焦乾黒者死

熱病未得汗脉盛躁疾得汗者生不得汗者難瘥
熱病已得汗脉静安者生脉躁者難治
熱病已得汗大熱不去者亦死
熱病已得汗熱未去脉微躁者愼不得刺治
熱病發熱熱甚者其脉陰陽皆竭愼勿刺不汗出必
下利
診人被風不仁痿蹷其脉虚者生堅急疾者死
診癲病虚則可治實則死
診癲病脉實堅者生脉沉細者死
又癲疾脉得大滑者久而自已其脉沉小急實不可

小堅急者亦不可療也
診頭痛目痛久視無所見者死
診人心腹積聚其脉堅強急者生虛弱者死又實強者生沉者死其脉大腹大脹四肢逆冷其人脉形長者死腹脹滿便血脉大時絶極下血脉小疾者死
腸澼便血身熱則死寒則生
腸澼下白沫脉沉則生浮則死
腸澼下膿血脉懸絶則死滑大則生
腸澼之屬身熱脉不懸絶滑大者生懸濇者死以臟期之

腸澼下膿血脉沉小留連者生數疾且大有熱者死
腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死
洞泄食不化不得留下膿血脉微小連者生緊急者死
洩注脉緩時小結者生浮大數者死
蚕蝕陰注其脉虛小者生緊急者死
欬嗽脉沉緊者死浮直者浮軟者生小沉伏匿者死
欬嗽羸瘦脉形堅大者死
欬脫形發熱脉小堅急者死肌瘦下脫形熱不去者必死
欬而嘔腹脹且洩其脉弦急欲絶者死

吐血衂血脉滑小弱者生實大者死
汗出若衂其脉小滑者生大躁者死
吐血脉緊強者死滑者生
吐血而欬上氣其脉數有熱不得卧者死
上氣脉數者死謂損形故也
上氣喘息低昂其脉滑手足温者生脉濇四肢寒者必死
上氣面浮腫肩息其脉大不可治加利必死
上氣注液其脉虛寧伏匿者生堅強者死
寒氣上攻脉實而順滑者生實而則逆而者死太素云寒氣在上脉滿實何如曰實而滑則生實而逆則死矣其形盡滿何如曰舉形盡滿者脉急大堅尺濇而不應也如是者順則生逆則死何謂順則生逆則死所謂從者手足温也逆者手足寒也

病瘧脉實大病久可治脉弦小堅急病久不可治
消渇脉數大者生細小浮短者死
消渇脉沉小者生實堅大者死
水病脉洪大者可治微細不可治
水病脹閉其脉浮大軟者生沉細虛小者死
水病腹大如鼓脉實者生虛者死
卒中惡咯血數升脉沉[illegible]者死浮大疾快者生
卒中惡腹大四肢滿脉大而緩者生緊大而浮者死

緊細而微亦生
瘡腰脊強急瘈瘲皆不可治
寒熱瘈瘲其脉代絕者死
金瘡血出太多其脉虛細者生 實大者死
金瘡出血脉沉小者生浮大者死
斫瘡出血一二升脉來大二十日死
斫刺俱有病多少血出不自止者其脉來大者七日
死滑細者生
從頭頓仆內有血腹脹滿其脉堅強者生小弱者死
人爲百藥所中傷脉澁而疾者生微細者死洪大而

遲者生千金遲作速
人病甚而脉不調者難治脉洪大者易瘥
人內外俱虛身體冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆
體不得安靜者死脉實滿手足寒頭熱春秋生冬夏
必死矣
老人脉微陽羸陰強者生脉大而加加者死陰弱陽
强脉至而代期月而死
尺脉濇而堅爲血實氣虛也其發病腹痛逆滿氣上
行此爲婦人胞中絕傷有惡血久成結瘕得病以冬
時黍當赤而死

尺寸緊細而微者血氣俱不足細而來有力者是穀氣不
充病得節輒動棗葉生而死此病秋時得之左手
寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸至關關至尺三部
之位其脉動各異不同其人病仲夏得之此脉桃花
落而死
右手寸口脉偏沉伏乍小乍大朝浮大而暮沉伏浮
大卽太過上出魚際沉伏卽下不止關中往來無常
時復來者榆葉枯而死
右手尺部脉三十動一止有須臾還二十動止乍動
乍疎連連相因不與息數相應其人雖食穀猶不

愈蘩草生而死
右手尺部脉四十動而一止止而復來來逆如循張
弓弦絙絙然如兩人共一索至立冬死

病機

諸風掉眩皆屬於肝甲乙木也木鬱達之
諸寒收引皆屬於腎壬癸水也水鬱泄之
諸氣膹鬱皆屬於肺庚辛金也金鬱折之
諸濕腫滿皆屬於脾戊己土也土鬱奪之
諸痛痒瘡瘍皆屬於心丙丁火也火鬱發之
諸熱瞀瘛皆屬於火

□泄皆屬下 下謂下焦肝腎氣也人守司於下腎之氣也門戶束要肝之氣也故□□□□屬下也厥謂氣逆也固謂禁固也非氣逆□久□□固不禁出入無度燥濕不恒皆由下焦主也

諸病喘嘔皆屬於上 上謂上焦心肺氣也炎熱薄爍承熱分化肺之氣也熱鬱化上故病屬上焦

諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火熱之內作

諸頸項強皆屬於濕太陽傷濕

諸逆衝上皆屬於火炎上之性用也

諸脹腹大皆屬於熱熱鬱於內肺脹於上

諸躁狂越皆屬於火熱盛於胃及四末也

諸暴強直皆屬於風陽內鬱而陰行於外

諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱

諸熱胕腫疼酸驚駭皆屬於火

諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱反戾筋轉也水液小便也

諸病水液澄清澈冷皆屬寒 上下所出及吐出溺出

諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱

故大要曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝疏其血氣令其調達而致和平此之謂也五勝謂五行更勝也

標本運氣歌

少陽從本爲相火太陰從本濕上坐厥陰從中火是家陽明從中濕是我太陽少陰標本從陰陽二氣相包裹風從火斷汗之宜燥與濕兼下之可萬病能將火濕分徹開軒岐無縫鎖

辯十二經水火分治法

膽與三焦尋火治肝和包絡都無異脾肺常將濕處求胃與大腸同濕治惡寒表熱小膀溫惡熱表寒心腎熾十二經最端的四經屬火四經濕四經有熱有寒時攻裏解表細消息濕同寒火同熱寒熱到頭無兩說六分分來半分寒寒熱中停真浪舌休治風休治燥治得火時風燥了當解表時莫攻裏當攻裏時莫解表表裏如或兩可攻後先內外分多少敢謝軒岐萬世恩爭奈醯雞笑天小

治病

不讀本草焉知藥性專泥藥性決不識病假饒識病未必得法識病得法工中之甲

六陳

藥有六味陳久爲良狼茱半橘枳實麻黄

十八反

本草名言十八反半蔞貝歛及攻烏藻戟遂芫俱戰草諸參辛芍叛藜蘆

運氣歌

病如不是當年氣看與何年運氣同只向某年求治法方知都在至真中

五不及

坎一丁三土五中一七癸九是災宮勝復都來十一位誰知臟腑與宮同、

斷病人生死

靈樞經云人有兩死而無兩生陽氣前絶陰氣後竭

其人死身色必青陰氣前絶陽氣後竭其人死身色必赤故陰竭則身青而冷陽竭則身赤而濕

四因、

夫病生之類其有四焉一者始因氣動而內有所成二者始因氣動而外有所成三者不因氣動而病生於內四者不因氣動而病生於外

因氣動而內成者謂積聚癥瘕瘤氣癭起結核癲癇之類是也

不因氣動而病生於內者謂留飲澼食饑飽勞損宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類

不因氣動而病生於外者謂瘴氣賊魅蟲蛇蠱毒蜚尸鬼擊衝薄墜墮風寒暑濕斫射刺割捶朴之類也

如此四類有獨治內而愈者有兼治內而愈者有獨治外而愈者有兼治外而愈者有先治內後治外而愈者有先治外後治內而愈者有須解毒而攻擊者有須無毒而調引者凡此之類方法所施或重或輕或緩或急或收或散或潤或燥或軟或堅方士之用見解不同各擅已心好丹非素故復問之

五苦六辛

五苦六辛從來無解盖史家闕其義也一日麻徵君

以此質疑于張先生先生亦無所應行十五里忽然有所悟欣然迴告于麻徵君以爲五苦者五臟爲裏屬陰宜用苦劑謂苦補瀉爲陰六辛者六腑爲表屬陽宜用辛劑謂辛甘發散爲陽此其義也徵君大服其識鑒深遠恨昔人不傳之妙故曰知其要者一言而終不知其要者流散無窮

儒門事親卷之十五

戴人張子和著
新安吳勉學校

瘡瘍癰腫第一

治螻蛄瘡

良薑　白芨　瀝青　已上各等分

右爲細末嚼芝蔴水同熬爲膏入冷水共定用緋絹片火熨斗作膏藥貼瘡上

又方千年石灰　茜根燒灰

右爲細末用水調雞翎塗上

水沉金絲膏　貼一切惡瘡

瀝青　白膠　已上各一兩　春秋宜用油

夏宜油臈二錢半　冬宜用油蠟四錢

右件鎔開油蠟下瀝青白膠用槐枝攪勻綿子濾過入冷水中扯一千餘遍如瘡透了喫敗先作劑於瘡口填者亦妙攤紙上貼勿令火炙

乳香散　治下疳

乳香　没藥　輕粉　黄丹　龍骨　烏魚骨

黄連　黄芩　銅綠　已上各等分　麝香少許

右爲細末先以温漿水洗過貼瘡瘡上

治蛇傷方

右用蒲公英科根作坐貼于傷處用白麪膏藥貼之大効

紫金丹　治疔瘡

白礬四兩　黄丹二兩

右用銀石器内鎔礬作汁下丹使銀釵子攪之令紫色成也用文武火無令太過不及如有瘡先以週圍挑破上藥用唾津塗上數度着無令瘡乾其瘡潰動取疔出也兼瘡顏色紅赤爲効如藥末成就再杵碎炒令紫色

治疔瘡

生蜜與隔年葱一處研成膏

右先將瘡週廻用竹鍼刺破然後用瘡藥於瘡上攤之用緋絹蓋覆如人行二十里覺疔出然後以熱醋湯洗之

千金托裏散　治一切發背疔瘡

連翹乙兩　黄耆乙兩半　厚朴乙兩　川芎乙兩

防風一兩　桔梗一兩　白芷乙兩　芍藥乙兩

官桂乙兩　木香三錢　乳香二錢半　當歸半兩

没藥一錢　甘草乙兩　人參半兩

右爲細末每服三錢用酒一碗盛煎三沸和滓服
服膏子貼之

二聖散　治諸瘡腫

黃丹二兩　白礬一兩飛

右爲細末每服乾摻瘡口上後用保生錠子捏作
餅子貼之

保生錠子

巴豆四十九箇另研文武火炮熟　金脚信二錢　雄黃三錢
輕粉半匣　硇砂二錢　麝香二錢

右件爲末用黃蠟一兩半化開藥將和成錠子冷

水浸少時取出旋捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥
破每用貼一餅子次用神聖膏藥封貼然後服托
裏散若瘡氣透裏危者服破棺散用神聖膏貼之

神聖膏藥　貼治一切惡瘡

當歸半兩　沒藥三錢　白芨二錢半　乳香二錢
藁本半兩　琥珀二錢半　黃丹四兩　木鱉子五箇去皮
膽礬乙錢　粉霜乙錢　黃蠟二兩　白膠三兩
巴豆二十五箇去皮　槐柳枝一百二十條各長一把　清油乙斤

右件一處先將槐柳枝下油內煮焦取出次後下
其餘藥物煮得極焦亦撈出却將油澄清再熬成
膏子用緋絹上攤貼之

破棺丹

大黃乙兩半　甘草二兩　荊三稜乙兩半　山梔子二兩半
牽牛末二兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服半丸食後酒
半盞研化服之忌冷水

三聖散　治臁瘡疔瘡搭手背疽等瘡

葱白一斤　馬莧一斤　石灰一斤

右三味濕搗爲團陰乾爲細末貼瘡如有死肉者
宜先用潰死肉藥

潰死肉藥方

炊飯尖半兩各三等　一等半兩入巴豆二箇
一等半兩入巴豆三箇　一等半兩入巴豆五箇各搽作白餅子

右先用二巴豆納瘡如不潰再用納三巴豆又不
潰用五巴豆者更用丹砂炒紅色摻瘡口追出清
水其惡肉未盡至追出赤水是惡肉盡更用三聖
散貼之用膏藥傅之

治臁瘡久不愈者

用川烏頭黃蘗各等分爲末用唾津調塗紙上貼

之大有効矣

治一切惡瘡方

以天茄葉貼之或爲細末貼之亦妙

又方　用臘月人中白燒灰油調塗瘡痂上

又方　以乾松不拘多少陰乾爲末先用槐枝葱白湯洗之過摻之立効灸瘡久不斂者更妙

又方　以蒲公英搗之貼一切惡瘡諸刺

替鍼丸　治一切惡瘡

川烏二錢　草烏二錢　五靈脂二錢

輕粉一分　粉霜一分

又方　加班猫二十箇去足翅　巴豆二十箇去皮用

右將三件爲末研令勻次入輕粉粉霜研勻又入班猫巴豆以水調糊爲錠子如作散子[illegible]

懸蔞散　治發背惡瘡

懸蔞一箇　大黃一兩　金銀花一　當歸半兩

皂角刺一兩

右剉碎用酒一椀煎至七分去滓溫服如有頭者加黍粘子

治附骨癰及一切惡瘡

當歸半兩　甘草一兩　山梔子十二箇　木鼈子一箇

右爲細末每服三五錢冷酒調服之

治諸惡瘡

白殭蠶直者　大黃二味各等分

右爲細末生薑自然汁與蜜同和爲劑丸如彈子大每服一丸細嚼

治惡瘡死肉錠子

巴豆一錢去皮油　五靈脂半兩　黃丹二錢飛

加枯白礬一錢

右爲細末以糊和丸錠子入瘡内用之

當歸活血散　治瘡瘍未發出内痛不可忍及婦人

產前後腹痛

當歸二錢　沒藥一錢　乳香半錢　白芍藥三錢

瘡瘍者加人參木香婦人加赤芍藥

右爲細末每服一錢水一中盞煎至七分和滓溫服日二服婦人酒煎瘡既發不須用

治惡瘡方

紫花地丁一名米布袋

右取根曬乾用四箇半頭塼壘成爐子燒著地丁用絡絲塼一枚蓋了使令塼眼内煙出薰惡瘡出黃水自愈

治蛇瘡
用蒲公英科根作埿貼于傷處用白膏藥封之
接骨散 并治惡瘡
金頭蜈蚣一箇 金色自然銅半兩燒紅醋淬研爲細末水飛之
乳香二錢爲細末用之 銅錢重半兩者取三文或五文燒紅醋淬研細
金絲水蛭一錢半每箇作三截瓦上煿去氣道爲度 沒藥三錢研細
右爲細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見得
出腰先用粗藥末少許小油少半匙同打勻再入
少半匙再打勻又入前藥接骨散半錢再都用銀
釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛天明

一宿自破便効如打折骨頭并損傷可用前項接
骨散半錢加馬兜苓末半錢同好酒一大盞熱調
連滓溫服如骨折損立接定不疼如不折了喫了
藥立便止住疼痛此方屢經効驗不可具述服藥
覷可以食前服食後服又外用接骨藥
陳爛麻根兩把半斤約乙對 亂絲一握多者更妙
右取肥松節劈碎約量多少先放三兩根於新瓦
上都於上外三味在上燒着存性就研爲末如生
再燒研爲度後入五靈脂或半兩如疼入好乳香
少許和藥如茶褐色爲度用布條子約纏一遭先
攤小黃米粥勻上撒上藥末勻纏定折處上又用
軟帛三五重上又竹箄子纏𦁀得緊慢得中初三
日換上一次再後五日換一次又七日再換上一
次無有不接者
赤龍散 消散一切腫毒
用野葡桃根紅者去粗皮爲末新水調塗腫上頻
掃新水
便癰方本名血疝
牡礪 大黃 甘草已上各半兩 懸蔞乙箇
右酒浸露一宿服之以利爲度

又方 冬葵子爲末酒調下三兩服
又方 皂角不蛀者燒過陰乾爲末酒調服立効皂
角子七箇水調服之亦効
又方 胡桃七箇燒過陰乾研爲末酒調服之不過
三服大効
又方 生蜜米粉調服休喫飯利小便爲度
治瘡無頭者
蛇退皮於腫處貼之
又方 皂角刺燒灰陰乾
右爲末每服三錢酒調嚼葵菜子三二五箇以荊藥送

千大効

生肌歛瘡藥

白歛　定粉各等分　黄丹少許

右同為細末洗淨瘡口乾貼之

治諸瘡水度腫者

生白礬末水調塗之自消

接骨藥

銅錢半兩醋淬焦燒研為末　木香一錢　自然銅一錢

射香少許

右為極細末如在上食後每服三匙頭嚼丁香一

枚乳香一粒無灰酒一小盞在下食前如不折其

藥反出服罷其痛不可當勿疑待一日如骨未接

再服如前老者十餘日少者不過五七日

萬聖神應丹出箭頭

莨菪科一名天仙子取看中一科根本枝葉花實全者佳

右於端午日前一日持不語尋見莨菪科言道先

生你却在這裏那道罷用柴灰自東南為頭圍了

用木椑子撅取了根週廻土次日端午日未出時

依前持不語用钁口一钁取出上用淨水洗了不

令雞犬婦人見於淨室中以石臼擣為泥丸如

千大丸丹為衣以紙袋封了懸於高處陰乾如有

人著箭不能出者用緋絹盛此藥放臍中用綿

裹肚繫了先用象牙末於瘡口上貼之後用前藥

如瘡口生合用刀子利開貼之

治凍瘡

臘月雀腦子燒灰研細小油調塗凍瘡口上

又方　以正黄蘗為細末用乳汁調塗瘡口上

又方　以山藥少許生於新瓦上磨為泥塗瘡口上

治手足裂

白芨不以多少為末水調塗裂處

治面上瘡

用鏊子底黒煤於小油中以匙打成膏子攤在紙

上貼瘡神効

治金瘡血不止

用白薇末貼之立止

善應膏藥

黄丹一斤　南乳香另研　沒藥另研　當歸

木鱉子生用　白歛生用　白礬用　官桂一十

杏仁生　白芷各二錢　新柳枝各長一寸一斤

右除黄丹乳沒等外八件用芝麻油五斤浸一宿

用鐵鍋內煎令黃色藥不用次入黃丹鍋內柳條攪令黃色方可擾下用柳枝攪出大煙入乳沒勻令冷傾在磁盆內候藥硬用刀子切作塊油紙裹

接骨丹

五靈脂 乙兩　茴香 乙錢

右二味為細末另研乳香為細末於極痛處摻上用小黃米粥塗了後用二味藥末摻於上再用帛一子裹了用木片子纏了少壯人二日効老者五六日見効矣

治癬如聖丸

黃蘗　黃芩　黃連　防風　已上各半兩

白殭蚕 乙兩　全蠍 三分　輕粉 半錢

右為細末羊蹄根汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二三十丸嚼羊蹄根汁送下隨病人上下分食前後又羊蹄汁塗癬

治小兒癬雜瘡

白膠香　黃蘗　輕粉

右為細末羊骨髓調塗瘡上

治瘰癧方

斑猫 去頭翅足　赤小豆　白殭蚕　苦丁香

白丁香　磨刀泥

右各等分為細末十歲已上服一錢二十已上服二錢五更用新汲水一盞調下比至辰時見効女人小便見赤白色三兩次男子於大便中見赤色白色為効當日服白粘粥不得喫別物大忌油膩患三四者只一服七八年者再一服

玉餅子　治瘰癧一切惡瘡軟癤

右用白膠一兩磁器內鎔開去滓再於磁開後以萆麻子六十四箇作泥入膠內攪勻入小油半匙頭柱點水中試硬軟添減膠油如得所量瘡大小以緋帛攤膏藥貼之一膏藥可治三五癤

又方治瘰癧

小龍肚腸 一條炮乾　鱉殼裙襴 炒　川練子 五箇

牡礪　大黃　牛蒡子 炒各　皂角子 五十箇

右為細末蒸餅為丸如菉豆大每服十五丸食後艾湯下日三服

又方將臘月貓糞用新瓦兩箇合在內外用鹽泥固濟燒成灰以小油調塗瘡口上

又方取小左盤龍不以多少為末陳米飯中和丸小丸如梧桐子大每服三五十丸却用陳米湯送下

治眉煉頭瘡
小麥不以多少燒令黑色存性爲末以小油調塗
瘡上
治小兒瘑瘡
羊糞熬湯洗去痂用屋懸煤炒黑爲末以小油塗
瘡上
聖靈丹　治打撲肭損痛不可忍者
乳香三錢另研　烏梅五箇去核細切焙乾爲末　白萵苣子二兩八錢炒黃擣爲末　白米一撚另研細末
右再入乳鉢內研數百下煉蜜爲丸如栗大細嚼
熱湯下病在上食後在下食前

出醫方
右用蕎麥稭一擔不爛者燒灰存性入石炭半斤
同灰一齊過令火滅然後以熱水霖灰篙淋下灰
水用鐵器內煮以篠起攪成膏子於瘤上點自出
或先以草莖刺破亦可
又方桑柴灰石灰淋汁熬成膏草莖刺破點以熱水
沃之忌油膩等物
燒湯火方
多年廟上物與走獸爲末小油調塗燒湯火瘡效

又方生地黃汁入小油蠟同熬成膏磁器內盛用
翎掃瘡處
又方培上青苔燒灰小油調塗燒湯處
治燒燙方
生地黃旋取新者爛搗取自然汁入小油黃蠟少
許銀石器中熬成膏子用雞翎掃瘡上
又方飯甑底灰用臘猪脂調塗
又方寒水石燒過爲細末水調塗之
枯瘤方
砒　硇砂　黃丹　雄黃　粉霜　輕粉

已上各等一錢　斑猫二十箇生用　朱砂乙錢
乳香三錢　沒藥乙錢
同研爲末粥糊爲丸捏作棊子樣曝乾先灸破瘤
頂三炷爲則上以瘡藥餅蓋上用黃蘗末以水調
貼之數日自然乾枯落下
又方以銅綠爲末草刺破瘤摻在上以膏藥塗之
治頭面生瘤子用蛛絲勒瘤子根三二日自然退落
乳香散　貼杖瘡腫痛
大黃　黃連　黃蘗　黃芩　已上各三錢
乳香另研　沒藥另研已上各乙錢　腦子少許

右四味爲末後入三味冷水調勻攤於緋絹上

枎瘡上

治痔瘡方

馬明退燒灰三錢　輕粉少許　乳香少許

右研爲細末先以溫漿水洗淨乾摻之

治痔瘡久不愈者

海浮石燒紅醋淬數次　金銀花

右海石二停金銀花一停同爲細末每服二錢半如茶一般日用二服瘡在上食後在下食前服如病一年服藥半年則愈

瀉肺湯　治肺癰喘急坐卧不安

桑白皮剉炒　甜葶藶隔紙焙各乙兩

右二味粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服以利爲度

桔梗湯　治肺癰吐膿

桔梗剉炒乙兩半　甘草生剉半兩

右爲粗末每服六七錢水二盞煎至半盞去滓空心服須臾吐膿立愈

黄蘗散　治鵝巢微腰等瘡

黄蘗　白芨　白斂　已上各等分　黄丹少許

右爲細末凉水調塗

口齒咽喉第二

地龍散　治牙痛

地龍去土　玄胡索　蓽撥　已上各等分

右爲細末每用一字用綿子裹隨左右痛於耳內塞之大效

牙宣藥

蓽撥　胡椒　良薑　乳香另研　麝香　細辛

青盐　雄黄　已上各等分

右爲細末先以溫漿水刷淨後用藥末於痛處擦追出頑涎休吐了漱數十次痛止忌油膩一二日

仙人散　刷牙

地骨皮二兩酒浸二宿　青盐乙兩　黍粘子乙兩炒

細辛乙兩酒浸

右爲細末入射香少許每用一字臨卧擦牙茶酒嗽良久吐出

又方　石膏　細辛　檳榔　已上各等分

右爲末擦之

治牙疳

米二停　鹽一停　盆礆　射香少許　白礬

右相合水拌匀紙包裹燒黑焦爲末貼瘡上立愈

治牙痛

口噙米水一口用大黄末紙撚蘸左右痛處鼻內任之立止

又方

韶粉一錢　好朱砂一錢

右爲末每用少許擦痛處

又方　好紅豆二錢　花椒少許

右爲末隨牙痛處左右鼻內嗃之

又方　華細辛去苗　白茯苓去皮　川升麻

蓽撥　青鹽　明石膏　川芎　不蛀皂角去皮酥炙黄色　已上各等分

右爲細末早晚刷牙温水漱之牙痛處更上少許

又方

以巴豆去皮用針刺於燈焰上炙令煙出薰牙痛處薰三五上

又方　高良薑一塊　全蝎一隻

右爲細末先用酸漿水漱牙次用藥末擦之流下涎水即愈

又方治牙疼　艾　牙坑痛立止

又方　枯白礬　之

治走馬咽痺

右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透如左右俱有者用二枚

又方

用生白礬研細塗於綿針上按於喉中立破綿針以榆條上用綿纏作棗大是也

又一法如左右喉痺於頂上分左右頭髮用手挽拔之剔然有聲立効此法年幼時常見鄭六嫂救人甚多不得其訣近與子正話及方得其傳

又一法以馬勃吹咽喉中立止

治喉痺

大黄　朴硝　白姜蚕

右件同爲細末水煎量度實用以利爲度

口瘡方

白礬一兩飛半生用　黄丹一兩炒紅色放下炒紫色爲度

右二味爲細末摻瘡上立愈

治倒睫拳毛

自疾避第三

將川山甲以竹箄子刮去肉用羊腰窩脂去皮膜

仍將川山甲於炭上炙令黃色用脂擦去山甲上一
如此數遍令酥為末隨左右眼喑水鼻內嗃一字
一月餘見効
又方
木鼈子三箇乾炒　木賊乙錢十節　地龍二條去土
赤龍爪乙錢二十箇則內刺針也
右為細末摘去倒睫每日以紙撚蘸藥嗃之一日
三五次
又方
穿山甲炮　地龍去皮　蟬殼　五倍子已上各等分
右為細末如用藥時先將拳毛摘盡後用藥一字
隨左右鼻內嗃之次日目下如線樣微腫是驗也
貼赤眼
取青泥中蛆淘淨曬乾為末赤眼上乾貼之甚妙
貼赤瞎
蘆甘石一兩　密陀僧乙兩　黃連　朴硝
右方先將黃連用水熬成汁入童子小便再同熬
後下硝又熬少時用火煅爐甘石紅黃連汁內淬
七次與密陀僧末同為末臨卧貼之
貼赤眼

銅碌　輕粉　牙硝　腦子少許　麝香
右為細末乾貼之
截赤眼方
黃連　綠礬　杏子　甘草　銅碌　各等分
右為粗末水煎洗甚効
碧霞丹　治赤眼暴發并治赤瞎
銅碌　白土　芒硝
右件各分為末丸如皂子大每用白湯研化一丸
洗之立効
汾州郭助教家神聖眼藥
蕤仁乙兩燒　金精石二兩　銀精石二兩　爐甘石四兩
赤石脂乙兩　滑石二兩　密陀僧二兩　高良
薑三兩　秦皮乙兩　黃丹乙兩飛過　銅碌二錢　硇砂
三錢　硼砂乙錢半　乳香三錢　盆硝少用　青塩
腦子　射香　已上并少用之
右用東流水三升先入蕤仁次下餘味等白沙蜜
一斤熬至二升以線絹細濾過澄清入前藥攪之
勻點大効
視星膏
白沙蜜一斤揀去蜜滓用十兩　密陀僧乙兩金色者研極細

水磨研細六七錢　新椰箬子（四個……半炒）
右用臘雪水五升與蜜鎔調入藥與椰箬子同入
於磁瓶中以椰木塞瓶口油絹封勒於黑豆鍋中
熬從朝至暮仍用椰棒攪瓶防傾側用文武火另
添一鍋豆水滚下旋於另鍋中取水添之熬成用
重綿濾滓却入瓶中用井水浸三兩日埋在雪中
更妙頻點為上

復明膏　治外障

白丁香（水飛研入九錢）　揀黃連（乙兩）　防風（去蘆）
蜜（一斤）……許一兩　新椰枝（方一寸者三片）

右好四味用新水一升半雪水更妙春秋兩三時
冬月一宿以銀石器內熬至六分濾去滓另用蜜
一斤滚陀傾研極細末三字入蜜攪勻另熬以無
漆匙攪點下蜜中急攪候沸湯定一人攪蜜一人
旋又傾藥汁都下在內攪勻再熬三兩沸色稍變
用新綿三兩重濾去滓盛器內點眼如常木方無
藥半合用片腦一麥粒大不用亦可

錠子眼藥

黃丹（飛乙兩）　黃蘗（半兩去皮）　黃連（半兩去鬚）　枯白礬（半兩）
爐甘石（半兩用黃連製）　銅碌（半兩）　硇砂（三錢）

川烏（炮三錢）　乾薑（二錢）　蝎稍（乙錢）　信（半錢火煅）
乳香（少許）　沒藥（少許）
右為細末入豆粉四兩洗蜜和就如大麥許錠子
於眼大眥頭待藥化淚出為効

治冷淚目昏

密蒙花　甘菊花　杜蒺藜　石決明　木賊（去節）
白芍藥　甘草（各等分）
右為細末茶清調下一錢服半月後加至二錢

又方　乾薑肥者為末每用一字浸湯點洗

又方　貝母一枚膩白者胡椒七粒為末點之

卒治目昏

荊芥穗　地骨皮　楮實（已上各等分）
右為細末煉蜜為丸桐子大每服二十丸米湯下

治一切目昏

川椒（乙斤微炒搗取紅約取四兩）　甘菊花（四兩末之）
生地黃（二斤取新者杵作泥極爛）
右將地黃泥與前藥末同和作餅子透風處陰乾
再為末以蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後
茶清送下

洗眼黃連散

當歸　赤芍藥　黃連　黃柏　各等分
右細剉以雪水或甜水浸煎汁熱洗能治一切風
毒赤目
諸物入眼中
好墨清水研傾入眼中良久即出
點攀睛瘀肉
黃丹（乙兩二錢水飛過曬乾）　白礬（乙兩銀器內化成汁）
右將白礬於銀器內化成汁入黃丹末在內以銀
匙兒攪勻更入乳香沒藥各一錢慢火不住手攪
令枯乾為粉候冷研極細熟絹羅過後入鵬砂一

錢半血竭二分射香少許輕粉三分粉霜二分共
研極勻如粉再以熟絹羅過細末點之大有神效
青金散
芒硝（乙兩）　螺青　沒藥一　乳香　巳上各少許
右為細末每用少許鼻內㗜之
治雀目
真正蛤粉（炒黃色為細末）
右油蠟就熱和為丸如皂子納於猪腰子中麻纏
蒸熟食之可配米粥
頭面風疾第四

治野雞風刺方
苦參（四兩）　紅芍藥　冬瓜　二味各四
玄參（乙兩）
右為末每用一字用手洗面上
猪蹄膏洗面上䵟藥
右用猪蹄一副刮去黑皮切作細片用慢火熬如
膏先用羅子濾過再入鍋內用蜜半盞又用
白芷　黑豆（去皮）　瓜蔞（乙兩）　白芨　白蘞
苓苓香　藿香　各一兩　鵝梨（二箇細切）
右將七味藥為末同梨入藥一處再熬滴水不散

方成以絹濾過臨卧塗面次日用漿水洗面
治面風
益母草灰麵湯和燒七遍洗面用之
治面䵟黑斑點方
白附子（乙兩）　白芨　白蘞　密陀僧　胡粉
白茯苓　巳上各等分
右為細末洗淨臨卧以乳汁調一錢塗面但洗先
淨牛乳亦可
治頭風
苦丁香　川芎　藜蘆　各等分

右爲細末噙水鼻內嗃之

芎黃湯 治頭目眩運

大黃 荊芥穗 川芎 防風 已上各等分

右爲粗末大作劑料水煎去滓服之以利爲度

耳聾方 萆麻子五十箇去皮

右與熟棗一枚同搗丸如棗子大更入小兒乳汁就和每用一丸綿裹納於聾耳內覺熱爲度一日一易如藥難丸日中曝乾

又方 口噙甘草一枚耳中塞二塊用綿裹立通

腦宣方

皂角不蛀者去皮弦子蜜炙搥碎水中揉成濃汁熬成膏子鼻內嗃之口中咬筯良久涎出爲度

治耳底方

以枯白礬爲末填於耳中立效

治鼻中肉螻蛄

赤龍爪 苦丁香 已上各三十箇

苦葫蘆子不以多少 射香少許

右爲末用紙撚子點藥末用之

胑臭方

烏魚骨三錢 枯白礬三錢 蜜陀僧一錢

右爲末先用漿水洗臭處後用藥末擦之

又方 蜜陀僧不以多少研細先以漿水洗臭處乾擦

烏頭藥

細針沙炒 蕎麵炒 已上各一盏

大麥亦同 釅醋半升與前二味打糊

凡用先使皂角水熱洗淨時前二味糊稀稠得所於髭鬢上塗之均勻先用荷葉包次用皮帽裹之三五時辰用溫漿水洗了却收取元針沙其髭鬢淨後用黑藥塗之黑藥方

沒食子 石榴皮 乾荷葉另搗 已上各一兩

五倍子 訶子皮 百藥煎 金絲礬

碌礬另研旋點當藥

右將七味爲細末炒熟麵五六匙入好醋打麵糊和藥末再塗髭鬢又用荷葉封裹後用皮帽裹之三五時間洗淨甚黑若更要黑光用猪膽漿水滓洗如鴉翎

又方 酸石榴 五倍子 芝麻葉

右同杵碎用絹袋盛之於鐵器內水浸揉髮自黑

治大頭病兼治喉痺方歌曰

人間治疫有仙方 一兩殭蚕二大黃

薑汁為丸如彈大　井花調鯊便清凉
又法　以砭針刺腫處出血立効
治時氣
馬牙硝　寒水石　黍粘子　鬼臼　川大黃
鬼箭草　已上各等分　腦子少許
右六味為細末用新井花水一盞藥末一二錢入
腦子喫外一半留用新水得稠雞翎掃在腫處有
風凉處坐
解利傷寒第五
雙解丸

巴豆六個去皮出　天麻二錢半　胭脂少許
右將巴豆天麻為末滴水丸如秫米大胭脂為衣
一日一丸二日二丸三日三丸巳外不解先喫冷
水一口後用熱水下如人行十里以熱湯投之
又一法無藥處可用兩手指相交緊扣腦後風府穴
向前禮百餘拜汗出自解
又一法適於無藥處初覺傷寒傷食傷酒傷風便服
太和湯百沸湯是避風處先飲半椀或以虀汁亦
妙以手揉肚覺恍惚更服半椀又用手揉至恍惚
更服以至厭飫心無所容探吐汗出則已

不卧散
川芎一兩半　石膏七錢半　藜蘆半兩去土
甘草二錢半生
右為細末口噙水鼻內各嗃之少時喫白湯半椀
汗出解之
川芎湯　解利一切傷寒
川芎　藁本　蒼朮
右三件為細末沸湯點三錢須臾覺嘔逆便解如
不解再服之
諸腰脚疼痛第六

皂角膏
右用醇酒二大椀皂角一斤去皮弦搗碎熬至一
半沸去滓再用前汁入銀石器熬為膏子隨痛處
貼之
治腰脚疼痛方
天麻　細辛　半夏　已上各二兩
右用絹袋二箇各盛藥三兩煮熟交互熨痛處汗
出則愈
牛黃白朮丸　治腰脚濕
黑牽牛　大黃　各二兩　白朮一兩

右為細末滴水丸桐子大每服三十丸食前生薑
湯下如要快利加至百丸

婦人病證第七

如聖丹 治婦人赤白帶下月經不來
枯白礬 蛇床子 已上各等分
右為末醋打麪糊丸如彈子大以胭脂為衣綿子
裹納於陰戶如熱極再換

誂誂丸 療婦人無子
當歸 熟地黃 已上各二兩 玄胡索
澤蘭 已上各一兩半 川芎 赤芍藥
白薇 人參 石斛 牡丹皮 已上各一兩

右為末醋糊為丸每服五十丸桐子大空心酒下

當歸散 治月經欲來前後腹中痛
當歸以米醋微炒 玄胡索生用 沒藥別研 紅花生用
右為末溫酒調下二錢服之

治產婦橫生 蓖麻子三十箇
研爛婦人頂上剃去髮少許以上藥塗之須臾覺
腹中提正便刮去藥却於脚心塗之自然順生也

治血崩 蚕沙不以多少
右為末每服三五錢熱酒調下服

又方 管仲去須剉碎
或用酒醋煎三錢煎至七分去滓溫服一服立止

當歸散 治血崩
當歸一兩 龍骨一兩燒赤 香附子三錢炒
椶毛灰半兩
右為細末空心米飲調下三四錢忌油膩雞猪魚
兎等物

蓮殼散
乾蓮蓬燒灰存性 椶櫚皮及毛各兩燒灰已上各半
香附子三錢炒
右為細末每服三四錢空心米飲湯調下服之

治婦人血崩 川大黃
右為末醋熬成膏就成雞子大作餅子酒磨化之

三分散 治產後虛勞不進飲食或大崩後
白朮 茯苓 黃耆 川芎 芍藥 當歸
熟乾地黃 已上各一兩 柴胡 人參
已上各一兩六錢 黃芩 半夏洗切 甘草炙
已上各六錢
右為粗末每服一兩水一大盞煎至七分盞去滓
服日二服

治產後惡物上潮痞結大小便不通
芒硝　蒲黃　細墨　各等分
右為末用童子小便半盞水半盞調下服之
治婦人產後虛弱和血通經
當歸焙乙兩　芍藥二兩　香附子三兩炒
右為細末每服一二錢米飲調下服之無時
治婦人產後惡物不出上攻心痛
赤伏龍肝　竈底焦土研細
用酒調三五錢瀉出惡物立止
治娠婦下痢膿血及咳嗽

白朮　黃芩　當歸　各等分
右為末每服三五錢水煎去滓食前加桑皮止嗽
百花散　治婦人產中欬嗽
黃蘗　桑白皮用蜜塗慢火炙黃色為度　二味各等分
右為細末每服一二錢水一盞入糯米二十粒同
煎至六分以欵冬花燒灰六錢攪在藥內同調溫
服之
治婦人吹妳
以樺皮燒灰存性熱酒調下三錢食後服之
又方　馬明退燒灰五錢　輕粉三錢　麝香少許

右為細末每服二錢熱酒調下服之
又方　以皂角燒灰蛤粉和熱酒將來調數字下得
喉嚨笑呵呵
又方　以淘米木杓上砂子七箇酒下以吹帚枝透
乳孔甚妙
欬嗽痰涎第八
九仙散
九尖萆麻子葉三錢　飛過白礬二錢
右用猪肉四兩薄批碁盤利開摻藥二味荷葉裹
文武火煨熟細嚼白湯送下後用乾食壓之

止嗽散
半夏乙兩半湯洗七次　枯白礬四兩
右二味為末生薑打麵糊和丸桐子大每服三二
十丸空心溫酒送下
八仙散
欵冬花　佛耳草　甘草　鍾乳　鵝管石
白礬　官桂　井泉石　已上各等分
右為細末每服三錢水煎服之又一方摻入喉中
三才丸　治嗽
人參　天門冬去心　熟乾地黃　已上各等分

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大含化服之

三分茶

茶二錢　蜜二兩　蕎麥麪四兩

右以新水一大椀約打千餘數連飲之飲毋良
下氣不可停人喘自止

石膏湯　治熱嗽

石膏亂文者一兩　人參半兩去蘆　甘草半兩炙

右為末每服三錢新水或生薑汁蜜調下亦可

三生丸　治嗽

胡桃仁乙兩　生薑乙兩去皮細切　杏仁乙兩

右二味同研為泥就和作劑可得十三四丸臨卧
爛嚼一丸可數服即止

化痰延壽丹

天麻半兩　枸杞子二兩　白茯苓乙兩半

半夏乙兩半湯洗七次用　乾生薑乙兩　人參乙兩

右為細末好糯酒拌勻如砂糖用蒸餅劑蒸熟去
皮杵臼搗四五十杵便丸如乾入酒三點丸如小
豆大每服三五十丸生薑湯下

半夏湯　治嗽欲死者

半夏乙兩洗　生薑二兩

右二味細切水二盞煎至八分去滓作二服遠

治肺痿喘嗽　漢防己

右為細末每服三錢漿水一盞同煎至七分和滓
溫服之

治年高上氣喘促睡卧難禁

右蘿蔔子搗羅為末白湯浸調五七錢食後服之
或炒或用糖蜜作劑為丸服之

麻黃湯　治因風寒衣服單薄致嗽

麻黃不去節　甘草生用　杏仁生用

右為粗末每服二三錢水煎食後溫服

心氣疼痛第九

失笑散　治急心痛并男子小腸氣

五靈脂半兩　蒲黃半兩炒

右為末每服二錢醋半盞煎二沸再入水半盞同
煎二沸空心食前和滓溫服之

又方　醋一盞加生白礬一小塊如皂子大同煎至
七分溫服立愈

又方　高良薑半兩　山梔子半兩　蔚茶半兩

又方　以新嫩槐枝一握切去兩頭水二盞煎至
一盞去滓分作二服熱服之

又方　沒藥　乳香　蒲黃　玄胡索 已上各等分
右爲末每服三錢水煎食後服之
小腸疝氣第十
抽刀散
川練子 乙兩破四分巴豆二十箇同炒黃色去巴豆用之
茴香 乙兩鹽炒黃色去鹽用之
右爲細末每服三錢葱白酒調下空心服之
治陰痛不可忍
吳茱萸 二兩洗七遍焙乾微炒　檳榔 乙兩　茴香 乙兩
右爲細末醋糊爲丸熱酒送下十丸食前服之

治偏腫　茴香　甘遂
右二味各等分爲末酒調二錢食前服之
又方　巴戟 去心　川練 炒　茴香 炒
各等分爲末溫酒調二錢服之
治小兒疝氣腫硬
地龍 不去土　爲末唾津調塗病處
治小腸氣痛
全蝎 乙兩　茴香 乙兩炒黃
右爲細末醋糊和丸如梧桐子大如發時每服五
七十丸溫酒送下食前服之

治小便渾濁如精之狀
沒藥　木香　當歸 已上各等分
右爲末以刺棘心自然汁爲丸如梧桐子大每服
五七十丸食前鹽湯下
治小便頻滑數不禁
知母　黃蘗 已上各等分
右剉碎酒浸透炒微黃爲末水丸梧桐子大如服
藥前一日休喫夜飯來日空心立服米飲湯下一
百丸只用一服効後喫淡白粥一頓
蕩疝丹
川練子 炒　茴香 炒　破故紙 炒已上各半兩

黑牽牛 二錢　青皮　陳皮 已上各三錢
廣茂 四錢　木香 四錢
右八味爲細末用好酒打麵糊爲丸如梧桐子大
空心食前溫酒下三十丸
灸疝法　放疝邊竪紋左右交弦灸七壯
腸風下血第十一
神應散　治腸風痔漏
牛頭角腮 乙隻酥中者　豬牙皂角 七挺　穿山甲
九片或四兩或四分取或一字取之　蝟皮 乙兩　蛇退皮 乙

右五味銼碎盛在小口磁器內鹽泥固定日中曬
乾瓶口微露出烟用文武火燒紅赤烟微少取
放冷為細末如服藥日先一日臨卧細嚼胡桃仁
半箇如糊用溫醇糯酒一盞送下不語便睡至次
日又五更服藥驗病年月遠近或秤三錢五七錢
用水半大碗醇糯酒半大盞相合熱和藥服之至
夏病再服
又一服再依前服藥不須用胡桃仁久病不過七服
忌油膩魚醬雞兔猪犬等物大有神効
溫白丸　治臟毒下血

樗根白皮 凡引者去粗皮酒浸曬乾服
右為末棗肉為丸如梧桐子大每服三五十丸淡
水送或酒糊丸
治脫肛痔瘻
胡荽子 升　乳香 少許　粟糠 半升或一升
右先泥成爐子止留一小眼可抵肛門大小不令
透煙火熏之
治脫肛
蔓陀羅花子　蓮殼 一對　橡椀 十六箇
右搗碎水煎三五沸入朴硝熱洗其肛自上

治痔漏下血不止
紫皮蒜 十箇獨科者外　大椒 六十箇　豆豉 四兩
右搗爛為泥丸彈子大空心細嚼一丸鹽湯下日
進三服効
治痔漏
白牽牛頭末 四兩　沒藥 一錢
右同為細末如欲服藥先一日不食晚飯明日空
心將獖猪精肉四兩燒令香熟薄批摻藥末在內
裹之漸又細嚼食盡然後用宿蒸餅壓之取下膿
血為効量病大小虛實加減服之忌油膩濕麵酒

色三日外不忌一服必効或用淡水煮肉熟用上
法亦可又云服前一日不食午飯并夜飯明日空
心用之
又方　黑白牽牛一合炒黃為末猪肉四兩切碎炒
熟與藥末攪勻只作一服用新白米飯三二匙壓
之取下白蟲為効
又坐藥黑鯉魚鱗二三甲以薄綿裹如棗扎樣納
之痛即止
淨肉丸　治痔漏下血痒痛
槐花 炒　枳殼 去穰　已上各一兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十丸
飲湯下空心食前十服見効

黃連貫衆散　治腸風下血

黃連　雞冠花　貫衆　大黃　烏梅已上各乙兩
甘草二錢炙　枳殼炮　荊芥已上各乙兩

右為細末每服二三錢溫米飲調服食前

槐荊丸　治痔漏

荊芥槐花等分為末水煎一大椀服丸亦可為之

又方　豆豉炒　槐子炒　各等分

右為末每服一兩水煎空心下

薰瀿藥　鳳眼草　赤皮葱　椒

三味擣粗同漿水滚過坐盆令熱氣薰痔但通手
瀿之如此不過三次愈矣

小兒病證第十二

治小兒脾疳　蘆薈　使君子　已上各等分

右為細末米飲調下一二錢服之

土筋散　治小兒馬脾風

甘草一寸煎水　甘遂末一字

右同油蜜生薑銀釵兒攪調下後用冷水半盞

奪命散

奪命散　治小兒胸膈喘滿

檳榔　大黃　黑牽牛　白牽牛　各等分半
當各半生熟用之

右為細末蜜水調服之

治小兒斑瘡入眼

麩炒蒺藜炙甘草　羌活防風等分擣為末
每服二錢漿水下　撥雲見日直到老

治瘡疹黑陷

鐵脚威靈仙一錢炒末　腦子一分

右為末用溫水調下服之取下瘡痂為効

治小兒黃瘦腹脹　乾雞糞一兩　丁香末一錢

右為末蒸餅為丸如小豆大每服二十丸米湯下

黃連散　治小兒頭瘡

川黃連　黃蘗去粗皮用　草決明　輕粉已上各半分

右為細末用生小油調藥於瘡上塗之立愈

治斑瘡倒壓方

胡桃一箇燒灰存性　乾臙脂三錢

右為末用胡荽煎酒調下一錢服之

又方　人牙燒灰存性研入射香少許每服三錢
酒調下少許服之不拘時

又方　小猪兒尾尖取血三五點研入腦子少許新
水調下食後與服之
又方　人中白臘月者最佳適風處以火煅成煤末
調三五錢陷者自出
消毒散　治瘡疹已未出咽喉腫痛
牛蒡子二兩炒　甘草半兩剉炒　荆芥乙分
右為粗末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫
服不拘時
治小兒斑瘡入眼
猪懸蹄甲二兩甘鍋內鹽泥固濟燒焦為末用　蟬殼二兩去土取末乙兩
羚羊角鎊為細末研之用

右二味為末研入羚羊角細末一分拌勻每用一
字百日外兒服半錢三歲已上服三錢新水或溫
水調下日三四服夜一二服一年已外則難治之
又方　透耳藥
朱砂乙錢　粉霜八分
右研為細末水調少許用匙杓頭傾一兩點於耳
內中後用
白菊花　菉豆皮　穀精草　夜明沙
右四味為末用米泔半椀熬成去滓入乾柿十箇

箇再同熬每日喫三兩箇仍飲煮乾柿湯
又方　治小兒斑瘡入眼
朱砂　腦子　水銀　射香　已上各等分
右四味研為細末用水銀調滴入耳中
發斑藥　珠子七箇研碎用新水調勻服之
破傷風邪第十三　陰毒傷寒亦附於此
辰砂奪命丹
鳳凰臺　川烏頭生已上各二錢　射香少許　朱砂少許
右為細末棗肉和為丸如彈子大朱砂為衣鰾酒
送下量病人年甲虛實加減用之小兒半丸以吐

為度不止以葱白湯解之
治破傷風
病人耳塞并爪甲上刮末唾津調塗瘡口上立效
無瘡口者難用
治破傷風
烏稍尾乙箇　兩頭尖兩箇　全蝎四箇
右三味為細末另用石灰五升柴灰五升沸湯五
升淋灰水澄清下藥熬之鐵鏞器內攪成膏子如
搊用唾津調先用溫漿水洗淨瘡口後
藥行吐黃水一

又方　天南星半生半熟　防風去蘆二味各等分

右為末清油調塗瘡上追去黃水為驗

又方　白芷生用　草烏頭尖生用去皮二味等分

右為末每用半錢冷酒一盞入葱白少許同煎服之如人行十里以葱白熱粥投之汗出立愈甚者不過二服

又方蜈蚣散

蜈蚣頭　烏頭尖　附子底　蝎稍以上四味各等分

右為細末每用一字或半字熱酒調下如禁了牙關用此藥斡開灌之

治陰毒傷寒破傷風

草烏頭七箇文武火燒熟去牙頭　麝香半錢　朱砂乙錢

右為細末每服一字以熱酒調下食前服之汗出為度忌猪兔魚鱉牯羖肉

治陰毒病者

用芥末以新水調膏藥貼臍上汗出為效

又方牡蠣乾薑末新水調塗手心握外腎汗出為效

諸風疾證第十四

不老丹　治一切諸風常服烏髭注顏明目延年

蒼朮四斤[illegible]

乙斤鹽三兩炒黃去鹽乙斤好醋一升煮盡　乙斤好酒乙升煮令盡

何首烏二斤米泔水浸軟竹刀子刮去皮切作片子用瓦甑先鋪黑豆三升乾棗二升上放何首烏上更鋪棗二升黑豆三升用炊單覆著上用盆合定候豆棗香熟取出不用棗豆

地骨皮去土二斤

右件於石臼內搗為細末後有椹汁搜和如軟麵劑相似瓷盆內按平上更用椹汁藥上高三指用紗綿帛覆護之晝取太陽夜取太陰使乾再搗羅為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下六十丸忌五辛之物

四仙丹

春甲乙採杞葉　夏丙丁採花

秋庚辛採子　冬壬癸採根皮

右為末以桑椹汁為丸每服五十丸茶清酒任下

起死神應丹　治癱瘓四肢不舉風痺等疾

麻黃去根節二十兩水五升熬去滓可成膏子五斤　白芷二兩　桑白皮二兩

蒼朮去皮二兩　甘松去土二兩　川芎三兩

苦參半三兩　加浮萍二兩

巳上各為細末用膏子和丸如彈子大每服一丸溫酒一盞化下臨卧服之微汗出勿虛如未安隔三二日再服手足即時軟伏及治卒中風邪涎

不利小兒驚風服之立効

愈風丹

芍藥 川芎 白殭蚕炒 桔梗 細辛去苗

羌活 已上各半兩 麻黃去節 防風去蘆

白芷 天麻 全蝎炙已上各乙兩 甘草三錢

南星半兩生薑製用 朱砂半兩為衣

為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒吞下

芎芷散 治偏正頭風

川芎 香附子炒 石膏亂紋者水飛 白芷

甘草 薄荷已上各乙兩 一方川烏頭半兩炮去臍皮用之

右為細末每服二錢溫酒或茶清調下服之

妙功十一丸 治癇

丁香 木香 沉香 乳香 射香 荆三稜炮

廣茂炮 黑牽牛微炒 黃連 雷丸炒

鶴虱炒 胡黃連 黃芩 大黃炮 陳皮

青皮 雄黃 熊膽 甘草炙各二錢半 赤小豆三百六十粒煮

白丁香直者三百六十箇 輕粉四錢 巴豆七粒

右二十三味為細末赤小豆爛煮研泥同蕎麪打糊和作十一丸朱砂為衣陰乾服時水浸一宿化一丸大便出隨病各有形狀取出為驗或作他一

歲不可再服曾經火灸者不治遠年愈効

朱砂滚涎散 治五癇

朱砂水飛 白礬生用 赤石脂 消石已上各等分

右同為細末研蒜膏如丸菉豆大每服三十丸食後荆芥湯下

又方 末砂不以多少水飛研為細末

右用猪心血浸蒸餅為丸如菉豆大每服二十丸空心金銀湯下之

治諸風疥癬及癩

浮萍乙兩 荆芥 川芎 甘草 麻黃已上各半

或加芍藥 當歸

右為粗末每服一兩水一椀入葱白根豆豉同煎至一半無時服汗出為度

治癲塗眉法

半夏生用 羊糞燒 已上各等分

右為末[illegible]自然汁調塗

五九散 [illegible]

地龍炒去土 蟬殼 白殭蚕 凌霄 全蝎

已上各等九箇

右同為末只作一服熱酒調下浴室中汗出粘臭

氣爲効

苦參散　治癘風

苦參（取頭末秤二兩）　猪肚（乙箇）

右以苦參末摻猪肚內用線縫合隔宿煮軟取出洗去元藥先不喫飯五頓至第二日先飲新水一盞後將猪肚食之如吐了再食之食罷待一二時用肉湯調無憂散五七錢取出小虫一二萬爲効後用皂角一斤不蛀者去皮弦及子捶碎用水四椀煮至一椀用生絹濾去滓再入苦參末攪熟稀麵糊膏子相似取出放冷後入餘藥和藥附後

何首烏（二兩）　防風（乙兩）　芍藥（五錢）

人參（三錢）　當歸（乙兩焙）

右爲細末入皂角膏子爲丸如桐子大每服三五十丸溫酒或茶清送下不拘時候日進三服後用苦參荊芥麻黃煎湯洗令

水腫黃疸第十五

治通身黃腫

苽蒂焙乾三四錢

右爲細末每用半字於鼻內吹上日一度併吹三日如不愈後用黃芩末之煎湯五錢下

治蠱氣

取環腸草不以多少曬乾水煎利小便爲度

治黃疸面目遍身如金色

瓜蒂（二十四箇）　母丁香（乙箇）　黍米（四十九粒）

右先擣瓜蒂爲末次入二味同爲細末每用半字夜卧令病人先噙水一口兩鼻內各半字吐了水令病人便睡至夜或明日取下黃水旋用熟帛搵了直候取水定便服黃連散病輕者五日重半月

黃連散　治黃疸大小便秘澁壅熱

黃連（三兩）　川大黃（乙兩剉碎醋拌炒過用之）　黃芩　甘草

炙　各一兩

右爲細末每服二錢食後溫水調下一日三服

治水腫不利小便非其法也故內經云濕氣在上以苦吐之濕氣在下以苦瀉之吐瀉後長服益元散加海金沙煎以長流水服之則愈矣大忌脚膝上針刺出水取一時之効後必死矣尤忌房室濕麵酒醋鹽味犯之必死

木通散　治水腫

海金沙　舶上茴香　巴戟　大戟　甘遂

芫花　木通　滑石　通草　巳上各等分

子065-676

右爲細末每服三錢以大麥麵和作餅子如當一
錢大爛嚼生薑湯送下

下痢泄瀉第十六

治痢

紫苑 桔梗 赤芍藥 白朮 已上各等分

右爲細末每服三五錢細切羊肝拌之作麵角兒
燒服之後用白湯送下食前

治痢

杜蒺藜炒碾爲末酒調下三兩服

香豉丸 治痢

蒜爲泥 豉爲末

右二味相和作丸如梧桐子大米飲湯下五七十
丸食前服之

治大人小兒吐瀉腹脹胸膈痞悶

五靈脂 青皮 陳皮 硫黃 玄硝 已上各等分

右將硝黃於銚子內以文武火鎔開用匙刮聚自
然結成砂子取出研碎與前三藥同末麵糊爲丸
如菉豆大小兒麻子大黃米大每服二十丸量虛實
加減米飲湯送下 無時

又方治瀉 車前子不以多少右爲細末每服二錢

米飲湯調下服之水穀分吐瀉止

諸雜方藥第十七

治消渴 揀黃連二兩入九節者良

右剉如㕮咀以水一椀煎至半椀去滓頓服立止

百日還丹

佛茄子 檉柳根 已上各等分

爲末枸杞汁和丸如雞頭大每服十丸新水送下

酒癥丸

巴豆十六箇 全蠍十五箇 雄黃乙塊 白麵五兩

右爲末滴水丸如豌豆大每一丸如痛飲者二丸

立應丸 治臟腑泄痢膿血不止腹中疼痛

乾薑乙兩炮另末 百草霜乙兩 巴豆連皮炒用乙兩

杏仁乙兩同巴豆和皮炒黑色杵爲泥後入霜研用

右用黃蠟四兩鎔開臘次入前四味用鐵器攪勻
旋丸桐子大每服三五丸甘草湯下白痢用乾姜
湯下食前若水瀉溫水下

反胃 黃蘗末熱酒調三五錢食後服之

治小便多 滑數不禁

金剛骨爲末以好酒調下三錢服之

又方 白茯苓去黑皮 乾山藥去皮白礬水內漬過慢火焙乾用之

右二味各等分爲細末稀米飲調下服之

治卒淋痛

芫花散三錢　茴香二錢微炒黃色

右爲細末水煎服之

治趼方

以水調白麵稀稠得所糊趼上以紙封之明日便乾如不曾破者剥去麵便行

治大便秘

生麻子不以多少研爛水調服之

坐劑治大便久秘攻之不透者用之

又用蚤不計多少慢火熬令作劑稀則粘手硬則脆稀稠得所堪作劑搓作劑樣如棗核大粗如筯長一寸許蘸小油内于肛門中坐良久自透有加鹽少許以素問鹹以軟之

交加飲子　治久瘧不已山嵐瘴氣

肉荳蔻（二箇一箇麵裹燒一箇）　草荳蔻（二箇同上法用）　厚朴（二寸一半生用一半熟用生薑汁製過用）　甘草（二寸半一半生用一半炙用）

生薑（二塊如棗大紙裹煨過半生半熟）

右爲末每服分一半水一椀銀石器内煎至一大盞去滓溫服發日空心未愈則再服

天真丸　補虛損

佛袈裟男用女女用男以新水四擔洗盡血水以酒煮爛爲泥

葳靈仙（乙兩）　當歸（半兩）　硇砂（乙兩）　蓮子肉（三兩炒熟）

乾地黃（乙兩酒浸）　廣茂（半兩）　甘草（二兩）　牡丹皮（乙兩）

牛膝（乙兩酒浸）　木香（半兩）　白朮（乙兩）　白茯苓（乙兩）

右爲細末與君主同搗羅爲細末酒浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服三五十丸三進日服

取雕青

水蛭取陰乾爲末先以白馬汗擦青處後用白馬

汗調藥塗之

治蚰蜒入耳中

右用猫尿灌耳中立出取猫尿用盆盛猫以生薑擦牙大妙

又方　黑驢乳灌耳中亦出

又方　以濕生蟲研爛塗於耳邊自出

辟穀絶食第十八

辟穀方

大豆五升（洗淨蒸三遍去皮爲細末）　大麻子五升（湯浸一宿漉出蒸三遍令口開去皮爲細末用）

糯米五升（淘淨同白茯苓一處蒸熟用之）

白茯苓五兩去皮同上糯米一處蒸熟爲用
右將麻仁末一處搗爛如泥漸入豆黄末同和勻
便團如拳大再入甑蒸從初更着火至半後夜住
火至寅時出甑午時曝乾搗爲末服之以飽爲度
不得喫一切物用麻子汁下第一頓一月不饑第二
頓四十日不饑第三頓一千日不饑第四頓永不
饑顏保日增氣力加倍如渴飲麻仁汁轉更不渴
滋潤五臟若待喫食時分用葵菜子三合爲末煎
湯放冷服之取其藥如後初間喫三五日白米稀
粥湯少少喫之三日後諸般食飲無避忌此藥大

忌欲事

又方　茯苓餅子
白茯苓四兩爲末　頭白麵一二兩
右同調水煎餅麵稀調以黄臈代油煿成煎餅臈
可用三兩飽食一頓便絶食至三日覺難受三日
後氣力漸生熟菓芝麻湯米飲涼水微用此小潤
腸胃無令涸竭開食時用葵菜湯并米飲稀粥少
少服之

又方　保命丹
人參五兩　麻子仁二兩炒去皮　乾地黄　瓜蔞子

又方　菟絲子酒浸已上各二兩　生地黄　乾大棗各一
兩　大豆黄一升去沫　黒附子乙兩生用乙兩炮去皮用之
白茯苓　茯神　地骨皮去粗皮　蔓精子煮熟用
杏仁去皮尖炒　麥門冬炒去心用　地膚子蒸七遍
黍米作粉　粳米作粉　白糯米作粉　天門
冬去心　車前子蒸　側栢葉煮三遍已上各二兩五錢
右同爲細末各揀選精粹者臈月內合者妙他時
不可合日月交蝕不可合如合時須揀好日淨室
焚香志心修合勿令雞犬婦人見又將藥末用臈
一斤半濾去滓白蜜一斤共二斤半一處溶開和

勻入臼杵二千下微入酥油丸如梧桐子大每服
十丸服至五日如來日服藥隔宿先喫糯米一頓
粳米白麵皆可次日空心用糯米粥飲送下如路
行人服遇如好食喫不妨要止便止如喫此小蒸
餅爛嚼嚥或乾果子以助藥力不喫更妙忌鹽醋
日後退下藥來於長流水中洗淨再服可百年不
饑矣

儒門事親卷之十五